LEHRBUCH DER NATURGESCHICHTE FÜR SCHULEN UND ZUM...

Gotthilf Heinrich Schubert

Digitized by Google

44. 9. 460

Erziehungs-Institut
von
Ph. Leyendecker
in Wiesbaden.
108.

Digitized by Google

Georg. Maguay
Dec. 1849.

Digitized by Google

Digitized by Google

Lehrbuch

der

Naturgeschichte,

für

Schulen und zum Selbstunterricht,

von

Dr. G. H. v. Schubert,

Hofrath und Professor in München.

Sechzehnte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Erlangen,

Verlag von Carl Heyder.

1849.

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorrede

zur sechzehnten Auflage.

Bei der Vergleichung dieser Auflage mit den zuletzt vorhergehenden wird man bemerken, daß der III. Abschnitt, welcher die Geschichte der Pflanzen behandelt, verschiedene Zusätze, der IV. aber, oder die Geschichte des Thierreiches, namentlich bei den höheren Klassen nicht nur Zusätze, sondern zum Theil auch eine andre (verbesserte) Anordnung erhalten habe.

Was die Zusätze betrifft, so sind dies zunächst Beschreibungen der gemeinnützigsten Gewächse oder einiger durch ihre Eigenschaften besonders interessanten Thierarten eines Welttheiles, dessen Naturkenntniß auch für uns Deutsche immer wichtiger wird, nämlich Amerikas. Diese ergänzenden Zusätze mögen vielleicht auch den Lesern und Besitzern meiner kleinen Jugendschrift, der neue Robinson genannt, nicht unwillkommen seyn, indem dieselbe außer der Beschreibung der merkwürdigen (nicht erdichteten) Schicksale des Philipp Ashton auch die

Digitized by Google

der reichen Natur der Insel Roatan in der Hondurasbay enthält, auf welcher Ashton mehrere Jahre lang ein Leben der Einsamkeit unter seinen Bäumen, Kräutern und Thieren führte.

Was die Veränderungen betrifft, die ich mir in der Anordnung, namentlich der systematischen Beschreibungen der Säugthiere erlaubt habe, so sind die Gründe für dieselben in der schon vor einigen und zwanzig Jahren erschienenen ersten Auflage meines größeren Werkes von verwandtem Inhalt: Geschichte der Natur genannt, so wie in der späteren Umarbeitung desselben näher entwickelt worden. In diesem eben genannten Buche finden auch die lateinischen Benennungen für die Mineralkörper ihre Rechtfertigung, und viele andre in diesem kleinen Lehrbuche nur kurz erwähnte Gegenstände ihre weitere vollständigere Erörterung.

München, 24. April 1849.

Der Verfasser.

Digitized by Google

I.

Von der Geschichte unsres festen Erdkörpers.

§. 1. Mit Recht haben mehrere weise Männer die große, schöne Natur um uns her, mit ihren Sternen, Bergen, Blumen und vielerlei Thieren, auch ein großes Buch Gottes für den Menschen genannt, was nur, statt der Buchstaben, worinnen die heilige Schrift verfaßt ist, in lauter Gestalten geschrieben ist. Auf jedem Blatte dieses großen Naturbuches steht auch von der Liebe Gottes zu den Menschen und zu allen seinen Geschöpfen geschrieben; eben so wie in der heiligen Schrift auf jedem Blatte von Gottes Weisheit und Größe.

Eigentlich ist freilich jedes kleine Thier und jedes kleine Pflänzchen, wenn man seinen innern Bau, und seine ganze Lebensart betrachtet, ein eben so wundervolles Werk und Zeugniß von Gottes Güte und unendlicher Allmacht, als das ganze schöne Weltgebäude und unsere große Erde. Aber der Mensch bewundert gewöhnlich doch das mehr, was als recht ungeheuer groß und gewaltig ins Auge fällt, und sieht erst nachher ein, daß er dieselben Wunder, die er dort im Großen anstaunte, auch im Kleinen bei und um sich hat. Wir wollen daher auch erst mit etwas recht Großem, mächtig ins Auge fallenden, mit der festen Erdmasse, anfangen, auf welcher dem Menschen und der ganzen ihn umgebenden Natur ihre Wohnstätte bereitet ist.

Tief ist der Mensch freilich noch nicht in die feste Erdrinde eingedrungen, die er bewohnt. Denn, obgleich die tiefsten Bergschächte in Tyrol und Böhmen vormals über 1500 Ellen (eine zu 2 Fuß gerechnet) und also gegen 12mal so tief hinunter in die Erde giengen, als die großen Thürme in Nürnberg hoch sind, oder 7mal so tief, als der große Thurm in Straßburg: so

Digitized by Google

ist das doch wie gar nichts zu rechnen gegen die Dicke unseres Erdkörpers, von seiner Oberfläche bis zu seinem Mittelpunkt. Denn diese Dicke beträgt gegen 20 Millionen Fuß oder nahe 46,000mal die Höhe des Straßburger Münsterthurmes.

Dagegen ist die Höhe, auf welche der Mensch hier auf seiner lieben Erdoberfläche, aus seinen Thälern und Ebenen hinaufgestiegen ist, schon ungleich beträchtlicher, und obgleich wir auf unserer Erde keine so gar hohen Berge kennen, wie auf dem Planeten Venus, wo es nach den neuesten Messungen der Astronomen welche geben soll, die 5mal so hoch sind, wie unsere höchsten; so ist doch schon der schöne Oertelerberg in Tyrol über 14000 Fuß, mithin 32mal so hoch, als der Straßburger Münsterthurm; und der Chimboraſſo in Amerika ist noch um etliche tausend Ellen höher, ja der Dhawalagiri-Berg in Asien ist mehr als noch einmal so hoch als der Oertelerberg, denn sein Gipfel ragt mehr als 13,000 Ellen hoch über die Meeresfläche hinauf.

Wenn man nun alles das, was die Menschen bei ihrem Hinabgraben in die Tiefe, welches freilich wegen des immer hinunterdringenden Wassers, und wegen der da unten sehr verdorbenen Luft gar schwer ist, zusammen nimmt, und dann mit dem vergleicht, was die Naturforscher beim Hinaufsteigen auf die höchsten Berge gefunden haben, so hat man Alles beisammen, was wir über den Bau des festen Erdkörpers aus unmittelbarer Anschauung wissen. Dieß besteht ohngefähr in Folgendem:

§. 2. Tief unter der Erdoberfläche, auf der wir wohnen, scheint es große Weitungen zu geben, die wohl meistens mit Wasser ausgefüllt seyn mögen. Denn bei starken Erdbeben, wie sie zuweilen in Asien und auch bei uns in Europa und Amerika zugleich waren, hat sich die Erschütterung öfters in sehr kurzer Zeit über eine Strecke von mehreren tausend Meilen, z. B. im Jahr 1755 von Lissabon bis hinüber nach Amerika verbreitet. Das ließe sich nicht leicht erklären, wenn man das Innere der Erde, von der Oberfläche hinein, als eine ganz solide Masse, ohne alle Höhlungen annehmen wollte, leichter aber, wenn man sich in der Tiefe Weitungen

Digitized by Google

denkt, die mit Wasser angefüllt, und unter einander im Zusammenhange sind, wodurch sich dann die Erschütterung von einer zur andern fortpflanzen muß. Manche solche Höhlen sind auch leer, und so weit nach oben gelegen, daß man zuweilen hineinsteigen, und ihr Inwendiges betrachten kann. Da sind nun freilich die Höhlen, die wir in unserm deutschen Vaterlande haben, wie die Baumanns- und Bielshöhle am Harz, oder die um Muggendorf in Franken, noch lange nicht die größten. Selbst jene Meilen weit sich fortsetzenden unterirdischen Gewölbe, zu denen die Adelsberger Grotte bei Triest und die Höhle des Cintrogebirges in Estremadura gehört, sind noch nicht die größesten, die man auf der Erde kennt, sondern schon Norwegen und die genauer bekannten Gegenden von Nordamerika haben Höhlen aufzuweisen, von unvergleichbar viel mächtigerem Umfange. In einer solchen Weitung der Tiefe verlor sich im Jahr 1344 plötzlich der wasserreiche Fluß Gaule in Norwegen, und es dauerte mehrere Tage, bis er die Räume derselben erfüllt hatte und an der Oberfläche wieder hervorbrechen konnte. In eine solche Weitung versank im Jahr 1702 unweit Friedrichshall in Norwegen (Distrikt Rake) der Hof Borge, mit dem ganzen zu ihm gehörigen Flächenraum, und das benachbarte Felsengebirge soll Oeffnungen enthalten, welche zu fast unergründbar tiefen Räumen führen. Die Höhle Dolsten auf dem Norwegischen Sundmör scheint sich unter das Felsenbette des Meeres fortzusetzen und endigt an unzugänglichen Abgründen. In Nordamerika hat noch niemand den Umfang der mächtig weiten unterirdischen Gewölbe überblickt, die sich im Gebiet von Warren County, in Kentuky eröffnen. Neunzehn Stunden lang hatte Ward diese Weitungen, deren viele er, wegen ihrer ungeheuren Ausdehnung, mit Städten verglich, nach verschiedenen Richtungen hin durchwandelt, ohne das Ende zu erreichen; die größte der Weitungen ist 6 englische Meilen vom Eingang entfernt. Und dennoch erscheinen die Höhlen, in welche der Mensch einzudringen vermag, meist nur als das obere Geschoß der großen, damit zusammen-

Digitized by Google

hängenden Räume, die ihm die Tiefe verbirgt. In dieser unbekannten Tiefe brauſt der Waſſerfall der Höhle bei Levington, in welcher Baker mit ſeiner Familie ſich verirrt hatte, ſo daß er erſt nach mehreren Tagen einen der beiden mächtig großen Ausgänge wieder fand; in ſolche Tiefen ſtürzen die Waſſer der Caſtletons- und Poolshöhle in England hinab.

§. 3. In der Tiefe der Erde muß aber auch, wenigſtens an vielen Orten, eine Urſache wirkſam ſeyn, welche große Wärme hervorbringt. Denn wenn man in manche Bergſchächte in England, die zum Theil unter den Meeresgrund hinabreichen, oder in die Bergſchächte vieler anderer Länder der Erde hinuntersteigt, findet man da nicht blos die gewöhnliche Wärme, die die Keller im Winter haben, und die nur daher kommt, daß die Kälte der Luft dahin nicht ſo eindringen kann; ſondern eine andere, ſelbſtſtändige Wärme, die immer zunimmt, je tiefer man hinabkommt, und die ihre Urſache tief unter der Erdoberfläche haben muß. Die Erde ſelbſt muß von innen heraus, außer dem, was die Sonne thut, Wärme verbreiten können, daher grünet und wächſt das Gras in Finnmarken tief unter dem Schnee fort.

Die feurigen und geſchmolzenen Maſſen, welche die feuerſpeienden Berge auswerfen, müſſen auch meiſt aus einer ſehr großen Tiefe heraufkommen, und wahrſcheinlich wohl eben daher, wo jene von unten herauf dringende Wärme ihren Urſprung nimmt. Der berühmte Reiſende A. v. Humboldt hat in den, gerade damals ganz ruhigen Schlund eines feuerſpeienden Berges hinunter geſehen. Da erblickte er in einer ungeheuern Tiefe, unten, in einer weiten Höhlung, drei unterirdiſche Bergſpitzen, aus denen Feuer und Rauch herausdrangen. Auch im Aetna ſieht man, wenn er ganz ruhig iſt, in der Tiefe unten das Feuer beſtändig aufwallen, die Lavamaſſe wie ein ſiedendes Waſſer immer heraufkochen, und wieder niederſinken. Aber der eigentliche Ort, von wo dieſe geſchmolzenen Maſſen emporbringen, muß von der Stelle, die man dort ſehen kann, wohl noch Meilen weit entfernt liegen. Denn

Digitized by Google

ehe der Vesuv oder Aetna zu speien anfangen, wird weit davon das Meer unten an seinem Grunde ganz siedwarm, so daß auch die dort liegenden eisernen Schiffsanker sehr heiß werden, und die Fische aus der Tiefe heraufkommen in die Nähe des Ufers, wo sie dann oft in gar großer Menge gefangen werden.

Daß der unterirdische Wirkungskreis der Vulcane sehr weit reichen müsse, zeigen die öfters über 30 Meilen weit gehenden Erdbeben, die bei ihren Ausbrüchen statt finden. Ueberhaupt sind alle die Erscheinungen, die bei großen vulcanischen Ausbrüchen vorkommen, sehr gewaltig und merkwürdig. Die Luft wird oft, bei denen auf Island, auf 30 Meilen weit umher so finster, daß man bei Tage Licht anzünden muß; auf das unterirdische Brüllen und auf das Beben der Erde folgen dann bergehohe Rauch- und Feuersäulen. Dabei scheint auch der Himmel in der Gegend des feuerspeienden Berges in Feuer zu stehen; Blitze fahren aus den Wolken herunter nach dem brennenden Schlunde, und Blitze fahren aus diesem hinauf, öfters so gewaltig, daß sie bei den Ausbrüchen des Katlegiaa auf Island Felsen durchbohrten, und in einem etliche Meilen weit entfernten Bauernhofe die Pferde im Stalle tödteten. Regengüsse stürzen nieder und machen die ausgeworfene Asche zu einem Schlammstrom, welcher im Jahre 79 nach Christo, in der Nähe des Vesuvs 2 Städte begrub, die man erst im vorigen Jahrhundert wieder zum Theil ausgegraben hat.

Die geschmolzene Materie, die nach oder bei solchen Ausbrüchen aus den Bergen hinausfließt, nennt man Lava; sie ist öfters, wie z. B. 1783 auf Island, in einer solchen Masse ausgeflossen, daß sie, wenn man sie zusammen nehmen könnte, ganze hohe Berge geben würde. Manche Vulcane, die Anfangs fast auf ebenem Boden ihre Oeffnungen hatten, haben sich aus jenen geschmolzenen und ungeschmolzenen ausgeworfenen Materien, nach und nach einen hohen Berg aufgebaut. Zuweilen ist auch die herausfließende Masse ein weicher, wässriger, heißer Schlamm, der erst nach und nach hart wird.

Digitized by Google

§. 4. Ein Theil der Quellen, besonders die heiſsen, mögen wohl auch aus groſser Tiefe heraufkommen, in der Gestalt von Dämpfen, die aber, wo es oben kälter ist, zu Wasser werden. Die meisten Quellen entstehen jedoch dadurch, daſs die kalten, dichten, hoch in die kühle Luft hinaufreichenden, oder waldbewachsenen Berge (denn ein im Schatten stehender Stein fühlt sich auch im Sommer viel kälter an, als ein Stück Holz, oder als die Luft) die Wolken und Wasserdämpfe aus der Luft an sich ziehen; eben so wie ein Stein oder Spiegel, welche man im Winter aus der Kälte hineinbringt in die warme Stube, und welche beide feucht werden. Das Wasser läuft dann an den Wänden der Bergritzen hinunter und fliesst unten als Quelle heraus.

Es giebt gar viele Quellen, die Salz, andere, welche Eisen oder Schwefeltheile in sich haben. Es giebt auch Quellen, wie z. B. den Bullenborn im Paderbornischen, die abwechselnd in regelmäſsigen Zwischenzeiten Wasser in Menge ausströmen, dann wieder damit einhalten.

§. 5. Die Quellen laufen zu Bächen zusammen, diese zu Flüssen, die Flüsse vereinigen sich zu Strömen, und diese gehen zuletzt groſsentheils ins Meer. Dieses verdeckt uns nun freilich, mit seinem Gewässer, das an manchen Orten wohl eben so tief seyn mag, als die höchsten Berge hoch sind, mehr denn $\frac{3}{4}$ von unserer Erdoberfläche. Aber unten im Meeresgrund ist wieder dieselbe Abwechslung von Höhen und Tiefen, von ganzen Bergzügen und Thälern, wie auf dem festen Lande. Man sieht dieses, wo sich solche unter dem Wasser gelegenen Berge bis hinan an die Oberfläche des Wassers erheben, mit bloſsen Augen, oder die Schiffsleute fühlen es und bemerken es mit ihren Ankern. Und als zum Beispiel der groſse feuerspeiende Berg Avatcha auf Kamtschatka im Jahre 1737 einen Ausbruch machte, da trat das Meer Meilen weit vom Ufer zurück und die auf die Höhen geflüchteten Bewohner der Küste sahen mit Schrecken in seine grause Tiefe, in seine Berge und Thäler, die nun aufgedeckt da lagen, hinein. Aber gleich darauf kam das Meer

Digitized by Google

wieder, und trat nun mit solcher Gewalt über das Ufer hinüber, daß es bis zu 180 Fuß Höhe hinaufstieg und viele ziemlich weit landeinwärts stehende Häuser und Bäume wegriß und wegspülte.

Wenn daher auf einmal das Meer abgelassen werden könnte, würde es in seiner Tiefe auch nicht viel anders aussehen, als auf unserer Erdoberfläche. Wir würden daselbst große, lange Sandflächen, und Berge von Kalk und Gyps erblicken, die sich aus dem anfänglichen Gewässer gebildet haben; sie alle untermischt mit häufigen Muscheln und andern Seethier-Ueberresten. Denn wenn man unsere meisten Berge ansieht, bemerkt man gar leicht, daß sie auch einmal unter Wasser gestanden, ja, daß sie in einem großen Meere und unter einem großen Meere gebildet worden sind. Viele von ihnen sind ganz erfüllt von Muschel- und Seethier-Ueberresten, und auf manchen Bergen von Neuholland, die sehr hoch sind und jetzt viele Meilen weit vom Meere, landeinwärts liegen, sieht man noch jetzt Corallenbäumchen aufrecht stehen, und der ganze Boden hat den Anschein, als wenn er plötzlich wäre vom Meere verlassen worden, von dem er einmal Jahrhunderte lang bedeckt gewesen war. Aber man braucht nicht so weit zu reisen, um etwas Aehnliches zu beobachten. Auch in und auf unsern Kalkbergen findet man Corallenarten und Muscheln, die nur im Meere gelebt haben und gewachsen seyn können. Man sieht es manchen unserer Sandgegenden an, daß einmal lange Zeit hindurch Wasser über ihnen gefluthet haben muß, und das Salz, welches manche unserer Berge und Ebenen in sich führen, muß auch noch aus jener Zeit herrühren, wo ein salziges Meer da stund.

Manche Naturforscher glauben: das Meer sey nach und nach kleiner geworden, und nehme noch jetzt ab. Denn einige Städte an der Ostsee und am Mittelmeere sind wirklich nach alten Aussagen und Zeugnissen ehedem näher am Meere gelegen als jetzt. Das Meer soll sich schon seit Menschengedenken hie und da so gesenkt haben, daß die Zeichen, die man vor etwa 60 Jahren an Felsenklippen, gerade an der Stelle, zu der

Digitized by Google

das Meer damals hinaufreichte, eingehauen hatte, jetzt schon ziemlich weit darüber herausragen. Aber andere, und eben so gründliche Naturforscher haben bewiesen, daß dieß nur an manchen Meeren und an manchen Orten so erscheine, daß aber das Meer seit mehreren Jahrtausenden weder um ein Merkliches angewachsen sey, noch auch abgenommen habe.

Es scheint also jene große Veränderung, wodurch viele unsrer Länder und Berge vom Meere, unter dem sie vorher stunden, verlassen und nun zum festen Lande wurden, auf einmal gekommen zu seyn. Ueberhaupt ist das nicht die einzige Veränderung, die mit unserm Erdboden vorgegangen seyn muß. Bei Canstadt, im Würtembergischen, bei Burgtonna, in Thüringen, und in gar verschiedenen Gegenden von Deutschland z. B. im Braunschweigischen und Hannöverischen, dann auch in Frankreich, ja sogar in dem kalten Sibirien, hat man Knochen ausgegraben, die von Elephanten, von Nashörnern und andern solchen Thieren herkamen, welche nur in sehr heißen Ländern leben können. Dabei auch an den nämlichen Orten Palmen, Bambusröhre und andere Gewächse aus warmen Ländern. Diese Thiere und Pflanzen, die oft mit einander, wie noch in ihrem jetzigen Vaterlande zusammen vorkommen, müssen einmal in jenen jetzt so kalten Ländern, eben so wie im nördlichen Amerika, wo man sie häufig findet, gelebt haben. Es muß demnach dort einmal viel wärmer gewesen seyn, als es jetzt ist.

Man kennt auch unter den ausgegrabenen Thieren der Vorwelt viele Geschlechter, von denen es jetzt, so viel man weiß, keine einzige Art mehr auf der Erde giebt. Unter diesen mögen nun freilich manche, besonders Muscheln und andre Seethiere seyn, welche, so wie die vielen Tausende von Blüthen, die man im Frühling an unsern Kirschbäumen aufbrechen und dann abfallen sieht, ohne daß Kirschen daraus werden, zwar gelebt, aber nicht in mehreren Generationen fortgelebt haben. Tausende von Arten und Abarten mögen zu dem lebendigen Gewimmel gehören, womit auf Gottes allmächtiges Schöpferwort das Meer sich erregte, als die Schichten des vom Leben durchwebten Kalkschlammes wie Blätter sich übereinander legten und die Mauern des nun hervortretenden Festlandes bildeten. Andre aber scheinen auch späterhin noch auf dem Erdboden fortgelebt und sich vermehrt zu

Digitized by Google

haben. Wir nennen hier, so wie weiter unten, einige der merkwürdigsten Arten, ohne entscheiden zu wollen, ob sie zu den schon lange vor der großen Fluth wieder abgestorbenen, oder zu den erst bei dieser umgekommenen Thieren gezählt werden sollten:

Das Weiland- oder Olimsthier, (Palaeotherium) hatte eine Rüsselschnautze und bildete ohngefähr ein eben solches Mittelgeschlecht zwischen Nashorn, Tapir und Schwein, als die Gemse zwischen Hirsch, Ziege und Schaf. Von diesem Geschlecht ließen sich 11 bis 12 Arten unter den in Frankreich, besonders aber bei Paris ausgegrabenen, Thierüberresten erkennen. Die eine, bei Orleans gefundene, war viel größer als ein Pferd (fast so groß als ein Nashorn), es gab aber auch etliche Arten, die nur so groß als unsere Schafe waren.

Ein anderes, ebenfalls ganz ausgestorbenes Geschlecht, aus dem sich die Knochen von fünf Arten bei Paris finden, ist das Barhaupt- oder Barmundthier (Anoplotherium) das weder einen Rüssel noch auch stark und hoch herausstehende Eckzähne, sondern vielmehr ein so gleichmäßiges Vordergebiß wie der Mensch, Backzähne wie das Rhinozeros, gespaltete Klauen wie ein Stier, und eine Ferse wie das Kameel hatte. Die eine Art war so schlank und leicht gebaut, wie eine Gemse, die andere Art hatte einen so plumpen Leib, wie ein Esel, zugleich aber so kurze Füße, und einen Schwanz, wie die Fischotter; noch eine Art war nur so groß wie ein Kaninchen.

Ein ganz besonderes Thier muß das Recken- oder Riesen-Faulthier (Megatherium) gewesen seyn, das auch Groß-Klauenthier (Megalonyx) heißt, wegen seinen überaus langen, scharfen Klauen. Dieses war von der Schnautze bis zum Ende des Rückens gegen 6 Ellen lang und 3 Ellen hoch. Im Bau, besonders des Kopfes, glich es einem Faulthiere und mag auch eben so schwerfällig beweglich gewesen seyn als dieses. Dabei hätte sich auch sonst Niemand vor ihm zu fürchten gehabt, denn es hatte weder Vorder- noch eigentliche Eckzähne, sondern blos Backzähne zum Kauen der Pflanzentheile oder der Schaaren kleiner weicher Thiere, von denen jenes Riesenfaulthier, entweder wie die jetzigen Faulthiere, oder wie die amerikanischen Ameisenfresser, lebte. Man hat zwei Arten von diesem Thiergeschlecht, beide in Amerika, ausgegraben.

Ein anderes, ebenfalls ganz ausgestorbenes Thiergeschlecht, das Mastodon, oder wie man es auch wegen des ersten Fundortes, an welchem es gegraben wurde, (am Ohiofluß in Nordamerika) nannte: das Ohiothier (Mastodon ohioticum) hatte freilich nahe Aehnlichkeit mit einem Elephanten, und die große Art, deren Knochen ziemlich häufig in Nordamerika gefunden werden, erreichte eine Höhe von 10 bis 12 Fuß, die beim asiatischen Elephanten nur selten ist, und zugleich eine größere Länge als dieser. Dabei hatte das Thier Füße wie ein Elephant, Stoßzähne und allem Anscheine nach

Digitized by Google

auch einen Rüssel wie dieser. Aber es hatte auch zugleich Zacken-Backzähne, fast so wie die fleischfressenden Thiere sie haben, (obgleich es bei seinem ganzen plumpen Bau und bei seinem Mangel an Vorderzähnen unmöglich ein Raubthier seyn konnte) und so viele lange Haare, wie sie der Elephant nicht hat. Von einer kleineren Art dieses Geschlechts hat man auch in Südamerika, in Asien (in der Tartarei) und in Europa, sogar bei uns an der Donau, Ueberreste gefunden.

Dagegen giebt es auch unter den ausgegrabenen Thieren solche, die wirklich zum Geschlecht der jetzigen Elephanten gehört haben, unter andern den häufig in Sibirien und selbst in Deutschland aufgefundenen Mammuths-Elephanten (Elephas jubatus). Doch besaß dieser, vielleicht als eigenthümliches Unterscheidungszeichen, lange Mähnen am Halse, übrigens aber eben so gestaltete Zähne, als der jetzige asiatische Elephant. Auch von einer andern Elephantenart, welche im Bau der Zähne der jetzigen afrikanischen glich, finden sich, wiewohl seltener, die Ueberreste.

Die Nashorn-Knochen, die man an verschiedenen Orten, namentlich in Deutschland, auffindet, müssen einem Thiere angehört haben, das dem jetzigen, zweihörnigen afrikanischen Nashorn sehr ähnlich, und von ihm nur durch einen etwas längeren Schädel und seinen starken Haarwuchs verschieden war.

Außerdem hat man die Ueberreste von Flußpferden, Tapiren, Hirschen und Elennthieren, letztere zum Theil mit sehr großen Geweihen, ausgegraben; manche Knochen von Ochsen, die öfters von ungeheurer Größe sind, und alsdann zu der Art des großen indischen Riesenbüffels zu gehören scheinen; von einer Pferdeart, unsrer jetzigen sehr ähnlich, und von mehreren Arten von Nagethieren entdeckt. Knochen von sehr großen Bären, von einer Hyänenart, die größer war als die jetzige, und von einem Löwenartigen Thiere, von Wolf- und Marderarten, so wie selbst vom Vielfraß, hat man auch häufig in den Höhlen der Kalkgebirge, namentlich in der Bielefelder so wie in den Muggendorfer und Gailenreuther Höhlen aufgefunden.

Vögelüberreste sind freilich selten, doch entdeckte man dergleichen in der Knochenbreccie einiger Küstengegenden des Mittelmeeres und in dem Gyps bei Paris, so wie im Kalkstein bei Oeningen. Bei Mastricht fand man in einem Kreideberge das Gerippe von einer ungeheuern Eidechsenart, die vom Krokodil ziemlich verschieden, und gegen 12 Ellen lang gewesen seyn muß (der Schwanz über 5 Ellen). Ueberreste von solchen großen Eidechsenarten oder Sauriern sind auch in Deutschland an mehreren Orten, namentlich bei Bayreuth, Banz und Altdorf unweit Nürnberg gegraben worden.

Eben so auch von Schildkröten und von unzähligen Fischen. Von den letzteren finden sich unter andern in dem Kupferschiefer, der unter dem ältesten Flötzkalkstein liegt (nach

Digitized by Google

S. 12), viele Ueberbleibsel, an denen man noch erkennen kann, daß manche von ihnen von Fischen herrühren, welche etwa zur Sippschaft der Häringe u. a. gehörten. Doch finden sich auch, besonders in Oberitalien, Ueberbleibsel von Arten, deren Familien jetzt nur noch in dem indischen Meere vorkommen.

An manchen Orten, wie z. B. in Sibirien, hat man Thiere der Vorwelt z. B. Mammuthe und Nashörner, mit Haut und Haaren und mit Fleisch gefunden, das noch für Hunde und Wölfe genießbar war. Es muß demnach die große Veränderung, wodurch es nach den Polen unserer Erde hin so kalt wurde, wie es jetzt ist, noch nicht viele Jahrtausende, und sie muß plötzlich geschehen seyn, denn nur in einem so kalten Lande, wie Sibirien, konnte sich das Fleisch solcher Thiere der Vorwelt in geringer Tiefe des Bodens so unzerstört erhalten.

Wie es nun damit zugegangen, und wodurch eine solche Veränderung entstanden sey, das wissen die Gelehrten selber nicht, wie sie denn überhaupt gar Vieles nicht wissen. Die heilige Schrift aber und die Sagen vieler Völker, in Europa, Asien und Amerika, erzählen uns von einer großen Fluth: von der Sündfluth, die über den ganzen Erdboden kam und seine höchsten Berge bedeckte, und wobei fast alle damals auf der Erde lebende Wesen zu Grunde giengen. Und an eine solche Fluth, nach deren Verlauf die Erdoberfläche ihre jetzige Gestalt erhielt, und ihr jetziges Klima, muß man glauben, wenn man allen Zeugnissen der Natur nicht geradezu ins Angesicht widersprechen will. Ein Theil des damaligen festen Landes scheint (wie noch jetzt einzelne Inseln) ins Meer versunken zu seyn; ein Theil des Meeresgrundes ist dabei emporgekommen und zum trocknen Lande geworden.

§. 6. Zwar führen nicht alle Berge solche Muscheln oder Seegewächse oder Salz bei sich, woraus man schließen könnte, daß sie ehemals Meeresgrund gewesen wären, aber alle, auch die, bei denen das nicht der Fall ist, sind offenbar (bis auf die wenigen aus vulcanischem Feuer erzeugten) aus einem wässrig formlosen Zustand hervorgegangen und im Wasser gebildet. Und das sagt uns auch die heilige Schrift, der freilich heut zu Tage manche Gelehrte immer gerne widersprechen wollen, die aber, sobald man nur die Natur recht genau ansieht, auch in solchen Dingen immer Recht behält, und ewig Wahrheit bleiben wird. Die Gebirge, die keine Muscheln, keine Steinkohlen und keine Salze enthalten, und dabei so aussehen, wie sie der §. 7 beschrieben wird, heißt man Urgebirge. Sie haben sich, wie man das

Digitized by Google

an manchen Orten in Norwegen, in Südtyrol und in der Schweiz sehen kann, auch noch zu einer Zeit gebildet, wo es schon ein belebtes Meer gab, und haben sich zum Theil über Lagen und zwischen Lagen erzeugt, in denen Seegeschöpfe eingeschlossen sind (woraus eben folgt, daß auch die Urgebirge in dem Elemente entstunden, worin solche Wesen leben können, nämlich im Wasser). Sie finden sich meist nur an den höchsten Stellen der Erde, und aus ihnen werden die meisten Erze: Zinn, Silber, Gold, Blei, Kupfer und Eisen gewonnen. Man findet diese Metalle großentheils in sogenannten Gängen, welche man allerdings zuweilen mit vormaligen Spalten in den Gebirgen vergleichen kann, die sich durch die hineingeflossenen Erzmassen ausgefüllt haben.

Die Gebirge, welche hauptsächlich aus Kalk, aus Sandstein, aus Gyps bestehen, welche viele Muscheln und Steinkohlen, uud auch Salz in sich führen, und noch andere Eigenschaften haben, die in §. 8 beschrieben werden, nennt man Flötzgebirge. Diese enthalten zwar im Allgemeinen nicht so viel Erze, als die Urgebirge, doch an manchen Orten einen sehr kupferreichen Schiefer, und auch anderwärts etwas Blei, Galmey und vieles Eisen.

Den losen Sand, Lehm, Töpferthon, die in unsern Ebenen und Thälern liegen, nennt man aufgeschwemmtes Land. In diesem findet man außer eben dem Lehmen und Töpferthon, und außer Braunkohlen, nicht viel Besonderes. Ueber allen diesen Gebirgsarten liegt dann die Damm- oder Gartenerde.

Das aufgeschwemmte Land bildet sich noch alle Jahre, so oft ein Fluß im Frühling oder nach großen Regengüssen austritt, und die Wiesen und Felder umher mit Sand oder thonigtem Schlamm überdeckt. Flötzgebirge bilden sich auch noch im Meer und am Meer, z. B. an der Küste von Sizilien, wo man an manchen Stellen häufig Sandsteine zu Mühl- und Bausteinen wegbricht, und immer wieder andere Sandsteine entstehen. So füllen sich auch jene Oeffnungen in Kalk- und Sandsteinen aus, und schließen sich, durch die noch, vielleicht vor nicht vielen Jahren, lebendige Kröten zum Winterschlaf hineinkriechen konnten, die man dann zuweilen noch lebend in solchen Steinmassen findet. Eigentliches, vollkommenes Urgebirge entsteht zwar jetzt nicht mehr vor

Digitized by Google

unsern Augen, wohl aber vielfältig solche kieslichte Massen, die im Urgebirge mit ein Hauptbestandtheil sind. Daher versteinert an manchen Orten Holz, z. B. das von Gerüstpfählen, schon nach wenig Jahren, und Oeffnungen in harten Feuersteinen schließen sich. Auch ein Theil der kleinen, sogenannten Aufgußthierchen legt nach seinem Absterben, durch die Anhäufung seiner kieselerdigen Schaalen den Grund zum Entstehen von Erdlagen, welche aus zarten Kieselkörnchen zusammengesetzt erscheinen.

§. 7. Die Urgebirge (**Montes primitivi**) finden sich, wie schon gesagt, meist an den höchsten Punkten des Landes, und wenn man z. B. von Nürnberg ausgeht, hat man erst ganz in der tiefen Ebene aufgeschwemmtes Land, steigt man höher auf die nahen Berge, so hat man Flötzgebirge, steigt man noch höher, so findet man (z. B. am Fichtelgebirge) das Urgebirge. Dieses besteht nicht mehr aus Kalkbergen oder aus Sandsteinen, sondern entweder aus jenem Thonschiefer, wovon unsere Schiefertafeln gemacht, und hie und da unsere Dächer gedeckt sind, und aus einem Schiefer, der oft weiß aussieht und wie Silber glänzt, weil er viel solche glänzende Blättchen in sich hat, die man Glimmer oder Katzensilber nennt, oder aus einem schwärzlich grünen Stein, oder aus Granit. Die Arten der Urgebirge sind:

1) Der Granit (**Pyropoecilos Granites**). An diesem erkennt man kleinere oder größere, flimmernde und glänzende Blättchen, die sich mit dem Messer in noch kleinere Blättchen spalten lassen: den Glimmer. An diese Blättchen ist ein Stein mit glatten Flächen angewachsen, der meistens weißlich oder röthlich aussieht, und wenn man ein Stückchen herunterschlägt, immer wieder glatte Flächen zeigt, dabei am Feuerstahl nur wenig Feuer giebt, dieser heißt Feldspath. Dann ist noch ein meist graulicher Stein in kleinen Körnern eingewachsen, der giebt am Feuerstahl viel Feuer, sieht aus wie Kieselsand und ist auch dasselbe, was der Kieselsand ist, nämlich Quarz.

Der Granit macht gar steile Wände, und große, runde Massen liegen um seine Berge hergestreut. Er giebt gute Bausteine. Als andere Arten des Glimmer-haltigen Urgebirges, welche mit zu dem Geschlecht des Granites gehören, lassen sich betrachten:

a) Der Gneuß (**Pyropoecilos foliaceus**), welcher mehr

Digitized by Google

Glimmer in sich hat, als der Granit und unvollkommen schiefrig ist, so wie

b) der von seinem vielen Glimmer silberartig glänzende, schiefrig gebildete Glimmerschiefer (P. schistosus), welcher auch Gestellstein (P. fornacum) heißt.

2) Der Thonschiefer (Schistus communis), wird auch Tafelschiefer (Sch. tabularis) genannt. Dieß ist eben der, meist blaulich oder graulich schwarze Schiefer, womit man Dächer deckt und woraus unsere Schiefertafeln und Schieferstifte für die Schulen gemacht werden.

Der Thonschiefer, so wie alle schiefrigen Gebirge, besonders aus der sogenannten Ur- und Uebergangsperiode, zeigen meist eine solche Stellung ihrer Schichten und Lagen, welche nach der Vermuthung der Gelehrten nicht die ursprüngliche gewesen seyn kann, in welcher sie sich aus dem Wassen niedergeschlagen und gebildet haben. Denn diese ursprüngliche Stellung war vermuthlich dem Gesetz der Schwere gemäß horizontal, statt daß die Lagen jetzt häufig sehr stark gegen den Horizont geneigt sind, ja fast senkrecht stehen. Bei solchen Trümmersteingebirgen, in denen gewaltige Felsenblöcke und Steingerölle auf den später zu Stein verhärteten Schlammgrund niedergesunken und hier mit eingewachsen sind, kann man, wenn man sie, wie in England, mit ihren Lagen fast senkrecht stehen sieht, vernünftiger Weise schon gar nichts Anderes annehmen, als daß diese Stellung erst später, da das Gestein schon gebildet und fest war, eingetreten seyn müsse, denn sonst wären jene Trümmermassen, ihrer Schwere gemäß, alle in die Tiefe hinuntergerollt. Um nun diese so allgemein in die Augen fallenden Thatsachen zu erklären, haben manche Gelehrte angenommen, die Granit- und andere Grundgebirge wären erst später, durch vulcanische Kräfte aus der Tiefe der Erde ausgestoßen worden, und dabei hätten sie die horizontal liegenden Schiefer durchbrochen und emporgehoben, so daß dieselben nun in jene schiefen Stellungen gekommen seyen. Vielleicht möchten sich aber für die Veränderung der anfänglichen Stellung der geschichteten Gebirge auch noch andere Erklärungsgründe auffinden lassen. Es lehrt uns nämlich der Anblick jeder gemengten Gebirgsart, wie namentlich der Granit eine ist, in welchem sich Feldspath, Quarz und Glimmer an und durcheinander gewachsen finden, daß diese Gesteine weder aus einer eigentlichen Auflösung im Wasser, noch aus einem feuerflüssigen, geschmolzenen Zustand sich gestaltet haben können. Denn wenn dieses der Fall gewesen wäre, so würden die leichter krystallisirbaren oder leichter erstarrbaren Steinarten sich früher zu Boden gesenkt und gestaltet haben als die andren, welche schwerer krystallisirbar sind, und so würden sie dann schichtenweis über einander aufgehäuft, nicht durch-

Digitized by Google

einander gewachsen erscheinen. Ein wahrhaft großer Naturforscher unsrer Tage (J. N. Fuchs) hat daher gezeigt, daß die festen Gesteinmassen unsrer Erde vor der Schöpfung der Gebirge in einem festweichen, unkrystallisirten Zustand sich befanden, wo sie zwar vom Wasser durchdrungen, nicht aber in ihm aufgelöst waren. In dem Augenblick, wo die noch ungestaltete (formlose) Masse von der schöpferischen Kraft der Krystallisation durchdrungen und gestaltet wurde, zog sie sich aus dem festweichen, ausgedehnteren Zustand auf einen viel kleineren Umfang zusammen, wodurch große, anfangs mit Wasser erfüllte Weitungen und leere Räume entstunden, welche das Einstürzen und Niedersinken der geschichteten Gebirgsmassen nach sich zogen.

3) Der Syenit (**Psaronius Syenites**) sieht dem Granit sehr ähnlich, nur hat er keine solchen glänzenden Blättchen in sich, die sich mit dem Messer so leicht spalten lassen, sondern dafür schwärzlich grüne Stückchen, die wohl auch glänzen, aber lange nicht so schön wie der Glimmer. Sie heißen Hornblende. Er ist bei uns seltener als der Granit.

Zu dem Geschlecht des Syenites gehören auch, weil sie ebenfalls aus Hornblende und Feldspath zusammengesetzt sind, der gemeine Hornblende-Fels (**Ps. vulgaris**), an welchem schon eine grünliche Färbung bemerkbar ist, und in welchem man noch die Hornblende mit ihren grünlich schwarzen Punkten deutlich von dem weißlichen Feldspath unterscheidet, so wie der Urgrünstein (**Ps. tenax**) ein gar festes, grünliches Gestein, in welchem die Hornblende so fein mit dem Feldspath zusammengemengt ist, daß man beide nicht mehr von einander unterscheiden kann.

4) Der Serpentin (**Ophites secabilis**), ein meist grünlicher, dabei aber öfters gleich einer Schlangenhaut gelblich, röthlich, auch schwärzlich gefleckter Stein, läßt sich leicht mit scharfen Werkzeugen schneiden und verarbeiten, weshalb man Mörser und andere Schalen aus ihm dreht.

5) Der Porphyr (**Porphyrites leucostictus**), wovon wenigstens die eine Art, welche in alter Zeit, besonders in Aegypten, häufig zu kostbaren Bauwerken und andern Kunstsachen verarbeitet wurde, zu den Urgebirgen gehört, hat meist eine dunkelrothe Grundfarbe, aus welcher aber häufig heller gefärbte Punkte hervorstechen, welche von eingewachsnem Feldspath oder Quarzkörnern herkommen. Dieses Gebirge ist gar oft

Digitized by Google

in viele mächtige Pfeiler und Säulen zerspalten, auch in Platten zertheilt.

Mit und bei dem Porphyr findet sich an vielen Orten der rothe Mandelstein (P. **amygdalinus**). Dieser hat meist kleine runde oder länglich runde Löcher in sich, welche wieder mit etwas Weißem (Kalkspath, Zeolith) oder Grünem (Grünerde) ausgefüllt sind.

6) Der Urkalk (**Lychnites Marmor candidum**) wird auch später noch erwähnt werden. Es ist der schöne Stein, der meistens weiß aussieht (weißer Marmor) und viele schimmernde Körnerchen und kleine glatte Flächen hat.

Die Uebergangsgebirge (**Montes transitorii**) sind so genannt, weil sie in ihrer äußeren Beschaffenheit noch sehr den Urgebirgen gleichen, dabei aber doch schon Vieles mit den Flötzgebirgen gemein haben, und daher einen Uebergang von den einen zu den andern bilden. Sie lassen sich aber noch recht gut als ein Anhang zu den Urgebirgen betrachten. Dahin gehört der Uebergangskalk (**Lychnites versicolor**), welcher meist dunkelfarbig, dabei aber häufig bunt gefleckt und gezeichnet ist, weshalb er unter dem Namen Marmor zur Zierde unserer Gebäude verwendet wird. Vor Allem gehören aber dahin die Grauwacke und der Grauwackenschiefer, der fast so aussieht, wie der unter Nr. 5 beschriebene Urthonschiefer, nur in der Regel etwas schmutzfarbiger und erdiger. In beiden werden öfters Metalle gefunden.

§. 8. Die Flötzgebirge (**Montes stratarii**), welche größtentheils aus Sandstein, Kalk und Gyps bestehen, haben gar häufig solche ebenflächige Lagen übereinander, die man Schichten (**strata**) nennt, und die ihnen das Aussehen geben, das etwa eine Mauer hat, in der recht große breite Quaderplatten, eine über die andere, gelegt sind. Es finden sich auch öfters mitten zwischen diesen Schichten noch andere Lagen, die, wenn sie Kohlen oder auch wohl metallische Körper enthalten, durch besondere, z. B. dunklere Farben abstechen und sich so ausnehmen, als wenn man mitten hinein unter die einerlei gefärbten Quadersteine einer Mauer andere Quadersteine legte, die eine andere Farbe haben, oder in ein Buch, dessen Blätter weiß aussehen, ein anderes Blatt, das

Digitized by Google

schwarz oder roth wäre. Solche Lagen nennt der Bergmann Flötze, und überhaupt bedeutet flötzen oder flößen das Ansetzen durchs Wasser, wodurch offenbar jene Gebirge entstanden sind.

Die Flötzgebirge bilden auch, zum Beispiel in unserm lieben deutschen Vaterlande, gar schöne, ansehnliche Berge, die zwar nicht so gar hoch sind wie die Urgebirge, aber oft steiler und jäher aussehen. Die Gegenden, die am Fuße und in den Thälern der Flötzgebirge liegen, sind meist gar fruchtbar, voll schöner Laubwälder, grünender Felder und Wiesen, und wo es warm genug dazu ist, sieht man an den Abhängen Obst-Pflanzungen, Hopfen und Weinberge. Oben auf den Höhen der Flötzgebirge ist es aber freilich hie und da etwas kahl und unfruchtbar, wenn nicht etwa Waldungen daselbst angepflanzt sind. Denn das Kalkgebirge, wie z. B. auf der rauhen Alp und in Franken, hat oben auf seinen Gipfeln meistens gar kein Wasser, keine Quelle, keinen Bach, noch weniger einen See. Da müssen denn die Leute manchmal sehr weit vom Berge heruntergehen, um Wasser für ihren Haushalt und für ihr Vieh zu holen, oder müssen das Regenwasser in Brunnen auffangen und in Pfützen, aus denen sie ihr Vieh tränken und ihr Bier brauen. Im Thale unten haben sie aber Wasser genug und fast reichlicher als im Urgebirge. Denn alles Wasser, das oben auf die Kalkberge fällt oder sich aus der Luft niederschlägt, das rinnt in den kleinen Ritzen herunter, und sammelt sich unten, wo es oft so stark aus den Bergen herausquillt, wie ein Bach, so daß ein solcher Quell gleich Mühlräder treibt.

Die Arten des Flötzgebirges sind:

1) Der Flötzsandstein, (**Saxum arenarium**), den wohl Jedermann als einen meist wie aus lauter kleinen Kieselkörnerchen fest zusammen gewachsenen Stein kennt, aus dem hier zu Lande die Mühlsteine gemacht sind. Der Sandstein spaltet sich öfters von selber, und zwar im Großen wie im Kleinen in viereckige Quadern. Daher hat er im Großen solche glatte, ganz steile Wände, und solche (fast viereckige) Pfeilerfelsen, wie am Lilienstein und Königstein in Sachsen, wie bei Adersbach am Riesengebirge, und noch sonst an vielen Orten. Der Sandstein besteht meistens aus lauter kleinen, durch ein kiesliches oder thonigt-kalkiges Bindemittel fest zusammengekitteten Quarz- oder Kieselkörnchen, manchmal sind aber auch recht große runde Brocken, wie die großen runden Steine, die im Bache

Digitized by Google

liegen, fest untereinander zusammengewachsen, und solchen Sandstein nennt man Conglomerat. Der Sandstein ist zum Bauen gar gut zu gebrauchen; unsere Alten haben auch, z. B. in Nürnberg, an der Sebalduskirche, gar viele Bildhauerarbeit daraus gemacht.

2) Der Porphyr ist schon oben, S. 15 beschrieben. Ein Porphyr kommt aber auch unter den Flötzgebirgen vor, welcher meist von einer mehr erdigen und thonartigen Beschaffenheit ist, als der ältere Porphyr, weshalb man ihn Thonporphyr (**Porphyrites argillaceus**), oder, wenn er Steinkohlen enthält, Steinkohlenporphyr (**P. carbonarius**) nennt.

3) Der Flötzkalkstein (**Calx vulgaris**), der als ein sehr gemeiner Stein fast überall bekannt ist, wo Flötzgebirge sind, sieht meist grau aus, doch ist er auch zuweilen buntfarbig gefleckt und gezeichnet, so daß man ihn, wie den oben S. 16 beschriebenen Uebergangskalk als Marmor verbrauchen kann. Denn aller eigentliche Marmor ist Kalkstein, der weiße wie der bunte. Man kann den Kalkstein leicht daran erkennen, daß er, wenn man einige Tropfen Scheidewasser darauf schüttet, aufschäumt und zischt. Der Flötzkalkstein bildet Berge, die nach oben meist in schmale Rücken auslaufen. Er hat sonderbar zackige Klippen, oft recht viele Löcher und auch große Höhlen in sich. Man gebraucht ihn zum Bauen und Kalkbrennen. Er theilt sich manchmal in graue oder gelbliche Schiefer, und von solcher Art ist der lithographische Schiefer, der sich bei Solenhofen in Bayern findet, und zu den sogenannten Steindrücken benutzt wird. Muschelversteinerungen findet man genug in ihm, von deren vermuthlicher Entstehung schon oben (S. 8) die Rede war. Besonders die Arten des:

a) Ammoniten (**Ammonites**). Diese sind rund in sich hineingewunden, als wenn man einen dicken Strick oder Bindfaden so zusammendrehte, daß er ein ganz flaches und ebenes Gewinde machte. In ihrem Innren bemerkt man, gleichsam klammernartige Abtheilungen, wie nach §. 50 D. beim Schiffsboot. Solche Thiere giebt es jetzt gar nicht mehr auf der Welt.

b) Die Arten des Belemniten (**Belemnites, Dactylus Idaeus**) sehen wie Finger aus die aber oben spitzig zulaufen,

Digitized by Google

und keinen Nagel haben, heißen daher auch im gemeinen Leben Teufelsfinger. In der Schweiz bedient man sich eines aus den Belemniten-Schalen gemachten Pulvers, als eines Hausmittels gegen das Bauchgrimmen der Kinder.

c) Der Seeigel (Echinus) ist rund, oder rundlich wie ein Apfel, und hat Buckelchen.

d) Lochmuscheln oder Terebratuliten (Terebratulithus) laufen meist oben in 2 zusammengebogene oder zusammengelegte Spitzen aus, unten rund und breit, wie eine ganz kleine Birne oder Feige, sind manchmal glatt, manchmal gestreift, und meist nicht viel größer, als eine Haselnuß, auch wohl nur wie eine große Erbse.

4) Als eine besondere Felsart muß in vielfacher Hinsicht der krystallisch körnige oder auch fast dichte Dolomitkalk betrachtet werden, dessen wir unten, bei Beschreibung der Kalksteine noch näher erwähnen werden.

5) Der Flötzgyps (Gypsum stratarium) sieht meist weißlich aus, und dabei entweder so körnlich wie Zucker, oder auch fasrig, wie die Fasern des Fleisches. Aller Gyps ist so weich, daß man mit den Fingernägeln hineinkratzen kann. Man macht aus dem Gyps (der auch Alabaster heißt) sowohl große, als auch die kleinen bunten oder weißen Steinfigürchen für die Kinder: den gebrannten benutzt man zu Stuckaturarbeit und zu einem Steintafelwerk für Fußböden, auch streut man den Gyps auf manche Felder und Wiesen, besonders auf die junge Kleesaat.

6) Die Steinsalz- oder Salzthongebirge (Montes salini), könnte ja, wo sie frei offen da lägen, jeder Hirsch und jede Ziege, die gerne daran lecken, erkennen, geschweige der Mensch. Gewöhnlich kommt aber das Salz so mit Thon vermischt oder im Gypsgebirge verborgen vor, daß man es nur an dem salzigen Geschmack der Quellen erkennt, die unter dem Gyps hervorbrechen.

7) Das Steinkohlengebirge (Concrementum carboniferum), das an vielen Orten bei und in dem Sandstein und jüngerem Porphyrgebirge gefunden wird, ist aus glimmerigem Sandstein, schiefrigen Thonsteinen und Steinkohlen zusammengesetzt.

Nun giebt es aber auch noch andere Flötzgebirge, die man Flötztrappgebirge nennt, diese sind:

Digitized by Google

8) Der Basalt (**Basanites columnaris**). Dieser ist ein schwarzer, sehr fester Stein. Er macht sonderbare Berge, wie die Ameisenhaufen oder Heuschober so rund. Rings um diese Berge her giebts viele Quellen. Der Basalt spaltet sich auch von selber in Säulen, die öfters um seine Berge so herumgestreut liegen, oder auch aufrecht stehen, daß man meinen sollte, die Menschen hätten dort einmal ein Gebäude aufgeführt gehabt, wovon die Säulen noch herum lägen. In manchen Ländern giebt es schöne Höhlen im Basalt, in denen lauter Säulen stehen.

Wacke, Grünstein, (**Basanites argillaceus**) von thonigt weicherer Beschaffenheit als der Basalt, so wie der schwärzliche Mandelstein (**B. amygdalinus**), dessen inwendige Zwischenräume meist weiß ausgefüllt sind, kommen bei und mit dem Basalt vor. Die Wacke sieht auch meistens grünlich aus. Auch der Porphyrschiefer oder Klingstein (**B. schistosus**) gehört hieher, ein ziemlich festes, grünlich graues Gestein, das sich leicht in Platten ablöst.

§. 9. Das aufgeschwemmte Land, ist freilich in unserm deutschen Vaterlande bekannt genug. Denn wo man so im Sande waden muß, wie bei Nürnberg, und bis hinunter nach Ellingen, oder wie selbst am schönen Rheinstrome (besonders unterhalb Köln) hinab, und noch mehr da oben in der Mark und um Berlin herum, oder wo man nichts sieht, als solchen groben Kies, wie um München, oder fettes, thoniges Land, das von jedem starken Regen so weich wird, daß die Leute mehrere Tage lang gar nicht spazieren gehen können, wie oben über Bremen hinauf, und bei Stralsund, da ist überall aufgeschwemmtes Land.

Wenn aber auch, wie oben gesagt, im aufgeschwemmten Lande nicht viel zu holen ist, (denn im Sande wächst außer Föhren und Haidekraut nur wenig von selber) so kann doch der Mensch durch seinen Fleiß gar viel hineinlegen. Denn Wasser giebts da meist genug, und unsern Landsleuten, die nach Holland hin, oder nach Bremen, nach Hamburg, nach Pommern hin wohnen, läuft am Ende doch fast alle das Wasser

Digitized by Google

zu, was aus unsern deutschen Gebirgen herausquillt, so daß diese guten Leute öfters und an manchen Orten mehr durch Ueberfluß als durch Mangel an Wasser zu leiden haben. Fast allenthalben in unserm aufgeschwemmten Lande giebt es auch Sümpfe, feuchte Ebenen, wo viel Laubwald und schönes Gras wächst; auch fetten Ackerboden, mitten unter dem Sand; große Flüsse, mit fruchtbaren Ufergegenden, so wie kleine Seen. Die Hügel, die sich im aufgeschwemmten Lande finden, bestehen aus keinen festen Felsenmassen, sondern sind aus Sand, Thon und Lehmen so locker zusammengelegt, daß man ohne alle Mühe in sie hineingraben kann. Das aufgeschwemmte Land, das stellenweise auch oben auf dem Ur- und Flötzgebirgsrücken liegen kann, denn das Wasser wäscht auch diese Berge aus, und schwemmt das Ausgewaschene zusammen, enthält:

1) Groben Kies (**Glarea**),
2) Sand (**Arena**),
3) Thon und Lehmenlager (**Strata argillacea**), die zum Bauen und zur Töpferwaare gebraucht werden.

§. 10. Wir wollen nun die vorzüglichsten Gebirge in Deutschland ganz kurz anführen und beschreiben.

Unsere Gebirge im deutschen Vaterlande hängen mit den mächtigen Hochgebirgen im Osten, welche man als das Grundgemäuer der Erdveste unsrer Halbkugel betrachten darf, auf dreifachem Wege zusammen, einmal, im Norden von der Donau, durch die Karpathen, **Carpathici montes**; zweitens, im Westen vom Rhein und im Süden von der Donau, durch jenen Theil der Alpen, der sich von der Ostseite des Adriatischen Meeres her durch die Krainer, Kärnthner, Tridentiner, Norischen und Rhätischen Hochgebirge hinzieht; drittens durch jenen andern Theil der Alpen, der sich von den Apenninen her durch die Seealpen, durch die Cottischen, Grajischen, Penninischen und Adula-Gebirge in die Mitte der Schweiz und von hier aus weiter bis tief in unser Vaterland fortsetzt. Wir betrachten die Abkömmlinge dieser drei Höhenstämme einzeln:

Alle die großen, waldbedeckten Höhen, welche von den kleinen Karpathen (**Sarmatici montes**), die zwischen der March und Waag gen Preßburg hinablaufen, in Westen durch Mähren, Böhmen, Thüringen, Franken bis zum Schwarzwalde sich fortsetzen, begriffen die alten Römer unter dem allgemeinen Namen des Hercynischen Waldgebirges, **Hercynius Saltus**. Sie unterschieden aber bald, und wir können dieses als Bewohner dieser Gegenden noch viel leichter,

Digitized by Google

folgende einzelne Gebirgsgruppen: 1) Das Oesterreichisch-Schlesische (Mährische), das den Namen **Hercynius Saltus** behielt, und dessen Gipfel, der Hussoko und der Altvater sich 4990 und 4500 Fuß über die Meeresfläche erheben. 2) Das Glatzer und Schweidnitzer, so wie weiterhin das Riesengebirge, **Asciburgius Mons.** Hier erhebt sich der Glatzer Schneeberg 4300; die Riesenkoppe 4955; das große Rad 4707 Fuß hoch. Die letzten Enden dieses Asciburgischen Gebirgszuges verlaufen nach der Oberlausitz, wo der Oybin 1591, die Landeskrone 1304 Fuß Höhe haben. Aber den Hauptthöhenzug bilden ferner jenseits der Elbe, in südwestlicher Richtung 3) die Sudetischen Gebirge, **Sudeta**, an deren Anfang der große Winterberg 1599, der Lilienstein 1220, der Gipfel eines südwärts abgehenden Zweiges (der Donnersberg des böhmischen Mittelgebirges) 2513 Fuß messen. Aber der eigentliche Hauptrücken der Sudeten, der aus Urgebirgsarten bestehet, erhebt sich, schon als Sächsisches Erzgebirge, viel höher: zum Keilberg, bei Altenberg, welcher 3800, Fichtelberg bei Gottesgab, der 3600, Auersberg, der 3100 Fuß hoch ist. Jenseit des Thales der Voigtländischen Elster empfängt der Zug der Sudeten den Namen des Fichtelgebirges, dessen Gipfel, der Schneeberg, 3272, der Ochsenkopf, zu 3170 Fuß sich erheben; das Westende der Sudeten ist das Thüringer Waldgebirge, dessen Gipfel, der Inselberg, 2949 F. hoch ist. 4) Ein Zweig, der von der Mitte der Sudeten gen Südosten ausgehet, wird zum Böhmerwalde, **Gabreta Sylva**, der zwischen Böhmen und Bayern die natürliche Gränze bildet und dessen Gipfel: der Arber 4540, Rachel 4432 F. hoch sind. An dem südlichen Ende des Böhmerwaldes beugt sich der Höhenzug wieder nordöstlich nach dem Schlesisch-Mährischen Gebirge hin und erzeuget im Norden der Donau den mäßigen Höhendamm 5) des Böhmisch-Mährischen Gebirges, **Luna sylva.** — Wenn wir aber weiter zu der Betrachtung des geraden Verlaufes der Sudeten fortgehen, so schließt sich an das vorhin erwähnte Westende derselben: an den Thüringerwald, im Westen 6) der Buchonia-Wald, oder das Hessische Gebirge, **Bacenis Sylva**, an, wo der große und kleine Gleichberg bei Römhild 2241 und 2116 Fuß; die Geba bei Meiningen 2442; der Kreuzberg im Rhön 2835, das Vogelsgebirge bis 2100; der Habichtswald 1400; der Meißner 2481 Fuß sich erheben. Südwestlich vom Hessischen Gebirge beginnt im Spessart und in dem jenseits des Maines an diesen sich anschließenden Odenwald (wo der 1880 Fuß hohe Katzenbuckel ist) eine südlichere Richtung des Höhenzuges, der nach dieser Richtung hin, zu seinem letzten Ende hat: 7) den Schwarzwald, **Sylva Marciana**, mit dem 4597 F. hohen Feldberge und 4313 F. hohem Belgen.

Digitized by Google

Aber auch im Norden und Westen des Buchoniawaldes erheben sich noch, zum Theil parallel mit dem Hauptzug, mehrere Nebenzüge, nämlich, 8) der Harz, Melibocus Mons, der gleich einer Insel, mit seinem 3633 Fuß hohen Gipfel (Brocken genannt) über die weite Ebene hervorragt und gegen Nordwesten nach der Weser hin den Herculeswald, Sylva Herculi sacra, bildet. Ferner gränzet unmittelbarer an das Hessische Gebirge in Nordwesten das Aunobische Gebirge des Ptolemäus, Aunoba Mons Ptolemaei, an, das sich zwischen Weser und Rhein ausbreitet und dessen einzelne Theile sind: der Taunus (Taunus) mit dem 2606 Fuß hohen Feldberge; der Westerwald, mit dem 2000 F. hohen Salzburgerkopfe; der 2200 Fuß hohe Ederkopf, an dem die Sieg, Lahn und Eder entspringen; das Rothhaargebirge, Sylva Caesia, mit dem 2519 Fuß hohen Astenberg, das bei seinem nordwestlichen Ende den Teutoburgiensischen Bergwald, Saltus Teutoburgiensis, erzeugt; das Siebengebirge, Rhetico, mit der 1900 Fuß hohen Löwenburg und dem über 1000 Fuß hohen Drachenfels.

Der andere große Hauptstamm der Gebirgsketten, der aus den Ländern südwärts der Donau und nordostwärts vom Adriatischen Meere herkommt, berührt freilich nur den südöstlichsten Theil der Länder, in denen deutsch gesprochen wird. Man unterscheidet als Theile desselben den Laybacher-Stamm Albia mons; die Okra, Ocra; den Karst, Carusadius; dann die an Höhlen sehr reichen Krainer Alpen, Alpes Juliae; die Kärnthner Alpen, Alpes Carnicae, zwischen dem Drau- und Saustrom; die Tridentiner Alpen, Venetae Alpes; die Norischen Alpen, Noricae Alpes, bei deren Beginn sich der 11,668 F. hohe Groß-Glockner erhebt, und die sich gegen Nordosten in die Salzburger- (wo noch der Watzmann 8348, der Ewigschnee 9048 F. sich erheben) gegen Ost und Südost in die Pannonischen Alpen, Alpes Pannonicae, verzweigen, so wie sie im weitern Verlaufe die Steyerischen Gebirge, Carabanca Mons, und zuletzt den Wienerwald, Cetius Mons, erzeugen. Als die letzten, äußersten Zweiglein dieses großen Stammes gegen Deutschland herein lassen sich die Vorberge betrachten, welche zwischen dem Inn und der Donau bis gegen Passau hinan verlaufen; aber westwärts von den norischen Alpen, auf der rechten (südlichen) Seite des Inns geht noch ein ungleich mächtigerer Ast, unter dem Namen der Rhätischen Alpen, Alpes Rhaeticae, von dem Hauptstamme aus, der sich als Brenner- und Oetzthalgebirge ausbreitet, an den Quellen der Etsch sich gen Süden wendet, und am Anfange dieser Wendung zuerst den über 12,000 F. hohen Oerteler, an ihrem Ende aber, am Gardasee, den 6768 F. hohen Baldusberg bildet.

Digitized by Google

Die Enden des dritten europäischen Hauptgebirgs-Stammes, der, wie oben erwähnt, von den Apenninen her sich ausbreitet, reichen schon weiter in das deutsche Vaterland herein, als die des zweiten. Der Hauptast, von welchem diese letzten Zweige herkommen, führt zuerst da, wo sich an ihm der 11,058 Fuß hohe Mont Cenis, der 12,456 Fuß hohe M. Isere, und der 14,760 F. hohe Montblanc erheben, den Namen der Grajischen Alpen, Alpes Grajae, oder Grajus Saltus. Bei diesem Gipfelpunkt der westlichen europäischen Alpen wendet sich der Hauptast gegen Osten, und die Höhenkette vom großen Bernhard bis zum St. Gotthard bildet nun die Penninischen Alpen, Alpes Penninae oder Poeninae. Hier finden sich der 8460 F. hohe, große Bernhard, Poeninus Mons, auf welchem ein Hospiz 7668 Fuß hoch liegt, der 14,226 F. hohe Monte Rosa, der 13,860 Fuß hohe M. Cervin, der 10,680 F. hohe Mont Velant und an einem nördlichen, durch das Rhonethal geschiedenen, Seitenast erheben sich das Finsteraarhorn 13,200, die Jungfrau 12,850, der Mönch 12,663, das Schreckhorn 12,618, der Eiger 12,216, das Wetterhorn 11,445, Babenhorn 11,415, Ritzlihorn 10,125 Fuß hoch. — Die Alpenkette vom 8587 F. hohen Gotthard, bis zu der Gränze, welche das Inn- und Addathal zwischen ihr und den Rhätischen Alpen bilden, heißt das Adulagebirge, Adulas Mons. Die Seitenzweige, in die sich in dieser Gegend der Hauptast theilt, bilden gegen Norden und Osten hin die Graubündner Alpen, die den Rhein zu beiden Seiten bis zum Bodensee begleiten, und die Nord-Tyroler und Bayerischen Alpen, welche an beiden Seiten der Ill und des Lech, so wie an der linken oder nördlichen Seite des Inn verlaufen und zuletzt zwischen der Isar und dem Inn, gegen die Donau sich hinabsenken. In diesem Nordtyroler und Bayerischen Gebirge erhebt sich die Zugspitz bei Partenkirchen, 9069 Pariser Fuß, der Watzmann 8263, der Hochvogel 7952, das Karwendel-Gebirg 7744, der Wetterstein bei Mittenwald 7311, die Kreuzspitz an den Quellen der Ammer 6700, der Seiling 6254, der Wendelstein 5663, die Benedictenwand 5500, der Haimgarten 5479, die Tharspitz bei Ettal 5200 Pariser Fuß.

Als ein eigenthümlicher Seitenzweig des Stammes der von den Apenninen herkommenden, westlichen Alpen läßt sich das Juragebirge, Jura, betrachten. Eine Fortsetzung von diesem ist jener Höhenzug, der sich in nordöstlicher Richtung zuerst zwischen Donau und Neckar, als rauhe Alp, Alpis, in Würtemberg ausbreitet, und hier den 3121 Fuß hohen Schafberg, den 2849 F. hohen Hörnli und den 2621 F. hohen Hohenzollern erzeugt, dann aber weiter im Norden der Donau, mitten durch Bayern bis zum Böh-

Digitized by Google

merwald und Fichtelgebirg verläuft und auf diesem Wege seinen Gipfel an der über 1900 Fuß hohen Wülzburg erreicht. Außer diesem nordöstlichen, hat jener Seitenzweig des Jura auch noch einen unmittelbaren nördlichen Verlauf, in welchem er, an der linken Seite des Rheines die Vogesen, Mons Vogesus, mit dem 4500 F. hohen Grand Ventron, weiterhin aber das Hardtgebirge und den 2090 F. hohen Donnersberg erzeugt. — Das Gebirge zwischen dem Rheine und der Maas, dessen alter Name der Baduhennawald, Baduhennae Lucus, ist, umfasset die hohe Veen, das Eiffelgebirg mit der 2225 Fuß hohen Hochach, den Hochwald und Hundsrück. Dieses sind die vorzüglichsten deutschen Gebirgszüge, deren Bestandtheile wir nun etwas genauer betrachten wollen.

Die Urgebirgsarten, Granit, Gneuß, Glimmerschiefer, oder doch wenigstens der Thonschiefer, werden, wenn auch nur stellenweise an und auf den Höhen aller der oben erwähnten, deutschen Gebirge frei, zu Tage stehend, gefunden, obwohl sie auch andere Male von Flötzgebirgen oder von den jüngern Anschwemmungen überdeckt sind. Wer mithin von uns oben am Fichtelgebirge, bei Gefrees, Münchberg, Schwarzenbach an der Saale, dann wieder, wer von Schönsee und Waldmünchen bis hinunter an die Donau wohnt, der wird rings um seine Heimath her eine oder die andere Art der im §. 7 beschriebenen Urgebirgsarten finden. Von Hof an, fast durchs ganze Voigtland hindurch, giebt es dann meist Thonschiefer; so auch ober Waldsassen, um Vohenstraus, Bleistein u. s. w. bis tief hinein nach Böhmen. Denn der ganze Zug der Sudeten, so wie das Böhmerwaldgebirge haben zur Hauptmasse ihres Hochrückens die Urgebirgsarten, und dasselbe gilt auch vom Böhmisch-Mährischen Gebirge. Wer deshalb and er Donau hinunter geht oder fährt, von Regensburg an bis fast nach Wien, der sieht linker Hand oder nördlich von sich hinauf auch nur wenig andere, als Urgebirge, die sich dort durch den ganzen südlichen Theil von Böhmen bis an die Gegend von Kuttenberg hinanziehen. Von München aus gegen Süden hin trifft man erst beim Inn und jenseits desselben das Urgebirge und zwar zunächst den Glimmerschiefer an. — Wer im Sächsischen Erzgebirge wohnt, oder in Böhmen bei Eger und Karlsbad, oder in der Oberlausitz bei Bauzen, Löbau u. s. w., der hat auch Urgebirge um sich. Die Nachbarn des Riesen- oder Asciburgischen Gebirges die Bewohner von Schlesien haben um sich und nahe an ihren Gränzen gar mannichfaltige und ausgezeichnet schöne Urgebirge. Denn der schönste alte Granit zieht sich als eine hohe Gebirgsmauer von Reichenberg bis Schmiedeberg und Hirschberg, ja bis ganz nahe vor Kupferberg; Gneuß-Granitbildungen ziehen sich, wie ein Saum die Granitkette umfassend, südöstlich von Schmiedeberg, von Wolfshau bei der

Digitized by Google

kleinen Koppe, bis fast gegen Kupferberg hinan. Eben so in weiterer Ausdehnung (wiewohl häufig von Sand und Sandstein, auch hie und da von Basalt bedeckt) von Hirschberg nordwestlich bis hinüber in die Gegend von Görlitz und Marklissa, Seydenberg, Reibersdorf, Zittau. Syenit findet sich südlich und östlich von Glatz, um Piltsch, Oberhansdorf, Werdeck, Heinrichswaldau, auch um Levin. Glimmerschiefer, zum Theil mit Thonschiefer, fängt an nördlich von Görlitz bei Rengersdorf, umgiebt die Gegend von Lauban und zieht sich so südöstlich hinunter bis an Kupferberg, von da am Gneuß- und Granitgebirge südwestlich herum bis Freiheit, Schwarzenthal, Hohenelbe, Starkenbach, ja bis westlich von Reichenberg und bis gegen Grottau, unweit Zittau. Auch südlich von Wigandsthal, dann ferner um Hochstadt, auch um Hohenfriedenberg, Freiburg, Volkenhayn findet man solche Urschiefer. Urgebirge verschiedener Art zeigen sich um Landeck, Reichenstein, Strehlen, Reichenbach, Schweidnitz, Striegau, Jauer. Serpentin (mit Schillerfels) um Volpersdorf, ostwärts von Neurode. Uebergangsgebirge zwischen schlesisch Freyburg und schlesisch Landshut. — So, um wieder zu einer andern Gegend zu kommen, haben denn auch die Leute am Thüringer Walde und die am Harze beim Blocksberg oder Brocken, Proben von Urgebirgen um sich. Die Nachbarn des Spessarts, namentlich auch die Bewohner der Gegend von Aschaffenburg, dürfen nicht weit nach Urgebirgen suchen, denn sie finden, besonders nördlich von Aschaffenburg, Granit und Gneuß genug (den Gneuß schon in ihrem großen Garten), und südlich hinunter noch dazu den Flötzsandstein ganz in der Nähe. Wer in dem schönen Heidelberg auf der Brücke steht, der merke sich auch: daß die höheren Bergkuppen um die Stadt, besonders aber die, so östlich liegen, fast lauter Urgebirge sind, denn dieses zieht sich, wenn man von Heidelberg aus auf der Bergstraße hinunter geht, immer rechter Hand neben einem her, bis über Zwingenberg hinauf, obwohl es nicht weit von Weinheim auch Steinkohlen-Gebirge giebt und nur wenige Stunden östlich hinüber den rothen Sandstein. Da wo die Mosel und die Lahn sich im fruchtbaren Rheinthale fast begegnen, giebt es Thonschiefer und die im §. 7 nach Nr. 6 zuletzt erwähnten Gebirgsarten. Man findet diese von Saarburg und von Bingen, immer rechts am Rhein hinunter bis an Elberfeld, und von Wetzlar und Dillenburg an, bis hinüber an die Schelde. (Ein großer Schieferzug beginnt im hessischen Gebirge: nordöstlich zwischen Biedelar und Marburg, setzt zwischen Bingen und Bonn durch den Rhein, zwischen Namur und Mezieres durch die Maas, und verliert sich erst in Frankreich.) Bei Freiburg im Breisgau hat man nach Osten hin, bei Baden nach Süden hin (am Schwarzwalde) immer auch das Urgebirge, das sich in einer ziemlich geraden Linie von Baden an, bis nach

Digitized by Google

Schopfheim und nach Seckingen am Rheine fortsetzt, und auch anderwärts kann man oft Proben von Urgebirgen sehen, die z. B. rings umher von lauter Flötzsandstein umgeben sind. — Die Kalklager bei Elberfeld, Gemarke, Schwelm u. s. sind Uebergangskalke.

Freilich ist in allen diesen Gegenden das Urgebirge nirgends so gar majestätisch und so hoch, wie in den hohen Alpengebirgen von Savoyen, Graubünden, Mittel-Tyrol, oder wie in Salzburg und Kärnthen beim Großglockner, aber unsere Landleute in der ebenern Gegend werden sich darüber gerade nicht betrüben. Denn es ist zwar wohl etwas Herzerhebendes und Herrliches, auf einem solchen hohen Alpengebirge zu stehen, aber wenn man dann rings um sich her, auch mitten im Sommer, in die unermeßlichen Schnee- und Eisfelder hineinsieht, aus denen sich Meilen weit keine einzige grüne Wiese erhebt: da fühlt man doch, daß solche gar gewaltige Höhen mehr für kühne Adler und Gemsen gemacht sind, als für den Menschen, der sich unten im Thale gemüthlicher befindet, bei seinen grünen Wiesen und Auen und Gärten.

Um übrigens nur noch einen kleinen Begriff davon zu geben, wie sehr die Berge dazu beitragen, uns Menschen die Aussicht über Gottes schöne Erde zu erweitern, so erwähnen wir nur, daß ein Mann, der auf ganz ebenem Boden steht, nicht viel über eine Stunde (14,400 Pariser Fuß) weit über die ebene Fläche, z. B. des Meeres hinausschauen kann. Steht er aber auf einem Hügel oder Thurme, der 100 Fuß hoch ist, so kann er schon $2\frac{3}{4}$, auf 200 Fuß Höhe $3\frac{5}{8}$, auf 300 Fuß Erhöhung $4\frac{3}{4}$, auf 400 und 500 Fuß Erhöhung $5\frac{1}{2}$ und $6\frac{1}{6}$, auf 1000 und 2000 Fuß Höhe schon $8\frac{3}{4}$ und $12\frac{3}{10}$ Meilen weit hinausschauen. Wenn man auf einem 3500 oder 4500 Fuß hohen Berge steht, kann man $16\frac{1}{4}$ und $18\frac{7}{8}$ Meilen weit über die ebene Fläche hinsehen, auf einem 12,000 Fuß hohen 30 Meilen weit. Eben so erblickt man dann auch, wenn man auf dem Meer oder auf einer ganz ebenen Fläche ist, die Spitze eines 300 Fuß hohen Thurmes schon $4\frac{3}{4}$, den Gipfel eines 3500 Fuß hohen Berges schon $16\frac{1}{4}$ Meilen weit, und wenn man mitten in der Ebene oder auf dem Meere selber auf dem 3500 Fuß hohen Berge einer Insel steht, so kann man den Gipfel eines eben so hohen, am Lande stehenden Berges gerade noch einmal so weit, nämlich $32\frac{1}{2}$ Meilen weit sehen; von einem 300 Fuß hohen Leuchtthurm oder Felsen kann man (wenigstens durchs Fernrohr) die Spitze eines eben so hoch aus dem Meere hervorragenden andern Thurmes oder Felsens, statt $4\frac{3}{4}$ auf $9\frac{1}{2}$ Meilen weit wahrnehmen.

An Flötzgebirgen fehlt es uns in unserm deutschen Vaterlande gerade auch nicht. So giebt es den sogenannten rothen Flötzsandstein, den die Gelehrten für älter halten, als viele andere Sandsteine, an der Ostseite des Harzes und am Thüringer Walde. Eben so in Schlesien um Liebenau, Se-

Digitized by Google

mile, Schatzlar, um Schönau, an der Katzbach, um schlesisch Waldenburg, Friedland u. a.

Eine andere Art des Sandsteines, welche man den bunten Sandstein nennt, findet sich am Mainstrome immer rechts hinunter, von Gemünden und Lohr an bis gegen Obernburg und Aschaffenburg und südwärts vom Main durch den Odenwald bis an den Neckar, ja bis an die Quellen der Ems und durch den Schwarzwald immer südlich hinab. Einen ähnlichen hat man auch um Kaiserslautern, wo er an der ganzen Straße von Gölheim bis nach Homburg und noch über Blieskastel hinunter einen schmalen Streifen von Bergen bildet. Ueberhaupt ist diese Art des Sandsteines überaus weit durch unser deutsches Vaterland, besonders aber um und neben jenen Gebirgen verbreitet, die von dem ersten der vorhin beschriebenen Stämme herkommen. Er läßt sich daher vom südlichsten Rande des Schwarzwaldes an bis zum nördlichsten Hügellande von Deutschland blicken; breitet sich in mächtigen Massen durch Schlesien und Polen so wie durch das mittlere Rußland aus.

Eine dritte Art von Sandsteinen, welche man Keuper nennt, findet sich gleichfalls in vielen Gegenden von Deutschland und Elsaß. Die schönen Vogesen, jenseits des Rheins, die man mit ihren alten Ritterburgen links von der Straße von Mühlheim und Colmar bis nach Straßburg sieht, bestehen bis auf einige kleine Punkte Urgebirges, z. B. einem westwärts von Colmar, ganz aus solchem Sandsteine; eben so die Gegend zunächst um Tübingen, Eßlingen; dann ein Landstrich, der sich von Dinkelsbühl und Gunzenhausen an, immer nördlich hinauf über Ansbach und Nürnberg, und hie und da ganz nachbarlich neben den Kalkgebirgen über Bamberg und Haßfurt durch einen Theil von Sachsen, Thüringen und Hessen bis fast hinan an Hildesheim und Wolfenbüttel hinzieht und noch deutlich unterscheidbar um Pyrmont sich findet. Auch um Baireuth und von da über Creußen hinüber, setzt sich der jüngere Sandstein fort. — Dagegen wird der Sandstein um Schwandorf, an der Straße nach Regensburg als eine besondere Art des zum Jurazug gehörigen Sandsteins unterschieden und Liassandstein oder Eisensandstein genannt. Dieser findet sich namentlich auch bei Aalen und Wasseraalfingen, wo er die Massen des dortigen oolithischen Thoneisensteins in sich enthält. Im nördlichen Deutschland, namentlich zu Oberkirchen bei Bückeburg und im Sandomirgebirge in Polen, enthält der Liassandstein öfters sehr mächtige Steinkohlenlager.

Noch einen andern Sandstein nennt man Quader- auch Mergel- und Grünsandstein. Dieser findet sich von dem nördlichen Rande des Westphälischen Schiefergebirges bis zu der Hügelkette des Teutoburger Waldes. Er findet sich bei Quedlinburg, wo er Steinkohlen enthält, so wie bei

Digitized by Google

Braunschweig und Hannover; sehr ausgezeichnet in den östlichsten Gegenden von Sachsen, namentlich in der Sächsischen Schweiz und den angränzenden Distrikten von Böhmen und Schlesien, wo er die oben erwähnten Pfeilerfelsen bildet. Insbesondere zeigt sich Quadersandstein in Schlesien bei Löwenberg, dann südlich von Bunzlau, so wie nahe bei Glatz um Habelschwerd und Mittenwalde. Er zeigt sich an der Landzunge von Mönkguth auf der Insel Rügen; auch westlich und nordwestlich von Königsberg in Preußen, von den Ruinen von St. Adalbert, immer an der Küste hinan, bei Dirschheim, Brauschen und überhaupt in sehr vielen Gegenden, wo der später zu erwähnende Kreidekalk vorkommt. Zu dieser Art des Sandsteines gehört auch der bei Kelheim an der Donau. Auch die Nagelfluh in der Nähe der Alpen wird zum Theil zu dem Mergelsandstein gerechnet, wiewohl der größte Theil des kalkigen, zum Theil Nagelfluh ähnlichen Sandsteines, in dessen Thonmassen öfters Braunkohlen (wie bei Mießbach) eingeschlossen sind und der sich namentlich vom Bodensee aus am nördlichen Saume der bayerischen Alpen bis gegen Oesterreich hinzieht, neuerdings zu den tertiären Ablagerungen gezählt wird, zu deren Bildung das Landgewässer, oder das Süßwasser eben so viel und öfters mehr beigetragen hat, als das damals nachbarlich angränzende Meer.

Flötzkalkstein, und zwar derselbe älteste Flötzkalk- oder Zechstein, welcher in Thüringen und Franken zwischen dem rothen und bunten Sandsteine liegt und unter sich den Kupferschiefer enthält, in dessen Lagen viele Ueberreste von Fischen vorkommen, findet sich nördlich von Aschaffenburg gegen Kehl und Biber zu, wo auch das Kupferschieferlager, das freilich überall nur etwa einen Fuß, und öfters nicht einmal so dick (mächtig) ist, bergmännisch benutzt wird. Dieses geschieht auch schon seit sehr langer Zeit am Harz, in Hessen und in Thüringen, wo jene Art von Flötzkalkstein in schmalen Bergzügen, z. B. bei Nordhausen, Frankenberg u. s. w. vorkommt.

Der Kalkstein, der sich von der obern Neckargegend bei Sulz an, gegen Norden, in einem schmalen Streifen, östlich von Pforzheim bis an die Enz; dann weiter von da an, wo die Rems ober Ludwigsburg in den Neckar fällt, nördlich und nordostwärts über Heilbronn, Jaxtberg, Jaxthausen, ferner über Ochsenfurt, Kitzingen und Würzburg, bis gegen Gemünden und Schweinfurt hin fortzieht, wird nach den neueren Bestimmungen als Muschelkalk benannt. Dieser wird überall, namentlich im nördlichen Theile von Deutschland bis zu den äußersten Enden des Hügellandes der Weser und von dem Nordrande des Eiffelgebirges an, bis zu dem Saume des Sandomirgebirges in Polen zwischen dem Keuper und dem bunten Sandsteine gefunden. Der untere Theil der Lager des Muschelkalkes, womit er an den bunten Sandstein sich anschließt, ist oft ganz von Sand durchdrun-

Digitized by Google

gen und deshalb zum Brennen untauglich. Er enthält zuweilen, wie in Würtemberg und Baden, reiche Lager von Steinsalz.

Die Berge und vorherrschende Gebirgsart, die man nördlich von Schaffhausen, die man bei Tuttlingen, Sigmaringen, dann immer nordöstlich hinauf über Gammertingen, Geislingen, Heidenheim, Neresheim, um Nördlingen, Pappenheim und Eichstädt, Beilngries, Neumarkt, östlich von Altdorf, dann um Sulzbach, Hersbruck, Rotenberg, Velten, Gräfenberg, Muggendorf und immer rechts (ostwärts) am Rednitzthal hin bis Bamberg, und dann gegen Staffelstein hin sieht, sind eine andre, wie man dafür hält, jüngere Art von Flötzkalkstein, die man Jurakalkstein nennt, weil das Juragebirge daraus gebildet ist. Die rauhe Alp im Würtemberger Lande besteht aus solchem Kalkstein. Wenn man übrigens dieses vom Jura herkommende Gebirge genauer betrachtet, dann bemerkt man bald, daß es aus mehreren verschiedenen Gliedern von Bergarten zusammengesetzt sey. Das unterste davon, das an den Keupersandstein angränzt, heißt der Liaskalk. Dieser zeigt sich, als ein unter dem eigentlichen Jurakalkstein vortretender Saum bei Bahlingen, Hechingen, Pfullingen, Kirchheim (bei Nürtingen) Göppingen, dann zwischen Aalen und Gemünd und so fort nach Pleinfeld und Ellingen, so wie weiter am Saume des eben beschriebenen Verlaufes des Juragebirges hin, hie und da am Gehänge des Böhmerwaldes und Fichtelgebirges. Zu diesem Liaskalk, welcher viele mergliche und thonige Lagen in sich enthält, gehört auch der gewöhnliche Gryphitenkalk und das bei uns öfter vorkommende Belemnitenflötz. — Ein zweites Glied des Juragebirges ist der schon oben erwähnte Liassandstein, der auch oolithischer Sandstein genannt wird. — Das dritte Glied des Juragebirges ist das wichtigste, an Masse vorherrschende, nämlich das eigentliche Jurakalkgebirge. Zu unterst besteht dieses bei uns gewöhnlich blos aus gemeinem, kohlensauren Kalk, der viele Corallenüberreste enthält und daher auch das Corallengebirge heißt. Ueber diesem folgt dann Dolomitkalk, in welchem kohlensaurer Talk mit dem kohlensauren Kalk vermischt gefunden wird und der sich durch sein körniges Aussehen unterscheidet, gewöhnlich auch fast ganz frei von deutlichen, organischen Ueberresten ist. Ueber dem Dolomitkalk liegt bei uns, namentlich bei Solenhofen und Pappenheim der lithographische Schiefer, oder es stellt sich wohl auch, wie bei Amberg, noch ein an Eisenerz sehr reicher Sandstein (der Pfälzische Sandeisenstein) ein. — Das Juragebirge, mit den eben beschriebenen Gliedern ist übrigens nicht blos auf den vorhin erwähnten nordöstlichen Verlauf durch Würtemberg und Bayern beschränkt, sondern, so wie der Seitenzweig des Alpenstammes, der das Juragebirge bildet, auch unmittelbar nach Norden hin gegen die Vogesen und weiter an der linken Seite des Rhei-

Digitized by Google

nes sich ausbreitet, so lassen sich die Bergarten des Jura auch an der Westseite der Vogesen, am südlichen Hange der Ardennen, ja durch die Normandie nach England und Schottland hinüber verfolgen. Im nördlichen Deutschland ziehen sie sich von Bromsche an der Haase bis nach Minden an der Weser, von hier bis gegen Hildesheim und Einbeck. Auch breiten sie sich nördlich vom Harz, zwischen Wolfenbüttel und Helmstädt aus. In Polen zeigen sich die Juragebirgsarten in sehr ansehnlichen Massen; namentlich besteht das Gebirge zwischen Olchusz und Krakau, bei Kromolon und Niegonomie aus schneeweißem Dolomit, der hier 1200 bis 1400 Fuß hohe zackige Felsen bildet.

Von dem Jurakalkstein unterschieden ist der Alpenkalk oder Kreidekalk, der einen großen Theil unserer Alpen bildet und hier öfters eine Mächtigkeit (Dicke) zeigt, die über 8000 Fuß beträgt. An die Bildungen des Alpenkalkes schließt sich der schon vorhin beschriebene Quader- und Grünsandstein als ein zu ihm gehöriges Glied an, denn auf diesem ruhet an den meisten Orten der Alpen- oder Kreidekalk auf. Dieser wird in einigen Gegenden des mittleren Deutschlands der Plänerkalk genannt. Er findet sich als solcher auf dem Quadersandstein in Sachsen, Böhmen, Schlesien und im nördlichen Deutschland, namentlich um Dortmund, Wattenscheid, Unna in Westphalen, auch im Hannöverschen und Lüneburgischen. Zu ganz vollkommnem Kreidekalk entwickelt zeigt er sich auf der Insel Rügen. Der Alpen- oder Kreidekalk enthält häufig in seinem Innern Quarz- und Feuersteinmassen, welche nach Zerstörung des Kreidegebirges frei auf dem Lande liegen bleiben. — Die Schiefer bei Oeningen am Bodensee gehören zu den beim Quadersandstein erwähnten tertitären (auch Süßwasser) Ablagerungen.

Den Flötzgyps findet man auch hin und wieder in Deutschland mit dem Flötzkalk und Sandstein zusammen. So z. B. in Mecklenburg und bei Lüneburg; in Thüringen bei Jena (den fasrigen) und im Unstrutthal; im Baireuthischen bei Dölau, im Ansbachischen bei Gnabronn, dann bei Windsheim, Neuburg an der Donau; im Würtemberger Lande bei Weinsberg, dann zu Fuessen am Lech und anderwärts im südlichen Bayern, z. B. zwischen Murnau und Partenkirchen, so wie bei Lengries unweit Tölz. Es ist aber der Gyps, schon durch seine Weichheit, so leicht zu unterscheiden, daß ihm wohl Jeder erkennen kann, der ihn in seiner Gegend findet, wenn er das oben im §. 8 Gesagte sich merken will.

Wo Gypsgebirge sind, da sind auch an vielen Orten Salzquellen und Steinsalz.

Wer gerne Flötztrappgebirge sehen will, der braucht nur nach Kemnath oder nach Neustadt am Culm zu gehen, oder von Kemnath nach Eger hinauf. Noch mehr Basalt giebts am Rhöngebirge, z. B. am Kreuzberg, dann im Darmstädti-

Digitized by Google

schen und in Hessen; am Rhein überall, um Coblenz und Bonn, auf und in dem dortigen Schiefer, und auch in Böhmen und Sachsen, dann im Würtemberger Lande, nach dem Bodensee hinunter, z. B. bei Engen, so wie auch zwischen Münsingen und Reutlingen giebt es Basaltgebirge.

Den aufgeschwemmten Sand und Lehmen und Thon braucht man zwar in Deutschland nirgends sehr weit zu suchen, denn fast jeder große Fluß und auch viele kleine haben um ihr Ufer her solches aufgeschwemmtes Land; wer sich indeß recht satt am Sande sehen will, der braucht nur die Reise von Leipzig bis Danzig, oder hinauf nach Pommern und Mecklenburg, oder auch von Leipzig nach Hamburg und Bremen zu machen, wobei er auch den Weg über die Lüneburger Haide mitnehmen kann. Indeß kann einer schon auf dem Wege von Nürnberg bis Roth sehen, was Sandboden ist, und daß da die Leute eben so vergnügt und glücklich sind, als die auf dem Ur- oder dem Flötzgebirge. Denn der Boden macht darin gerade gar keinen Unterschied, sondern Gottesfurcht und Fleiß; und guten Menschen schmecken die Kartoffeln auf ihren rauhen Gebirgen eben so gut, wie denen, die in den Ebenen wohnen, ihr Weißbrod; wenn beide das, was sie haben, mit Dank gegen Gott genießen. Auch hat wirklich jede Gegend ihr besonderes Gutes, die eine hat Bergbau und Erze und recht viel Holz, die andre hat Wein, die dritte hat Korn, damit eine Gegend der andern das geben soll, was sie im Ueberfluß hat, und von der andern nehmen, was diese in Menge besitzt, und so die Menschen, wenn auch einstweilen nur abbildlich, das Mittheilen lernen sollen. Und wenn man den, der oben auf den Bergen wohnt, fragt, ob er nicht herunter ziehen mag in die Ebene, wo es so viel Korn giebt, oder den aus der Ebene, ob er hinauf ziehen möchte auf die Berge, wo es so viel Erz giebt und gute Viehweiden, so wird meistens keiner gerne mögen. Denn da, wo er geboren ist, hat er seine Bekannten und Gevattern, die ihn lieb haben, und der Mensch ist doch nur da gern, wo andere ihn, und er andere lieb hat.

Das sey denn genug von der Gebirgskunde. Nur noch das wollen wir uns merken, daß, wenn der Mensch in andere Welttheile, z. B. nach Afrika, an's Vorgebirge der guten Hoffnung, oder nach Amerika und Asien reis't, er zwar dort überall andre Bäume, andere Thiere und auch andre Menschen findet, welche er nicht kennt und die ihn nicht verstehen; aber wenn er dann den Erdboden ansieht, wird er zu seiner großen Freude bemerken: daß da derselbe Granit liegt, oder derselbe Sandstein, wie beim Ochsenkopf am Fichtelgebirge, oder wie an der Veste bei Nürnberg. Und das

Digitized by Google

macht dann immer im fremden Lande einen guten Muth, weil man merkt, daß man doch wenigstens auf demselben Erdboden steht, wie die Nachbarn zu Hause; so wie ja auch dieselbe Sonne und derselbe liebe Gott überall zu finden ist, wo man die Augen zu Ihm aufhebt.

II.

Die Geschichte der einzelnen Steine, oder Mineralogie.

A. Die chemische Beschaffenheit der Mineralien.

§. 11. Wenn man ein Stück Granit genauer betrachtet, dann bemerkt man bald, daß derselbe kein durch und durch gleichartiges Gestein, sondern daß er nach S. 13 aus mehreren (in der Regel aus drei) verschiedenen Steinarten zusammengesetzt sey. Wenn man dagegen ein Stück reinen Kalkstein zerschlägt, oder dasselbe in einem Mörser zu Staub zermalmt und hierauf die einzelnen Theilchen, etwa durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, dann findet man, daß sie alle von einerlei Beschaffenheit sind, daß ein Theilchen, abgesehen von einer vielleicht noch bemerkbaren Verschiedenheit der Größen, dem andern vollkommen gleicht. Der Kalkstein erscheint uns auf diese Weise als ein durch und durch gleichartiger, einfacher Körper.

Aber jeder Maurer, jeder Kalkbrenner weiß es, daß der Kalkstein, so einfach er auch aussieht, dennoch zusammengesetzt sey, und zwar aus wenigstens zwei Elementen, welche jedoch nicht so, wie der Feldspath, Glimmer und Quarz, für das Auge unterscheidbar neben einander, sondern in vollkommener Durchdringung und Einigung eines im andern vorhanden sind. Denn wenn man den Kalkstein einer starken Hitze aussetzt, da trennt sich das eine seiner beiden Hauptelemente, die Kohlensäure von dem andren, sie nimmt die Luftform an und verflüchtigt sich; das andre, erdige Element bleibt als ätzender Kalk zurück. Aber selbst diese

Digitized by Google

beiden, die Kohlensäure wie die ätzende Kalkerde sind noch keine eigentlichen, einfachen Elemente oder wahrhaften Grundstoffe, sondern beide sind schon, jedes aus zwei Grundstoffen zusammengesetzt. Die Kohlensäure entsteht nämlich, wenn die Kohle oder vielmehr, da wir im gemeinen Leben unter Kohle einen meist sehr gemischten Körper verstehen, der reine Kohlenstoff mit einem andern, luftartigen Stoffe sich verbindet, welcher in der Atmosphäre überall zu finden ist und Sauerstoffgas, oder auch Lebensluft heißt. Man könnte ihn auch den Zündstoff nennen, denn er ist es, welcher durch seinen Zutritt die Entzündung der brennbaren Körper zur hellen Flamme unsres Ofenfeuers oder unsrer Kerzen und Lampen möglich machet; diese beide verlöschen augenblicklich, wenn ihr Brennstoff kein reines Sauerstoffgas mehr um sich findet, mit dem er sich verbinden kann. Und nicht allein die Kerze verlischt, wenn ihr der Zündstoff oder das Sauerstoffgas entzogen wird, sondern auch die Menschen und die Thiere müssen ersticken, wenn ihnen jene Luftart, welche das Athmen, und mit diesem zugleich das Leben unterhält, genommen wird. Dies ist der Grund, weshalb man die erwähnte Gas- oder Luftart auch Lebensluft genannt hat; Sauerstoffgas aber heißt sie, weil die brennbaren Körper, wenn sie mit ihr sich verbinden, in vielen Fällen, wie die Kohlensäure in unsern Sauerbrunnen, oder wie die Schwefelsäure, die sich durch das Verbrennen des Schwefels bildet, einen sauren Geschmack annehmen.

Nicht nur die Kohlensäure, die beim Brennen des Kalksteines aus diesem entflieht, sondern auch die ätzende Kalkerde, die nach diesem Brennen zurückbleibt, ist schon ein zusammengesetzter Körper. Dies hat man erst in neuerer Zeit erkannt, und gefunden, daß in der ätzenden Kalkerde eben so wie in der Kohlensäure ein eigenthümlicher Brennstoff enthalten sey, der mit dem Sauerstoffgas sich chemisch vermischt und geeinigt hat. Dieser Brennstoff der Kalkerde, Calcium genannt, unterscheidet sich aber sehr wesentlich von dem der Kohlensäure, oder dem Kohlenstoff, denn er gleicht seinem

Digitized by Google

Aussehen nach einem Metall, ist aber sehr leicht, entzündet sich augenblicklich mit dem Sauerstoff und nimmt nun ein größeres Gewicht an, als er vorher hatte, während die eigentlichen Metalle durch auffallende Schwere sich auszeichnen und nach ihrer Verbindung mit dem Sauerstoffgas leichter werden, als sie zuvor waren. So ist denn der anscheinend einfachste, und reinste Kalkstein, abgesehen von einem kleinen Antheil von Wasser, das in ihm eine feste Gestalt angenommen hat, nicht nur aus zwei, sondern aus vier eigentlichen Elementen zusammengesetzt, die sich nun nicht weiter theilen lassen, sondern, so weit unsere Kenntnisse reichen, als einfache Grundstoffe angesehen werden müssen.

Wie der Kalkstein, so sind die meisten, in unsere Augen fallenden Körper unsrer irdischen Natur nicht einfach, sondern aus mehreren Grundstoffen (chemisch) zusammengesetzt. Ist doch selbst das Wasser, das man vor Alters allgemein als ein einfaches Element betrachtete, kein solches, sondern aus der Verbindung, ebenfalls eines eigenthümlichen Brennstoffes, mit dem Sauerstoffgas gebildet. Der Brennstoff des Wassers ist in seinem gewöhnlichen freien Zustand eben sowohl eine Luftart, als das Sauerstoffgas und heißt Wasserstoffgas. Er ist der leichteste Körper, den wir auf Erden kennen, 16mal leichter als die Lebensluft, wird deshalb namentlich zur Füllung der Luftballons benutzt. Das Wasserstoffgas heißt auch brennbare Luft, weil dasselbe, wenn es mit Sauerstoffgas gemischt oder in Berührung ist und eine Flamme sich ihm naht, sich plötzlich, meist mit einem lauten Knall entzündet.

Im Gyps, dessen wir auch schon auf S. 19 erwähnten, ist die Kalkerde nicht mit Kohlensäure, sondern mit Schwefelsäure vereint, welche, wie bereits gesagt, aus der Verbindung des brennbaren Schwefels mit dem Sauerstoffgas entstanden ist. Ueberhaupt gehet das Sauerstoffgas unter allen Grundstoffen am öftersten mit den andern Grundstoffen Verbindungen ein, es verhält sich dabei zu diesen, auch

Digitized by Google

wenn kein eigentliches Verbrennen mit Flamme bei seiner Vermischung eintritt, wie Zündstoff zum Brennstoff. Aber nicht allein das Sauerstoffgas, sondern auch der Schwefel, der ihm für gewöhnlich zum Brennstoff dient, kann mit andern Grundstoffen Verbindungen eingehen, wobei diese den Brennstoff darstellen, er aber, an der Stelle des Sauerstoffes, als Zündstoff auftritt. Man kann, namentlich Kupfer, Eisen und andre Metalle bei einem hohen Grade der Erhitzung so mit dem Schwefel verbinden, daß dabei eine helle Flamme entsteht. Auch der sehr leicht brennbare Phosphor so wie selbst das Wasserstoffgas nehmen in vielen Fällen, bei ihrer Verbindung mit andern Grundstoffen, die Stellung und Eigenschaft des Zündstoffes an; unser gemeines Kochsalz enthält als Brennstoff ein Element (Natrium genannt), welches eben so wie jenes der Kalkerde einem Metall gleich siehet, ohne die andern Eigenschaften der Metalle zu theilen, und die Stelle des Sauerstoffgases vertritt, als Zündstoff das Chlor. Unter den Metallen sind es namentlich der Arsenik und der Spiesglanz (davon unten), welche sich gegen andre Metalle, z. B. das Silber, wie Zündstoff gegen den Brennstoff benehmen, obgleich sie selber gegen das Sauerstoffgas und während des Vereines mit diesem brennbar sind.

So beruhet die Vereinigung der Elemente unsrer irdischen Sichtbarkeit auf einer wechselseitigen Anziehung, welche jener gleicht, die beim Brennen jeder Kerze, jedes Stückchen Holzes zwischen dem brennbaren Körper und dem Sauerstoffgas wirksam ist. Man kann bei dieser Anziehung, wenn man will, den Brennstoff als den vorzüglich thätigen betrachten, welcher, gleich wie das hungernde oder athmende Thier die Speise oder die Luft, so den Zündstoff in sich auffasset. Aus diesem Grunde kann man, wie dies die Naturkundigen aus andrer Ursache gethan haben, die Reihe der Brennstoffe als die selbstthätigen, positiven Elemente, die der Zündstoffe als die negativen bezeichnen.

Die Scheidekunst (Chemie) unsrer Tage hat in der irdischen Körperwelt bereits 56 einfache Grundstoffe nachgewiesen,

Digitized by Google

davon gegen drei Fünftheile zu den eigentlichen Metallen, ein Fünftheil zu den metallähnlichen Grundlagen der Erdarten und Laugensalze gehören, während das letzte Fünftel die ebenfalls später zu erwähnenden Luftarten und die gleich dem Schwefel und Phosphor öfters als Zünd- wie als Brennstoff auftretenden, negativen, nichtmetallischen Grundstoffe umfasset. Wir werden Gelegenheit finden, von den meisten derselben zu sprechen.

Bei den Verbindungen, welche die Grundstoffe mit einander eingehen, ist der Umstand sehr bemerkenswerth, daß die Gewichtstheile der einzelnen Elemente jederzeit in bestimmten Proportionen mit einander vereint gefunden werden. Der sogenannte weiße Marmor oder Urkalk (nach S. 16) mag aus Schweden oder aus Italien oder sonst aus einem Lande der Erde seyn, immer sind in ihm gerade so wie in unsrem deutschen Urkalk 11 Theile Kohlensäure mit 14 Theilen Kalkerde vereint. Statt der Kohlensäure finden sich im Gyps 20 Theile Schwefelsäure mit 14 Theilen Kalkerde verbunden. Aber in dem Verhältniß, in welchem die beiden genannten Säuren ihre Verbindungen mit der Kalkerde eingehen, thun sie dies auch mit andren Stoffen, denn in der kohlensauren Baryterde (im Witherit) sind ebenfalls 11 Loth Kohlensäure, im schwefelsauren Baryt oder gemeinen Schwerspath 20 Theile Schwefelsäure mit $38\frac{3}{10}$ Baryterde verbunden, während sich von der Talkerde nahe 10 Loth mit 11 Loth Kohlensäure zum kohlensauren, mit 20 Loth Schwefelsäure zum schwefelsauren Talk vereinigen. Das Zinkmetall wird beim Verbrennen zur Zinkblüthe, die aus $32\frac{1}{2}$ Gewichtstheilen des Metalles und aus 8 Theilen Sauerstoffgas besteht. Dieselbe Masse von $32\frac{1}{2}$ Theilen des Metalles bildet mit 16 Theilen Schwefel den Schwefelzink oder die Blende. Und so wie in diesem Falle doppelt so viel Schwefel als Sauerstoffgas mit dem Metall sich vereint, geschieht dies auch in andern Fällen, denn vom Zinn verbinden sich 59, vom Blei 104 Gran mit 8 Gran Sauerstoff zum Metallkalk, mit 16 Theilen Schwefel zum Schwefelzinn oder Schwefelblei (Bleiglanz). Und so gilt es von allen Grundstoffen, daß, wenn man die Gewichtsmenge kennt, in der sich irgend ein andrer Grundstoff mit einem von ihnen vereint, man daraus berechnen kann, wie viel er von einem dritten Grundstoff aufnehmen werde, um mit demselben eine gesättigte Verbindung zu bilden. Hat man z. B. erkannt, daß 8 Gran Sauerstoffgas mit 6 Gran Kohlenstoff eine Verbindung eingehen, so kann man daraus schliessen, daß auch andre Grundstoffe in dem Verhältniß wie 4 zu 3 den Sauerstoff oder den Kohlenstoff aufnehmen werden. Nun giebt es aber allerdings Fälle, in denen eine größere Portion von Sauerstoffgas oder Schwefel, oder von sonst einem Element mit einem andern Grundstoff vereint gefunden wird als gewöhnlich, und bei dieser Gelegen-

Digitized by Google

heit hat man die merkwürdige Erfahrung gemacht, daß dieſe größeren Gewichtsmengen ſich zu den gewöhnlichen verhalten wie 2, 3, 4 u. ſ. w. zu 1. So verbinden ſich 104 Gran metalliſches Blei mit 8 Gran Sauerſtoffgas zur gelben Bleiglätte, während ſie in der Verbindung mit 16 Gran Sauerſtoff die Mennige bilden. 16 Gran Schwefel bilden mit 8 Gran Sauerſtoffgas die unterſchwefliche Säure. Wenn man den Schwefel verbrennt, dann entſteht die ſchwefliche Säure, in welcher 16 Gran Schwefel mit 2 mal 8 Gewichtstheilen Sauerſtoffgas vereint ſind, während die eigentliche Schwefelſäure dreimal 8 oder 24 Gewichtstheile Sauerſtoffgas auf 16 Theil Schwefel enthält. Auch in der eigentlichen Kohlenſäure ſind 2 mal 8 Miſchungstheile Sauerſtoffgas mit 6 Kohlenſtoff vereint, im Kohlenoxydgas nur 8 mit 6. Alle dieſe merkwürdigen Verhältniſſe der feſtſtehenden Proportionen der Gewichte werden unter dem Namen der ſtöchiometriſchen zuſammengefaßt, und die Körper, welche aus dem Verein der verſchiednen Maßtheile entſtehen, zeigen ſich auch in ihren Eigenſchaften verſchieden, wie z. B. der Magnetkies (davon wir ſpäter reden werden) vom gemeinen Schwefelkies. Jener, der nur die Hälfte von der Gewichtsmenge des Schwefels enthält, die im Schwefelkies gefunden wird, hat eine andre Farbe, iſt viel weniger hart als dieſer und wirkt auf die Magnetnadel, was der Schwefelkies nicht vermag. Bei ſolchen Grundſtoffen, welche vor ihrer Verbindung die Luftform beſitzen oder dabei annehmen, hat man noch überdies die Bemerkung gemacht, daß ſie auch nach feſtbeſtimmten Verhältniſſen ihres Rauminhaltes ſich vereinen. So bildet ein Kubikzoll Sauerſtoffgas mit einem Kubikzoll des luftförmigen Kohlenſtoffes das Kohlenoxydgas mit 2 Kubikzollen Waſſerſtoffgas das Waſſer.

Da von den chemiſchen Beſtandtheilen der Mineralkörper die Eigenſchaften ſo wie die Benutzbarkeit derſelben abhängt, ſchien es nöthig, die Lehre von den Grundſtoffen und ihren Verbindungen in einiger Ausführlichkeit zu betrachten.

B. Die regelmäßige Geſtaltung oder Kryſtalliſation der Mineralien.

Die Entdeckung, daß die Elemente der Körper ſich nur in gewiſſen feſtbeſtimmten Proportionen chemiſch verbinden, hat ein Deutſcher, Namens Richter, gemacht, und hierdurch iſt auch in der Lehre von der gegenſeitigen Anziehung der Stoffe ein Licht aufgegangen, das uns ſelbſt in dieſen dunklen Tiefen der Körperwelt jene Ordnung erkennen läſſet, die von dem Walten einer allbedenkenden, allerwägenden Schöpfer-

Digitized by Google

kraft das unverkennbarſte Zeugniß giebt. Auf eine andre, ſehr folgenreiche Wahrheit, in Beziehung auf die regelmäßige Geſtaltung oder Kryſtalliſation der Körper hat ebenfalls ein Deutſcher, der nämliche J. N. Fuchs, von welchem wir oben, auf S. 15 ſprachen, neuerdings aufmerkſam gemacht. Er hat es gezeigt und erwieſen, daß die regelmäßige Geſtalt, z. B. beim Bleiglanz oder beim Kalkſpath, die man durchs Zerſchlagen in lauter kleine, zuletzt nur noch unter dem Vergrößerungsglas erkennbare Würfel oder Rautenwürfel zertheilen kann, nicht daher komme, daß dieſe Körper gleich urſprünglich aus untheilbar kleinſten, regelmäßig geformten Theilchen, den ſogenannten Atomen zuſammengeſetzt ſind, welche von jeher dieſe Geſtalt hatten und dieſelbe auch niemals verlieren können, ſondern daß dieſe Geſtaltung die Folge einer noch beſtändig fortwirkenden Kraft ſey, welche die an ſich geſtaltloſen (amorphen) Elemente nach außen und innen, bis ins Kleinſte hinein durchdringt, und eben ſo, wie die Lebenskraft in den Thieren und Pflanzen, wenn ſie die ernährenden Stoffe in ihren Wirkungskreis hereinzieht, etwas ganz Neues aus ihnen ſchaffet. Es wirken demnach auch bei der Bildung der Kryſtalle nicht ſolche mechaniſche Verhältniſſe, nach denen etwa ein ſchon vorher geformter Ziegelſtein auf und an den andren gefügt wird, ſondern ſchaffende Kräfte, die nur ein Schöpfer und Bildner der Welt in ſeine Geſchöpfe legen konnte und in ihnen, als lebendiger Quell aller Kräfte, zu erhalten vermag. Die regelmäßigen Geſtalten der Mineralien laſſen ſich in 6 verſchiedene Familien theilen.

1) Wer zum erſten Mal einen Kryſtall, namentlich den ſpäter zu beſchreibenden Bergkryſtall, mit ſeinen glatten, ſymmetriſch an einander gefügten Flächen, Kanten und Ecken ſiehet, und von der regelmäßigen, natürlichen Geſtaltung der Steine noch keinen Begriff hat, der mag leicht auf den Gedanken kommen, daß dieſes ſechsſeitige Prisma, das nach oben und öfters auch nach unten in eine ſechsſeitige Pyramide endigt, durch eine künſtliche Menſchenhand ſo gebildet und

Digitized by Google

geſchliffen ſey. Und dennoch würde es der Menſchenkunſt ſchwer fallen, eine ſolche genaue Symmetrie oder Gleichmäßigkeit der Kanten und Ecken herauszubringen und innen zu halten, wie ſie bei allen Kryſtallen derſelben Art gefunden wird. Wenn man ſich von einer Kante oder von einer Ecke der Kryſtallgeſtalt des Bergkryſtalles oder Quarzes eine Linie, durch den Stein gezogen denkt, ſo daß ſie genau den Mittelpunkt deſſelben durchſchneidet, dann wird das andere Ende der Linie gerade auf eine gegenüberſtehende Ecke auftreffen, ſo daß man drei ſolcher Linien zählen kann, die ſich im Mittelpunkt des Prismas unter einem Winkel von 120 Grad durchſchneiden. Man nennt dieſe Linien Axen und jede derſelben iſt hier den beiden andern gleichartig. Aber zu dieſen 3 Axen kommt noch eine vierte, dies iſt die Linie, welche man ſich von der einen Spitze der beiden 6ſeitigen (oberen und unteren) Pyramiden nach der anderen, durch die Mitte der 3 übrigen Axen gezogen denken kann, welche alle 3 in einer Ebene liegen, welche von der vierten Axe ſenkrecht, unter einem rechten Winkel durchſchnitten wird. Man nennt ſolche Kryſtallgeſtalten, in denen 3 gleichmäßig angeordnete, in einer Ebene liegende Axen von einer vierten ungleichmäßigen (längeren oder kürzeren) Axe ſenkrecht durchſchnitten werden, ſechseckige oder ſechswinklige (hexagonale.)

2) Die Würfelform, oder die regelmäßig achtflächige und die zwölfflächige Geſtalt, welche das Kochſalz und der Alaun bei ihrer Kryſtalliſation annehmen und die ſich beim Schwefelkies, Bleiglanz, Flußſpath, beim Granat und vielen andren Mineralien findet, zeigt ſich von den eben erwähnten Formen, die namentlich am Quarz gefunden werden, ſehr verſchieden. Die drei Hauptrichtungen der räumlichen Ausdehnung, die der Höhe, der Breite und der Tiefe ſind ſich am Würfel vollkommen gleich; wenn man ſich von einer der 6 Ecken des regelmäßigen Achtflaches eine Linie nach der gegenüberſtehenden andern gezogen denkt, dann erhält man 3 Axen, die unter einem rechten Winkel ſich durchſchneiden und davon eine der andern

Digitized by Google

an Länge gleich iſt. Man nennt alle dieſe Formen, die ſich durch ihre große Symmetrie auszeichnen, die würflichen oder teſſeralen.

3) Beim Zinnſtein, ſo wie beim Hyazinth findet man auch zuweilen eine achtflachige Geſtaltung, wenn man aber durch die drei Paare der einander gegenüberliegenden Ecken 3 Linien zieht, dann erkennt man 3 Axen, die ſich zwar auch unter einem rechten Winkel durchſchneiden, davon aber nur 2 einander an räumlicher Ausdehnung gleichen, die dritte hiervon verſchieden, bald länger iſt als jene beiden, ſo daß ſtatt des Würfels ein vierſeitiges Prisma entſteht, bald aber auch kürzer, woraus eine ſtumpfe, flache 4ſeitige Doppelpyramide (niederes Achtflach) entſteht. Man kann die hierher gehörigen Kryſtallformen die vierſeitigen oder viereckigen (tetragonalen) nennen.

4) Wenn der geſchmolzene Schwefel bei ſeinem langſamen Erkalten in regelmäßige Geſtaltung übergeht, oder wenn wir das Bitterſalz und den Zinkvitriol aus ihrer Auflöſung im Waſſer, durch allmäliges Abdampfen kryſtalliſiren laſſen, dann entſteht bei jenem eine Art von Achtflach, bei dieſem eine vierſeitige Säule. Die 3 Linien, welche man durch die Ecken des Achtflaches ſo wie durch die beiden Paare der Kanten und in der Längsrichtung der Säule ſich gezogen denken kann, durchſchneiden ſich zwar auch unter einem rechten Winkel, aber keine gleicht der andern, alle drei Richtungen ſind mehr oder minder deutlich an Ausdehnung verſchieden; 2 einander gegenüber liegende Seitenflächen der Säule ſind ſchmäler, 2 breiter, das eine Paar der Kanten ſtumpfer, das andere ſpitzwinklicher. Man könnte die hieher gehörigen Kryſtallformen, in Beziehung auf die Stellung und Beſchaffenheit ihrer Axen die rechtwinklich dreipaarigen nennen.

5) Wenn man den Eiſenvitriol oder das Glauberſalz aus ihrer Auflöſung im Waſſer kryſtalliſiren läßt, dann erhält man eine meiſt breite, ſchiefe Säule von rautenförmigem Umriß, die oben und unten in Flächen endiget, welche ſchief auf der Längenaxe des

Digitized by Google

Prismas aufſitzen. Von den 3 Axen dieſer Säule durchſchneiden ſich 2, (die der Länge und eine, welche durch 2 Flächen oder Kanten des Prismas gehet) unter einem ſchiefen Winkel, während ſie beide von der dritten Axe (von jener der Breite) rechtwinklich durchſchnitten werden. Ein ähmliches Verhältniß findet bei den Kryſtallformen des Fraueneiſes und des Feldſpathes ſtatt und man kann dieſe Geſtaltung als die ſchiefwinklich zwei- und rechtwinklich einpaarige bezeichnen.

6) An den ſchönen Kryſtallformen des Kupfervitriols, welche ſo leicht durch Abdampfen ſeiner Auflöſung zu erhalten ſind, bemerkt man, daß von den 3 Axen keine die andere rechtwinklich durchſchneide, keine der Flächen einer andren, gegenüberſtehenden gleiche und entſpreche. Eine ſolche Form könnte man in Beziehung auf die Axen, als die dreifach ungleichartige benennen.

Im Allgemeinen erwähnen wir noch, daß die gewöhnlichſten Kryſtallformen der einzelnen Mineralien dadurch öftere Veränderungen erleiden, daß an ihnen da, wo vorher eine Ecke oder eine Kante war, eine Fläche und umgekehrt, da wo die Fläche war, eine Ecke oder Kante eintritt. So wird durch Verwandlung ſeiner Ecken in Flächen aus dem Würfel das Achtflach, durch gleiche Verwandlung der Kanten aus beiden das Zwölfflach, wie aus dieſem wieder das faſt kugelförmige Vierundzwanzigflach. Eben ſo entſteht aus dem 3ſeitigen Prisma durch dies Flächenwerden oder die Abſtumpfung aller ſeiner Kanten und aus der geſchobenen vierſeitigen Säule durch Abſtumpfung der beiden ſcharfen Seitenkanten das 6ſeitige Prisma. In manchen andren Fällen zeigen ſich auch da, wo gewöhnlich die Kanten oder Ecken ſind, durch eine Art von Zuſchärfung oder Zuſpitzung, 2, 3 Flächen oder eine Fläche iſt in mehrere getheilt.

Auch nehmen zuweilen einzelne Flächen eine ungewöhnliche Ausdehnung an, ſo daß, wenn dies bei 2 gegenüberliegenden der Fall iſt, die Kryſtallgeſtalt tafelförmig wird, oder der Würfel eine, nach einer Richtung hin verlängerte Geſtalt gewinnt, wodurch er einem 4ſeitigen Prisma ähnlich wird. Sehr häufig kommt es vor, daß die Kryſtalle nicht vollſtändig, ſondern nur an einem Theil ihres Umriſſes ausgebildet ſind; öfters finden ſich auch 2, 3 und mehrere Kryſtalle derſelben Art zu Zwillings- oder Drillingsformen mit einander verwachſen, oder eine Menge derſelben iſt kuglich, ſo wie reihenartig (treppenförmig) zuſammenge-

Digitized by Google

häuft, woraus nicht selten eine dendritische (einem kleinen Baum gleichende) Aneinanderlagerung entsteht.

Da sich vollständige, oder wenigstens nach einen Theil ihrer Flächen deutlich ausgebildete Krystalle nur dann bilden können, wenn ihre Gestaltung allmählich vor sich gieng, und wenn denselben zu ihrer Vollendung ein hinlänglicher freier Raum gegeben war, findet man häufig bei den Mineralien statt der einzelnen Krystalle nur krystallinische Massen, die durch Aneinanderhäufung unvollständig ausgebildeter Krystalle entstanden sind. Dergleichen krystallinische Massen sind die sogenannten körnigen Gesteine, von denen der Urkalk ein Beispiel giebt, in welchem man, beim Zerschlagen desselben, unzählige kleine, schimmernde, glatte Stellen bemerkt, welches unvollkommen ausgebildete und gleichsam verkümmerte Flächen der über und durch einander gehäuften Krystallkeime sind. Statt der körnigen, sogenannten Absonderung der krystallinischen Massen zeigt sich bei andren Steinarten eine stängliche oder fasrige, welche aus der Zusammenhäufung der ununterscheidbaren dickeren oder nadelförmig dünneren Säulen hervorgegangen ist. Diese Arten der Zusammenfügung werden öfters zuletzt so fein, daß man ferner keine Spur der anfänglichen Entstehung, aus unvollständigen Krystallen, mehr an ihnen unterscheiden kann; es sind dann dichte Massen, welche dennoch durch die Kraft einer krystallinischen Gestaltung erzeugt worden sind, und die deshalb, außer der deutlichen Gestalt, alle andre Eigenschaften der Krystallformen ihrer Art besitzen.

C. Die innere Beschaffenheit der Steinarten.

Ein zur Krystallform ausgebildetes Mineral ist auch, wie wir oben sahen, in seinem Innern durch und durch aus dem gestaltlosen zu dem gestalteten Zustand übergegangen. Man kann dies bei vielen Steinarten recht deutlich bemerken, wenn man ihre Krystalle oder krystallinischen Massen nach gewissen Richtungen zerschlägt oder zerspaltet, denn man kann sie auf diese Weise in regelmäßig würfliche oder rautenförmige, achtflachige oder prismatische Stücken zertheilen. Diese regelmäßigen Bruchstücke, die sich jeder Anfänger aus dem Bleiglanz, aus großen Kochsalz-Würfeln, aus dem Kalkspath, Flußspath u. s. w. herausschlagen kann, stehen mit den gewöhnlichsten Krystallformen der einzelnen Mineralien in solcher nahen Beziehung, daß man sie als die Grundgestalten dieser Formen be-

Digitized by Google

trachten kann. In vielen Fällen kann man diese Grundformen dadurch sich leichter kenntlich machen, daß man die Krystalle, welche man spalten will, vorher glühet und in kaltem Wasser ablöscht.

Von solchen Steinarten, bei denen sich die innre, krystallinische Gestaltung durch die glatten Flächen, die bei ihrem Zerschlagen zum Vorschein kommen, kund giebt, sagt man, daß sie einen blättrigen Bruch haben; bei andern, wo sich durch die mechanische Zertheilung keine regelmäßige Richtung der neuentstandenen Flächen wahrnehmen läßt, sagt man, daß sie einen muschlichen (rundlich eingetieften und glatten) oder splittrigen, unebenen oder ebenen, erdigen oder hakig (wie das zerreißende Fensterblei) gedehnten Bruch haben.

D. Das Eigengewicht oder die Schwere der Steinarten.

Bei der Bestimmung der Eigenschwere der in das Mineralreich gehörigen Körper wird das Gewicht des Wassers als Einheit angenommen und man giebt dabei bloß an, um wie vielmal ein Mineralkörper leichter oder schwerer ist als das Wasser. Ist derselbe tropfbar flüssig, wie das Erdöl oder das Queckſilber, dann bedient man sich eines cylindrischen Gläschens, das man etwa oben mit einer Glasplatte zudeckt. Dasselbe wird zuerst leer gewogen, dann ganz mit Wasser gefüllt und wieder gewogen, so daß man jetzt das Gewicht des in ihm enthaltenen Wassers erfährt. Wenn man dann dieses ausschüttet und statt seiner das kleine Gefäß eben so weit z. B. mit Queckſilber anfüllt, hierauf von neuem wiegt, findet man leicht, daß die Eigenschwere des Queckſilbers 14mal größer sey als die des Wassers. Wenn aber der Körper, den man so abschätzen will, fest ist, dann bringt man ihn, nachdem man ihn und das Gefäß mit Wasser vorher genau gewogen, ebenfalls in dieses hinein und treibt dabei gerade so viel Wasser aus dem ganz gefüllten Glas heraus, als sein Raumumfang beträgt,

Digitized by Google

und wenn z. B. der eingetauchte Stein für sich allein 3 Quentchen wog, die Gewichtsabnahme durch das Verdrängen des Wassers beträgt aber nur 1 Quentchen, da wiegt der Stein 3mal leichter, denn das Wasser. Auf einfachere Weise kann man zu derselben Kenntniß der Eigenschwere gelangen, wenn man ein Mineral, das mit dem einen Balken einer feinen Wage im Zusammenhang steht, in ein Gefäß mit Wasser taucht und dann an dem Sinken der andern Wagschaale es beachtet, wie viel das Mineral bei dem Einsenken ins Wasser scheinbar an Gewicht verloren hat. Das Wasser, welches durch dasselbe von seiner Stelle verdrängt wurde, hatte denselben Raumumfang wie das Mineral; je schwerer dieses ist, desto unbedeutender wird der Unterschied seyn, der sich bei seinem Eintauchen in das Wasser ergiebt. Denn ein Metall, das zehnmal so schwer als Wasser ist, und dessen zum Versuch gewähltes Stück 10 Gran wog, wird eine Senkung der andern Wagschaale bewirken, die sich durch das Herausnehmen eines einzigen Granes des in dieser liegenden Gewichtes wieder ausgleichen läßt; das Wasser, dessen Stelle das Metallstück einnahm, wog nur 1/10 so viel als dieses.

E. Der Zusammenhalt und die Härte der Mineralien.

Nur sehr wenige Mineralkörper sind, wie z. B. das Erdöl und das gediegene Queckſilber, flüssig, auch ist die Zahl derer nur gering, welche aus staubartigen, nur fest aufliegenden Theilchen bestehen, oder deren Masse so schwach zusammenhält, daß man sie zwischen den Fingern zerdrücken und zerreiben kann. Der bei weitem größere Theil der Mineralkörper verhält sich hierinnen so, wie man es vom Steinreich schon seinem Namen nach erwarten muß, er ist so fest, daß schon einige Kraft dazu angewendet, ja ein künstliches Werkzeug zu Hülfe genommen werden muß, wenn man in den Stein hineinritzen oder Splitter von ihm erhalten will. Zur Bestimmung der höheren Grade

Digitized by Google

der Härte bedient man sich deshalb des Mittels, daß man mit dem spitzigen Bruchstück des einen in die glatte Fläche eines andren hineinzuschneiden sucht, oder man nimmt auch, statt der Steinsplitter, zu einem Messer, zu einem Feuerstahl, zu einer gut gehärteten Feile seine Zuflucht. Mit einem Feuerstein oder mit der Spitze und mit dem scharfen Bruchstück eines Bergkrystalles kann man in das Fensterglas, so wie in Flußspath hineinschneiden; ein Splitter des Flußspathes ritzt aber wieder die glatten Flächen eines Kalkspath-Bruchstückes, ein Stück Kalkspath ritzt die Flächen des Steinsalzes, und das Fraueneis, so wie den gemeinen Talk kann man schon mit dem Fingernagel ritzen. Der Feuerstein aber, den wir vorhin zuerst nannten, ist auch bei weitem noch nicht der härteste Stein, sondern es giebt noch andre, durch welche man fast eben so stark in die glatten Flächen eines geschliffenen Bergkrystalles oder eines Feuersteines hineinritzen kann, als durch diesen in das Glas. Namentlich vermag man dieses durch die meisten Edelsteine, und man kann deshalb den höchsten Grad der Härte, welcher freilich wieder mehrere Stufen hat, unter der Bezeichnung der Edelsteinhärte zusammenfassen. Solche Steine, die zwar vom Splitter eines Topases geritzt werden, welche aber mit dem Stahle Funken geben, nennt man kieselharte, oder schlechthin harte; diejenigen, welche keine Funken am Stahle geben, von dem Messer aber sich nicht schneiden, sondern nur, zum Theil mit einiger Anstrengung, schaben (an der Schnittfläche zerstäuben) lassen, nennt man halbharte; jene, welche sich, wie die Schieferstifte, bequem mit dem Messer schneiden lassen, heißen weich, die, welche schon der Fingernagel ritzt, sehr weich.

Wenn beim Schlagen mit einem festen Körper, oder beim Schneiden mit einem Messer die Mineralkörper mehr oder minder leicht zerspringen und zerstäuben, heißen sie spröde und zerspringbar, wenn sie aber wie das gediegene Gold, wie Silber u. a. sich unter dem Hammer breit schlagen oder wie Fenster-

Digitized by Google

blei, ohne in kleine Splitter zu zerstäuben, schneiden lassen, heißen sie geschmeidig. Einige zeigen sich biegsam und selbst elastisch biegsam, wie die feinen Tafelbruchstücke des Glimmers.

F. Andre Verhältnisse der Mineralkörper zu unsern Sinnorganen.

Unser Auge bemerkt an den Steinen die Farben, welche im Mineralreich von außerordentlicher Reinheit und Schönheit gefunden werden, und großentheils durch eine Beimischung metallischer Stoffe entstanden sind; es bemerkt ferner den Ganz, welcher metallisch, demantartig, fettig, perlmutter- oder glasartig so wie stärker oder schwächer seyn kann, dann die Durchsichtigkeit oder Undurchsichtigkeit. Unter den durchsichtigen Mineralien giebt es einige, durch welche man die Gegenstände, statt einfach, doppelt sieht, von diesen sagt man, sie haben doppelte Strahlenbrechung. Manche Fossilien zeigen, zum Theil aus ihrem Innern heraus, ein Farbenspiel: sie opalisiren und irisiren (in Farben des Regenbogens). Noch andre empfangen, wenn man sie im Dunklen reibt, oder aus dem Sonnenlichte plötzlich ins Dunkel bringt, die Eigenschaft, einen mehr oder minder kurz andauernden Lichtschimmer von sich zu geben — sie phosphoresziren, was zuweilen auch beim Erhitzen ihres Pulvers ins Auge fällt. Von den wichtigsten dieser Eigenschaften werden wir bei Beschreibung der einzelnen Steinarten reden.

Noch eine andre Eigenschaft, welche manche Mineralien durch das Reiben oder Erwärmen empfangen, ist die, daß sie leichte Körper, wie Asche, Papierstückchen u. dergl. anziehen oder abstoßen; von diesen sagt man, daß sie elektrisch werden, während der Magneteisenstein so wie der Magnetkies Bewegungen der Magnetnadel bewirken und deshalb magnetisch sind, was der erstere sogar durch Anziehen der Eisenfeilspäne verräth.

Beim Anschlagen, beim Reiben, beim Anhauchen, ja selbst bei der bloßen Annäherung an das Geruchs-

Digitized by Google

organ, wird an mehreren Mineralkörpern ein eigenthümlicher Geruch bemerkt, am häufigsten bei solchen, die zu den brennbaren gehören. Dagegen erkennt man die Salze an ihrem Geschmack. Manche Mineralien fühlen sich gleichsam fett, wie Seife an, andre nur fein und mild, noch andre mager und rauh. Je dichter ein im Schatten stehender Stein ist, desto kälter fühlt er sich an. Einige Steinarten saugen so begierig die Feuchtigkeit ein, daß sie, wenn man sie an die feuchte Zunge bringt, daran ein wenig hängen.

G. Systematische Eintheilung der Mineralkörper.

Für die leichtere Uebersicht über das gesammte Reich der Fossilien behält noch immer jene ältere Art ihrer Eintheilung, in 4 Klassen, ihre Vorzüge, welche zunächst nur auf solche Kennzeichen Rücksicht nimmt, die selbst ohne Anwendung der chemisch zerlegenden Kunst in die Sinnen fallen. So läßt sich im Allgemeinen die Klasse der metallischen Fossilien durch ihre auffallende Schwere, öfters durch den metallischen Glanz unterscheiden; die Klasse der Salze durch ihren salzigen Geschmack und ihre Auflösbarkeit im Wasser; die Klasse der brennbaren Fossilien theils durch den Geruch und die geringe Schwere, vor allem aber dadurch erkennen, daß die meisten dahin gehörigen Körper schon an der Flamme oder in der Hitze des Ofenfeuers, oder doch bei einem Grad des Glühens sich entzünden, wobei das Silber noch nicht zum Schmelzen kommt. Zur Klasse der erdigen Fossilien gehören vor allem jene, deren ungeheuern Massen den Haupttheil unsrer Gebirge und der ganzen festen Erdoberfläche bilden, und welchen die Eigenschaften der 3 andern Klassen abgehen. Wie in den metallischen Fossilien das Metall, so bildet in den erdigen irgend eine Erdart, oder die krystallinische Kohle den wesentlichen Bestandtheil. Auch wird diese Klasse an der Uebereinstimmung gewisser anderer Eigenschaften, namentlich an der Härte, der, im Vergleich mit den Metal-

Digitized by Google

len, geringeren Schwere, den vorherrschenden Arten des Glanzes u. s. w. erkannt.

Indem wir auch hierin der älteren Anordnung folgen, beginnen wir mit der Beschreibung der zuletzt erwähnten Mineralien.

§. 12. Erste Klasse des Steinreiches: erdige Fossilien (Fossilia terrena), zu welchen theils jene Steinarten gehören, aus denen vorzugsweise die feste Erdoberfläche gebildet ist, theils aber solche, welche in ihren äußern Eigenschaften mit diesen Hauptgesteinen der Erde die größeste Aehnlichkeit zeigen. Den bei weitem meisten Mineralkörpern dieser Klasse liegen eine oder mehrere Erdarten zu Grunde. Man kann diese Klasse, der leichteren Uebersicht wegen, in folgende Ordnungen abtheilen.

I. In kiesliche Steine, Silicei. Mit dem Namen des Kiesels hat man ursprünglich, wie mit dem lateinischen Worte Cos, solche Steine und Felsenstücke bezeichnet, welche vornämlich durch ihre Härte vor andren, mit ihnen in Berührung kommenden Körpern sich auszeichneten (Cos als scharfe, den Schiffen gefährliche Klippe und als Wetzstein). An eine Beziehung dieses Namens auf den vorherrschenden chemischen Bestandtheil, welcher bei vielen hieher gehörigen Steinen die Kieselerde oder Kieselsäure ist, konnte man früher nicht denken, weil jener Grundstoff erst in späterer Zeit unterschieden und erkannt wurde. Allerdings werden wir nun hier solche Mineralien zusammenordnen, davon bei einer großen Zahl, statt einer andren Säure, die Kieselerde, für sich allein oder mit andren Erden verbunden auftritt, überdies aber auch, und zwar sogleich unter den ersten Nummern, solche aufführen, welche zunächst blos durch ihre Härte, durch den lebhaften Glanz, durch augenfällige Krystallisation an das allbekannt vor Augen liegende Geschlecht des Kiesels erinnern. Man verfährt hierbei nach denselben Grundsätzen, wie bei der systematischen Anordnung des Thierreiches, wo es sich auch der edle Löwe und der furchtbare bengalische Tiger gefallen lassen müssen, daß man sie unter ein Geschlecht ordnet, das man, nach

Digitized by Google

dem allbekanntesten zu ihm gehörigen Thier, das Geschlecht der Katzen nennt.

Man kann, vor allem nach ihrer Härte, die kieslichen Steine eintheilen in solche, die nach §. 11 E. die Edelsteinhärte haben, oder in edelharte, dann in Steine von der gemeinen Kieselhärte und in Afterhartsteine, welche nur halbhart und zum Theil nicht einmal dieses sind, übrigens aber durch andere Eigenschaften sich unmittelbar an die kieslichen anreihen.

A. Die Edelhartsteine ritzen großentheils in augenfälliger Weise den Feuerstein, sind mithin härter als dieser; die meisten von ihnen zeichnen sich überdies durch ihren starken Glanz aus. Dahin gehört vor allen andern:

1) Der Demant (Adamas), der härteste Stein und überhaupt der härteste Naturkörper der Erde, mit welchem man in alle andere Mineralien hineinschneiden kann und welcher mithin von den Steinschneidern zum Graviren und Durchbohren der Steine benutzt wird. Auch am Glanz kommt dem Demant kein anderer Körper gleich. Er findet sich öfters krystallinisch gestaltet und zwar in den Formen, die §. 11 B. Nr. 2 beschrieben sind, vornämlich in Achtflachen und Rautenzwölfflachen; er ist $3\frac{1}{2}$mal so schwer als das Wasser, zeigt meist lichte Farben. Ohngeachtet seiner großen Härte ist er dennoch spröd und zerspringbar. Seine Hauptfundorte sind Ostindien und Brasilien, wo er lose, im Sand oder eingewachsen im Sandstein vorkommt.

Der Demant, namentlich wenn er von wasserheller Farbe, und dabei als Brillant geschliffen ist, was nur mittelst des Pulvers eines Demantes geschehen kann, hat unter allen Kostbarkeiten der Erde den höchsten Geldwerth. Man spricht bei seiner Abschätzung nicht von Mark oder Loth, sondern von Karaten, davon 72 auf ein cöllnisch Loth gehen. Ein zum Brillant geschliffener Demant, der ein Karat wiegt, kann 70 bis 100 fl. kosten (der Werth ist nach verschiedenen Zeiten veränderlich). Wenn aber ein Demant von derselben Schönheit und Klarheit wie einer, der 100 Gulden geschätzt war, 2 Karat wiegt, dann wird er auf 2 mal 2 hundert, das heißt auf 400; ein 3 Karat schwerer auf 900, ein 10 Karat schwerer auf 10 mal 10 hundert, d. h. auf 10,000 Gulden ge-

Digitized by Google

schätzt. Darum schlägt man den Werth des sogenannten Amsterdamer Demantes, der im kaiserlich russischen Schatze ist und 194 Karat wiegt, weit über 3 Mill. Gulden an, obgleich er nur in Ostindien geschnitten, keine vollkommen schöne Brillantform hat; ja der Brillant, der unter dem Namen der Pitt, im Besitz der französischen Krone ist, hat, bei 136¾ Karat Gewicht, einen Werth von 3½ Mill. fl.; jener, der sich vormals im Schatze des Groß-Moguls befand, und der die Größe eines Taubeneies hatte (von fast 280 Karat Gewicht), wurde im Werth zu 7 Mill fl. angeschlagen. Und dennoch besteht dieser theure Stein, den die Menschen so gar hoch in Werth halten, aus nichts, als aus reiner Kohle, und man kann den Demant, so unbezwingbar hart er auch erscheint, im Brennpunkt eines großen Brennspiegels, oder, unter Zutritt der Luft in einer Hitze, wobei etwa das Silber zum schmelzen kommt, langsam verglimmen und verbrennen sehen, und also der Welt Kostbarkeit in einen Kohlendampf verwandeln.

2) Der Rubin und Sapphir (**Carbunculus Sapphirus**), denn beide gehören zusammen, ist ebenfalls so hart, daß ihn keine englische Feile angreift, sieht schön roth oder blau aus, krystallisirt in Formen, die zu den §. 11 B. Nr. 1 beschriebenen gehören; ist fast 4mal so schwer als das Wasser. Auch dieser Edelstein ist sehr theuer. Denn ein schöner Rubin, der ein Karat wiegt, kostet 18 bis 27 Gulden, einer, der 10 Karat schwer ist, gegen 1800 Gulden. Die Sapphire sind wohlfeiler, und davon findet man kleine Stücke schon in Böhmen. Die schönsten Rubine und Sapphire kommen aber aus Ostindien.

Der so theuer geachtete Rubin oder Sapphir besteht, wie sich am Ende bei seiner chemischen Auflösung zeigt, nur aus Thonerde, welche aber freilich durch eine innere Naturkraft (durch die Krystallisation) hier zu einem so festen Stein verbunden ist. Als Arten des Sapphirsteins, welche auch wie dieser fast ganz aus Thonerde bestehen und ebenfalls von außerordentlicher Härte sind, lassen sich betrachten:

a) Der Demantspath (C. **adamantinus**), ein bräunlicher, in 6seitigen Säulchen krystallisirter Stein, der sich beim Zerschlagen in glattflächige Stücklein zerblättert, und so hart ist, daß man ihn zum Edelsteinschleifen brauchen kann. Er kommt aus China.

b) Zum Demantspath gehört der Corund, der meist graulich aussieht, aus Ostindien kommt und auch zum Edelsteinschleifen benutzt wird.

c) Der körnige Corund oder ächte Smirgel (C.

Digitized by Google

Naxius oder Smiris), welcher schmutzig indigoblau aussieht, und von einem feinkörnigen Gefüge ist, findet sich bei Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge.

3) Der Spinell (Lychnis carbunculoides), der auch Almandin und Rubis Ballais heißt, ist ein schön carmin- oder coschenillrother Edelstein, der öfters in kleinen Achtflachen oder dadurch, daß 2 einander gegenüber liegende Flächen eine ungewöhnliche Ausdehnung annehmen, in dreiseitigen Tafeln, wovon zuweilen 2 zwillingsartig zusammengewachsen sind, krystallisirt ist. Er kommt aus Ostindien.

4) Unter die Familie der im vorherrschenden Maaße Thonerde-haltigen Edelsteine gehört auch noch der Chrysoberyll (Chrysoberyllus nubiculatus), ein spargelgrüner Stein, der von innen heraus einen blaulichen Schimmer zeigt. Er kommt aus Brasilien.

5) Der Hyazinth (Lincurium Hyacinthus), sieht so gelblichroth oder bräunlichroth wie manche Gartennelken aus. Findet sich auch schon manchmal in Böhmen, am schönsten aber doch in Ostindien. Er enthält Zirkonerde und Kieselerde, krystallisirt nach §. 12 B. Nr. 3.

6) Der Smaragd (Smaragdus laete virens) sieht, wenn er recht schön, ist, so rein grün aus, daß die frischesten grünen Blätter und Frühlingswiesen neben ihm gelblichgrün erscheinen. Der schönste Smaragd findet sich in Südamerika und in Oberägypten, von wo man ihn vor Alters hergebracht hat. Auch in Salzburg, im Heubachthale findet man welchen, der ist aber nicht sehr ausgezeichnet. Er wächst in sechsseitigen Säulchen (nach §. 11 B. Nr. 1).

Dieses ist wohl der schönste Stein in der Welt, den man nur gern ansieht. Und seine Schönheit mag auch die Veranlassung gegeben haben zu der hohen Achtung und Verehrung, in welcher er bei manchen Völkern stund und noch steht. Denn nicht bloß erwiesen ihm die alten Peruaner eine abgöttische Ehre, sondern noch jetzt ist, wie dies Buchanan auf seiner Reise in Ostindien erfuhr, bei manchen Völkerschaften der Mahraten das Tragen eines Smaragdringes ein Vorrecht und Abzeichen des Fürsten und seiner nächsten Freunde so wie Gesandten. Deshalb gewährte dem Buchanan jener Smaragdring, den ihm ein Mahrattenfürst in dieser Absicht

Digitized by Google

an seinen Finger gab, größere Vortheile als der beste Paß oder Firman in andern Ländern gethan haben würde, indem er ihm überall unter dem streit- und raublustigen Gebirgsvolk die Beachtung eines fürstlichen Botschafters erwarb.

Der Smaragd enthält außer der Kieselerde auch Beryllerde und ist durch dasselbe Metall (Chrom genannt) so schön grün gefärbt, welches dem Spinell und dem böhmischen Granat ihre rothe Farbe giebt. Ein schöner Smaragd, der ein Karat wiegt, kostet 18 bis 20 Gulden, ein 12 Karat schwerer gegen 1500 Gulden. Als farblosere und darum werthlosere Arten, welche aber auch Beryllerde enthalten, gehören zum Geschlecht des Smaragds:

a) Der Beryll oder Aquamarin (Smaragdus Beryllus), der auch in vollkommnen 6seitigen Säulchen, die manchmal mehr als Fingers groß sind, wächst, sieht meistens meergrün, auch spargelgrün oder selbst wohl blaulich aus. Er findet sich am ausgezeichnetsten in Sibirien, aber auch im sächsischen Erzgebirge werden einzeln welche gegraben. Er ist bei weitem nicht so schön, als der Smaragd, aber auch lange nicht so theuer. Seine grüne Farbe kommt vom Eisen her.

b) Der gemeine Beryll (Sm. berylloides) ist grünlichweiß und meist nur ein wenig durchscheinend, er findet sich schon in Bayern, in Bodenmais und auch in Frankreich.

7) Der Granat (Haemanthrax Granatus), ein meist dunkelrother Stein, findet sich öfters in regelmäßiger Gestalt (Krystallen), die so aussehen wie das Inwendige einer Bienenzelle, indem sie an den Seiten 6 Rauten-Flächen, oben und unten auch noch 3, zusammen 12 haben (nach §. 11 B. Nr. 1). So ist er unter andern in dem Glimmerschiefer schon hie und da am Fichtelgebirge eingewachsen. Es findet sich aber auch sehr vieler Granat in losen Körnern.

Der edle Granat enthält vieles Eisen in sich, und außer der Kieselerde auch wie die unter Nr. 2 erwähnten, harten Steine, viele Thonerde. Als Arten des Granates, theils der Bestandtheile, theils der Gestalt wegen, lassen sich betrachten:

a) Der böhmische Granat, auch Pyrop genannt (H. Pyropus). Dieser sieht blutroth aus. Man erkennt an diesem Steine, wie weit es der Mensch mit seinen Geschicklichkeiten bringen kann. Denn die Leute bohren nicht blos durch seine harte Masse Löcher (mittelst des Demanten), sondern solche durchbohrte Steine sind so wohlfeil, daß man 1000 Stücke der kleineren Sorte für 60 bis 72 Gulden kauft. Aber es giebt freilich auch viele theurere Pyropen, denn von der ersten Sorte, wovon das Stück gegen 2 Karat wiegt, kostet schon das Hundert, wenn sie brillantenartig geschliffen sind, über 200 Gulden, und jener ausgezeichnet große, schöne,

Digitized by Google

der sich im königlich sächsischen Schatze befindet, wird an Werth auf viele tausend Gulden geschätzt. Die ganz kleinen oder unreinfarbigen Körner benutzt man, wegen ihrer Härte, zum Steinschleifen.

b) Der schwarze Granat oder Melanit (H. melanchrotus), ist ein schwarzer Stein, der auch 12flachige Krystalle hat wie der edle Granat, welche aber an den Kanten abgestumpft sind. Er findet sich bei Rom.

c) Der Kalkerde-haltige gemeine Granat, auch Kolophonit (H. calcarius), hat öfters eine röthliche oder Zimmtbraune Farbe, ist erystallisirt wie der Melanit und enthält viel Kalkerde in seiner Mischung. Er kommt zuweilen in ganzen Lagen mit Eisenstein vor, und man benutzt ihn selbst zum Ausschmelzen seines Eisengehaltes. —

8) Der Staurolith (Staurolithus prismaticus), ein brauner Stein, der manchmal in 6seitigen, andere Male in geschobenen 4seitigen Säulchen krystallisirt ist (nach §. 11 Nr. 4), bildet durch das Durcheinanderwachsen der letzteren Gestalten die Figur eines Maltheserkreuzes. Er kommt aus Frankreich und Spanien, so wie aus der Schweiz und heißt auch Basler Taufstein.

9) Der Topas (Craterites Topazius) der insgemein kleine 4seitige Säulen hat, deren Flächen wieder in 2 getheilt sind, sieht meist so gelb aus wie Wein oder Honig, auch blaulich und ganz weiß. Er ist durchsichtig, wiegt mehr denn 3mal so schwer als Wasser.

An der sächsischen Grenze, nach Böhmen hin, giebt es einen ganzen Felsen, der voller Topasen ist. Den hat einer entdeckt, der landesflüchtig werden mußte, weil er im Trunke, bei einer Hochzeit, auf seine Obrigkeit gelästert hatte. Er wurde aber nachher begnadigt. In Brasilien giebt es noch viel schönere Topasen, als in Sachsen. Wegen seiner schönen gelben Farbe hieß der Topas vor Zeiten Chrysolith oder Goldstein, und in der heiligen Schrift kommt er unter dem Namen Tarschisch vor. Der Topas besteht aus Kieselerde, Thonerde und Flußspathsäure. Von ähnlicher Mischung ist denn auch der zu dieser Gattung gehörige Stangenstein oder schörlartige Beryll (Cr. virgulatus), welcher wie aus lauter kleinen Stengelchen zusammengesetzt und von strohgelber Farbe ist. Er findet sich bei Altenburg im sächsischen Erzgebirge. Man nennt ihn auch Pyknit.

10) Der Chrysolith (Chrysopteros Chrysolithus), ist freilich nicht so hart, als die andern Edel-

Digitized by Google

hartsteine, doch immer noch ein wenig härter als ein gemeiner Kieselstein. Dabei ist es ein gar lieblich pistaziengrüner Stein, schön durchsichtig und glänzend. Vor Zeiten hieß dieser Stein Topas, und unter diesem Namen kommt er auch in unsern Uebersetzungen der heiligen Schrift vor. Man findet den Chrysolith namentlich in Nubien und Oberägypten, von wo ihn auch der große Nilstrom mit sich gebracht hat, aus dessen Sande man noch jetzt zuweilen um Cairo und Alexandria welchen auflies't.

Der Chrysolith besteht aus Talkerde und Kieselerde mit etwas Eisenoxyd. Er krystallisirt in Formen, die wir §. 11 B, Nr. 4 beschrieben. Zu der Gattung des Chrysolithes gehört auch:

Der Olivin (Ch. Olivinus), ein schön olivengrüner, oft auch gelblicher, wie aus lauter Körnern zusammengewachsener Stein, der nicht selten in Basalt eingewachsen ist (z. B. am Rhöngebirge).

11) Der Helvin (Pumilio Helvinus) ist ein blaßgelbes, in dreiseitigen Pyramiden krystallisirtes Steinlein, das bei Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge gefunden wird.

Zu den freilich nur noch fast edelharten, sonst aber den eben erwähnten Edelsteinen nahe stehenden Steinarten kann man zählen:

12) Den Jolith, der auch Dichroit und Wassersapphir heißt (Dichrus sapphirinus), ein dunkelblauer, in 6seitigen Säulen krystallisirter Stein, der in Spanien und auch schon bei Bodenmais vorkommt.

B. Die gemeinen Hartsteine, Silicei duri, geben Funken am Stahl, schneiden aber nicht in Feuerstein und Kiesel, weil sie selber ihres Gleichen sind. Die hieher gehörigen Steine sind selten mehr, meist weniger als 3mal so schwer denn Wasser. Dahin gehören:

1) Der Schörl (Jonia electrica), ist ein schwarzer Stein, der öfters wie aus kleinen Stengeln zusammengesetzt aussieht, und häufig in Granit eingewachsen ist. Er krystallisirt in 3 und 6seitigen Säulen. Der sogenannte edle Schörl, oder Turmalin, hat auch bunte, z. B. grüne, rothe Farben, und ist, wenn

Digitized by Google

man ihn gegen das Licht hält, durchsichtiger, als der gemeine Schörl. Wenn man den Turmalin über glühenden Kohlen oder am Licht erwärmt, zieht er die Asche oder kleine Papierstückchen an sich, wie der geriebene Bernstein. Solcher edle Schörl, oder Turmalin, wird besonders in Brasilien gefunden.

2) Der Augit (**Augites Melas**), ist von dunkel rabenschwarzer Farbe und meist undurchsichtig. Seine Krystalle, (breite 6seitige Säulen, nach §. 11 B. Nr. 5) sind oft im Basalt eingewachsen. Wie der Turmalin zum gemeinen Schörl, so verhält sich zum Augit der Diopsid (**A. Diopsides**), ein öfters fast eben so schöner grüner Stein, als der Chrysolith. Dieser Schönheit wegen, die ihm sein chrysolithartiges Grün und sein Glanz öfters verleihen, lassen wir ihn hier mit seinen Arten bald nach dem Chrysolith folgen, obgleich seine geringere Härte ihm den Rang der edelharten Steine streitig macht. Man findet den Diopsid meist in Säulen krystallisirt. Der schönste kommt aus den Alpen, besonders aus Tyrol. Doch findet sich auch welcher in Sachsen und Schlesien.

Einige Abänderungen des Diopsids sind von den Mineralogen unter dem Namen Baikalit und Sahlith aufgeführt worden; als besondere Arten aber, welche zu derselben Gattung gehören, lassen sich betrachten:

a) Der Kokkolith (**A. Coccolithus**) ist dunkelgrün, und sieht aus, als wenn er aus lauter zusammengepreßten Beeren bestünde, er findet sich in Norwegen.

b) Der Omphazit (**A. Omphacites**), ein grasgrüner, körniger Stein, wird am Fichtelgebirg gefunden.

3) Der Vesuvian (**Melichloros tetragonalis**), nähert sich durch seine chemischen Bestandttheile dem gemeinen Granat, von dem er sich jedoch durch seine meist 4seitig säulenförmige Krystallisation (nach §. 11 B. Nr. 3) unterscheidet. Zu ihm gehört der Egeran, der bei Eger gefunden wird. Den Bestandtheilen nach schließt sich hier an:

4) Der Prehnit (**Prehnites venustus**), der von seinem ersten Entdecker, dem Oberst Prehn, den Namen führt, ist ein meist grün- oder gelbfarbiger Stein von blättrigem oder faserigem Bruche, welcher

Digitized by Google

letztere sternförmig erscheint. Er ist zuweilen in Säulen kryſtalliſirt. Man findet ihn am Cap der guten Hoffnung in Afrika, so wie in Grönland, in Frankreich, in Tyrol und an verschiedenen Orten in Deutschland. Besonders findet sich der schöne faſrige bei Oberstein im Zweibrückiſchen.

Recht eigentliche Kieſelsteine (**Crystallini**) sind:

5) Der **Bergkryſtall** (**Silex Crystallus**), ein schöner durchsichtiger Stein, meist so hell wie Wasser, den man in und auf den Urgebirgen oft antrifft. Er besteht aus ganz reiner Kieſelerde. Man findet ihn (nach §. 11 B. Nr. 1) meist in Pyramiden oder Säulen, die manchmal in der Schweiz Ellen hoch, und wie die auf der Berner Stadtbibliothek 6 Centner und darüber schwer sind, gewachsen. Eine solche Säule hat 6 ein wenig gestreifte Seiten und ist auch noch mit 6 glatten Flächen zugespitzt. Man schleift den Bergkryſtall. Wenn er gelb aussieht, heißt er Citrin, wenn er bräunlich aussieht, nennt man ihn Rauchtopas. Das Eigengewicht des Bergkryſtalles, wie aller zu seiner nächsten Verwandtschaft gehörigen Steine, übertrifft das des Wassers um 2½mal. Alle diese fast aus reiner Kieſelerde bestehenden Steine werden zur Bereitung des Glaſes benutzt.

Der Bergkryſtall findet sich hauptsächlich in den sogenannten Kryſtallkellern der Granitgebirge der höchsten Alpen, z. B. in der Schweiz und in Savoyen. Solche Kryſtallkeller sind Höhlungen oder Klüfte in dem Granitgebirge, die man an den hohen, steilen Felsenwänden, schon von ferne als weiße Adern erkennen kann, denn die Kluft ist nach außen gewöhnlich mit weißem Quarze verwachsen und zugeschlossen. Die Kryſtallgräber lassen sich dann, wo sie eine solche weiße Ader sehen, an einem Seile, oft mit großer Lebensgefahr, von der gähen Wand heruntergleiten, klopfen, auch wenn die Kluft verschlossen ist, überall mit dem Hammer daran, und wo es hohl klingt, schlagen sie ein, und haben auf solche Weise oft Gewölbe entdeckt, aus denen für viele tausend Gulden Kryſtalle gewonnen wurden. Freilich ist jetzt der Bergkryſtall, besonders seitdem man ihn in so gar großer Menge aus Madagaskar bringt, ungleich wohlfeiler als sonst, und man bezahlt heutiges Tages an dem geschliffenen fast nur die Arbeit, und auch diese gar gering. Blos der gelbe, den man z. B. in Genf öfters zu großen Ringsteinen (als unächten Topas) ver-

Digitized by Google

arbeitet, wird noch etwas theurer bezahlt, und auch solche ausgezeichnete Krystalle, wie Herr Pfarrer Meyer zu Hospendal, im Ursener Thal am Gotthardsberge, in seiner schönen Sammlung hat, behalten immer einen hohen Werth. Vor Zeiten hat man die kleinen, hellen Bergkrystalle unter dem Namen der sächsischen oder fränkischen Demante verschliffen. Solchen Steinchen fehlt aber freilich noch viel zur Härte und zum Glanz des Demants. Zuweilen finden sich im Bergkrystall kleine, nadelförmige Krystalle, namentlich von dem noch später zu erwähnenden Rutil oder auch von Amiant eingeschlossen; diese kleinen, eingeschlossenen Krystalle sind so schön und rein ausgebildet, als ob sie bei ihrem Entstehen im Freien geschwebt hätten; ein Zeichen, daß, als sie sich bildeten, die Kieselerde nicht flüssig, sondern wie gallertartig war, weil sie sonst zu Boden gefallen seyn würden.

Als Arten gehören zum Geschlechte des Bergkrystalls:

a) Der Amethyst (Silex Amethystus), sieht schön veilchenblau oder röthlichblau aus. Findet sich auch auf unsern Gebirgen.

b) Der Rosenquarz (S. roseus), schön rosenroth, findet sich bei Zwiesel am Rabenstein, dann bei Bodenmais und am Hörlberge in der Lahm auf dem Böhmerwald.

c) Der gemeine Quarz (S. usitatissimus), ist der Kieselstein, der überall so viel herumliegt, als Bachkiesel, als Sand am Meere und in den Wüsten, so wie in ganzen großen Blöcken. Er ist weiß oder grau oder roth, und manchmal noch sonst gefärbt. Er ist auch oft in solchen kleinen Pyramiden oder in Säulen gewachsen, wie der Bergkrystall. Ist fast überall zu haben, und wird zur Bereitung des gemeinen Glases benutzt.

d) Der Eisenkiesel (S. ferrarius), erscheint von der rothen, oder gelben Farbe des Eisenochers.

e) Der Prasem (S. prasius), ein schöner lauchgrüner, fettig glänzender Stein, der im Erz- und Fichtelgebirge vorkommt. Der Prasem ist eigentlich ein Bastardgemisch, aus Quarz und dem weiter nachher zu beschreibenden Strahlsteine zusammengesetzt, während dagegen

f) Das Katzenauge (S. Asteria), aus Quarz und Amiant zusammengewachsen ist.

g) Hornstein (S. corneus) nennt man eine Art des Kiesels, welche fast gar keinen Glanz, sondern nur einen schwachen Schimmer wie Horn hat.

h) Der Holzstein (S. Lithoxylon), zeigt noch in seiner ganzen Gestalt, öfters auch in der Farbe, daß er einst ein Holz war, zwischen dessen Fasern sich Kieselmasse hineinzog, die das Holz allmählich verdrängte.

i) In den meist schwarzen Kieselschiefer (S. schistosus), der, wenn er statt des schiefrigen einen vollkommen muschlichen Bruch hat, Probierstein (S. Lydius) heißt,

Digitized by Google

ist wirklich etwas Kohle eingemischt, welche ihm die schwarze Farbe giebt. Endlich gehört auch noch zu dem weitläufigen Geschlecht des Quarzes:

k) Der gemeine Feuerstein (S. Pyrites). Dieser findet sich in gar vielen Gegenden von Deutschland, besonders aber da, wo Kreide oder Kalkgebirge in der Nähe sind. Er hat sehr verschiedene, vornämlich aber graue oder bräunliche Farben, und öfters eine knollige Gestalt. Der Feuerstein läßt sich, da wo er in Platten gewachsen ist, wie in Frankreich, leicht, mit wenig Hammerschlägen, in solche scharfe, 4eckige Trümmer schlagen, die man zu Feuer- und Flintensteinen braucht. Von solchen Steinen, die, wenn man sie zerschlägt, eine so rundliche Vertiefung oder Erhöhung bekommen, wie der Feuerstein hat, sagt man: sie haben einen muschlichen Bruch. Der Feuerstein giebt den Glasschneidern ein ganz vorzüglich brauchbares Material ab.

6) Der Chalzedon (Sarda aërizusa), welcher eigentlich eben so wie der Jaspis nur eine Unterart des Quarzes bildet, ist nur durchscheinend, nicht so vollkommen durchsichtig, wie der Bergkrystall oder wie Glas; glänzt fettartig, sieht bläulich, weißlich, graulich, auch grünlich aus, und ist zuweilen rhomboidal-würflich krystallisirt. An den geschliffenen Achaten sieht man ihn oft, denn solche Steine, die aus Chalzedon, Jaspis, Amethyst u. s. w. zusammengewachsen sind, und öfters in kugelrunden Stücken gefunden werden, nennt man Achate. Er findet sich (wenn auch nicht überall schön) an vielen Orten. Wenn der Chalzedon schöne braune oder schwärzliche Streifen hat, die mit den weißlicheren regelmäßig abwechseln, heißt er Onyx. Dieser wird am schönsten aus den Morgenländern gebracht. Wenn moosartige Zeichnungen im Chalzedon erscheinen oder wirkliche moosartige Pflanzentheile in ihm eingewachsen sind, heißt er Mocchastein. In der Gegend von Oberstein, welche an allen Arten des Achates und Chalzedons reich ist, findet sich auch der Mocchastein. An den Chalzedon schließen sich zunächst an:

a) Der Carneol oder Sarder (Sarda rubra), ist fleischroth oder blutroth, und auch etwas durchsichtig und so fettartig glänzend wie der Chalzedon. Der schönste Carneol kommt auch aus dem Morgenland. Wenn derselbe regelmäßige weiße Streifen, abwechselnd mit den rothen hat, heißt er Sardonyx.

Digitized by Google

b) Der Chrysopras (S. Chrysoprasius), ist ein schöner apfel- oder grasgrüner Halbedelstein, der durch den Kalk des Nickelmetalls so herrlich gefärbt ist. Er findet sich in Schlesien.

c) Der Heliotrop (S. Heliotropium) ist auf grünem Grunde roth punktirt, kommt (meist verarbeitet) aus Asien zu uns, findet sich aber auch in Böhmen und in Tyrol.

7) Der Jaspis (Jaspis), ist meist schön roth, auch braun und grün. Den schönsten braunen findet man in Aegypten, z. B. bei Kairo überall auf den Feldern herum; der gemeine, meist rothe Jaspis findet sich an verschiedenen Orten in Deutschland; der bandartig gestreifte, oder sogenannte Bandjaspis, kommt am schönsten (grün und roth gefärbt) aus Sibirien; der lavendelblaue oder auch gelbliche Porzellanjaspis ist eigentlich eine gebrannte thonige Sandsteinmasse und findet sich bei ausgebrannten Steinkohlenlagern und im Basalt.

Etwas Kali und meist auch Kalkerde mit der Kiesel- und Thonerde verbunden finden sich in den nachstehenden:

8) Der Feldspath (Astrios vulgaris), ist eben der Gemengtheil, der mit dem Glimmer und Quarz zum Granit und mit Hornblende zum Syenit zusammengewachsen ist. Es ist ein Stein, der weiß, gelblich, röthlich, auch graulich und grün aussieht, am Feuerstahl noch Funken giebt, beim Zerschlagen glatte Flächen hat und $2\frac{1}{2}$mal so viel wiegt als das Wasser. Wenn er schön durchsichtig und glänzend ist, heißt man ihn Adular (Astrios Lunula). Dieser findet sich fast nur in hohen Alpengebirgen. Zum Adular gehört auch der fälschlich sogenannte glasige Feldspath, der namentlich am Drachenfels gefunden wird.

Der Feldspath zeigt sich am häufigsten als eine breite, 6seitige Säule (mit 4 schmalen und 2 sehr breiten Seitenflächen) krystallisirt, welche oben und unten mit 2 Flächen von ungleicher Größe zugeschärft ist (nach §. 11 B. 5). Sehr oft sind aber 2 dergleichen Säulen zu solchen Zwillingskrystallen verwachsen, wie man in der Gegend von Karlsbad (bei Elnbogen) und anderwärts findet. Dergleichen zusammengewachsene Zwillinge (z. B. aus der Gegend von Baveno im Mailändischen) nehmen nicht selten die Gestalt einer 4seitigen Säule an. Der Feldspath enthält in seiner Mischung über 12

Digitized by Google

Procent Laugensalz (Kali). Daher läßt er sich leicht zu einer Emaille-artigen Glasmasse schmelzen, und man benutzt ihn, um dem Porzellan seine schöne Glasur zu geben. Eine besonders zu erwähnende Abart des Feldspathes ist der schöne grüne Amazonenstein (Astrios amazonicus), der in Sibirien und am Amazonenstrome in Amerika gefunden wird. Besondere Arten, die zum Feldspath gehören oder sich an ihn anschließen, sind:

a) Der dichte Feldspath (A. Ariste), der beim Zerschlagen keine glatten Flächen zeigt, und mit Grünstein verwachsen, den Variolit bildet.

b) Der Labradorstein (Astrios Mythrax), ist dunkelfarbig, hat aber ein schönes blaues, grünes, rothes und gelbliches Farbenspiel, ist krystallisirt, wie der Feldspath und zeigt auch beim Zerschlagen so glatte Flächen wie dieser. Sein Fundort sind Labrador und Finnland, Abarten desselben finden sich aber an vielen Orten und schon bei uns in Deutschland.

c) Der Nephrit (A. nephriticus), ist grün, hat splittrigen Bruch, und ist weniger hart als der Feldspath. Dahin gehört auch der Beilstein.

9) Als eine eigene, besondere Art, muß der Albit (Astroites foliatus) betrachtet werden, der statt des Pflanzenlaugensalzes, welches im gemeinen Feldspath gefunden wird, das Natron oder Mineralalkali in seiner Mischung enthält. Ein Mittelglied zwischen dem Albit und gemeinen Feldspath bildet der Periklin. Namentlich der Albit findet sich in unserm Urgebirge in großen Massen.

10) Der Pistazit (Grammatias Pistacites), ein schön gras- und pistaziengrüner Stein, der in Säulen mit starkgestreiften Seitenflächen krystallisirt oder auch in andern Steinen (wie am heiligen Damm bei Doberan) eingewachsen und oft mit weißen Quarzadern durchzogen ist, findet sich in Tyrol, am Fichtelgebirge und sonst noch an verschiedenen Orten. Als Nebenart gehört hierher: Der Zoisit (Gr. griseus), von aschgrauer Farbe, findet sich auch am Fichtelgebirge.

11) Der Axinit (Axinites rhomboïdes) ist ein schöner, glänzender nelkenbrauner Stein, dessen flach-rhomboidale Krystallgestalt gleich einer Axt in eine Schärfe zuläuft und zu den im §. 11 B. Nr. 6 beschriebenen Formen gehört. Er findet sich im sächst-

Digitized by Google

schen Erzgebirge; schöner aber in der Dauphine und in Cornwallis.

12) Der Leuzit (Oritis alcalinus), welcher meist in kugelförmigen (tesseralen nach §. 11 B. 2) Krystallen mit 24 Flächen, oder in runden Körnern vorkommt, wird in Italien, besonders am Vesuv, gefunden. Hieran schließen sich:

a) Der Analzim (O. leucitoides), ist weißlich und röthlich, als Würfel mit dreiseitig zugespitzten Ecken oder in der Leuzitform mit 24 Flächen krystallisirt, findet sich in Tyrol, in Steiermark, Böhmen, am Harz und in Schottland.

b) Der Chabasit oder Cuboizit (O. Cuboïcites), in kleinen, etwas geschobenen Würfeln krystallisirt, von weißlicher Farbe, kommt in Tyrol, Böhmen, auch bei Oberstein im Zweibrückischen vor.

13) Der Lasurstein (Cyanus orientalis), der ganz schön blau ist, kleine wie Gold glänzende Körnchen in sich hat, und beim Zerbrechen körnlich aussieht, ist wohl der schönste unter allen gemeinen Hartsteinen. Man macht aus seinem Pulver eine prächtige blaue Farbe, welche die Maler Ultramarin nennen. Von einer Art dieses Ultramarinblaues kostet das Loth in Italien 26 Gulden. Er findet sich vorzüglich in Persien.

Der lebendige Abgott Dalai Lama in Tibet hat wohl in seinem Tempel zu Lassa die schönsten und meisten Lasursteine, denn da ist mitten in der großen Kirche eine kleine Kirche aus fast lauter solchen edlen Steinen gebaut. Die Türken und Perser glauben: die kleinen gelben Punkte, die im Steine drinnen sind, wären Gold, weil sie so schön glänzen, und wir Europäer verstünden die Kunst, dieses Gold besser als sie auszuschmelzen; deßwegen halten sie ihn so hoch im Preise.

14) Der ächte Türkis oder Callait (Callais aërina), ein hellblauer, auch grünlicher Edelstein, der sich in Persien, so wie bei Steine in Niederschlesien, und bei Oelsnitz im Voigtland findet. Er enthält phosphorsauren Thon, mit Kupferoxyd, auch etwas Eisenoxyd. Mit ihm verwechselt man oft den unächten Türkis (Pseudo-Turcosa), welcher aus nichts anderem besteht, als aus einer von blaulichem Kupferkalk durchdrungenen, thierischen Zahnmasse. —

Hieran reihet sich

Digitized by Google

Der Lazulith (C. spuria), der auch Blauspath heißt, sieht meist dunkelblau aus und findet sich im Salzburgischen, und in Kärnthen.

15) Der Wawellit (Eupetalos Iris), welcher auch Lasionit heißt, gleicht freilich seinem Aeußeren nach mehr den später zu erwähnenden Zeolithen; seinem chemischen Gehalt nach, welcher phosphorsaure Thonerde ist, muß er aber zum Türkis gestellt werden. Der Wawellit ist zuweilen einfarbig, andre Male zeigen sich an ihm grüne, gelbe und blauliche Farbenstreifen, die in concentrischen Kreisen fast wie am Regenbogen mit einander wechseln. Er kryſtallisirt in kleinen Nadeln, welche sternförmig auseinanderlaufend und büschelförmig gruppirt sind, oder findet sich kuglich und traubig, mit feinstrahligem, sternförmig auseinanderlaufendem Bruche. Er findet sich bei Frankenberg in Sachsen, Amberg in Bayern, so wie in Böhmen, Hessen, England, Irland, Grönland u. s. w.

Zu den gemeinen Hartsteinen gehören auch noch

16) der Wernerit, Skapolith (Scapolithus Werneri), ist ein grau-, öfters auch grün-, roth- oder blaufarbiger Stein, der in Säulen kryſtallisirt, oder wie aus lauter Stengeln zusammengewachsen, auch blättrig ist. Man findet ihn in Grönland und Norwegen, so wie bei Eisenberg in Mähren. Er ist kaum so hart als Feldspath.

Zu der Art des Skapoliths haben einige Mineralogen auch den Porzellanspath gezählt, der sich in den Porzellanerde-Gruben bei Passau findet, und welcher außer der mit Thon- und Kalkerde verbundenen Kieselerde auch Chlornatrium (Kochsalz nach §. 11 A.) enthält. Er ist schmelzbar und wird durch starke Säuren zersetzt. Wenn er verwittert, entsteht aus ihm die an sich selber unschmelzbare Porzellanerde.

17) Der Andalusit (Phoenicitis prismatica), ist pfirsichblüthroth, auch perlgrau, meist in sehr deutlichen 4seitigen Säulen kryſtallisirt, welche im Glimmerschiefer eingewachsen sind oder auch frei aus demselben hervorstehen. Er wurde Anfangs in Andalusien, dann aber bald auch am Fichtelgebirg, in Schlesien, Sach-

Digitized by Google

sen, Mähren und Tyrol aufgefunden. Ist etwas härter als Quarz.

18) Der Hohlspath oder Chiastolith (**Cenoprisma decussatum**) bildet kleine, inwendig hohle und hier meist mit einer dunkleren Masse ausgefüllte, 4seitige Säulchen, welche in ein griechisches χ oder Chi durcheinandergewachsen sind und im Thonschiefer bei Gefrees im Bayreuthischen, so wie bei Friedenfels in der Oberpfalz, auch in Spanien und Frankreich gefunden werden.

19) Der Obsidian (**Obsidianus**), ist ganz so schwarz wie Sammet. Wenn man ihn zerschlägt, giebt er so scharfe Stücken, daß die alten Mexicaner Barbiermesser daraus machten, und so scharfe Waffen, daß sie mit Hülfe dieses Steines, den sie in ihrem Lande häufig hatten, alle Völker umher bestegten. Gegen die eisernen Säbel und Waffen der Europäer kamen aber solche Waffen doch nicht auf. Er findet sich am schönsten in Island, Mexico, auch auf den Inseln des Mittelmeeres, besteht aus unkrystallinischer (amorpher) Kieselerde und ist kaum so hart als Feldspath.

20) Der Perlstein (**Margaris**), ist meist perlgrau oder blaulich, sonst auch gelblich und röthlich gefärbt, und wie aus lauter kleinen, perlenartigen Körnern zusammengewachsen. Er findet sich in Ungarn, dann auf Euganeen in Italien, so wie in Island und Mexico.

C. Die Afterhartsteine (**Silicei duriusculi**), geben kein oder kaum noch Feuer am Stahl, lassen sich aber durch ein gewöhnliches Messer meistentheils noch nicht ordentlich schneiden. Auch dahin gehören noch recht schöne Steine, z. B.:

1) Der edle Opal (**Paederos Opalus**). Wenn man den ansieht und ein wenig herumdreht, spielt er in die schönsten rothen, grünen, gelben Farben. Sonst sieht er bläulich weiß, wie abgerahmte Milch aus, und seinen Bestandtheilen nach gleicht er ganz dem Bergkrystall, denn er ist auch reine, jedoch unkrystallinische (amorphe) Kieselerde. Der schönste Opal findet sich

Digitized by Google

in Ostindien und in Ungarn; es giebt aber auch in Sachsen welche, die nicht so gut sind. Die 2 größten und schönsten Opalsteine hat wohl der Kaiser von Oesterreich, denn da ist einer so groß wie eine Faust, der andere wie ein Ei, und beide sind der Schätzung nach über eine Million Gulden werth.

Schon die alten Römer kannten den edlen Opal aus Ungarn, und einer, welcher der Triumvir Antonius hieß, und in großem Ansehen stund, war ein solcher Narr, daß er nicht eher nachließ, bis ein anderer Römer, welcher Nonius hieß, aus der Stadt hinausgejagt ward, weil er ihm seinen edlen Opal nicht verkaufen wollte. Dieser aber gab seinen schönen Ring doch nicht her, sondern gieng lieber mit dem Edelstein (der 1,400,000 fl. werth war) am Finger zum Thore hinaus. Als Arten schließen sich an den Opal an:

a) Der Hyalit (Paederos hyalinus), sieht wie ein weißlicher, oder gelblich weißlicher Glasfluß aus, der z. B. in der Gegend von Frankfurt am Main, so wie in Böhmen und Ungarn, in den Klüften und auf der Oberfläche mancher basaltischer Mandelsteine, wie ein darüber geschmolzener Ueberzug gefunden wird. Er ist insgemein mit vielen kleinen Rissen und Sprüngen durchzogen. In dem Thale von Santiago (in Amerika), wo er sehr gemein ist, tragen die Ameisen, die ihn doch weder genießen, noch sonst benützen können, diesen hübschen, glänzenden Stein, überall, wo der Basalt sich etwas aufgelöst hat, sehr begierig und häufig in ihre Nester. So haben selbst diese kleinen Thierlein eine Freude an den Steinen, und auf ihre Weise an der Mineralogie.

b) Der gemeine Opal (P. vulgaris) findet sich von milchweißer, gelber, brauner, rother und grüner Farbe und zeigt sich zuweilen dentritisch gezeichnet; dabei ist er durchscheinend. Er findet sich in Island, Ungarn, Schlesien, Sachsen, Bayern und anderwärts. Ein in Mähren vorkommender erscheint wie aus Amiantfäden gebildet.

c) Der Halbopal (P. spurius) von gelber, brauner, und anderer Färbung, die meist ins Graue fällt, fettartig glänzend und fast undurchsichtig. Er findet sich in ziemlich großen Massen bei Steinheim unweit Hanau und anderwärts. Eine schönere, stärker glänzende Abart von ihm ist der Holzopal.

d) Der Menilit oder Knollenopal (P. tuberosus) ist leberbraun, oder graufarbig, und findet sich in knolligen Stücken oder dünnen rundhöckerigen Lagen bei Menil-Montant unweit Paris im Klebschiefer eingewachsen, so wie bei Bilin in Böhmen.

e) Der Eisenopal oder Opaljaspis (P. Jaspius) ist meist braun, glänzt fettartig, wegen seines starken Eisen-

Digitized by Google

gehaltes ist er ziemlich schwer. Man findet diesen Stein auch in Bayern (z. B. in der Gegend von Passau).

2) Der Pechstein (**Porphyrites piceus**), sieht grünlich, bräunlich, röthlich, auch schwärzlich aus, und glänzt wie Pech, drum heißt er so. Er findet sich in Sachsen, z. B. bei Meissen.

3) Der Bimsstein (**Pumex**), ist der bekannte, meist grauliche, löcherige Stein, der zum Poliren genommen wird. Die Schiffsleute rasiren sich zuweilen mit abgeschliffenem Bimsstein, weil es auf dem Schiffe, wenn das so schwankt, doch gefährlich seyn würde, ein ordentliches Barbiermesser zum Rasiren zu nehmen. Findet sich auf den Inseln des Mittelmeers, und auch am Rheine.

4) Der Natrolith (**Nitrolithus**), welcher in manchen andren Abänderungen auch Faser- und Nadelzeolith, so wie Skolezit heißt (**N. acuarius**), ist ein schöner, meist erbsengelber Stein, der inwendig faserig aussieht und ringförmig gezeichnet ist. Die Fasern laufen alle von einem Mittelpunkt (sternförmig) aus. Er findet sich im Würtemberger Lande, hauptsächlich bei Hohentwiel. Zu Stuttgart im Schlosse kann man gar schöne Tische davon sehen.

Der Natrolith enthält viel mineralisches Laugensalz oder Natron. Zu dieser Gattung gehören als nahe verwandte Arten:

a) Der Strahlzeolith oder Stilbit (**N. Stilbites**), findet sich in Island, in Tyrol und auch in Schlesien, und am Harz. Ist meist röthlich oder graufarbig.

b) Der Blätterzeolith (**N. foliaceus**), ist roth, braun, auch weißlich, glänzt perlmutterartig, hat breite, säulenförmige Gestaltung, findet sich sehr schön im Fassathal in Tyrol und auch am Harz.

c) Der Albin (**N. albinus**), der in einer seiner Abänderungen auch Fischaugenstein (Ichthyophthalm) heißt, ist weiß oder röthlich, hat starken Perlmutterglanz, ist stark durchscheinend und kommt in Achtflachen, so wie in vierseitigen Säulen und Tafeln krystallisirt vor. Findet sich in Tyrol und in Böhmen.

d) Der Kreuzstein (**N. cruciformis**), ist eigentlich in meist breiten 4seitigen Säulen von der §. 11 B. Nr. 3 beschriebenen Form krystallisirt, von denen aber öfters 2 und 2 so durcheinander gewachsen sind, daß sie nach oben ein Kreuz bilden. Er ist weißlich, zuweilen auch rothfarbig, findet sich

Digitized by Google

am Harz, so wie bei Oberstein im Zweibrückischen. An die Verwandten des Natroliths oder Zeolithes schließt sich auch noch an: der Laumontit (N. Laumontii), aus Ungarn, Tyrol u. s.

5) Die schon oben, S. 15 erwähnte Hornblende (Actinotus Psaronii), welche im Syenit und andern hornblendehaltigen Felsarten der Urzeit meist nur von dunkel grünlich schwarzer Farbe, strahlichem Bruche und undurchsichtig vorkommt, begreift mehrere zum Theil sehr schöne Unterarten in sich, welche sämmtlich eine bedeutende Menge von Talkerde unter ihren chemischen Bestandtheilen enthalten. Solche sind namentlich:

a) Der glasige Strahlstein (Actinotus vitreus), ein schöner grüner, glasartig glänzender, ziemlich durchsichtiger Stein, welcher in kleinen, säulenartigen Krystallen im schiefrigen Talk eingewachsen in Tyrol und im Salzburgischen gefunden wird. Seinem chemischen Gehalt nach ist der Strahlstein mit dem Diopsid verwandt.

b) Der gemeine Strahlstein (A. vulgaris), grün, in großen Massen strahlich zusammengewachsen, findet sich in ganzen Lagern in Sachsen, Böhmen, Schlesien, Mähren, Tyrol u. s. w.

c) Der asbestartige Strahlstein (A. fibratus), ist graulich, wie aus lauter kleinen Fasern, zusammengewachsen, findet sich öfters in Gesellschaft des gemeinen.

d) Der Tremolith oder Grammatit (A. canus), ist meist von grauer Farbe, mit welcher er dem hohen Scheitel mancher Alpengebirge so zur Auszeichnung dient, wie das graue Haar dem Scheitel eines Greises. Der Tremolith hat übrigens strahlichen und fasrigen Bruch und krystallisirt in langen, breiten Säulen. Er findet sich am schönsten am Gotthard und in Tyrol, sonst auch noch am Fichtelgebirg und in Sachsen und Schlesien. Eine feinfaserige Abart desselben heißt asbestartiger Tremolith; der glasartig glänzende, wenn er schön grünfarbig und halb durchsichtig ist (wie in Schweden), heißt Kalamit.

e) Die basaltische Hornblende (A. basaniticus), ist in deutlichen 6 oder 8seitigen Säulen krystallisirt, schwarz, findet sich frei, oder in den Flötztrappgebirgsarten eingewachsen in Böhmen, Sachsen, Hessen und im Breisgau. — Zu den Arten der Hornblende gehören auch der Karinthin (A. carinthiacus) aus Kärnthen, der stängliche oder strahliche Anthophyllit (A. virgulatus) aus Grönland und Norwegen und der gemeine Hornblendeschiefer (A. schistosus).

Selbst der Amiant und Asbest schließen sich an die Steine vom Geschlecht der Hornblende an, wir beschreiben sie jedoch erst unten, bei den talkigen Steinen (III. Nr. 4).

Digitized by Google

6) Der Cyanit (**Cyanoïdes Pseudo-Sapphirus**), ist öfters so rein blau als ein Sapphir, findet sich am schönsten in der Schweiz in breiten Säulen krystallisirt in Glimmer- und Talkschiefer eingewachsen und sonst auch in Tyrol, Böhmen und Sachsen. An den Cyanit schließt sich der graue Rhätizit an, von welchem der Fibrolith eine Bastard-Abart ist. Eben so der Faserkiesel, der sich bei Wettin unweit Halle so wie bei Parma findet.

Unter die Afterhartsteine gehören auch noch:

7) Der Serpentin (**Ophites**), welcher schon oben (S. 15) beschrieben ist. An diese Steinart schließt sich der Schillerspath (**Oph. versicolor**) an, der sich in vielen Ländern, namentlich am Harz, in Sachsen, Schlesien und Tyrol im Serpentin eingewachsen findet. Seine Farbe ist meist gelblich oder schwärzlich grün; er wirft, nach manchen Richtungen betrachtet, einen tombackfarbigen, metallischen Schiller von sich. Hierher gehört auch der Bronzit (**O. chalcoides**), ein bronze- oder tombackfarbiger Stein, von meist krummblättrigem Bruche, der sich in Steyermark, Tyrol, am Fichtelgebirg und noch sonst vielen Orten findet. Der Serpentin enthält öfters gegen 40 Prozent Talkerde, mit Kieselerde verbunden.

8) Der Basalt, welcher auch schon oben S. 20) beschrieben ist. Man kann ferner hier anreihen:

9) den Thonschiefer (**Schistus communis**), dessen bereits auf S. 14 erwähnt wurde. An diesen schließen sich aber als untergeordnete Arten an:

a) Der Wetzschiefer (Sch. Cos), ist grünlich grau, ein wenig durchscheinend an den Kanten, härter als der Thonschiefer.

b) Der Alaunschiefer (**Sch. aluminosus**), sieht schwarz aus, und ist so schiefrig wie der Thonschiefer. Es wittert Alaun daraus hervor. Man findet ihn in Sachsen, am Fichtelgebirge, und noch auf einigen deutschen Urgebirgen. Die eine Art glänzt schön und heißt deshalb glänzender Alaunschiefer. Der Alaunschiefer enthält schon etwas Kohle. Noch mehr kohlenartige Theile enthalten aber:

c) Der Brandschiefer (**Sch. gliscens**), der in Steinkohlengebirgen vorkommt, so wie

d) Der Zeichenschiefer (**Sch. pictorum**), der unter

Digitized by Google

dem Namen der schwarzen Kreide überall bekannt ist. Bei den Steinkohlen findet sich auch

e) Der Schieferthon (Sch. argillaceus), auf welchem öfters Kräuterabdrücke gesehen werden und der so weich ist, daß man ihn mit den Fingernägeln kritzen kann.

10) Der Glimmer, das Katzensilber (Atizoës micans), glänzt fast wie Metall, ist von sehr verschiedenen Farben, am häufigsten jedoch weißlich, graulich, gelblich und schwärzlich. Er krystallisirt öfters in 6seitigen Tafeln, davon viele sich übereinander legen, so daß sie zusammen eine 6seitige Säule bilden. Er läßt sich leicht in Blättchen oder Scheiben spalten, welche man, wenn der Glimmer durchsichtig ist, unter dem Namen Marienglas oder Frauenglas statt des gewöhnlichen Glases benutzt. In Sibirien wird er in so großer Masse gegraben, daß man ihn zu Fenster- und Laternenscheiben verwendet, welche, weil der Glimmer elastisch biegsam ist, nicht so leicht zerbrechbar sind, als gewöhnliches Glas. Er enthält außer Kieselerde, Thonerde und Talkerde, auch öfters gegen 10 Prozent Kali, wiegt fast 3mal so schwer als Wasser. Arten, welche zum Geschlecht des Glimmers gehören, sind:

a) Der Lepidolith (A. Lepidolithus), der auch Lithionglimmer heißt, ist in seinen schönsten Abänderungen, wie sie sich namentlich in Mähren finden, pfirsichblüthroth und aus lauter kleinen, glänzenden Schüppchen, gleich jenen der Schmetterlingsflügel zusammengewachsen. In andren Abänderungen gleicht er ganz dem gemeinen Glimmer, von welchem er sich überhaupt durch seine chemische Beschaffenheit, nämlich durch ein in ihm enthaltenes eigenthümliches Laugensalz, das Lithion genannt, unterscheidet, welches auch im Spodumen (Triphan) und Petalit so wie in manchen Abänderungen des Turmalins gefunden wird.

b) Der Pinit (A. Pinites), grünlich und röthlich grau, in 6seitigen Säulen krystallisirt; findet sich in Sachsen, im Baden'schen (bei Heidelberg) u. a.

c) Der Chlorit (A. Chloauges) ist ein schön grüner blättriger oder schuppiger, fettig glänzender oder schimmernder Stein, der in 6seitigen Tafeln wie der Glimmer krystallisirt, nicht aber so leicht wie dieser sich in Blättchen zerlegen läßt, sondern, wenn man ihn mit dem Messer ritzt, ein grünes Pulver giebt. Er bildet als Chloritschiefer ganze Gebirgslager und findet sich in vielen Gebirgsgegenden, namentlich in Schlesien, Sachsen, Bayern, Tyrol u. s.

d) Der Perlglimmer oder Margarit (A. Marga-

Digitized by Google

rites), von perlgrauer, röthlicher und grünlicher Farbe und körnigblättrigem Gefüge, findet sich bei Sterzing in Tyrol.

Als zweite Abtheilung der erdigen Fossilien beschreiben wir nun solche Arten, welche zwar häufig Kieselerde zu ihrem Bestandtheil haben, dabei aber weder den Zusammenhalt noch die regelrechte (krystallinische) Gestaltung besitzen, durch welche die meisten kieslichen Fossilien ausgezeichnet sind; man nennt die erdigen Fossilen dieser zweiten Abtheilung:

II. Thonige Steine (laimige Weichsteine) (**Argillacei**). Diese lassen sich mit dem Messer sehr leicht schneiden, ja manche schon mit den Fingern zerbröckeln und zerreiben. Sie kleben ein wenig an der Zunge, wenn man sie daran bringt, und lassen sich auch mit dem Wasser zusammenkneten.

1) Die reine Thonerde oder der Aluminit (**Aluminites argillaceus**), ist eigentlich keine reine, sondern eine schon mit Schwefelsäure und vielem Wasser verbundene Thonerde. Findet sich in knolligen, weißfarbigen, feinerdigen Stücken nahe unter der Erdoberfläche z. B. bei Halle an der Saale.

2) Die Porzellanerde (**Argilla leptoceramos**), sieht meistens weiß oder röthlich aus und läßt sich schon mit den Fingern zerdrücken. Sie besteht aus Kieselerde und Thonerde. Man findet sie in Sachsen, auch bei Passau an der Donau und noch sonst an etlichen Orten; man darf sie aber vorzüglich nur da suchen, wo es recht vielen Feldspath (und sogenannten Porzellanspath) giebt.

Einer, der sich für einen Goldmacher gehalten, von reichen Leuten viel Geld im Voraus genommen hatte, und zuletzt darüber ins Gefängniß gekommen war, erfand hier die Kunst, das Porzellan auch in Deutschland nachzumachen, das vorher nur aus China und Japan gekommen war. Da konnte er dann alle seine Schulden bezahlen, und lebte als ein ehrlicher Mann von seiner Arbeit. Zu der Gattung des Thones gehören auch als Unterarten:

a) Der Töpferthon (**A. figularis**), dieser und seine Benutzung, so wie auch der Lehmen (**A. lateraria**) und was man damit macht, sind freilich in jedem Dorfe bekannt. Der Thon sieht meistens weißlich, der Lehm aber gelblich aus und wird dann durchs Brennen in den Ziegelöfen ziegelroth. Dem Thon muß man auch meistentheils ein wenig ganz fei-

Digitized by Google

nen Quarzsand zumischen, wenn er recht haltbare Töpferwaaren geben soll. Den ganz feinen, zähen Thon, aus dem man die langen Tabackspfeifen macht, nennt man deswegen auch Pfeifenthon. Der Lehmen oder Letten ist meist mit einer bedeutenden Menge von kohlensaurer Kalk-, Talkerde so wie mit Eisenoxyd gemischt, und deßhalb im Feuer schmelzbar.

b) Die Gelberde (A. Sil) ist ein von vielem Eisenocher gelbgefärbter, Kieselerde-haltiger, feiner Thon, den man zum Gelbfärben benutzt. Findet sich bei Amberg in Bayern, so wie in Sachsen und Frankreich.

c) Der Tripel (A. tripolitana), ist ein graulichgelber, feinerdiger, mager anzufühlender Stein, den man zum Poliren benutzt und der fast ganz aus reiner Kieselerde mit Eisenoxyd und Wasser besteht. Zuerst war der aus Tripolis im Handel, man findet ihn aber auch in Bayern (bei Amberg), so wie in Böhmen und Sachsen.

d) Der Polirschiefer (A. tripolitana schistosa) ist den Bestandtheilen und Eigenschaften nach nur ein feinschiefriger Tripel, wird zum Putzen des Silbers benutzt und findet sich bei Steinkohlenlagern in Böhmen, Sachsen und Hessen.

e) Der Klebschiefer (A. (schistosa adglutinans) klebt stark an der Zunge; findet sich bei Paris.

3) Das Steinmark (Sphragis spuria), ist die feine, thonige Erde, die manchmal in den Klüften der Berge gefunden wird, und woraus man vormals kleine Scheiblein machte, auf welche ein Stadtwappen gedruckt wurde, und die man dann in den Apotheken als Siegelerde, gegen mancherlei Krankheiten verkaufte. Hierbei sollte das Steinmark einen andern ihm verwandten Stein ersetzen:

a) Den Bolus (Sphr. officinarum S. lemnia). Dieser ist meist braun, doch auch gelblich und röthlich, glänzt fettig, hat muschlichen Bruch, zerspringt im Wasser mit Knistern. Er findet sich auf der Insel Lemnos (Stalimene), aber auch in Schlesien, Sachsen und Böhmen, so wie bei Siena. Dieser letztere (aus Siena) wird von den Kupferstechern als braune Farbe benutzt. Auch

b) die Bergseife (Sphr. Sapo) aus Thüringen und Böhmen, läßt sich hier anreihen.

4) Die Walkerde (Smectis fullonum), eine grünliche oder gelbliche sehr fettig anzufühlende Erde, die zum Walken der Tücher dienlich ist, findet sich in Sachsen und England. Sie enthält meist Kieselerde und Wasser mit etwas Thonerde und Eisenoxyd.

Digitized by Google

Zu diesen Bestandtheilen kommt in der Grünerde (Sm. chlorochroma) auch Kali. Sie wird als grüne Farbe gebraucht und findet sich im Mandelstein im Veronesischen, so wie in Böhmen, Sachsen, Schlesien und bei Oberstein. Der Pimelit (Sm. Pimelites) aus Schlesien, der mit dem S. 59 erwähnten Chrysopras gefunden wird, ist wie dieser durch Nickelocher so schön grün gefärbt.

5) Der Umber (**Ochra fusca**), den man als braune Farbe benutzt, gehört freilich nur seines äußeren Aussehens und seiner erdigen Beschaffenheit wegen hieher, denn seinen Bestandtheilen nach, welche großentheils Eisen und Graubraunsteinocher sind, sollte er bei den Metallen stehen. Er findet sich auf Cypern, sonst aber auch noch bei Stuttgart u. a.

III. Talkige Steine (**Oreostearini**), sind meistens fettig anzufühlen und glänzen auch zum Theil wie Fett. Man kann sie mit dem Messer schneiden und oft auch mit dem Finger zerreiben.

1) Der gemeine Talk (**Oreostear officinarum**), der am schönsten in den Alpengegenden, sonst aber auch noch in Schlesien, Sachsen und Bayern vorkommt, ist von ausgezeichnet grüner Farbe, starkem Perlmutterglanz, und läßt sich fast so wie Fensterblei biegen. Er ist ein wenig durchsichtig, dabei aber so weich, daß er sich zwischen den Fingern zu einem Pulver zerreiben läßt, welches die Haut fettig und glänzend macht. In den Apotheken verkauft man welchen. Sonst haben ihn solche Leute, welche gerne schöner aussehen möchten, als sie sind, mit zur Schminke oder zu einer Hautsalbe genommen, und offeriren noch derlei Hautsalben.

Der verhärtete Talk (**O. fissile**), der graulich aussieht, läßt sich mit dem Messer schneiden, wozu man will. Er ist schiefrig. Bei Hohenstein im sächsischen Erzgebirge, wo er recht schön gefunden wird, schneiden die Leute Uhrgewichte und andere Geräthe daraus.

2) Der Speckstein (**Steatites communis**), läßt sich eben so schneiden und ist dem vorigen auch sonst in Vielem ähnlich, nur daß er nicht so schiefrig ist. Er findet sich am Fichtelgebirge bei Wunsiedel gar schön. Wenn man mit einem Stückchen Speckstein auf Glas schreibt, und dann das Geschriebene wegwischt, so

Digitized by Google

kommt es doch immer wieder zum Vorschein, wenn man daran haucht. Daher gebrauchen ihn die Glaser zum Zeichnen aufs Glas. Auch Flecken im Tuch macht man damit heraus.

Als äußerlich nahe verwandte Art möge hier stehen: der chinesische Bildstein oder Agalmatolith (St. chinensis), von gelblicher, röthlicher oder grünlicher Farbe, aus welchem die Chinesen allerhand kleine Figuren von Götzen, Menschen u. s. w. schneiden.

3) Der Meerschaum (**Magnesites spuma marina**), woraus die schönen Pfeifenköpfe gemacht werden, ist ein gelblich oder graulich weißer, leichter Stein, welcher sehr fest zusammenhält, ein wenig an der feuchten Zunge klebt, und wenn man ihn ins Wasser legt, dieses mit zischendem Geräusch in sich saugt. Er bildet knollige Massen, besteht aus nahe zwei Theilen Kieselerde und einem Theil Talkerde.

Der Meerschaum findet sich freilich am schönsten in der Türkei, aber auch schon recht gut und brauchbar in Mähren. Wir können also in unserm Vaterlande künftig noch eben so gute Meerschaumköpfe haben, als die vornehmen Leute in Constantinopel, die gewöhnlich den besten Meerschaum nicht zu uns heraus lassen, sondern selber behalten. Es ist indeß überhaupt so gar nöthig nicht, daß man raucht, und aus einem guten Ulmer-Kopf von Holz schmeckt der Tabak auch.

4) Der Amiant (**Asbestos Amiantus**), den man auch Federweiß und Bergflachs nennt, glänzt wie Seide, und besteht auch aus lauter seidenartig feinen, zum Theil ziemlich langen Haaren, welche sich wie Flachsfäden biegen lassen. Er findet sich meistentheils in den Serpentinbergen, in den Alpenländern, doch auch schon in Schlesien, am Harz, in Sachsen u. a.

Schon die alten Römer machten Tücher und Gewänder daraus. Solche Gewänder haben das Gute, daß man sie nicht zu waschen braucht, wenn sie schmutzig sind, sondern nur in den Ofen zu stecken und weiß zu brennen. Denn der Amiant verbrennt nimmermehr im Feuer, sondern nur der Schmutz. Solche Amianttücher nahmen die Alten auch zu Todtentüchern, worein sie ihre Todten wickelten, die man damals, statt sie zu begraben, verbrannte. Dann mischten sich die Knochen und Asche nicht unter die Holzasche und konnten leicht für die Aschenkrüge herausgenommen werden.

Als Arten gehören noch zu dem Amiant:

a) Der gemeine Asbeststein (A. **lapideus**), welcher meist grün ist, und aus fest zusammengewachsenen, unbieg-

Digitized by Google

samen harten Fasern besteht, so daß er sich in langsplittrige Stücke zerbrechen läßt. Er findet sich oft in Gesellschaft mit dem Amiant.

b) Das Bergholz (A. ligneus) gleicht an Farbe und faserigem Gewebe ganz einem scheibenartigen alten Stück Holz. Es findet sich in Platten-ähnlichen und schiefrigen Lagen bei Sterzing in Tyrol.

c) Der Papierasbest oder Bergkork (A. papyraceus, s. suberosus), findet sich meist in papierartig dünnen biegsamen Blättchen oder in korkartig elastischen Stücken von bräunlicher, auch weißlicher Farbe, in der Schweiz, so wie in Schweden, Schlesien und Sachsen. — Alle diese Arten des Amiants oder Asbestes, die übrigens mit dem Diopsid und Strahlstein sehr nahe verwandt sind, enthalten Kiesel- und Talkerde nebst Kalkerde und haben ihre (z. B. braune) Farbe vom Eisenocher. Dagegen enthält:

5) Der Karpholith (Carpholithus bohemicus), obgleich er wegen seiner äußeren Aehnlichkeit mit den Amiantarten hieher gestellt werden kann, nur Kiesel- und Thonerde mit Wasser und Graubraunsteinocher, so wie ein wenig Flußspathsäure. Der Karpholith ist strohgelb und besteht aus zarten, büschel- oder sternförmig zusammengefügten, seidenartig glänzenden Fasern, die sich leicht von einander lösen lassen. Er findet sich bei Schlackenwalde in Böhmen.

IV. Die Kalksteine (calcarii), welche Kalkerde in sich haben, theilt man in:

A. Brausekalksteine oder kohlensaure Kalke (Calces caementariae), die, wenn man ein wenig Salpetersäure oder Scheidewasser darauf thut, aufschäumen und ein wenig aufbrausen (weil dann ihre Kohlensäure durch die stärkere Säure ausgetrieben wird), dabei nur zwischen zwei und dreimal so schwer als Wasser, auch niemals so hart sind, daß sie Feuer geben. Dahin gehören fürs erste folgende afterharte Kalksteine (die sich mit dem Messer nicht recht schneiden lassen):

1) Der Kalkspath (Calx crystallina). Wenn man den zerschlägt, bemerkt man lauter kleine Flächen daran und die kleinen abgeschlagenen Stückchen sehen aus wie schiefe Würfel-Rauten. Er ist zwar meistens weißlich, hat aber auch andere Farben. Wenn er ganz durchsichtig ist, und man legt ihn auf ein Buch, so

Digitized by Google

sieht man alle Buchstaben doppelt. Solche durchsichtige Kalkspäthe, durch die man alles doppelt sieht, und die man deßwegen Doppelspath heißt, kommen am schönsten aus Island.

Der Kalkspath ist oft in Säulchen, Pyramiden, Tafeln und schiefen Würfeln gewachsen, welche zu den §. 11 B. Nr. 1 beschriebenen Formen gehören, zuweilen auch so zapfenartig wie die Eiszapfen. Ueberhaupt ist derselbe ein wegen seiner mannichfaltigen Krystallisationsgestalten, deren man mehr denn 600 unterscheidet, höchst merkwürdiger Stein, an welchem man das Walten jener wundervollen Naturkraft, welche im Steinreich die Krystallisation, bei Pflanzen und Thieren das Leben bewirkt, recht auffallend beobachten kann. Deßhalb hat sich auch die Krystallkunde der neueren Zeit hauptsächlich durch die Betrachtung der vielfachen, und dennoch von nur einer Grundform ausgehenden Krystallgestalten des Kalkspathes ausgebildet. Was die Benutzung dieses Steines betrifft, so nimmt man ihn vorzüglich zum Kalkbrennen. Eine bloße Abart des Kalkspathes ist der schöne weiße Schieferspath aus Schwarzenberg in Sachsen. Als Arten gehören übrigens noch hieher:

a) Der körnige Kalkstein (Calx Lychnitis), ist eben der Urkalk, von dem schon oben S. 16 die Rede war, und den viele Menschen unter dem Namen weißer Marmor kennen, weil sie ihn wenigstens an Leichensteinen der vornehmen Leute gesehen haben.

b) Der gemeine, dichte Kalkstein (C. communis), ist auch schon S. 18 erwähnt. Den brennt man am meisten zu Kalk, wobei, wie oben §. 11 A. erwähnt wurde, seine Kohlensäure entweicht. Den schiefrigen benutzt man auch, wie schon erwähnt, zum Steindruck, indem man mit Säuren allerhand hineinäzt und schreibt.

c) Der faserige Kalksinter (C. stiriaeformis s. Stalagmias), setzt sich, so wie der eigentliche Kalkspath, in Eiszapfenform und allerhand andern Gestalten in den Tropfsteinhöhlen an oder bildet an den heißen Quellen, z. B. bei Carlsbad, buntfarbige Lagen. Er ist von faserigem Bruch.

d) Der Erbsenstein (C. pisiformis), der wie lauter zusammengeleimte Erbsen aussieht, kommt am schönsten aus Carlsbad in Böhmen, wo man ihn gefunden hat, als man den Grund zu einem Kirchengebäude graben wollte.

e) Der Kalktuff (C. Tophus), von graulicher oder gelblicher Farbe, ist meist porös, enthält oft Blätter- und andere Kräuterabdrücke, setzt sich überall aus kalkhaltigem Wasser an.

f) Der Tutenkalk (C. virgulata) findet sich bei Quedlinburg und Stuttgart.

Digitized by Google

g) Der Roggenstein (C. Olithes), der aus lauter kleinen, meist röthlichgrauen rundlichen Körnern (wie Fischroggen) zusammengewachsen ist, findet sich in Thüringen und am Harz.

2) Der Stinkstein (**Dysodes lapis suillus**), läßt sich wohl schon ein wenig mit dem Messer schneiden, aber noch nicht recht. Er sieht bräunlich oder dunkelgrau aus, und wenn man ihn reibt, stinkt er wie verbrannte Haare. Das kommt vielleicht daher: weil bei seinem Entstehen sehr viele faulige Stoffe von verwesenden organischen Körpern in ihn mit hineingekommen sind.

Zu diesem Geschlecht gehört auch der bituminöse Mergelschiefer oder Kupferschiefer (**D. metallicus**), von schwarzer Farbe, mit Fisch- auch Kräuterabdrücken und öfterem Gehalt an Kupfererzen. Er findet sich in Thüringen, Hessen, Schlesien (auch in Franken) in weit fortlaufenden Lagen, auf welchen Bergbau betrieben wird.

3) Der Anthrakolith (**Anthracolithus**), ist durch seinen Gehalt an Kohle ganz schwarz gefärbt; enthält auch etwas Kieselerde. Seine Zusammenfügung ist stänglich und körnig. Er findet sich am Harz und im Salzburgischen.

4) Der Dolomit (**Stearochalyx**), welcher von einem französischen Naturforscher: Dolomieu, seinen Namen führt, weil dieser ihn zuerst genauer unterscheiden lehrte, ist aus kohlensaurem Kalk mit kohlensaurem Talk zusammengesetzt. Es gehören dahin folgende Arten:

a) Der Bitterspath, welcher wegen der rhomboidalen Gestalt seiner Krystalle auch Rautenspath genannt wird (**St. rhomboëdricus**), ist meist von weißer und gelblicher Farbe, glänzt perlmutterartig, giebt glattflächige, rhomboidale Bruchstücke. An ihn gränzt der durch seinen Eisengehalt ausgezeichnete Braunspath, welcher auch, wenn er beim Herausbrechen aus der Tiefe von hellerer Farbe war, an der Luft leicht dunkler wird. Dieser findet sich auf Gängen der Gebirge, während die rautenförmigen Krystalle des gemeinen Bitterspathes einzeln in Talk- oder Chloritschiefer eingewachsen vorkommen.

b) Der fasrige Dolomit (**St. fibratus**), von röthlicher Farbe, findet sich in Ungarn und Schlesien.

c) Der körnige Dolomit (**St. granulatus**), ist ein weißer oder grauer, feinkörniger, leicht zu zerbröckelnder Stein, schwerer als der gemeine Kalk; findet sich am schönsten in den Alpengegenden, während

Digitized by Google

d) der gemeine, fast schon dichte Dolomitkalk (St. solidus) vorherrschender in unseren S. 18 erwähnten Flötzkalkgebirgen gefunden wird.

5) Der Talkspath (**Magnesia scutula**), steht nur wegen der äußern Aehnlichkeit seiner rhomboidalen Gestalt und seines Vorkommens im Talkschiefer, hier neben den Bitterspatharten, seiner Mischung nach ist er reine kohlensaure Talkerde, mit Eisenocher. Er findet sich in Tyrol und Salzburg bei dem Rautenspath, ist ein wenig härter und glänzender als dieser. Hieher gehört auch die sogenannte reine Talkerde aus Schlesien und Mähren.

6) Der Arragonit (**Anteros prismaticus**), krystallisirt in rhombischen und 6seitigen Säulen, ist von gelblicher, röthlicher, auch violblauer Farbe, und enthält außer der kohlensauren Kalkerde zuweilen ein wenig Stronthianerde. Ueberhaupt ist es nicht die chemische Beschaffenheit, welche diesen Stein vom Kalkspath unterscheidet und ihm seine größere Härte und Schwere so wie die minder leichte Auflösbarkeit in Säuren giebt, sondern die Verschiedenheit liegt in der Grundform und wird schon daran erkannt, daß der Arragonit, wenn man ihn zerschlägt, nicht in schiefe Würfel (Rhomben) zerspringt. Er findet sich in Spanien, England, Deutschland u. a. Etwas Stronthianerde enthält zuweilen auch die schöne schneeweiße, staudenförmige Eisenblüthe (**A. coralliformis**) aus Steyermark.

Es giebt nun auch noch Weichsteine, die zu dem Brausekalk müssen gerechnet werden, weil sie meist aus kohlensaurer Kalkerde bestehen, und deshalb, wenn man Salpetersäure daran schüttet, stark aufschäumen. Diese sind so weich, daß man sie meist schon mit den Fingern zerbröckeln kann, fühlen sich gar nicht so fettig wie Thon, sondern mager an, und färben stark ab. Dahin gehört:

1) Die Kreide (**Calx cretacea**), welcher Jeder kennt, und die auf der Insel Rügen und in Dänemark ganze Berge ausmacht, welche so weiß aussehen, daß man sie von weitem für Schnee hält, auf denen

Digitized by Google

aber, so unfruchtbar auch die Kreide für sich allein ist, dennoch oben viele schöne Wälder wachsen und fruchtbare Felder sind.

2) Die Bergmilch (**Calx spumea**), ist schön weiß, fühlt sich gar leicht an, fast wie Schaum, und läßt sich mit dem Finger gleich zerdrücken. Man findet sie in den Ritzen und Löchern der Kalkberge, z. B. bei Streitberg.

3) Der Mergel (**Marga**), der sich an gar vielen Orten findet, ist ein Gemisch von kohlensauren Kalktheilen und thonerdigen, auch sandigen Massen. Diese Steinart ist für den Landwirth von unschätzbarem Werthe, indem sie den fruchtbarsten Boden bildet. Einige Abänderungen des Mergels werden auch zur Bereitung des so wichtigen hydraulischen Kalkes benutzt.

B. Die Phosphorkalke (**Calces phosphoratae**), haben Phosphorsäure mit ihrer Kalkerde verbunden, und sind härter als die kohlensauren Kalkarten. Wenn man sie an einem dunklen Orte reibt oder auf heißes Blech streut, sieht man sie leuchten. Dahin gehört nur

1) Der Apatit (**Apatelios speciosus**), welcher durch seinen schönen Glanz und seine bunten Farben die nach Rothgiltigerz suchenden Bergleute oft mag getäuscht haben. Er ist in 6seitigen, zuweilen mit sehr vielen Flächen facettirten Säulen kryſtallisirt, kommt nicht bloß buntfarbig, sondern öfters auch ganz wasserhell vor, findet sich auf den Hochalpen und in den Erzgängen in der Schweiz, in Böhmen, Sachsen, Tyrol und Mähren. Eine schöne spargelgrüne Abänderung des Apatits, aus Tyrol, heißt Spargelstein; eine strahlich fafrige Unterart aus der Gegend von Amberg und aus Böhmen, heißt Phosphorit (**A. Phosphorites**).

C. Flußkalke (**Argyrodamantes**), heißen so, weil man durch sie, wenn man sie den Erzen, die man ausschmelzen will, beimengt, die Metalle viel leichter zum Schmelzen oder Fließen bringen kann, als z. B. durch gemeinen Kalkstein. Die Flußkalke brausen nicht mit Scheidewasser, bestehen aber auch aus Kalkerde mit

Digitized by Google

einer Säure verbunden, die man Flußsäure nennt, und welche das Glas zerfrißt. Es gehört dahin:

Der Flußspath (**Argyrodamas tesselatus**), ein gar schöner Stein, welcher meist in regelmäßigen Würfeln, zuweilen auch in Würfeln mit dreifach zugespitzten oder mit abgestumpften Ecken und in Achtflachen kryſtallisirt ist, findet sich meist nur in den Bergschachten bei den Erzen und sieht öfters so schön grün wie der Smaragd, oder veilchenblau und roth wie der Amethyst und der Rubin, auch weingelb wie der Topas aus.

Als es daher vor etlichen hundert Jahren Mode war, daß die Aerzte Edelsteine zu Pulver zerstoßen ließen, und den Kranken eingaben, wurde auch gar oft grüner Flußspath statt des schönen Smaragds, oder rother statt des Rubins in die Apotheken gebracht, und da zerstoßen. Und das war auch gut, denn er pulverte sich leichter und war viel wohlfeiler, und arme Leute konnten doch nun, wenn sie wollten, die Mode auch mitmachen, Edelsteine einzunehmen. Und wenn ihnen dann nicht viel fehlte, oder sie einmal ihren Glauben daran hatten, so wurden sie auch eben so gut wieder gesund wie von Edelsteinen, die mitunter nicht viel anders müssen gewirkt haben, als ganz fein gestoßene Topfscherben.

Der heller gefärbte Flußspath ist durchsichtig. Er läßt sich mit dem Messer nicht schneiden, schneidet aber auch nicht ins Glas, und giebt am Feuerstahl keine Funken. Wenn man ihn zerschlägt, bekommt er glatte Flächen, 4 oder 8, und diese Bruchstücke sehen dann wie 3seitige Pyramiden, oder wie ein Achtflach aus. Doch ist dieß nicht bei allem Flußkalk der Fall, denn nicht aller hat einen blättrigen Bruch. Man unterscheidet daher von dem Flußspath eine Abänderung des Flußkalkes, welche am Harz, in Sachsen, Schweden und Savoyen gefunden wird, unter dem Namen des dichten Flusses, weil sie nur einen dichten Bruch hat, einen andern, in stauberdigen Theilchen vorkommenden Flußkalk als erdigen Fluß.

D. Die Gypse (**Gypsa**), enthalten auch Kalkerde in sich, die mit Schwefelsäure verbunden ist. Sie sind so weich, daß sie sich mit dem Fingernagel ritzen lassen, schon dadurch unterscheiden sie sich von den ihnen etwa ähnlichen, ungleich härteren kohlensauren Kalkarten. Auch sind die kohlensauren Kalke, weil sie fester und dichter sind, viel kälter anzufühlen als die Gypse.

Digitized by Google

Dahin gehören:

1) Das Fraueneis (**Gypsum Selenites**), ist durchsichtig, und glänzt schön perlmutterartig. Man braucht es hier und da beim Porzellanmachen, auch in den Apotheken findet man es.

Hiezu gehören als Arten:

a) Der körnige und dichte Gyps, oder der Alabaster (**Gypsum Alabastrites**), welcher wenn er von rein weißer Farbe ist, schon seit alten Zeiten, wo man vorzüglich Balsambüchschen (**Alabastri** genannt) daraus machte, zu allerhand Bildhauerarbeiten verwendet wird. Wenn er bunt gestreift oder gefleckt ist, heißt er Perlgyps.

b) Der faserige Gyps (**G. fibratum**), wurde schon oben S. 31 erwähnt. Außerdem unterscheidet man noch

c) den stauberdigen Gyps (**G. pulverulentum**), der sich in manchen Höhlen des Gypsgebirges findet, und

d) den Schaumgyps (**G. spumeum**), der aus schneeweißen, zartschuppigen, schaumartig leichten Theilchen besteht. Der Schaumgyps findet sich bei Montmartre unweit Paris; von den Orten, wo die andern Gypsarten vorkommen, war oben S. 31 die Rede. — Aller eigentliche Gyps enthält vieles (mehr als ⅕ seines Gewichts) Krystallisationswasser. Wenn man ihn durchs Brennen dieses Wassers beraubt, zieht er es, wenn man ihn anfeuchtet, begierig wieder an und fügt sich nun kittartig fest mit andern Körpern zusammen, daß man ihn zu Stukaturarbeiten und zum Täfeln der Fußböden anwendet. Das gebrannte Fraueneis giebt die Hauptmasse zu Pastellstiften ab. Auch bedient man sich des rohen Gypses zum Verbessern des Bodens, besonders beim Kleebau.

2) Der wasserfreie Gyps oder Anhydrit (**Theiochalyx anhydros**), enthält blos schwefelsauren Kalk, ohne Krystallisationswasser. Er findet sich meist im Steinsalzgebirge (z. B. bei Berchtesgaden) und zerfällt nach der Beschaffenheit seines Bruches in würflichten, der auch Muriazit (**Th. prismaticus**) heißt, und in den dichten oder den Blaugyps (**Th. spissus**). Der würflichte oder blättrige geht durch seine körnigblättrigen Abänderungen in den dichten über.

E. Boraxsaure Kalkgattungen. Dahin gehört eigentlich nur

1) Der aus boraxsaurem Kalk und aus Kieselerde bestehende Datholith (**Dactylolithus**) aus Nor-

Digitized by Google

wegen, der äußern Aehnlichkeit wegen sezt man aber auch hieher:

2) Den aus boraxsaurem Talk bestehenden Borazit (**Chrysocollites tesselatus**), ein fast demantartig glänzendes weißliches oder grünliches, quarzartig hartes Steinchen, dessen Würfelkrystalle (an welchen öfters die Ecken und auch die Kanten abgestumpft gefunden werden, und welche nicht selten in 4 oder 8flach übergehen) im Gyps, besonders bei Lüneburg und bei Segeberg im Holsteinischen einzeln eingewachsen sind.

V. Die Schwerspathsteine (**Barystathmi**), welche Baryterde enthalten, fühlen sich fast so schwer an wie Erze, man sieht es aber doch jenen gewichtigen Erdmännern gleich an, daß sie keine Erze, sondern erdige Steine sind. Sie lassen sich mit dem Messer schneiden. Dahin gehören:

1) Der Witherit (**Deleterion**), der sich in den Bergschachten, in England und zu Neuburg in Steyermark findet, sieht fasrig aus; ist, wenn man ihn pulvert, ein starkes Rattengift, an welchem selbst Menschen sterben können. Er besteht aus kohlensaurer Baryterde.

2) Der Schwerspath (**Barylithus lamelliformis**), welcher aus schwefelsaurer Baryterde besteht, zeigt auch glatte Flächen beim Zerschlagen, und giebt dann kleine, längliche, geschobene Vierecke. Er krystallisirt nur in den breiten, auch tafelförmigen Säulen, welche zu den bei §. 11 B. Nr. 4. beschriebenen Formen gehören. Er glänzt etwas fettartig, und löst sich wie in lauter gerade Schaalen oder Lamellen auseinander. Man findet ihn in Bergschachten, aber auch sonst hier und da in Steinbrüchen, z. B. im Sandstein bei Wendelstein unweit Nürnberg.

Zu dem eigentlichen, oder schwefelsauren Baryt gehören als Unterarten:

a) Der körnige Baryt (**B. granosus**), wegen seines körnigen Bruches so genannt, findet sich in Steyermark, Tyrol, Graubündten und im Nassauischen.

b) Der säulen- und stangenförmige (**B. columnularis**), besonders aus der Gegend von Freiberg in Sachsen.

c) Der strahlige Baryt oder Bologneser Leuchtstein (**B. Chrysolampis**), dessen Eigenschaft, wenn er vor-

Digitized by Google

hin dem Feuer oder dem Licht der Sonne ausgeſetzt war, im Dunkeln zu leuchten, ein Schuhmacher in Bologna, welcher aufs Goldmachen ausgieng und Vincent Cascariolo hieß, im Jahre 1630 entdeckte. Dieſer Stein findet ſich in flachen, rundlichen Stücken bei Bologna und bei Amberg.

d) Der dichte Baryt (B. spissus), hat einen dichten Bruch, iſt graulich, gelblich, röthlich, findet ſich am Harz, in Sachſen, in Tyrol und Steyermark.

e) Der faſrige Baryt (B. fibratus), weißlich und bräunlich, in knolligen und ſchaaligen Stücken, findet ſich bei Lüttich, bei Neu-Leiningen in Rheinbayern und in Böhmen. — Man bedient ſich des ganz weißen Barytes, nachdem man ihn gebrannt und feingeſtoßen hat, zur Bereitung von Paſtellſtiften, zur weißen Farbe, zur Bereitung von ſogenannten Capellen beim Silberbrennen und vor allem zum Gewinnen der Baryterde, aus welcher dann allerhand Arzneimittel (z. B. ſalzſaurer Baryt) zuſammengeſetzt werden.

VI. Die Steine des Stronthiangeſchlechts (**Strontionitei**), haben ihren wenig ſagenden Namen von der Erde erhalten, die ſie enthalten; dieſe aber, die Stronthianerde, den ihrigen nicht etwa von einer Eigenſchaft, ſondern von der Provinz **Strontionshire** in Schottland, von woher Steine dieſes Geſchlechts zu uns gebracht wurden. Die Stronthianerde nähert ſich in ihren Eigenſchaften der Kalkerde; verbunden mit Schwefelſäure giebt ſie:

1) Den blättrigen Cöleſtin (**Theioxenos foliaceus**), welcher faſt immer, beſonders in Sicilien, in gaſtlicher Zuſammengeſellung mit dem gediegenen Schwefel gefunden wird, weshalb man ihn auch dort **Zolfo** nennt. Er iſt himmelblau, auch gelblich weiß, kryſtalliſirt in Tafeln und Säulen, wird in Sicilien am ſchönſten, übrigens auch in Tyrol, Sachſen und im Hannöverſchen gefunden.

Arten davon ſind:

a) Der faſrige Cöleſtin (Th. fibratus), meiſt blaulich, findet ſich bei Jena.

b) Der dichte Cöleſtin, grau, bei Paris.

2) Der kohlenſaure Stronthian (**Strontionites Sulzeri**), den Sulzer zuerſt beſchrieb, iſt grün oder gelb, hat blättrigen und ſtrahlichen Bruch, findet ſich in Schottland, in Sachſen, Schleſien, am Harz und im Salzburgiſchen.

Digitized by Google

VII. Die Hallithartigen Steine (**Haloidei**), könnten freilich, 1) mit dem Gyps oder schwefelsaurem Baryt, 2) mit dem Flußspath verbunden werden, aus Anhänglichkeit jedoch gegen das hier zunächst von uns befolgte System und wegen der Verschiedenheit der den Hallithen zu Grunde liegenden Erde mögen sie hier noch eine besondre Abtheilung bilden. Sie enthalten vorzüglich Thonerde mit einer Säure verbunden. Dahin gehören:

1) Der Alaunstein (**Stypteriacites**), von hellgrauer, auch röthlicher und weißlicher Farbe, körnig und dicht, besteht aus Thonerde und Schwefelsäure, nebst Kali und Wasser. Findet sich bei Tolfa unweit Civita-vecchia im römischen Kirchenstaate, auch auf Milo und Argentiera, sowie in Ungarn.

2) Der Kryolith (**Coagulum saxeum**), welcher, wenn man ihn ins Wasser legt, einen gallertartigen Anschein bekommt, ist von weißlicher Farbe, blättrigem Bruch, salzartigem Glanz. Er besteht aus flußsaurer Thonerde und mineralischem Laugensalz, findet sich in Grönland.

§. 13. Zweite Klasse des Mineralreiches: die Salze (**Salia**). Diese unterscheiden sich, wie schon oben gesagt, gar leicht durch ihren salzigen Geschmack, und dadurch, daß sie sich so leicht im Wasser auflösen, von allen andern Steinen.

1) Das gewöhnliche Salz oder Kochsalz (**Sal usitatissimus**), findet sich hier und da, als Steinsalz, ganz fest und so gar schön durchsichtig, wie ein Glas, in den Bergen, z. B. in Polen und Salzburg.

In Afrika, wo es recht heiß ist, und die Leute das Salz viel nöthiger gebrauchen, als wir in unsern Ländern, weil dort der Mensch viel mehr Verlangen darnach hat und alles Fleisch ohne Salz bei der großen Hitze leicht faulen würde, gelten die kleinen Salztafeln, in Ländern, wo das Salz rar ist, wie bei uns das Silbergeld, im Handel und Wandel, und am Nigerfluß erhandeln die Neger das Salz sehr theuer, indem sie Goldstaub dafür geben, der sich freilich bei ihnen häufig genug findet, und ihnen nicht so nützlich ist, wie das Salz. Dort sieht man öfters die Kinder an einem Stückchen Salz mit eben solchem Appetite saugen,

Digitized by Google

wie bei uns am Zucker. Am kaspischen Meere und auch an andren Meeresküsten setzt sich das Salz aus dem Seewasser ab und bildet an seichten Stellen des Ufers, z. B. beim Aralsee, Massen wie Grundeis, die man nur herauszustechen und vom Schlamm zu reinigen braucht, um sie genießbar zu machen. Oder man gewinnt das Seesalz, indem man Seewasser in seichte Gruben hineinleitet und hier durch die Sonnenhitze abdampfen lässet.

Das Kochsalz besteht aus Chlor und Natrium (aus salzsaurem mineralischen Laugensalz), welches gewöhnlich mit etwas Kalkerde verunreinigt ist. Wenn das salzsaure mineralische Laugensalz ganz rein ist, sollte man meinen, müßte es das beste Küchensalz seyn, aber es ist dann von geringerer Auflösbarkeit und hat keinen so kräftigen salzigen Geschmack, obwohl es in Wien häufig verkauft und verbraucht wird, und auch dadurch ganz besonders interessant erscheint, daß man es unmittelbar zur Fuchsischen Bierprobe benutzen kann. Diese sehr einfache und leichte Bierprobe gründet sich darauf, daß sich in einer gewissen Portion Wasser immer eine festbestimmte Menge reines Kochsalz auflöst. Je mehr sich deshalb in einem Maßtheile Bier solches Salz auflöst, desto mehr Wasser ist in dem Bier enthalten, (desto schwächer ist es).

2) Der Salpeter (**Nitrum vulgare**), aus Salpetersäure und Laugensalz (Kali) zusammengesetzt, erzeugt sich auch stellenweise bei uns von selber, besonders da, wo Pflanzen oder manche Stoffe aus dem **Thierreiche verrotten und verwesen, recht häufig aber doch nur in heißen Ländern. So besonders in Ostindien und in einigen Ländern von Amerika. Man benutzt ihn als kühlendes Arzneimittel, als Schmelzmittel, vor allem aber und am meisten zur Bereitung des Schießpulvers und zum Gewinnen der Salpetersäure. In Aegyptenland hat man sonst den Salpeter, noch mehr aber das**

3) Mineralalkali (**Natrum**), **das dort an einem See häufig gefunden wird, auch mit dazu gebraucht, um die Körper der todten Menschen so einzubalsamiren, daß sie nicht verwesen konnten. Denn der Mensch, der nicht weiß, wie es mit dem Tode beschaffen ist, und daß der eigentliche, lebendige Mensch, der in uns wohnt, gar nicht mit ins Grab gescharrt wird, auch vom Tode gar nicht angetastet werden kann, und, wenn er gut war, sich wohl freut, wenn er aus**

Digitized by Google

dem armen, schweren Leibe erlöst wird, fürchtet sich gar sehr vor der Verwesung im Grabe.

4) Der natürliche Vitriol (**Chalcanthum nativum**), ist eine Verbindung der Schwefelsäure mit Eisen, zu dem grünen, mit Kupfer, zu dem blauen, mit Zink, zu dem weißen Vitriol. Man benutzt ihn beim Färben und in der Wundarzneikunde.

5) Der natürliche Alaun (**Alumen Stypteria**), von fasrigem und strahlichem Bruche, süßlich zusammenziehenden Alaungeschmack, findet sich meist in Steinkohlengebirgen. So in Böhmen und Sachsen. Er besteht aus Schwefelsäure, Thonerde und mineralischem Laugensalz (Kali). Einige Abänderungen enthalten auch Ammoniak.

6) Der Salmiak (**Ammoniacum**), eine Verbindung der Salzsäure mit dem flüchtigen Laugensalz (Ammoniak), findet sich nur an Vulkanen und bei entzündeten Steinkohlenlagern.

7) Der Borax (**Chrysocolla**), ist ein vortreffliches Mittel, um die Metalle zum leichten Schmelzen zu bringen, und wird deshalb von den Künstlern zum Löthen der reinen Metalle, so wie zum Fertigen der künstlichen Edelsteine aus Metallkalken gebraucht, von den Mineralogen aber bei Löthrohrversuchen benutzt. Auch in der Arzneikunde ist der Borax dienlich. Man findet ihn am Ufer einiger tibetanischen und persischen Seen, auch in China, Peru und Potosi in Südamerika. Die Boraxsäure kommt übrigens auch in Europa, namentlich in Italien, in mehreren heißen (vulkanischen) Quellen vor.

§. 14. Dritte Klasse des Steinreiches, die brennbaren Fossilien (**Combustibilia**). Diese unterscheiden sich von andern Steinen, wie schon ihr Name sagt, dadurch, daß sie brennen oder doch unkrystallinische Kohle in sich enthalten, und überdieß auch durch ihre meist sehr geringe Schwere.

1) Der Schwefel (**Sulphur**), dessen Krystallgestalt oben, §. 11 B. 4. erwähnt wurde, findet sich in manchen Gegenden, besonders in Italien und in Polen

Digitized by Google

in gar großer Menge, und in großen Massen in den Gebirgen; vornehmlich im Gypse. Auch aus den Schwefelkiesen, die nachher noch beschrieben werden sollen, gewinnt man welchen, der jedoch oft mit dem giftigen Arsenik vermischt ist. Er sieht nicht immer gelb aus, sondern manchmal auch grau oder weiß. Wenn man aber daran riecht, merkt man gleich, daß es Schwefel ist. Sein Gewicht kommt kaum dem zweifachen des Wassers gleich. Das Brennen der Vulkane mag wohl öfters von den Schwefelmassen, die in der Erde sind, herkommen.

2) Das Erdharz (**Bitumen**), dessen Arten aus einer Verbindung des Kohlenstoffes mit dem Wasserstoffgas bestehen, ist nicht blos aus der Zersetzung urweltlicher Pflanzenstoffe entstanden, sondern auch ein ursprüngliches Erzeugniß der Natur, eben so wie der Quarz und der Kalkstein. Es ist leichter als Wasser. Hieher gehören:

a) Das Erdpech oder der Asphalt (**Bitumen Asphaltus**). Dieses ist von schwarzer oder brauner Farbe, findet sich in ganzen Stücken oder als Ueberzug über andere Steine, hat muschlichen Bruch und riecht beim Reiben wie Theer. Der Asphalt, von welchem das todte Meer, auf welchem und an welchem er häufig gefunden wird, seinen alten Namen „Asphaltsee" führte, wird zum Theeren der Schiffe, zu Fackeln, zum Tränken der Leinwand für Zelte und Vordächer, zu Kitten bei Wasserbauten und auch mit trefflichem Erfolg zum Straßenpflastern angewendet. Der Asphalt löst sich in Oel auf und wird so als Räderschmiere für allerhand Maschinerien benutzt. Er findet sich nicht bloß auf mehreren vulkanischen Seen, sondern auch in den Gebirgen vieler Länder auf Lagern und Gängen. Der Centner kostet in Triest 50 bis 65 Gulden.

b) Das Erdöl (**B. liquidum**), oder die Bergnaphtha, brennt, wenn man sie einmal angezündet hat, an den Orten, wo sie aus der Erde quillt, so ununterbrochen fort, daß die Feueranbeter in Persien, die statt des lieben Gottes die Sonne anbeten, deßwegen gern an solchen Orten wohnen, wo Erdöl ist. Sie brauchen dort nur ein Loch mit einem Stock in die Erde zu machen, und dann ein Licht daran zu bringen, da haben sie Feuer, das immer fort brennt, wenn man es nicht durch darauf geschüttete Erde auslöscht.

3) Die Steinkohle oder Schwarzkohle (**Lithanthrax**), die in manchen Gegenden häufig statt des

Digitized by Google

Holzes gebrannt wird, und bei vielen Schmelz- und Schmiedearbeiten noch besser ist, als die Holzkohle, überdieß bei der Dampfschifffahrt und für die Dampfwägen der Eisenbahnen ein unschätzbar werthvolles Material ist, findet sich zum Glück in sehr vielen Ländern, namentlich in England, Belgien, auch in Böhmen und Sachsen, in Hessen, und am Rheine hinunter, in dicken, weit ausgebreiteten Lagen zwischen den andern Steinen (z. B. Sandsteinen). Oftmals zeigen sich mehrere solche Lagen, wie Stockwerke übereinander, und liefern so viele Steinkohlen, daß in manchen Gegenden der Steinkohlenbau schon seit vielen hundert Jahren betrieben wird, und doch noch immer welche da sind. Die eigentlichen Steinkohlen sehen ganz schwarz aus und brennen im Feuer ohne zu zerspringen.

Der Unterschied zwischen den ungleich nutzbarern eigentlichen Steinkohlen und den minder werthvollen Braunkohlen besteht darinnen, daß die Steinkohlen in der Glühehitze sich aufblähen und eine poröse (schwammige) fast metallisch glänzende Masse, die sogenannten Coaks bilden, während die Braunkohlen durch das Erhitzen in lauter kleine Stücken zerspringen und durchs Kochen in einer Potaschenauflösung zu einer dunkelbraunen Flüssigkeit werden.

4) Die Braunkohlen (**Turfae solidae**), welche zwar öfters durch ihre mehr braune Farbe erkennbar sind, zuweilen aber auch den ächten Steinkohlen so gleichen, daß sie, wie bisher in Oberbayern, mit ihnen verwechselt werden, zerspringen, wie schon erwähnt, im Feuer und brennen überhaupt bei weitem nicht so gut als die Schwarzkohlen. Sie finden sich auch in großer Menge in dem aufgeschwemmten Land so wie in den jüngern Flötzgebirgen. Unter ihnen liegen oft noch ganze Baumstämme, auch manchmal solche, die jetzt nur in heißen Ländern wachsen.

5) Der Bernstein (**Succinum electricum**), ein schöner weißlicher oder gelber und durchsichtiger Stein, der sich mit dem Messer bröckeln läßt, und am Lichte zu brennen anfängt, wird zum Schmucke, zum Bereiten des Firnisses, und zum Räuchern gebraucht. Er findet sich in vielen Ländern, am meisten aber in den Ländern der Ostsee, z. B. Preußen, unter der

Digitized by Google

Erde, im Sande. Dort wäscht ihn das Meer heraus, und wirft ihn dann, weil er nicht viel schwerer ist, als das Seewasser, bei starken Stürmen ans Land, wo ihn die Leute aufleſen.

Auf der Insel Rügen darf man sich selber solche schöne Bernsteine aufleſen, so viel man will, es giebt aber dort nicht so viele und nicht so schöne Stücke, wie in manchen andern Küstengegenden. Den Bernstein haben schon die alten Phönizier, und späterhin unsere alten Deutschen an der Ostseeküste aufgeleſen, und die ersteren haben ihn dann theuer an andere Völker verkauft. Die alten Deutschen nannten ihn Gleſſum oder Gläſum, welches Wort mit „Glas" verwandt scheint. Das Pfund schöner, durchsichtiger, zum Verarbeiten tauglicher Bernstein kostet einen Thaler, das Pfund Firnißbernstein gegen 6 Groschen oder 30 Kreuzer.

6) Der Graphit oder das Reißblei (**Graphitis**), besteht aus reiner, sehr schwer verbrennbarer Kohle, mit welcher öfters etwas Eisen verbunden ist. Dem chemischen Gehalt nach gleicht demnach der Graphit gänzlich dem Demant, nur ist in ihm der todte Stoff nicht von der Kraft der Krystallisation ergriffen, welche der Kohle in dem Demant ihre ungemeine Härte, ihren Glanz und ihre hellen Farben verleiht, während sie im Graphit weich, glanzlos und eisenschwarz erscheint, und einen dichten, öfters auch schuppigen und blättrigen Bruch hat. So nahe auch der Graphit seiner chemischen Beschaffenheit nach dem Demant stehet, ist es dennoch der menschlichen Kunst eben so wenig gelungen, aus ihm einen kostbaren Demant, als aus der todten Kohle eine lebendige Pflanze zu schaffen. Uebrigens ist der Graphit, wenn auch kein Edelstein, dennoch wegen seiner Nützlichkeit ein ehrenwerther, edler Stein, denn aus ihm werden die gewöhnlichen Bleistifte gemacht, indem man ihn entweder nur zu einer hierzu dienlichen Form zuschneidet oder ihn gepulvert mit Thon oder andern zähen Substanzen zusammenmischt und fest werden läßt. Auch macht man aus Graphit und Thonerde feuerfeste Schmelztiegel. Er findet sich in vorzüglicher Güte in England, sonst aber auch in Schlesien, Böhmen, Bayern, Oesterreich, Salzburg u. a. Von dem besten englischen Graphit kostet der Centner an Ort und Stelle 300 Thaler

Digitized by Google

(540 fl.), von dem böhmischen und bayerischen 150mal weniger, nämlich nur 2 Thaler oder 3 fl. 36 kr. bis 3 fl. In diesem Werthverhältniß könnten auch die aus beiderlei Sorten von Graphit gefertigten Bleistifte stehen. — Die mineralische Holzkohle so wie die Glanzkohle oder Kohlenblende schließen sich der äußern Aehnlichkeit nach als Nebenarten an den Graphit an. Sie bestehen aus ziemlich reiner Kohle, welche mit mehr oder weniger Kieselerde verbunden ist, wodurch sie in der Regel schwer verbrennbar werden.

§. 15. Die vierte Klasse des Mineralreiches begreift die Metalle (**Metalla**). Diese lassen sich, wie schon gesagt, durch ihre große Schwere und öfters auch durch ihren Metallglanz unterscheiden, wenn sie nicht gar zu sehr mit erdigen Theilen vermengt, oder auch durch ihre Vererzung etwas unkenntlich geworden sind. Man hat aber dann noch immer andere Merkmale, woran man sie erkennen kann, die wir bei jedem einzelnen erwähnen wollen.

1) Das Platinametall (**Leucochrysos**), findet sich in Südamerika, so wie im russischen Reiche in Klumpen oder in Körnern, im Sand- oder Lehmland. Es ist noch schwerer wie Gold, (das vollkommen reine wiegt über 22mal mehr denn Wasser) sieht lichte stahlgrau aus, läßt sich, weil dazu ein 48mal höherer Hitzegrad erfordert wird, als zum Schmelzen des Zinnes, in unsern gewöhnlichen Hochofenfeuern gar nicht schmelzen, wohl aber zusammenschweißen und dann zu Schmuckarbeiten, Münzen, allerhand physikalischen Instrumenten, vorzüglich aber zu kleinen Schmelztiegeln, verarbeiten, die sich durch ihre Unschmelzbarkeit bei gewöhnlichem Kohlenfeuer und auch dadurch empfehlen, daß sie eben so schwer als Gold von den Säuren angegriffen werden. Das Platinametall ist aber sehr theuer, viel theurer als Silber und fast halb so theuer als Gold.

2) Das Gold (**Aurum**) hat Mancher freilich noch nicht viel anders gesehen, als an den vergoldeten Bildern in den Kirchen, er weiß aber darum doch so gut wie ein Anderer, daß es gelb aussieht. Es ist sehr

Digitized by Google

schwer, (19mal schwerer als Wasser), läßt sich mit dem Messer schneiden und biegen, so wie auch hämmern, und zwar das letztere so fein, daß man einen Ducaten, der doch nur so groß ist wie ein Dreikreuzerstück, so viel ausdehnen kann, daß sich ein Reiter mit sammt dem Pferde damit übergolden ließe. Das Gold ist schon viel leichter schmelzbar als Platina. Dennoch will es dazu etwas mehr Hitze haben, als das Silber und selbst das Kupfer, und ein Goldschmiedofen, worin man Gold will zum Fließen bringen, muß eine fast 11mal größere Erhitzung bekommen, als zum Schmelzen des Zinnes, eine fast 9mal größere, als zum Schmelzen des Bleyes nöthig wäre. Es findet sich zuweilen als Achtflach krystallinisch gestaltet und in andren §. 11 B. Nr. 2 erwähnten Formen.

In unserm deutschen Vaterlande hat man sonst auch Gold aus dem Flußsande gewaschen. Es war aber niemals sehr viel darinnen, und in manchen Gegenden gehörte schon viel dazu, wenn einer den ganzen Tag über für einen Groschen Gold herauswaschen wollte. Damals aber war alles noch so wohlfeil, daß von einem Groschen eine Familie einen ganzen Tag über leben konnte. Jetzt aber ist dieß anders, und da ist es sicherer, sein Brod auf eine andere Art im Schweiß seines Angesichts zu essen. Dagegen findet man in Südamerika und auch in manchen Gegenden von Afrika noch jetzt, und ehemals, ehe die Europäer Alles so ausgesucht hatten, viel häufiger, ganze Klumpen und Klümpchen, oder doch Körnlein Goldes, in manchen Gegenden unter dem Sande. Noch im Jahr 1785 grub man unter andern bei Bahia eine Masse gediegenen Goldes, welche 2560 Pfund wog. Dennoch sind diese Gegenden, in denen so ungemein viel Gold und Silber gegraben wird, für das Volk, welches dieselben bewohnt, gerade keine reichen oder besonders Glück bringenden zu nennen. Denn abgesehen von den Gefahren und Unbequemlichkeiten, welche dort die giftigen Schlangen, wilden Thiere, wie wilden Menschen dem ruhigen Bewohner bringen, ist es auch insgemein gerade da, wo Gold und Silber in der größesten Menge vorkommen, so theuer zu leben, daß der Arbeiter für den hohen Lohn, welchen er empfängt, kaum die nöthigsten Lebensmittel und andere Bedürfnisse des Hauses sich anschaffen kann. Dieses haben unter andrem manche unsrer deutschen Bergleute erfahren, wenn sie, angelockt durch den großen Lohn, den man ihnen drinnen anbot, in die amerikanischen Bergreviere hineinzogen, und daselbst, statt, wie sie gehofft hatten, so viel zu erübrigen, daß sie Geld für ihre armen Familien in die Heimath schicken

Digitized by Google

könnten, kaum für ihren eignen nothdürftigen Unterhalt ausreichten. Auch ist schon Mancher, dem Amerika's Gold und Silberminen ungeheure Schätze eingebracht hatten, in Mangel und Geldnoth gerathen und als armer Mann gestorben, wie dies ja selbst die Geschichte des mächtig reichen Königs Philipps II. von Spanien gezeigt hat. Darum bleibt es dabei: nur der ist reich zu nennen, der mit dem, was er erwirbt oder einnimmt, für sich und die Seinigen zum Leben genug hat und auch noch etwas übrig behält, zu geben den Dürftigen. Nur der vor allem ist reich und glücklich zugleich, der ein zufriedenes, immer fröhliches Herz und ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen hat.

Gold wird auch in Ungarn und Siebenbürgen viel gegraben, und in neuerer Zeit hat man in einem zum russischen Reich gehörigen Länderstrich am Uralgebirge einen erstaunenswürdigen Reichthum an Gold, im aufgeschwemmten Lande gefunden. Bei uns glaubt manchmal auch einer, wenn er beim Pflügen oder sonst wo ein Stücklein Schwefelkies oder Kupferkies findet, er habe Gold gefunden. Ein solcher Fund ist aber meistens keinen Pfennig werth, obgleich der Stein eben so gelb aussieht und auch fast so glänzt wie Gold. Das Gold ist mehr als 15mal so theuer als das Silber, denn das Mark von jenem gilt gewöhnlich 364 Gulden, mithin das Pfund gegen 728 Gulden, während das Mark (halbes Pfund) Silber nur einen Werth von 24 Gulden hat.

3) Das Silber (Argentum), ist schon etwas häufiger bei uns zu finden. Das gräbt und grub man in Sachsen, am Harz, am Fichtelgebirge, in Böhmen, am Schwarzwald, und noch sonst an manchem Ort aus den Gängen oder Erzadern der Urgebirge. Freilich überall da nicht so häufig, wie in Südamerika, z. B. in Potosi, wo ganze Thonschieferberge von gediegenem Silber stellenweise reich durchzogen, auch Gänge gefunden sind, die mehrere Ellen hoch und dick, gleich silbernen Mauern aus der rings um sie her von allerhand zerstörenden Einflüssen der Natur aufgelösten und vom Wasser hinweggeführten Bergmasse hervorragten. Aber man hat doch auch sonst, vor mehreren Jahrhunderten z. B. einmal zu Schneeberg, im Sächsischen Erzgebirge, eine Masse Silber gefunden, die 100 Centner wog, und so groß war, daß ein damaliger Herzog darauf, wie auf einer Tafel, mit seinen Begleitern speiste. Das Silber ist nur $10\frac{1}{2}$mal so schwer als Wasser; eine Kugel von Silber wiegt daher noch nicht einmal halb so viel, als eine gleich große Kugel von

Digitized by Google

vollkommen reinem Platina-Metall. Es fordert, um zu schmelzen, nur 8mal mehr Hitze denn Zinn, noch nicht ganz 7mal so viel mehr denn Bley, läßt sich wegen seiner Geschmeidigkeit leicht hämmern und verarbeiten, hat einen starken Glanz und zeigt sich in jener Haupteigenschaft als ein edles Metall, daß es nicht so leicht rostet als die unedlen.

Die reichen Silbergänge bei Freiberg sollen durch Fuhrleute, die da durch den Wald fuhren, entdeckt worden seyn; die bei Schneeberg in Sachsen durch einen Mann aus der Donau-Gegend, der mit Schustergeräthe und allerhand anderer kleiner Waare einen Handel nach Zwickau trieb, und sich da, wo jetzt Schneeberg liegt, im Walde verirrt hatte. Ueberhaupt ist es recht merkwürdig, daß die meisten und reichsten Erzgänge in Europa und Amerika, von ganz gemeinen und unwissenden Leuten, z. B. Hirten, Bauern, Fuhrleuten, nicht von Bergoffizianten, die aufs Suchen ausgiengen, entdeckt worden sind. Auch daran sollen wir merken: daß nicht des Menschen große Kunst und Verstand, sondern ein einfältiges Auge, und vor Allem Gottes Segen und Beistand es sey, was uns das Reichste und Größte giebt.

Das Silber findet sich in mehreren Formen und Vererzungen:

a) als güldisch gediegenes Silber (A. Electrum). Dieses ist eine natürliche Verbindung von 54 Prozent Gold mit 46 Pr. Silber und findet sich am Schlangenberg in Sibirien. Eine Abänderung davon, welche nur aus 20 Pr. Gold und 72 Silber besteht, wird zu Kongsberg in Norwegen und Mexiko gefunden.

b) Als gediegen Silber (A. nativum), dieß ist haarförmig, auch so dick und krumm wie ein Schweinszahn u. s. w., läßt sich schneiden, und sieht da, wo mans anschneidet, schön glänzend und silberweiß aus. Es läßt sich auch biegen und hämmern, und ist ganz reines Silber.

c) Glaserz (A. plumbeum), sieht grau wie Bley aus. Läßt sich auch zum Theil (wenigstens die eine Art), so schneiden und biegen wie Bley. Es besteht aus Silber und Schwefel.

d) Rothgiltigerz (A. rubrum), sieht roth aus oder röthlich, und glänzt schön. Es ist Silber mit Schwefel und Spiesglanz verbunden.

Außer den oben angeführten, werden auch die natürlichen Verbindungen des Silbers mit Spiesglanz, Arsenik, Molybdän u. s. unter dem Namen Spiesglanz-, Arsenik-, Molybdän-Silber angeführt und beschrieben; eine Verbindung des Silbers mit Salzsäure, zu einem weichen, meist grünen, fast demantartig glänzenden Erz, führt den Namen Hornerz.

Digitized by Google

4) Das Queckſilber (**Hydrargyrus**), findet ſich flüſſig, in ſchönen, zinnweißen und hellglänzenden Tropfen, die in Steinen eingewachſen ſind. Dieſes gediegene, flüſſige Queckſilber wird bei großer Kälte ganz feſt wie Gold und Silber, dann läßt es ſich auch hämmern. In Rheinbayern, noch mehr aber in Idria, in Spanien und in Amerika, findet man viel Queckſilber. Es wird unter andern beim Spiegelbelegen ſo wie in ſeiner Vermiſchung (Amalgamation) mit Gold zum Vergolden gebraucht, ſo wie zum Füllen der Barometer und Thermometer. Der Centner koſtet jetzt gegen 250 Gulden.

Das Queckſilber verbindet ſich ſehr leicht mit manchen Metallen, z. B. mit Gold und Silber zu Amalgam und holt daher dieſe Metalle, auch wenn ſie nur in ganz feinen Theilchen in andere Geſteine eingewachſen ſind, wie ein Spürhund das Wildpret aus dichtem Gebüſche hervor. Darum bedient man ſich des Queckſilbers häufig in den Amalgamirwerken, um die edlen Metalle aus andern Geſteinen auszuſcheiden. Wenn man dann das hierbei entſtandene Amalgam in den Amalgamiröfen der Hitze ausſetzt, verflüchtigt ſich das Queckſilber, welches man in den Zügen des Rauchfanges beim Erkalten großentheils wieder auffängt, während das Gold oder Silber im Schmelzofen rein zurückbleibt. Eben ſo dampft man auch beim Vergolden das Queckſilber des Goldamalgams durch die Hitze ab. Das Queckſilber wiegt ſchwerer als Silber, faſt 14mal ſo ſchwer als Waſſer. Als Arten gehören zu dieſem Geſchlecht:

a) Das Amalgam (H. argentosus), iſt eine natürliche Verbindung des Queckſilbers mit Silber. Findet ſich ſchön bei Moſchellandsberg und Stahlberg im Zweibrückiſchen.

b) Der Zinnober (H. Cinnabaris), iſt eine Verbindung des Queckſilbers mit Schwefel, welche ſich außer den obenangeführten Orten, auch in Böhmen, Sachſen u. a. findet. Wenn der Zinnober mit kohlichten und thonigen Theilen vermiſcht iſt, was ſich durch ſeine geringere Schwere, dunkelbraune Farbe u. ſ. verräth, heißt er Queckſilberleber erz. Dieß findet man in Idria. Eine Verbindung des Queckſilbers mit Salzſäure heißt Queckſilber-Hornerz.

Dieſe 4 Geſchlechte der Metalle denn: Platina, Gold, Silber, Queckſilber, heißen edle Metalle (**Metalla nobilia** oder **virginea**), vorzüglich deßhalb, weil ſie nicht ſo leicht durch Roſt beſchmutzt und verdorben werden, als die andern Metalle.

5) Das Kupfer (**Cuprum**), iſt ein allbekanntes,

Digitized by Google

röthliches, beim Reiben eigenthümlich riechendes Metall, das $8\frac{1}{2}$mal schwerer wiegt denn das Wasser, und leichter schmelzbar ist denn Eisen, schwerer jedoch als Silber. Wegen seiner Geschmeidigkeit und Festigkeit ist dieses Metall, das sich in sehr vielen Ländern der Erde findet, seit den frühesten Zeiten von den Menschen benutzt, und zu Münzen, so wie zu allerhand Geräthschaften und Gefäßen verarbeitet worden. Mit Zink zusammen geschmolzen, giebt das Kupfer den Messing, mit Zinn giebt es die Bronze, so wie das Glockenmetall. Wegen seiner großen Elastizität hat das Kupfer unter den meisten andern Metallen den hellsten Klang, daher braucht man den Messingdrath zur Bereitung der Klavier- und anderer Seiten und, wie schon erwähnt, zum Gießen der Glocken. Auch wird, mittelst des Essigs, Grünspan aus dem Kupfer bereitet. Der Centner dieses nützlichen Metalles kostet 60 bis 62 Gulden; das japanische, so wie das russische Copekenkupfer, das ein wenig Gold beigemischt enthält und geschmeidiger ist als das gewöhnliche Kupfer, kostet 70 bis 80 Gulden.

Das Drathziehen so wie die Verfertigung der messingenen Saiten ist in Nürnberg erfunden worden. Die Erfindung der Glocken ist aber ungleich älter und kam wahrscheinlich aus Asien her, wo es noch jetzt z. B. zu Pecking in China Glocken von 2500 Centnern giebt. Doch war auch früher in Moskau eine Glocke von mehreren tausend Centnern (4140) Gewicht; die große Glocke zu Toulose wiegt 506, die des Stephansthurmes zu Wien 412; eine noch jetzt in Moskau befindliche 356; die von Rouen gegen 360; die große Mailänder, die Berliner und die Pariser jede 320; die Erfurter 302; die Magdeburger 293 Centner. Man findet das Kupfer

a) als gediegen Kupfer (C. regulare), hie und da noch jetzt in ganzen großen Massen und Klumpen. Dieß sieht kupferroth aus, läßt sich ein wenig schneiden, übrigens auch biegen und hämmern, und Jeder, der es fände, würde es gleich als Kupfer anerkennen.

b) Der Kupferkies (C. aurichalcoideum), sieht so schön gelb aus, daß man ihn für Gold halten könnte. Mit dem Messer kann man leicht daran schneiden, das Abgeschnittene fliegt aber wie Pulver weg (ist nicht so geschmeidig wie gediegen Gold oder Silber). Er besteht aus geschwefeltem Kupfer und geschwefeltem Eisen. Dagegen besteht

c) Der Kupferglanz (C. sulphuratum), welcher eine schwärzlich bleygraue Farbe hat, nur aus einer Verbin-

Digitized by Google

dung des Kupfers mit wenig Schwefel, und eine Mittelart zwischen beiden, welche allerdings schon eine eigene Spezies bildet und die gegen 14 Prozent Eisen bei sich führt, heißt Buntkupfererz.

d) Das Fahlerz (C. chalybeum), ist stahlgrau oder eisenschwarz, krystallisirt in deutlichen 3seitigen Pyramiden und enthält meist Spiesglanzmetall beigemischt.

e) Das Rothkupfererz (C. rubricosum), ist graulich-koschenillroth, glänzt demantartig. Das blättrige findet sich als Rhombenzwölfflach (wie der Granat) und als Achtflach krystallisirt. Das haarförmige, das oft sehr schön karminroth aussieht, ist selten. Doch findet sich noch immer einiges bei Rheinbreitenbach und in Ungarn. Das blättrige Rothkupfererz findet sich am schönsten am Uralgebirge in Sibirien und bei Chessy unweit Lyon, sonst aber (wenn auch von minderer Schönheit) auch in vielen Gegenden von Deutschland, namentlich in Schlesien, Thüringen u. a. Alle Rothkupfererze bestehen blos aus Kupfer- und Sauerstoff- oder Lebens-Luft. Dagegen finden sich andre Säuren dem Kupferkalk beigemischt, bei den nachstehenden Arten:

f) Der Kupfermalachit (C. Molochites), sieht schön grün aus. Ist manchmal faserig, wie aneinander gelegte Seidenfäden, manchmal auch dicht. Läßt sich mit dem Messer schneiden. Wenn man Salpetersäure oder sonst eine starke Säure daran bringt, löst er sich schäumend auf, denn er besteht aus kohlensaurem Kupferkalk.

g) Kupfergrün (C. Aerugo), nennt man den grünen Ueberzug, der dem Grünspan sehr ähnlich ist.

h) Die Kupferlasur (C. cyaneum), ist blau wie der Lasurstein, schäumt auch mit Säuren auf und läßt sich mit dem Messer schneiden. Sie besteht auch aus kohlensaurem Kupferkalk.

i) Das salzsaure Kupfer (C. muriaticum), ist gras- und smaragd-, auch lauchgrün, findet sich in Südamerika und am Vesuv, außerdem aber auch in Sachsen und bei Rheinbreitenbach.

k) Das phosphorsaure Kupfer (C. phosphoratum), meist von dunkelgrüner Farbe, findet sich bei Rheinbreitenbach.

l) Das arsenikfaure Kupfer (C. arsenicatum), dessen Abarten in das himmelblaue Kupferlinsenerz, in den smaragdgrünen Kupferglimmer und in die olivengrünen Olivenerze getheilt werden, kommt meist aus Cornwallis in England.

6) Das Eisen (Ferrum), ist wohl unter allen Metallen in der Welt das, was am häufigsten und öftersten gefunden wird, und schwerlich ist ein großes

Digitized by Google

Land anzutreffen, wo nicht auch etwas Eisen vorkommen sollte. Und das ist gar eine schöne Einrichtung in der Welt. Denn wir gebrauchen das Eisen viel nöthiger als Gold und Silber. Dennoch ist das Verhältniß des Werthes, den der Mensch den Dingen beigelegt hat, so seltsam verschieden, daß einer, der einen schönen Demant hätte, welcher vier Loth wöge, dafür gegen 100 Centner reines Gold, mehr als 1500 Centner Silber, fast 110,000 Centner Kupfer und 660,000 Centner Eisen kaufen könnte. Denn ein Centner auserlesen gutes Eisen kostet gewöhnlich nur 10 Gulden, mithin noch nicht einmal so viel als ein viertel Pfund Silber oder ein halbes Loth Gold. Das Eisen ist über 7½mal so schwer als das Wasser. Um dasselbe zum Schmelzen zu bringen, braucht man beim Gußeisen eine 37, beim Stabeisen eine 45mal größere Hitze als zum Schmelzen des Zinnes. Die Arten des Eisengeschlechts sind:

a) Der Schwefelkies (F. sulphuratum s. Pyrites). Dies ist eben der schöne Stein, welcher so gelb aussieht, und auch fast so glänzt wie Gold, und den schon Mancher, der ihn auf der Erde liegend fand, mit Freuden aufhub, und nach Hause trug, als ob er etwas Rechtes gefunden hätte. Man darf aber nur, wenn man einen solchen Stein gefunden hat, ein Messer nehmen, und ihn damit probiren. Ließe er sich dann freilich schneiden auf die Weise wie Bley, und das abgeschnittene Stückchen sich breit schlagen zwischen zwei Steinen, oder hämmern, nun, dann könnte es Gold seyn, was übrigens nur selten zu erwarten wäre. Ließe es sich schneiden, die abgeschnittenen Stückchen bröckelten sich aber weg, wie Pulver, dann wäre es Kupferkies; läßt es sich aber nicht schneiden, sondern ist vielmehr so hart, daß es am Feuerstahl Funken giebt, dann ist es eben unser Schwefelkies, der aus Eisen und Schwefel besteht, was man schon an dem Schwefelgeruch merken kann, der einem beim Hervorschlagen der Funken in die Nase zieht. Schwefelkies findet sich übrigens an gar vielen Orten in der Erde. Er findet sich in sehr verschiedenen, zufälligen Formen, wenn er aber krystallisirt ist, dann zeigt er sich am öftersten (nach §. 11 B. 2.) als Würfel, dessen 6 Flächen nicht selten durch eine vorspringende Kante, jede in 2 Flächen von 5eckiger Form getheilt sind, so daß daraus eine Krystallgestalt mit 12 Flächen: das sogenannte Pentagonal-Dodecaëder entsteht. Wenn an dieser Figur auch noch die 8 Ecken des Würfels abgestumpft sind, wird daraus ein 20Flächner, (ein Icosaëder). Man benutzt den

Digitized by Google

Schwefelkies, welcher mehr als die Hälfte seines Gewichtes (54 Prozent) Schwefel enthält, um den Schwefel aus ihm zu gewinnen oder um den für die Färberei so nützlichen (grünen) Eisenvitriol und Schwefelsäure (Vitriolöl) aus ihm zu bereiten. Das Eisen, das in ihm enthalten ist, läßt sich wegen seines niemals ganz zu entfernenden Schwefelgehaltes nicht verarbeiten, sondern höchstens, als Eisenoxyd, zum Rothfärben und zum Poliren der Spiegelgläser benutzen.

Wenn sich in der Verbindung mit Eisen nur 37 Prozent Schwefel (zu 63 Eisen) finden, dann entsteht daraus der bronzenfarbene, minder harte Magnetkies, der ein wenig auf die Magnetnadel wirkt.

b) Der Magneteisenstein (F. attractorium; Magnes), sieht eisenschwarz aus, und zieht oft Eisenfeilspäne an sich.

c) Der Eisenglanz (F. nitens), sieht auch stahlgrau und eisenschwarz aus. Die eine Art spaltet sich gar leicht in kleine Blättchen. Wenn man mit dem Messer oder mit der Feile hineinritzt, sieht der Ritzen roth aus.

d) Rotheisenstein (F. Haematites), ist manchmal faserig, und bricht dann in solche Stücke, die unten spitzig wie ein Keil zulaufen, manchmal aber auch nicht. Er heißt auch rother Glaskopf, und Blutstein, weil man glaubte, er stille das Blut, wenn man ihn auf eine Wunde lege. Er sieht roth aus, hat auch oft rothen Ocker zum Ueberzug, und ist schwer. Diese 3 zuletzt erwähnten Arten (b bis d) bestehen blos aus einer Verbindung des Eisens mit dem Sauerstoffgas der Luft. Man gewinnt aus ihnen ein sehr brauchbares Eisen.

e) Brauneisenstein (F. badium), ist fast eben so gestaltet wie d, sieht aber braun aus, und hat oft gelben Ocker zum Ueberzug. Er hat meist etwas Graubraunsteinocher und auch kohlensaures Eisen bei sich und enthält überdieß viel Wasser in seiner Mischung. Er giebt großentheils ein gutes Eisen.

f) Der Spatheisenstein (F. carbonatum) besteht aus einer Verbindung des Eisenkalkes mit der Kohlensäure. Er sieht gelblich aus, läuft aber an der Luft dunkel an. Er krystallisirt in geschobenen Würfeln (Rhomboëdern), hat blättrigen Bruch. Da der Stahl, den man aus dem Eisen macht, eigentlich nur durch eine Verbindung des Eisens mit Kohle dargestellt wird und mithin beide zum Stahl gehörige Stoffe im Spatheisenstein vorhanden sind, taugt dieser ganz vorzüglich gut zum Bereiten des Stahles. Er findet sich in großer Menge in Kärnthen und Steyermark, doch auch am Fichtelgebirg in Bayern, in Thüringen, Sachsen und anderwärts. Zum Spatheisenstein gehört auch der sogenannte er-

Digitized by Google

dige Sphärosiderit, der nur ein Gemisch des staubartigen Spatheisensteins mit Thon ist.

g) Arsenikfaures Eisen (F. arsenicatum), wird in die Arten des Eisensinters, des Würfelerzes und des Skorodits getheilt. Findet sich im sächsischen Erzgebirge (bei Schwarzenberg).

h) Phosphorfaures Eisen (F. phosphoratum), wenn es mit Graubraunsteinerz gemischt ist, heißt Eisenpecherz, das reinere phosphorsaure Eisen unterscheidet sich in blaue und grüne Eisenerde. Beide Arten finden sich in Bayern u. a.

i) Mit Phosphorsäure ist häufig verunreinigt der Raseneisenstein (F. caespitosum). Dieß ist das Eisenerz, das man im aufgeschwemmten Lande gleich unter dem Sand, und in Sümpfen findet, und zum Theil wie Torf herausstieht. Das Metall, das man aus dem Raseneisenstein ausschmilzt, ist ein gutes, dünnflüssiges Gußeisen, ist aber seines Phosphorgehaltes wegen sonst nicht viel zu gebrauchen, da es ein kalkbrüchiges Stabeisen abgiebt.

k) Mit Kieselerde verbunden ist das Eisenoxyd im Lievrit. Von den mit Thon verbundenen rothen und braunen Eisenkalken führen wir nur an

l) den Röthel (F. Rubrica), ein allbekannter, den Zimmerleuten fast unentbehrlicher Stein, der sich in Thüringen (bei Saalfeld) in Schlesien und Salzburg findet.

m) Das Bohnerz (F. fabaceum), in runden oder länglichen Körnern, fast wie kleine Bohnen, findet sich bei Eichstädt, bei Neresheim und noch sonst an vielen Orten.

n) Die Eisenniere oder der Adlerstein (F. Aëtites) ist inwendig hohl wie eine Nußschaale, manchmal klappert sie, wenn man sie schüttelt. Findet sich bei Erlangen, dann auf dem Weg von Bayreuth nach Sanspareil und anderwärts. — Ganz zuletzt, wegen seiner großen Seltenheit, erwähnen wir

o) das gediegene Eisen (F. nativum). Dieses kommt bei uns, wie man sonst glaubte, nur unter den Steinen vor, die aus der Luft fallen. In Sibirien hat man einmal eine solche Masse von gediegenem Eisen gefunden, welche mehrere Centner wog, und tief landeinwärts in den nordamerikanischen Wäldern liegt ein so ungeheuer großer Klumpen reines Eisen, daß die dortigen Eingebornen schon seit gar langer Zeit alle ihre Eisengeräthschaften daraus schmieden. Außer diesen aus der Luft gefallenen, an der Oberfläche des Erdbodens liegenden gediegenen Eisenmassen hat man aber auch am Ural unter den Platinakörnern reine, gediegene Körner von Eisen aufgefunden, und auch in einigen Gegenden von Nordamerika hat man reines Eisen, zum Theil krystallisirt, als Achtflächner, entdeckt. Ueberhaupt scheint

Digitized by Google

das Eisen, je weiter man nach Norden kommt, desto mehr an Menge zuzunehmen. Das gediegene Eisen ist meist zackig, und man sieht es ihm übrigens gleich an, daß es Eisen ist.

7) Blei (**Plumbum**), ist ein weiches, nutzbares Metall, das mehr als 11mal schwerer ist denn Wasser, und nicht viel mehr als den dreifachen Grad der Hitze, welche das Wasser zum Sieden bringt, bedarf, um zu schmelzen. Der Kaufpreis für den Centner beträgt bei dem besten 18 Gulden. Es findet sich meistens als Bleiglanz (**Plumbum Galena**) in den Bergschachten, welcher von lichter oder dunklerer bleigrauer Farbe ist, stark glänzt, und, wenn man ihn zerschlägt, in kleine Würfel sich zertheilt. Er besteht aus Schwefel und Blei, und ist öfters in Würfeln, an denen zuweilen die Ecken abgestumpft sind, krystallisirt. Man findet ihn an gar vielen Orten. Er zerbröckelt sich auch leicht, wenn man ihn mit dem Messer schneidet. Der Bleiglanz hat außer dem Blei, auch etwas Silber in sich, und wenn dieser Gehalt an Silber mehr als 4 Loth auf den Centner beträgt, nennt man ihn in manchen Gegenden schon silberreich. Außer dem geschwefelten, giebt es noch folgende Arten der Bleierze:

a) Kohlensaures Blei (Pl. Psimmythium), wird der Farbe nach in weißes und schwarzes getheilt, glänzt demantartig. Findet sich am Harz u. a. O.

b) Phosphorsaures Blei (Pl. phosphoratum), wird der Farbe nach in grünes und braunes getheilt, findet sich in Sachsen, am Rhein (bei Ems) und sonst häufig.

c) Molybdänsaures Blei (Pl. molybdaenium), das seiner Farbe nach auch gelbes Bleierz heißt, in Kärnthen, Bayern und andern Gegenden.

d) Das Chromsaure oder rothe Bleierz (Pl. Chromium), kommt am schönsten aus Sibirien. Die Bleierde ist keine eigentliche Art, sondern nur ein Gemisch des kohlensauren Bleies mit Eisenocher, Thon- und Kieselerde. Findet sich in Bayern, Kärnthen u. a.

8) Der Zinnstein (**Cassiteris**), sieht bräunlich oder schwarz aus, ist oft in Säulen oder Pyramiden (nach §. 11. B. 3) krystallisirt, läßt sich mit dem Messer nicht schneiden, sondern ist ziemlich hart (giebt sogar einzelne Funken am Feuerstahle). Er findet sich in Ostindien, England, Sachsen und auch am Fichtelgebirge. Er ist fast 7mal schwerer denn Wasser. Aus

Digitized by Google

ihm schmilzt man das Zinn aus, welches, wenn es rein ist, der Centner noch immer mit 70 bis 80 Gulden bezahlt, und zu Geschirren aller Art, so wie als Staniol, mit Queckſilber vermischt, zum Spiegelbelegen benutzt wird. Das reine Zinn ist mehr den 7mal schwerer denn Wasser, und braucht keine 3mal größere Hitze zum Schmelzen, als das Wasser zum Sieden.

9) Der Wismuth (Tecochalcos), ist zinnweiß und meist wie federartig gestreift. Er schmilzt so leicht, daß er, wenn man ihn nur auf einen heißen eisernen Ofen legt, oder ans Licht hält, herausträpfelt. Man nimmt ihn unters Schnellloth, auch zu den Schriften der Buchdrucker, und zu andern Metallcompositionen. Der gediegene Wismuth findet sich vorzüglich in Sachsen bei Schneeberg. Da dieses Metall übrigens selten vorkommt, steht der Preis für den Centner immer auf 86 Gulden.

10) Der Zink (Cadmia aenea), den man mit Kupfer zusammenschmilzt, und dann Messing daraus macht, findet sich a) als Blende (C. sulphurata), die gelb und braun und schwarz ist, fast demantartig glänzt, in 12flachen, jenen des Granates ähnlich, krystallisirt und auch beim Zerschlagen in regelmäßige Bruchstücke (mit 12 rautenförmigen, glatten Flächen) sich zertheilt, und b) als Galmey (C. terrena), der fast wie ein Kalkstein aussieht, meist weiß ist oder gelblich, aber dabei viel schwerer, als ein Kalkstein. Der Galmey findet sich meistens im Flötzkalkstein. In rein gediegenem Zustand wird das Zinkmetall eben so wenig gefunden, als das Zinn. Das künstlich, durchs Ausschmelzen, dargestellte reine Zinkmetall wiegt übrigens nahe gegen 7mal schwerer denn Wasser, und ist ziemlich leicht zum Schmelzen zu bringen. Bei einer Wärme, welche ohngefähr die des siedenden Wassers ist, läßt es sich zu dünnen Platten walzen; in der Glühehitze verbrennt es und giebt dann die sogenannten Zinkblumen. Es löst sich leicht in Säuren auf, und wenn man es in Salpetersäure bringt, welche mit Wasser sehr verdünnt ist, dann entwickelt sich bei der Auflösung des Zinks die brennbare Luft oder das

Digitized by Google

Wasserstoffgas, dessen man sich, wie oben §. 11 A. erwähnt wurde, auch zum Füllen der Luftballons bedient hat. Die Physiker bedienen sich des Zinks beim Galvanismus. Der Centner dieses nützlichen Metalles kommt etwa auf 12 Thaler oder 22 Gulden zu stehen.

11) Das Spiesglanzmetall oder Antimon (Stibium) sieht grau wie Blei aus, zeigt spieß- oder nadel-förmige Krystalle und beim Zerschlagen lauter glänzende Strahlen. Man nimmt es zu Metallcompositionen, benutzt es zum Schriftgießen und gebraucht es gar viel in den Apotheken, wo der Brechweinstein daraus gemacht wird, den man als Brechmittel anwendet, so wie der Kermes oder reine Goldschwefel. Auch fertigt man das sogenannte Neapelgelb daraus. Es wiegt nicht ganz 7mal so schwer denn Wasser, und ist schwerer zu schmelzen, als der Zink. Der Centner ausgeschmolzenes Spiesglanzmetall kostet gegen 25 Thaler oder 45 Gulden. Arten des Spiesglanzmetalles sind:

a) Das gediegene Antimon (St. nativum) kommt aus Allemont in der Dauphiné, findet sich auch am Harz und in Böhmen.

b) Das Grau-Spiesglanzerz (St. sulphuratum), von bleigrauer Farbe, strahlichem, auch körnigem Bruch, krystallisirt in langen 4seitig geschobenen Säulen, besteht aus einer Verbindung des Spiesglanzerzes mit Schwefel. Dieses Erz kommt am öftersten und in ziemlich vielen Gegenden vor, z. B. am Fichtelgebirge in Bayern, in Böhmen, Sachsen, am Harz, in Ungarn, Salzburg, Tyrol u. s.

c) Das rothe Spiesglanzerz (St. rubrum), von dunkelrother Farbe, in haarförmigen Säulchen, ist ein stärker verkalktes Spiesglanzmetall mit Schwefel verbunden.

d) Das weiße Spiesglanzerz (St. album), besteht aus Antimonkalk mit etwas Kieselerde.

e) Der Spiesglanzocher (St. ochraceum), von strohgelber Farbe, ist reiner Spiesglanzkalk.

12) Das Tellur- oder Silvanmetall (Parachrysos), ist nächst dem Queckſilber das leicht schmelzbarste Metall. Denn es braucht nur 2mal so viel Wärme, um zu fließen, als das Wasser zum Sieden. Man findet dieses seltene, in Siebenbürgen vorkommende Metall zuweilen gediegen, öfters aber mit Gold

Digitized by Google

und Silber verbunden als Schrifterz, Weiß-Silvanerz und Nagyackererz.

13) Das Graubraunsteinerz (Aëromagnes), sieht schwärzlich, fast wie Stahl oder Eisen aus, ist meistens strahlich oder faserig, färbt zum Theil, wenn man es angreift, die Hände schwarz. Einiges läßt sich leicht mit dem Messer schneiden, andres, das man unter dem Namen des Schwarzeisensteins begreift, ist bedeutend hart. Wenn man es glüht, geht eine Luftart (das oben im §. 11 A. erwähnte Sauerstoffgas) daraus hervor, in der alles Brennende viel heller brennt. Man verwandelt mit dieser die Salzsäure in Chlor und benutzt dann die Dämpfe zum Bleichen, auch wendet man das Graubraunsteinerz zum Reinigen der Glasmasse von fremden, färbenden Stoffen, z. B. Kohle und Eisenkalk an, weil die erwähnte Luftart die Kohle verzehrt und die Eisenfarbe zerstört.

14) Das Nickelerz (Aërochalcos), sieht schön kupferroth aus und hat einen apfelgrünen Ocker. Es findet sich in Sachsen bei Schneeberg in den Bergschachten, kommt aber auch in kleinen Portionen in den Steinen vor, die manchmal aus der Luft fallen. Das reine Metall, das man (aber mit vieler Mühe) aus dem Nickelerz, in welchem es mit Schwefel verbunden ist, ausschmelzen kann, ist fast so schön und edel als Silber und kann, wie das Eisen, magnetisch werden. Man benutzt in neuerer Zeit das Nickelmetall in seiner Verbindung mit Kupfer und Zink zur Bereitung der silberähnlichen Metallcomposition des Argentan. Der Ocker ist eigentlich das, was manche edle Steine, z. B. den Krysopras aus Schlesien, so schön grün färbt.

15) Das Kobaltmetall (Glaucochalcos), findet sich in Verbindung mit Schwefel und Arsenik als Speiskobalt, der so heißt, weil man ihn zur Glockenspeise, überhaupt aber zu mancherlei Metallcompositionen nimmt, und überdieß findet es sich als Erdkobalt. Der Speiskobalt sieht entweder zinnweiß, und wächst dann oft in Würfeln, oder grau aus. Er ist sehr schwer, läßt sich mit dem Messer nicht schneiden, und wenn man daran schlägt oder stark reibt, riecht er

Digitized by Google

nach Knoblauch, wie der Arsenik, weil er immer Arsenik bei sich hat. Er findet sich vorzüglich in Sachsen, bei Schneeberg, aber auch in Schlesien, am Harze, in Hessen und am Rheine.

Die sächsischen Bergleute achteten vormals, da sie noch Silber genug hatten, das nützliche Kobaltmetall so wenig, daß sie es eben deswegen spottweise Kobold, d. h. einen neckenden Berggeist nannten. Nun aber sind sie froh, daß sie den Kobalt haben, und der ist ihnen jetzt in der Gegend von Schneeberg fast nützlicher und einträglicher als das Silber, denn es nähren sich gar viele Hände durch das Gewinnen des Kobalts und durch die Bereitung der schönen blauen Farbe, die daraus gemacht und weit und breit als treffliches Farbematerial versendet wird. So lernen die Menschen manche weniger in die Augen fallende Gabe Gottes und manchen scheinbar geringen Fund erst spät, zur Zeit der Noth, recht lieben und schätzen.

Die Erdkobalte sehen bläulich, schwarz, braun, gelb und roth aus. Am schönsten ist unter diesen der arsenikſaure Kobaltkalk oder der rothe Erdkobalt, welcher roth wie Pfirsichblüthen oder auch wie Koschenille aussieht, und wovon die eine Art (die Kobaltblüthe) schöne Strahlen hat. Der gelbe und braune bestehen aus Kobaltkalk, welcher durch erdige Theile verunreinigt ist, der schwarze enthält viel Graubraunsteinerz. Die Erdkobalte kommen in Sachsen und Thüringen in den Bergschachten vor, und man macht auch die blaue Farbe daraus.

16) Der Arsenik oder Mispickel (Arsenicum), kommt in der Natur häufig mit andren Metallen, namentlich mit Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Blei verbunden vor, aus deren Verein er, in der Hitze der Schmelzhütten als weißlicher, giftiger Rauch entweicht. Als reines Metall erscheint er von fast zinnweißer Farbe, ist nicht ganz 6mal schwerer als Wasser, halbhart, verflüchtigt sich vor dem Löthrohr und verbrennt bei stärkerer Hitze mit einer blaulichen Flamme. Er ist ein starkes Gift.

Man bedient sich unter andrem einer Beimischung des Arseniks, um Platina zum Schmelzen zu bringen, und um die schmelzende Glasfritte von den sie färbenden kohligen Theilen zu reinigen. Die Hutmacher beitzen mit ihm die thierischen Haare, welche sie bei ihrem Geschäft brauchen; die Kattundrucker verändern durch ihn die Schattirungen der Farben; unter Blei gesetzt, macht er dieses zum Schrotgießen tauglicher. Er giebt in seinen verschiedenen Verbindungen

Digitized by Google

sehr prächtige, dabei aber gefährliche, gelbe und grüne Farben, z. B. das Rauschgelb, das Scheelische und das Mittisgrün. Man nimmt ihn auch als Zusatz zu mancherlei Metallcompositionen, vorzüglich aber zur Bereitung des englischen Weißkupfers, das fast wie Silber aussieht. Außer diesem ist der Arsenik mit Erfolg als Heilmittel gegen mehrere, sonst fast für unheilbar gehaltene, furchtbare Leiden des menschlichen Leibes, z. B. gegen Krebsschäden, äußerlich angewendet worden. Es ist daher nicht zu verwundern, daß jenes giftige und doch so vielfach brauchbare Metall besonders nach dem gewerbthätigen England in solcher Menge ausgeführt wird, daß allein Sachsen jährlich um fast 100,000 Thaler davon verkauft, obgleich der Centner in Schneeberg nur 12 Thaler kostet.

Man hat den Arsenik als Ueberzug über das Pfahl- und Holzwerk der Meeresdämme und Schiffe gegen die Bohrwürmer angewendet; bei uns vergiftet man öfters Mäuse und Ratten damit, in Polen gebraucht man ihn aber zur Vergiftung der Wölfe. Wenn ein Mensch nur ein ganz klein Wenig Arsenik, das nicht viel größer ist wie eine Erbse, einnimmt, bekommt er fürchterliche, grausame Schmerzen im Leibe und muß sterben, wenn man ihm nicht geschwind Seifenwasser und auch fette Milch zu trinken giebt, und einen geschickten Arzt ruft, welcher dann, wenn es noch zeitig genug ist, den Kranken durch die Anwendung der wirksamsten Gegenmittel zu retten suchen wird.

Wenn man den Arsenik ans Feuer bringt, oder daran schlägt, riecht er stark nach Knoblauch. Und das ist immer sehr bemerkenswerth. Denn der Phosphor, der auch sehr giftig ist, wenn man ihn einnimmt, riecht beim Verbrennen ebenfalls wie Knoblauch; manche giftige Thiere, z. B. Kröten, wenn man sie recht bös macht, riechen auch so, und selbst der Knoblauch, so schwach in ihm die Eigenschaft seyn mag, von der sein Geruch herkommt, ist wenigstens vielen Menschen zum Ekel. Der Arsenik findet sich:

a) als gediegener Arsenik (A. nativum). Dieser besteht meistentheils aus solchen kuglichen und traubigen Stücken, die nur halb herausstehen, so wie die Wasserblasen auf dem Wasser. Wenn man ein solches Stück zerschlägt, sieht man öfters, daß es aus lauter, so wie Zwiebelschaalen übereinander gefügten Lagen besteht. Er ist bedeutend schwer, auswendig meist von schwärzlicher Farbe, womit sich auch die frisch aufgeschlagnen, anfangs weißlich aussehenden Stellen bald wieder überziehen. Findet sich am Harz, in Sachsen, Böhmen, im Elsaß und in Ungarn und Siebenbürgen, doch an allen diesen Orten nur sparsam und selten. Häufiger dagegen findet sich:

b) Der Arsenikkies (A. sulphuratum), sieht weiß-

Digitized by Google

lich aus, und glänzt metallisch, wächst in Säulchen, und giebt schon am Stahl Feuer, wobei er stark nach Knoblauch riecht.

c) Das Rauschgelb (A. Auripigmentum), ist gelb und roth, glänzt fast demantartig, und giebt eine zwar schöne gelbe Farbe, die aber noch viel giftiger ist als Gummigutt. Es ist Schwefel mit Arsenik.

17) Das Molybdänmetall (Molybdaenium), findet sich unter dem Namen des Wasserbleies (M. sulphuratum), mit Schwefel vererzt. Es ist bleigrau, krummblättrig und sehr weich, man kann mit ihm schreiben, wie mit Graphit. Man benutzt es hauptsächlich zum Poliren des Stahls, zum Lassiren des Messings und zur Bereitung einer grünen Farbe beim Porzellanmalen.

18) Das Wolframmetall (Lycochalcos), findet sich meist als gemeiner Wolfram, der fast so aussieht wie Zinnstein und auch da gefunden wird, wo der Zinnstein vorkommt. Er krystallisirt aber in fast tafelartig breiten, schiefen Säulen, die nach oben wie ein Giebeldach zulaufen (nach §. 11 B. Nr. 5) und sieht bräunlich schwarz aus.

19) Das Mänak- oder Titanmetall (Titanium), dessen Kalk oft mit Eisenkalk und verschiedenen Erden verbunden ist, bildet in diesen Zusammensetzungen den meist bräunlich rothen Rutil, dessen zarte, nadelartige Säulen oft (nach S. 57) in Amethyst und Bergkrystall eingewachsen sind, den Sphen oder das gelbe Mänakerz, den Octaëdrit, und andere meist in den hohen Alpen, doch auch schon in unsern Gebirgen vorkommende Steinarten. Das reguliniſche oder gediegene Mänakmetall wird, in kleinen, schönen Würfeln krystallisirt, öfters in Eisenschlacken gefunden.

20) Das Uranmetall (Uranium), kommt nur an wenigen Orten, und zwar theils wie ein schöner grüner Glimmer (Uranglimmer), theils als ein schwarzes, sehr schweres, wie Pech glänzendes Erz (Uranpecherz) vor, und man kann es nur etwa zu einer Farbe für Porzellanmaler benutzen.

Digitized by Google

III.

Die Geschichte der Pflanzen oder Botanik.

§. 16. Wenn auch der Stein geziert ist mit aller Pracht der Farben und des Glanzes; wenn auch seine regelmäßige Gestalt von einer noch so schönen, harmonischen Anordnung seiner Elemente zeuget; so geht ihm doch Etwas ab, was das kleinste, unscheinbarste Moos vor dem Demant und Smaragd voraus hat, nämlich ein fortwaltend inwohnendes Leben. Wenn das Eisen die Lebensluft der Atmosphäre an sich zieht, wenn es diese gleichsam in sich einathmet und nun zum Magneteisenstein oder zum Eisenglanz wird, da regt sich freilich, in demselben Augenblick, etwas in ihm, das einem Leben gleicht; aber sobald die Verbindung, sobald das Einathmen geschehen ist, da wird gleich Alles wieder still und todt; der Eisenglanz ist und bleibt, was er geworden war. Anders ist es dagegen bei der lebenden Pflanze. Diese zieht auch das Wasser und luftartige Stoffe in sich, aber sie giebt dieselben zum Theil bald wieder von sich; sie athmet auf ihre Weise ein und athmet auch wieder aus; in ihr ist eine Kraft, welche nach freiem Triebe mit den Elementen waltet, und diese gestaltet, nicht wie es die Natur jener Elemente, sondern wie der Lebenstrieb dieses schaffet. Ueberdieß aber kann die Pflanze fruchtbare Saamen hervorbringen, aus denen Pflanzen derselben Art aufwachsen, was der Stein nicht vermag; es liegt mithin in dem Gewächs ein Funke der Schöpferkraft, durch die im Anfang alle diese Arten der lebendigen Dinge gemacht worden sind, und diesen Funken der Schöpferkraft nennen wir Leben. Die Gewächse sind also Wesen, die in Kraft eines in ihnen wohnenden Lebens wachsen, ihres Gleichen hervorbringen, dann sterben und verwesen, während der Stein weder sterben noch eigentlich verwesen kann, weil er niemals gelebt hat. Von den Thieren unterscheiden sich die Pflanzen dadurch, daß jene eine Bewegung haben, die aus ihnen selber kommt und mit dieser Bewegung

Digitized by Google

zugleich auch Empfindung; während die Bewegungen, die man etwa an einer Pflanze bemerkt, entweder nur durch eine äußere mechanische oder physikalische Reizung z. B. Licht, Wärme, Kälte hervorgebracht werden, oder auf einer durch das Wachsthum selber hervorgerufenen Schnellkraft beruhen, die gleich, nachdem sie sich geregt hat, wieder erlischt.

Solche lebende Wesen, wie die Pflanzen und die Thiere sind, nennt man auch organische; denn in ihrem Innern wie in ihrem Aeußren zeigen sich sehr verschiedenartige Theile oder Organe, davon die einen zum Umlauf der Säfte, andre zum Aufnehmen der Nahrung, noch andre zur Gestaltung der Frucht dienen. Und auch diese Vielheit der Organe beweiset, daß in den lebendigen Wesen ein Funke oder ein Abbild jener schaffenden Einheit inwohnet, durch welche die Vielheit und Mannichfaltigkeit der sichtbaren Dinge entstanden ist. Denn der Stein hat deßhalb kein Auge für das Licht, kein Ohr zum Hören, weil er keine Seele hat, die zu sehen, zu hören u. s. w. begehrt und bedarf.

Wir wollen nun die eigenthümliche Natur des Gewächsreiches und sein Verhältniß zum Erdganzen etwas näher betrachten. Und zwar reden wir zuerst von diesem letzteren Verhältniß.

Während das Vorkommen der einzelnen Fels- und Steinarten gar nicht merklich vom Klima ihres Fundortes abhängt und z. B. der Beryll eben so schön im kalten Sibirien als im heißen Brasilien, der Zirkon in Norwegen wie auf Ceylon, der Topas im sächsischen Erzgebirge wie in Neuholland gefunden wird, zeigt sich bei den Pflanzenarten ein ganz andres Verhältniß. Von diesen können manche nur in der heißen Zone, andre nur in der gemäßigten oder in der kälteren gedeihen; einige wachsen da im Freien und zeitigen ihre Saamen, wo der Sommer nur mäßig heiß, zugleich aber auch der Winter nicht sehr kalt ist, (wie z. B. in den niedrigeren Gegenden von England) andre bedürfen zum Reifen der Früchte eine größere Sommerhitze, obgleich sie zugleich auch die Winterkälte

Digitized by Google

besser vertragen können, wie das Erstere namentlich vom Erdbeerbaum, das Letztere vom Weinstock gilt. Es hängt mithin das natürliche Wohlbefinden und gesunde Gedeihen der einzelnen Familien und Arten der Gewächse zunächst zwar von der mittleren Temparatur einer Gegend, außer diesem aber von den dort möglichen Extremen, und der längeren oder kürzeren Andauer der Wärme und der Kälte, während des Sommers und des Winters ab.

Die mittlere Temperatur eines Ortes ist nicht das Mittel zwischen der größesten Kälte und höchsten Wärme, welche man im Verlaufe des Jahres an demselben beobachtete, sondern es ist das Mittel der Temperatur aller einzelnen Tage des Jahres, welches gefunden wird, wenn man mehrere Male täglich, sey es auch nur in zwei gleichnamigen Stunden, z. B. 9 Uhr Morgens und 9 Uhr Abends das Thermometer beobachtet, dann die Ergebnisse addirt und mit der Zahl der Tage dividirt. Es kann zwar ein Länderstrich, welcher dem Pole näher liegt, auf kurze Zeit im Sommer einem ziemlich bedeutenden Grad der Hitze unterworfen seyn, während er in dem übrigen größern Theil des Jahres einer gegen den Januar, oder auf der südlichen Halbkugel gegen den Juli immer zunehmenden, großen Kälte ausgesetzt ist, niemals aber kann in den niedriger gelegenen Gegenden nahe am Aequator eine bedeutende Kälte eintreten. Doch hat hierauf auch die Höhe der Lage über der Meeresfläche großen Einfluß, denn die einzelnen Orte sind kühler oder kälter, je höher sie liegen. Auch bewirkt die Nähe des Meeres einige Milderung, sowohl der Hitze als der Kälte; denn die tiefen landeinwärts unter dem Aequator gelegenen Länder sind immer heißer als die an die Küste grenzenden. Im Allgemeinen nimmt man an, daß die mittlere Wärme des Jahres in den heißen Ebenen unter der Linie noch nicht ganz 22½ Grade Reaumur betrage und bis zum 20. Grade der Breite nahe 21° (20,8) bleibe. Auch bis zum 30. hält sie sich auf mehr denn 17½ (17,6) Grad, bis gegen den 40. kommt sie auf 14⅖, bis zum 50. Grade der Breite auf 8⅕, beim 60. auf 4 Grade Reaumur herunter und weiter nach dem Pole hin steht sie unter dem Gefrierpunkte. So ist z. B. die mittlere Jahrestemperatur in Guinea fast 22½ (22,40) in Havanna unter dem 24. Breitengrad 20, in Kairo, das unter dem 30. Grade der Breite liegt, nahe 18, in Neapel, unter dem 41. Breitengrade 14⅖, in Amsterdam 9½, in Abo (unter dem 61. Breitengrade) wenig über 4 Grad. Wenn aber auch das eben erwähnte Verhältniß in mehreren nicht viel über die Meeresfläche erhöhten Gegenden unserer nördlichen Halbkugel so ziemlich eintrifft, zeigt sich dagegen auf der südlichen Halbku-

Digitized by Google

gel ein bedeutend niedrigerer Wärmegrad unter den gleichen Graden der höheren Breiten und auch in den östlichen Ländern von Asien ist es in gleichen Entfernungen vom Aequator kälter denn bei uns. Uebrigens hat auch, wie schon erwähnt, die Höhe über dem Meere einen sehr entschiedenen Einfluß auf die mittlere Wärme und man nimmt im Allgemeinen an, daß dieselbe mit jedem Ansteigen von beiläufig 670 bis 680 Fuß um einen Grad des Reaumurschen Thermometers sich vermindere. So liegt z. B. das St. Bernhards-Hospiz nur um einen Grad nördlicher als Mailand; und doch ist daselbst die mittlere Temperatur des Jahres um mehr denn 11° niedriger als in Mailand, denn dort beträgt sie 1° unter, hier aber 10½ Grade über dem Gefrierpunkt. Vergleicht man aber die Höhe beider Orte über dem Meere, dann findet man, daß das Bernhards-Hospiz um nahe 7300 Fuß höher liegt als Mailand.

Die größte Hitze, welche man auf unserer Erde mit dem Thermometer gemessen hat, betrug nur einige 40°, namentlich beobachtete Ritchie in der Oase Mourszuk eine Wärme von $43\frac{1}{10}$ Graden. Doch ist diese Wärme, wenn sie durch die Nacht nicht bedeutend abgekühlt wird, und mithin nur auf einen Theil des Tages beschränkt ist, wenigstens für die Gesundheit des Menschen sehr nachtheilig, denn als im August 1819 zu Bagdad die Hitze über 39 Grad stieg und auch in der Nacht nur auf $33\frac{3}{4}$ Grad herunter kam, starben mehrere Menschen daran. — Auch die größeste Kälte, die man bisher auf der Erdoberfläche maß, geht schwerlich bis unter 50°. Capitän Black fand sie in Fort Reliance $45\frac{3}{10}$ Grad.

In den Berichten der Reisenden so wie der Beobachter in verschiedenen Ländern sind die Angaben öfters nach sehr verschiedenen Thermometerskalen gemacht. Dabei kann man dann die nach der hunderttheiligen Skala zwar sehr leicht mit dem Reaumurschen Thermometer in Uebereinstimmung setzen, (denn 5 Grad der erstern sind immer gleich 4 Graden des letzteren, 100 gleich 80, 45 gleich 36, 15 gleich 12 u. s. w.) scheinbar schwieriger ist jedoch die Ausgleichung der Fahrenheitschen und Reaumurschen Thermometergrade, weßhalb wir hier zur Erleichterung eine kleine Uebersichtstabelle beifügen. Das — bedeutet bekanntlich die Kälte unter dem natürlichen oder künstlichen Eispunkt, das + die Wärme über demselben.

— 30°	Reaumur	sind	gleich	— 35°,50	Fahrenheit.
— 29°	—	—	—	— 33°,25	—
— 28°	—	—	—	— 31°,00	—
— 27°	—	—	—	— 28°,75	—
— 26°	—	—	—	— 26°,50	—
— 25°	—	—	—	— 24°,25	—
— 24°	—	—	—	— 22°,00	—

Digitized by Google

— 23°	Reaumur	sind	gleich	— 19°,75	Fahrenheit.
— 22°	—	—	—	— 17°,50	—
— 21°	—	—	—	— 15°,25	—
— 20°	—	—	—	— 13°,00	—
— 19°	—	—	—	— 10°,75	—
— 18°	—	—	—	— 8°,50	—
— 17°	—	—	—	— 6°,25	—
— 16°	—	—	—	— 4°,00	—
— 15°	—	—	—	— 1°,75	—
— 14°	—	—	—	+ 0°,50	—
— 13°	—	—	—	+ 2°,75	—
— 12°	—	—	—	+ 5°,00	—
— 11°	—	—	—	+ 7°,25	—
— 10°	—	—	—	+ 9°,50	—
— 9°	—	—	—	+ 11°,75	—
— 8°	—	—	—	+ 14°,00	—
— 7°	—	—	—	+ 16°,25	—
— 6°	—	—	—	+ 18°,50	—
— 5°	—	—	—	+ 20°,75	—
— 4°	—	—	—	+ 23°,00	—
— 3°	—	—	—	+ 25°,25	—
— 2°	—	—	—	+ 27°,50	—
— 1°	—	—	—	+ 29°,75	—
— 0°	—	—	—	+ 32°,00	—
+ 1°	—	—	—	+ 34°,25	—
+ 2°	—	—	—	+ 36°,50	—
+ 3°	—	—	—	+ 38°,75	—
+ 4°	—	—	—	+ 41°,00	—
+ 5°	—	—	—	+ 43°,25	—
+ 6°	—	—	—	+ 45°,50	—
+ 7°	—	—	—	+ 47°,75	—
+ 8°	—	—	—	+ 50°,00	—
+ 9°	—	—	—	+ 52°,25	—
+ 10°	—	—	—	+ 54°,50	—
+ 11°	—	—	—	+ 56°,75	—
+ 12°	—	—	—	+ 59°,00	—
+ 13°	—	—	—	+ 61°,25	—
+ 14°	—	—	—	+ 63°,50	—
+ 15°	—	—	—	+ 65°,75	—
+ 16°	—	—	—	+ 68°,00	—

Digitized by Google

+ 17°	Reaumur	sind	gleich.	+ 70°,25	Fahrenheit.		
+ 18°	—	—	—	+ 72°,50	—		
+ 19°	—	—	—	+ 74°,75	—		
+ 20°	—	—	—	+ 77°,00	—		
+ 21°	—	—	—	+ 79°,25	—		
+ 22°	—	—	—	+ 81°,50	—		
+ 23°	—	—	—	+ 83°,75	—		
+ 24°	—	—	—	+ 86°,00	—		
+ 25°	—	—	—	+ 88°,25	—		
+ 26°	—	—	—	+ 90°,50	—		
+ 27°	—	—	—	+ 92°,75	—		
+ 28°	—	—	—	+ 95°,00	—		
+ 29°	—	—	—	+ 97°,25	—		
+ 30°	—	—	—	+ 99°,50	—		

Es fällt bei dem Anblick der vorstehenden Tabelle leicht in die Augen, daß je 2¼ Grade des Fahrenheitschen Thermometers einen Grad des Reaumurschen, oder daß 9 Grade des ersteren 4 des letzteren ausmachen, daß aber zugleich der künstliche Frost- oder Nullpunkt der Fahrenheitschen Skala etwas über 14° unter den Gefrierpunkt des Wassers oder den Nullpunkt des Reaumurschen Thermometers gesetzt ist, so daß man bei 0° R. schon 32° F. zählt. Will man deshalb Reaumursche + oder Wärmegrade in Fahrenheitsche übertragen und z. B. finden wie viel 36° R. nach F. sind, dann braucht man nur zu 2¼mal 36 oder 81 die 32 zu addiren und man erhält 113 F.; oder wenn man in den Angaben eines Reisenden liest, daß die Sonnenhitze in irgend einem heißen Lande auf 122° F. gestiegen sey, zieht man von 122 die 32 ab, dividirt mit 2¼ in 90 und findet so, daß 122° F. gleich sind 40° R. Bei den Kältegraden der Reaumurschen Skala hat ein umgekehrtes Verfahren statt, hier muß man, wenn sie unter 14° sind, von der durch Multipliziren mit 2¼ gefundenen Summe die 32, oder wenn sie über 14 (von — 14 bis 0 R. stehen), die so erhaltene Summe von den 32 abziehen, wenn man R. in F. übersetzen will, oder man muß die 32 statt zu subtrahiren, addiren, und in die so erhaltene Summe mit 2¼ dividiren, wenn man F. in R. verwandeln will.

Wenn deshalb berichtet würde, die Kälte eines künstlichen Gemisches sey — 121° F. gewesen, dann finde ich durch Hinzufügen von 32 zuerst 153, durch Theilung dieser Zahl mit 2¼ aber 68°; d. h. — 121° F. sind — 68° R.

Wir sprechen nun auch noch einige Worte von den chemischen Bestandtheilen der Pflanzen, so wie von ihrer Gestaltung und von der Beschaffenheit ihrer einzelnen Organe.

Digitized by Google

Was die chemischen Bestandtheile der Pflanzen und der organischen Körper überhaupt (also auch der Thiere) betrifft, so sind diese nicht, wie bei den Mineralkörpern vorwaltend von fester, metallischer oder erdiger Beschaffenheit, sondern großentheils jene zur Luftform geneigten, die wir oben §. 11 A. als Wasserstoff=Sauerstoffgas und als Grundlage der luftförmigen Kohlensäure (Kohlenstoff) kennen lernten. Dazu kommt noch jene Luftart, die mehr denn drei Viertheile der atmosphärischen Luft ausmacht, davon nur nahe ein Viertheil Sauerstoffgas ist, und welche Stickgas heißt, weil die Thiere in ihr ersticken, die Kerzen verlöschen. Dieses 4te Element wird besonders in den thierischen Körpern, übrigens auch namentlich in jenen Theilen der Pflanzen gefunden, die, z. B. als Mehl zu unsrer Nahrung dienen. Aus den eben genannten 4 Hauptelementen, in Verbindung mit einigen, verhältnißmäßig wenigen zu den Erdarten, Laugensalzen und ähnlichen festen Stoffen gehörigen Bestandtheilen bildet die schöpferische Kraft des Lebens, das von der Seele ausgeht, alle die unzähligen Mischungen der Säfte, des Holzes, der genießbaren oder ungenießbaren Früchte; alle Pracht und Formen der Blüthen und Blätter.

Die Pflanzen sind mit einem Theile ihres Körpers, den man Wurzel nennt, in oder an den Erdboden, oder an Felsen und Mauern, oder auch an andern Pflanzen fest geklammert und gewachsen. Die Wurzel ist zwar im Allgemeinen in einem vorherrschenden Maaße, nicht aber ganz allein zum Einsaugen von Wasser und von Nahrung aus der Erde bestimmt, sondern fast alle andere Theile der Pflanzen, besonders die Rinde und Blätter, saugen auch Nahrung aus der Luft und aus dem Wasser an sich, eben so gut wie die Wurzel, und es giebt Pflanzen in heißen Ländern und auch bei uns, die mit ihrer Wurzel auf so ganz trockene und dürre Steine festgewachsen sind, daß sie alles Wasser, das sie zur Nahrung gebrauchen, nur durch Stamm und Blätter aus der Luft an sich ziehen können, und daß ihnen die Wurzel wirklich nur zur Befestigung

Digitized by Google

dient. Auch steigen die Säfte bei den Bäumen eben so gut aus dem Stamm hinunter in die Wurzel, als umgekehrt aus der Wurzel herauf, und die Wurzel nimmt nicht blos und saugt ein, sondern stößt auch die verbrauchten Theile aus. Namentlich werden alljährlich, eben so wie die Blätter, auch die kleineren Wurzelzasern, durch welche das Einsaugen der Säfte geschahe, abgestoßen und in der Erde abgelegt, und neue treiben statt ihrer hervor.

Inwendig in der Pflanze giebt es solche Theile, die man mit den Adern in einem Thiere vergleichen kann, weil auch in ihnen besondere Lebenssäfte sind, und auf- und niedersteigen, wie das Blut in den Adern des Thieres. Freilich sind aber solche Adern in der Pflanze ganz anders beschaffen, als im Thiere. Einige sind wie Bienenzellen, und sitzen immer eins an und über dem andern. Eine andere Art sind wie kleine, oben und unten verschlossene Schläuche, und ob sie gleich verschlossen sind, dringt doch der Saft aus dem einen in den andern ein, wie in Löschpapier. Noch eine andere Art ist so gewunden wie eine Uhrfeder und man nennt diese Spiralgefäße. Bei den meisten Pflanzen, die hier bei uns wachsen, laufen fast alle diese Zellenschläuche und Gefäße, wodurch das Gewächs ernährt wird, unter der äußersten Rinde, in dem sogenannten Bast, in die Höhe. Wenn man daher bei einem Baume, der doch seine meiste Nahrung aus der Erde an sich saugt, den Bast rings umher vom Holze abschält, so muß er oben dürr werden und sterben, weil ihm jetzt die Kanäle genommen sind, durch welche die Nahrungssäfte seinen Aesten und Blättern zuströmten. An einem Baume findet man übrigens ganz nach außen die eigentliche Rinde oder grüne Oberhaut, diese kann man wegschälen, ohne daß der Baum stirbt, dann kommt der Bast, der im gemeinen Leben auch noch zur Rinde gerechnet wird, dann folgt der Splint oder das junge Holz, dessen ringförmige Lage jedes Jahr zum eigentlichen Holz erhärtet, (daher die Jahresringe). Das Holz ist zum großen Theil nichts recht Lebendiges mehr, und dient den übrigen Theilen

Digitized by Google

des Gewächses dem Anschein nach nur zum festen Boden und zur Stütze, obgleich zu vermuthen ist, daß bei den meisten Bäumen ehe ein reifes Holz zur Gestaltung kam, eben so wenig eine vollkommene Entwickelung der Frucht möglich sein mochte, als ohne das Knochenskelet im höheren Thierreich ein vollkommen empfindendes Nervensystem und übrigens auch im Holze noch eine Art von innerem Umlauf der Säfte statt findet. Ganz inwendig nach der Mitte hin findet sich bei jungen Bäumen und Zweiglein das Mark.

Bei den Gräsern und Zwiebelgewächsen (Lilien, Narcissen), so wie bei der Palme (wie im Ganzen bei allen Monocotyledonen, davon wir nachher reden werden), stehen aber die Gefäße nicht so wie der Bast an den Bäumen ringförmig herum, sondern in zerstreuten Bündeln.

Die Blätter, so wie die grüne äußere Oberhaut der Pflanzen, haben viele kleine Oeffnungen, durch die sie Feuchtigkeiten und Luftarten in sich ziehen, aber auch Luftarten und Feuchtigkeiten von sich geben. Man hat daher auch gesagt, daß die Pflanze mit ihren Blättern Athem holt, wie das Thier mit der Lunge. Die Luftart, welche die Pflanzen, wenn die Sonne auf sie scheint, aus ihren Blättern von sich geben, so lange diese grün sind, ist eben die Lebensluft oder das Sauerstoffgas, davon oben §. 11 A. (S. 34) die Rede war. Daher ist es einem im Sommer, wenn die Sonne scheint, in grünen Laubwäldern so gar wohl behaglich, und dieß nicht blos um des kühlen Schattens willen, sondern auch der gesunden Luft wegen. Deshalb sind auch, weil die Pflanzen so viele Feuchtigkeit aus der Luft an sich ziehen und wieder aushauchen, die Gegenden, wo viel Wald steht, immer feucht, und manche Insel, z. B. Barbados, die sonst ziemlich wasserreich, hat jetzt fast gar keinen Regen, und keine Quellen mehr, weil die dortigen Europäer (die nun zur Strafe dafür ihr Wasser viele Meilen weit von andern Inseln herholen müssen) alle Wälder, die auf den Bergen stunden, abgehauen haben.

Digitized by Google

Manche Blätter, besonders solche, wo an einem langen Stiel immer 2 kleine Blättlein einander gegenüberstehen, wie an den Akazienbäumen, legen sich Abends, wenn es dunkel wird, mit den Flächen der kleinen Blättlein an einander, einige bewegen sich auch, (ziehen sich zurück) wenn man sie angreift.

An der Pflanze ist freilich das, was man gewöhnlich am meisten daran schätzt und sucht, das, um dessen willen man die meisten Gewächse hegt und anbaut: die Frucht. Da ist nun zu bemerken, daß oftmals die Gewächse gar keine Früchte tragen wollen, sondern nur in lauter Blätter und Zweige wuchern, wenn sie in gar zu fettem, nahrhaften Boden stehen und es ihnen gar zu gut geht. Das weiß der Gärtner auch, darum schält er dann ein wenig von der auswendigen Rinde und selbst etwas vom Baste weg (aber ja nicht den ganzen rings herum) oder unterbindet ein Zweiglein ziemlich fest mit Drathe, daß nicht so gar viele Nahrungssäfte hinaufsteigen, dann werden viele von den Knospen, die sonst nichts als Blätter getragen hätten, in gute Fruchtknospen umgewandelt. Geht es doch selbst mit dem Menschen oftmals so, daß er, wenn es ihm äußerlich gar zu wohl und zu reichlich hergeht, versäumt, solche gute Früchte anzusetzen, als der liebe Gott von ihm verlangt. Und der Gärtner muß dann auch durch manche äußere Noth und Schmerzen zu Hülfe kommen, damit aus den wilden Blattknospen gute Früchte werden.

Der Früchte sind mancherlei: Obstartige, Steinfrüchte, Kürbisartige, auch Kapseln (wie beim Mohn), Hülsen, wie bei den Bohnen und Erbsen, Schoten, wie beim Kohl und Rübensaamen. In den Früchten drinnen liegt der Saamen oder das Körnchen. Das muß erst in der Erde aufgelöst werden, und gewissermassen verfaulen, ehe es mit den bei den meisten Pflanzen vorhandenen kleinen Flügelchen oder Saamenblättlein aufgehen kann.

Ehe aber die Frucht oder der Saame wächst, ist bei sehr vielen Gewächsen vorerst eine Blüthe da. Diese besteht z. B. bei den Rosen, erstlich außen herum aus

Digitized by Google

dem grünen Kelch, den man an den Birnen und Aepfeln, besonders aber an den Mispeln, oben selbst an der Mitte der Frucht (obwohl meist verwelkt) noch daran sitzen sieht; dann kommen die Blumenblätter, oder die Blumenkrone, deren meist zierlich geformte Blätter bei der Rose roth, bei der Kirschblüthe weißfarbig sind. Inwendig in der Blumenkrone und meist zunächst an diese gränzend, findet man, obwohl nur bei manchen Pflanzen die Theile der sogenannten Zwischenkrone, welche man Honiggefäße oder Nectarien genannt hat, obgleich der Blumenhonig, den die Bienen aus den Blüthen saugen, nur sehr selten in ihnen vorkommt, sondern gewöhnlich nur aus kleinen, höckrigen Stellen und Oeffnungen ausgesondert wird, die sich inwendig im Kelche, so wie auf dem innersten Grunde der Blumenkrone finden. Aber aus diesem innren Grunde erheben sich auch noch andre, augenfälligere Theile, welche für die Erzeugung des Saamens der Pflanze die wichtigsten sind. Wenn man nämlich, etwa in eine Tulipane hineinblickt, dann sieht man in ihrem Innren, zunächst nach den Blumenblättern hin 6 säulenförmige Körper stehen, an deren oberen Enden 6 eirunde, kleinen Schwämmchen gleichende Theilchen aufgewachsen sind, welche einen abfärbenden Stoff enthalten. Dieses sind die Staubfäden und Staubbeutel (**Antherae**) und der färbende Stoff, der in den letzteren enthalten ist, heißt Blüthenstaub (**Pollen**). In der Mitte der 6 Staubfäden, im innersten Grunde der Blüthenkrone steht ein ansehnlich stärkerer, säulenförmiger Körper, der sich ähnlich einem Quirl, nach oben in drei, von einer Furche durchzogene Fortsätze theilt. Dies ist das Pistill (**Pistillum**) oder der Staubweg (Griffel), womit das Behältniß der Saamen, oder die Frucht, unmittelbar im Zusammenhang steht. Die Erzeugung der Saamen in der Pflanze geschieht auf ganz ähnliche Weise als das Erzeugen und Aufwachsen eines Getreidehalmes oder andren Gewächses aus dem in den feuchten Boden gelegten und hier aufkeimenden Saamenkorn. Die Körnchen des Blüthenstaubes fallen auf das obere Ende des Pistilles oder des Grif-

Digitized by Google

fels und es entwickelt sich aus dem flüssigen Gehalt des Blüthenstäubchens eine Verlängerung, die von einem zarten Häutchen umschlossen, einer Wurzel gleicht, in dieser Gestalt sich nach unten, in den Boden der Saamenbehältnisse verlängert, und hier mit dem noch flüssigen Stoffe der künftigen Saamen verwächst und sich verkörpert. Im innersten Theile des Saamenbehältnisses, an dessen Mittelsäule oder fächerartigen Wänden (wie in der Pfingstrose und in der Mohnkapsel) die Saamen angewachsen sind, hat man mit dem Eierstock einer Henne verglichen und deshalb **Ovarium** genannt. Ueberhaupt hat man nach einem spielenden und nicht ganz passenden Vergleich die Staubgefäße als die Männlein (Antheren), die Griffel oder die Pistille als die Weiblein der kleinen Blumenwelt betrachtet, und behält diesen Vergleich öfters noch jetzt, wenigstens in der griechischen und lateinischen Namensbezeichnung jener Theile bei. Da die Organe, welche zur Bildung der Frucht dienen, die wesentlichsten, wichtigsten Theile der Blüthen sind und am leichtesten ins Auge fallen, hat ein großer schwedischer Naturforscher des vorigen Jahrhunderts, Karl v. Linné (geb. 1708, gest. 1778) auf das Verhältniß der Zahl und der Zusammenstellung der Antheren und nächst diesen der Griffel eine systematische Anordnung der Pflanzen begründet, welche noch jetzt als die leichtfaßlichste erscheint. Nach dieser Anordnung theilt man die verschiedenen Formen des Gewächsreiches in 24 Klassen. Bei den ersten zehn Klassen pflegt man ganz einfach nur die Staubfäden zu zählen, welche in ihren Blumen stehen und sämmtlich sich gleich oder auch abwechselnd ungleich sind. So enthält denn z. B. die erste Klasse solche mit einem Staubfaden oder, nach dem veralteten Kunstausdruck einmännige (**Monandria**), die 2te zwei-, die dritte drei- und so fort die 9te neun-, die 10te zehn-männige, in der 11ten Klasse stehen aber solche welche 12 bis 20, in der 12ten solche, welche 20 und meist darüber Staubfäden enthalten die auf dem Kelche der Blume aufsitzen, während die vielen Staubfäden bei den Gewächsen der 13ten Klasse mehr nach innen auf

dem Blüthenboden stehen. In der 14ten Klasse giebt es 2 längere und 2 kürzere, in der 15ten 4 längere und 2 kürzere Staubfäden; in den Blumen der 16ten, 17ten und 18ten Klasse sind die Staubfäden unten in 1, 2, und in mehrere Bündel verwachsen; in der 19ten sind die Staubbeutel unter einander, in der 20sten sind sie mit der Frucht verwachsen; an den Blüthen der 21sten und 22sten Klasse findet man die Antheren und Pistille nicht mehr in einer und derselben Blüthe vereint, sondern entweder, wie am Haselnußstrauch und am türkischen Weizen oder beim Kürbis, in verschiedenen Blüthen, die jedoch auf gemeinsamem Stamme stehen, oder selbst in solchen Blüthen, die an 2 ganz gesonderten Stämmen wachsen, wie beim Hanf, Hopfen, Wachholderstrauch. Bei den Gewächsen der 23sten Klasse giebt es theils solche Blumen, darinnen Antheren und Pistille vereint, theils solche, da sie getrennt sind. Endlich, so haben die Gewächse der 24sten Klasse gar keine sichtbaren Blüthen und heißen deshalb verborgen tragende (**Cryptogamia**).

Während man so nach der Zahl und Zusammenordnung der Staubfäden im Allgemeinen die Klassen bestimmt, theilt man dieselben wieder nach der Zahl der Pistille in Unterordnungen ab, und nennt z. B. nach dem Kunstausdruck solche Blumen, darinnen 1, 2, 3 u. s. w. Griffel stehen, ein-, zwei- oder dreiweibige (**Monogynia**, **Digynia**, **Trigynia**) u. s. w.

Allerdings ist bei dieser zwar leichtfaßlichen, dennoch aber künstlichen Eintheilung nicht immer auf die natürlichen Ordnungen der Pflanzen Rücksicht genommen. Dergleichen Ordnungen bilden z. B. die Monocotyledonen oder die einfach saamenblättrigen Gewächse, bei denen, wie z. B. an den Lilien und Gräsern nur ein, (meist zusammengerolltes) Blättchen aus dem Saamen oder der Zwiebel aufgeht, so wie die Dicotyledonen oder paarig saamenblättrigen, bei denen, wie an den Bohnen, am Hanf, an der Petersile und an der größeren Zahl unserer Bäume, Sträucher und Kräuter 2 einander gegenüberstehende Blätter aus dem Saamen aufgehen, in deren Mitte

Digitized by Google

das Stämmchen sich entwickelt. Auch die Anwesenheit oder der Mangel der Spiralgefäße begründet solche natürliche Ordnungen, denn die Farnkräuter haben noch Spiralgefäße, die Mooſe, Flechten, Schwämme u. ſ. w. haben bloß Zellen, und dennoch stehen sie alle in der 24sten Klasse der Blüthenlosen beisammen. Obgleich aber in dieser Weise das künstliche System nicht zunächst auf die sogenannt natürlichen Ordnungen Rücksicht zu nehmen scheint und deshalb manche Gewächse, die z. B. allesammt Gräser sind, nach der Zahl und Anordnung der Staubfäden in die 2te, 3te 6te, 21ste Klasse aufnimmt, läßt es dabei dennoch auch häufig eine sehr deutliche, natürliche Gruppirung in Familien zu, wie wir dieß namentlich bei der 14ten, 15ten, 17ten und 19ten Klasse und häufig auch in den andern Klassen bemerken werden. Ueber den Charakter dieser Familien, so wie über die verschiedenen Formen aller einzelnen Theile der Pflanzen sprechen wir bei den verschiedenen Gattungen und Arten derselben ausführlicher.

Bei den Gräsern, z. B. beim Korn oder Roggen, nennt man die äußern Blättlein, die statt des Kelches bei andern Blumen die innern Blatthüllen der Blumen (die Blumenblätter) umgeben, Spelzen. Wenn sich die 2 Kelchspelzen beim Blühen des Korns auseinander thun, so sieht man, daß zwischen ihnen 2 Blüthchen sitzen, davon jede wieder mit 2 zärteren und lichter gefärbten Blüthenblättlein (Blüthenspelzen) versehen ist, in deren Innern die 3 Staubfäden, sammt den beiden schön federartigen Pistillen, und zu unterst der Fruchtknoten (das Korn) enthalten ist.

§. 17. In den Blumen, die in die erste Linnéische Klasse (Monandria) gehören, findet man nur ein Staubgefäß. Nur sehr wenige Pflanzen, die in unserm Vaterlande wachsen, gehören in diese Klasse, nämlich

A. von solchen, die nur einen Staubweg oder Griffel haben (Monogynia):

1) Der Tannenwedel (**Hippuris vulgaris**), sieht wegen seines gegliederten hohlen Stengels, um welchen die Blättlein quirlförmig herumsitzen, fast wie ein Schachtelhalm oder Zinnkraut aus (davon unten)

Digitized by Google

und hat keine eigentliche Blume, sondern der Staubfaden kommt in den Blattachseln aus einem niedrigen, zweilappigen Schüppchen hervor. Er wächst hie und da im stehenden Wasser.

B. Mit 2 Griffeln oder Pistillen (**Digynia**):

2) Der Erdbeerspinat (**Blitum capitatum**), hat fast Blätter wie der Spinat, wächst gegen $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und trägt rothe Früchte wie die Erdbeeren, die auch etwas süßlich schmecken. Seine grünlichen Blümchen stehen ährenförmig am Ende der Zweige beisammen, während sie bei einer andren, sonst sehr ähnlichen Art, (bei dem ruthenförmigen Erdbeerspinat, **Bl. virgatum**) zerstreut am Stengel aus den Blattwinkeln hervorwachsen. Man zieht den Erdbeerspinat hie und da in Gärten.

3) Das Wassersternchen (**Callitriche verna**), dieses ist das kleine grüne Pflänzchen, was eben so wie die Teichlinse, von der es aber ganz verschieden ist, auf dem Wasser wächst und welches an einem fadenartigen Stengelchen wenige eirunde, sternförmig genäherte Blättchen trägt. Bei einer andren im Herbst blühenden Art: der **Call. autumnalis**, sind die schmalen Blättchen an ihrer Spitze zweitheilig.

4) Der Glasschmalz (**Salicornia**), hat freilich manchmal auch 2, meistens aber doch nur 1 Staubfaden. Der Stengel ist sehr verästelt und gegliedert, die kleinen gelben Blüthlein stehen in Aehrchen beisammen. Die ganze Pflanze sieht röthlich aus, und schmeckt salzig. Denn sie wächst nur da, wo es Salz giebt: am Meere und in der Nähe von Salzquellen, die sich öfters dadurch verrathen. Das Laugensalz, das man aus der Asche dieser Pflanze zieht, (Soda und Natron genannt) nimmt man zur Bereitung des Glases, so wie der Seife.

Es gehören aber auch noch in diese Klasse das schöne indische Blumenrohr, (**Canna indica**), das man in den Gärten vornehmer Leute mit seinen schönen rothen Blüthen sehen kann, und das ebenfalls ostindische Gewächs, dessen Wurzel unser Ingwer ist (**Amomum Zingiber.**)

Digitized by Google

Wir nehmen den Ingwer gepulvert an die Speisen; reiche Leute, die oftmals zu wenig Bewegung und etwas zu viel zu essen haben, genießen aber auch die gewürzhaften Wurzeln von solchen Gewächsen, mit Zucker eingemacht, um das Essen zu verdauen und sich den guten Appetit zu erhalten. Unser einer braucht aber dazu solche Wurzeln nicht, denn der hat immer so viel Hunger als er braucht, und mancher wohl fast mehr, als er brauchen kann.

Auch unser Cardamom, den man in den Gewürzläden und Apotheken verkauft, kommt von einer ostindischen Art der Ingwerpflanze, dem **Amomum Cardamomum**, deren Saamenkapsel (Frucht) er ist. Eben so kommt auch die Kurkumewurzel, die man zum Gelbfärben braucht, von einem ostindischen Gewächs (**Curcuma longa**) das der Ingwerpflanze ähnlich ist, und daher gelber Ingwer heißt. Alle diese Amomumarten können nur in einem Lande im Freien ausdauern und gedeihen, wo die mittlere Temperatur des Jahres etwa 20° bis 22° Reaumur oder 77 bis 82 Fahrenheit ist.

§. 18. In der 2ten Klasse (**Diandria**) stehen solche Kräuter, und auch ziemlich viele Sträucher und Bäume, welche zwei Staubfäden in ihren Blumen haben. Man theilt sie nach der Zahl ihrer Griffel in mehrere Unterordnungen:

A. Solche, welche ein Pistill haben (**Monogynia**), wohin die nachstehenden Pflanzengattungen gehören:

1) Die Teichlinse, das Entengrün (**Lemna**), hat nur ein unvollkommnes, einblättriges Blümchen, welches zuweilen, sowie die Gewächse der 21sten Klasse, bloß Staubfäden, oder bloß ein Pistill, ohne Staubfäden enthält. Die Blättchen wachsen eines aus dem andern hervor und hängen dann anfangs bei der großen Teichlinse (**L. trisulca**) so zusammen, daß sie die Gestalt eines kleinen Epheublättleins bilden. Die gemeinste Art, welche auf den meisten Gräben und Teichen wächst, ist die kleine Teichlinse (**L. minor**). Die Teichlinsen sind ein angenehmes Futter für die Enten. Vor Zeiten hat man das äußerliche Auflegen der Teichlinsen auch als Linderungsmittel gegen die Schmerzen des Podagras empfohlen.

2) Der Ehrenpreis (**Veronica**), der an manchen Orten auch Gänseblümchen genannt wird. Ein schönes, meistens lichteblaues Blümchen, aus dessen vierlappi-

Digitized by Google

ger Blumenkrone man die beiden Staubfäden mit dem Pistill in der Mitte herausragen sieht. Er wächst, besonders im Frühling, auf allen Ackerrändern, Wiesen und Feldern.

Es giebt viele Arten davon. Die eine mit haarigem Stengel und stark sägenartig gezähnten Blättern (V. officinalis) wird in den Apotheken gebraucht, hat aber nicht viele Kräfte; eine andere, die man hie und da als Salat oder Gemüse im Frühling verspeist, wächst im Wasser und heißt Bachbunge (V. Beccabunga).

3) Der sogenannte türkische Hollunder oder Flieder (Syringa vulgaris), den man aber nicht mit dem Hollunder verwechseln muß, aus dem man Thee macht, (davon weiter unten) hat meist blaue, oder auch weiße, in Traubenbüscheln beisammenstehende Blümchen, die wie kleine Trichter aussehen, aber 4lappig sind und sehr gut riechen. Er blüht im Frühling ziemlich um die Zeit wenn die Aepfelbäume blühen.

4) Der Liguſterſtrauch (Ligustrum vulgare), auch Beinholz und Dintenbeere genannt, trägt kleine weiße Blüthchen, welche denen des türkischen Flieders an Gestalt ähnlich sind, fast mitten im Sommer blühen und etwas gar zu süßlich riechen. Die schwarzen Beeren stehen im Herbste in Trauben, oben an den Enden der Zweige.

Zu den beiden zuletzt beschriebenen Pflanzengattungen könnte auch, der natürlichen Verwandtschaft und Zahl der Staubfäden nach, die Edeleſche (Fraxinus excelsior) hingeordnet werden. Da wir jedoch bei der Beschreibung des Pflanzenreiches das Linnéische System zu Grunde legen, werden wir der Edeleſche erſt unter den Pflanzen der 23sten Klasse (mit vermengten Geschlechtern) erwähnen.

5) Der Oelbaum (Olea europaea), kann nur in solchen Ländern gedeihen und seine Früchte zeitigen, deren jährliche mittlere Temparatur nahe an oder über 12° Reaumur ist, mithin nicht in Deutschland, dessen mittlere Temparatur nur 7° bis 8° beträgt. Für jene wärmeren Länder ist aber der Oelbaum eines der nützlichsten und wichtigsten Gewächse, dessen schmale, fast weidenartige Blätter und kleine Blüthlein freilich kein

Digitized by Google

sehr schönes Ansehen haben, das jedoch durch seine guten Eigenschaften ersetzt, was ihm an Schönheit abgeht. Man preßt aus den Früchten, welche kleinen Pflaumen an Gestalt gleichen, und bei ihrer Reife (gegen den Herbst hin) sich schwarz färben, das gute Baumöl, das in den Ländern, wo der Oelbaum wächst, fast überall statt Schmalz und Butter an die Speisen gebraucht wird; die Früchte kann man aber auch, mit Salz und Pfeffer eingemacht, essen. Das Holz, wenn es verarbeitet ist, gilt als eine der schönsten Holzarten, sieht aus wie marmorirt, und wie mit Landschaften bemalt.

Als im Winter 1709 so viele Oelbäume in Frankreich erfroren waren, kam so viel solches Holz zu uns, daß man noch jetzt in manchen adelichen wie bürgerlichen Häusern unsres deutschen Vaterlandes kunstreich, wenn auch altmodisch gearbeitete Meublen und Tischgeräthe von Oelbaumholz findet, die aus jener Zeit sind. Solche Verheerungen des Winterfrostes sind für jene Gegenden des südlichen Frankreichs, deren Hauptreichthum der Oelbaum ist, ein eben so großes Unglück als für unsre armen Gebirgsländer die sogenannte Kartoffelseuche.

6) Auch der eigentliche und ächte Jasmin (**Jasminum**), den man nicht mit dem sogenannten wilden Jasmin (**Philadelphus**) verwechseln muß, wächst bei uns nicht im Freien, sondern muß einen größern Theil des Jahres hindurch in warmen Zimmern oder Treibhäusern gehalten werden. Die wohlriechende Blumenkrone hat oben 5 Abschnitte und unten eine lange Röhre. Der mit weißen Blüthen heißt der officinelle Jasmin (**J. officinale**), der mit gelben Blüthen heißt der staudige (**J. fruticosum**).

7) Das Gallenkraut, Gnadenkraut (**Gratiola officinalis**), hat eine fast rachenförmige, viertheilige Blume mit zurückgebogener Oberlippe. Die Blume ist dunkelroth gestreift, die Blätter sind punktirt. Diese Pflanze schmeckt sehr bitter und ist ein starkes Purgirmittel. Das Vieh berührt sie nicht leicht. Das Heu der Wiesen, auf denen sie häufig ist, bekommt den Pferden nicht gut, denn diese magern dabei sehr ab. Man brauchte sonst das Gnadenkraut gegen Wassersucht und hartnäckige Wechselfieber.

Digitized by Google

8) Das Fettkraut (**Pinguicula**), deſſen gelblich grüne, dicke, ſchleimig fettige Blätter roſenartig auf dem Boden liegen, wächſt in Gebirgsgegenden, auf ſumpfigmooſigen Wieſen. An jedem Blumenſtiele ſteht ein einzelnes Blümchen, das faſt eine löwenmaulartige Geſtalt hat (zweilippig iſt), und an welchem ſich ein langer Sporn zeigt. Der kleine Kelch iſt fünfſpaltig.

Die häufiger vorkommende veilchenblaue Art, mit geraden Spornen heißt gemeines Fettkraut (P. vulgaris); die gelb und weiß blüthige mit gekrümmten Spornen, welche nur in der Nähe der Hochgebirge wächſt, heißt Alpenfettkraut (P. albina). Wenn man auf die friſchen Blätter Milch, ſo wie ſie noch warm von der Kuh kommt, ſchüttet, gerinnt dieſe ſo zu einer gleichartigen Geſammtmaſſe, daß weder Rahm noch Molken ſich ſondern.

9) Das Waſſerſchlauchblümchen (**Utricularia vulgaris**), hat eine faſt löwenmaulartig geſtaltete, nach hinten geſpornte, kleine gelbe Blüthe, und ſchwimmt, mittelſt kleiner Bläschen, die an der Wurzel ſitzen, auf ſtehenden Waſſern. Nach dem Verblühen zerplatzen jene Bläschen, und das Gewächs ſinkt zu Boden.

10) Der Salbey (**Salvia**), wovon die eine Art (**S. pratensis**) mit ihren ſchönen, meiſt violblauen Blumen bei uns auf den Wieſen, eine andere (**S. officinalis**) in Gärten vorkommt, und

11) der Rosmarin (**Rosmarinus**), der ſchon in den Seeküſtengegenden von Piemont und Südfrankreich und an den dortigen Seealpen wild wächſt, ſtellt man auch hieher. Denn obgleich ſie beide gerade eine ſolche rachen- oder löwenmaulartige Blume haben, wie die Blumen, die in die 14te Klaſſe gehören, ſo ſind doch nicht zwei längere und zwei kürzere Staubfäden in ihnen, ſondern überhaupt nur zwei in allem. Sie ſind beide ein paar ſehr gewürzreiche Pflanzen.

12) Rachenförmige kleine, innen rothgeſtrichelte Blüthlein, welche in dichten Quirlen um den 4eckigen Stengel ſtehen, hat auch der am Waſſer wachſende Sumpfandorn oder Wolfsfuß (**Lycopus europaeus**), der mit Eiſenvitriol eine ſchöne, dauerhafte ſchwarze Farbe giebt.

13) Das Eiſenkraut (**Verbena officinalis**),

Digitized by Google

mit krummen, trichterförmigen Blüthchen, die in kleinen Aehrchen beisammenstehen, wird auch hieher gerechnet, obgleich es gewöhnlich 4 Staubfädlein hat.

14) Das Hexenkraut (Circaea lutetiana), das an schattigen Orten wächst, hat an seinen weißlichen Blüthen 2 Blüthenblättlein und 2 Kelchblättlein.

B. Mit 2 Staubwegen (Digynia).

15) Ein Gras, das Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), gehört daher, was auf allen unsern Wiesen und auch in den Wäldern vorkommt, und im Frühling mit nur 2 Staubfäden blüht, während alle unsere andern (vielen) Gräser 3 haben. Dies ist das Gras, welches vorzugsweise unsrem Heu seinen angenehmen Geruch giebt, und man kann wirklich das Ruchgras, wenn es blüht, und auch vor und nachher, durch den bloßen Geruch vor andern Grasarten erkennen.

C. Mit 3 Pistillen (Trigynia).

16) Der Pfeffer (Piper), der in dieser Abtheilung der Blumen mit 2 Staubfäden und 3 Pistillen steht, wächst freilich, wie schon das alte Sprüchwort sagt, gar ferne von uns, ist aber den Reichen wie den Armen ein so nützliches und fast täglich zu gebrauchendes Gewürz, daß wir seiner doch erwähnen wollen, obgleich er so weit hergeholt werden muß. Ist es doch gar so gut und weise eingerichtet, daß der Mensch so vieles, was er nöthig braucht, oder auch nicht nöthig braucht, und nur gerne haben möchte, nicht um sich hat, sondern aus fernen Ländern holen muß. Denn dadurch hat ein Volk das andere kennen gelernt, und die Europäer haben den andern armen unwissenden Völkern zwar viel Böses, aber zuletzt auch das liebe Bibelbuch und das Christenthum mitgebracht.

Der Pfefferstrauch schlingt sich wie Hopfen, hat seine Blüthchen und Früchtchen in einer Art von Aehre und Träublein beisammen, und seine Früchte sind Beeren. Er wächst in Ostindien, in Ländern, wohin die Seereise vormals, ehe man Dampfschiffe hatte, ein halbes Jahr und darüber dauerte, und die ersten Europäer, die ihn dort sahen, freuten sich gar sehr, daß sie doch nun auch einmal den Pfeffer hatten wach-

Digitized by Google

sen sehen. Er verlangt ein sehr heißes Land zu seinem Gedeihen.

Die weißen so wie die schwarzen Pfefferkörner, sind beides die Beeren von einer und derselben Art von Pfeffer. Der schwarze Pfeffer ist die noch unreife, und darum auch so runzlich aussehende und scharfschmeckende Beere; der weiße ist die ganz reife, die man so lange in Wasser und Essig weicht, bis die Haut mürbe wird, welche man dann herunterreibt, und nun die Beeren trocknet. Einige weiße Pfefferkörner, die man früh nüchtern ganz verschluckt, sind oftmals ein gutes Hausmittel gegen mancherlei Magenbeschwerden, selbst gegen den angehenden Magenkrampf. Der weiße Pfeffer hat, eben weil er reif ist, bei weitem nicht die Schärfe, die der unreife schwarze hat.

§. 19. Die dritte Pflanzenklasse, deren Blümchen 3 Staubfäden haben (**Triandria**), ist wohl für uns meiste Deutsche, ja für die meisten Europäer, unter allen die wichtigste und nützlichste. Denn wenn wir auf einmal die Pflanzen nicht mehr hätten, die in die 3te Klasse gehören, so fehlte uns und unserm Vieh der wichtigste Theil unserer Nahrungsmittel. Es gehören wirklich in diese Klasse fast alle unsere Getreide- und Grasarten: Weizen und Dinkel und Roggen, Gerste, Hirse, Hafer u. s. w. Was hülfe uns denn auch der Wein, wenn wir kein Brod hätten? Es stehen aber auch noch außer den mehrsten Gras- und Getreidearten, manche andere schöne und nützliche Gewächse unter dieser Klasse. So z. B.

A. Mit einem Griffel oder Staubweg (**Monogynia**).

1) Der Baldrian (**Valeriana officinalis**), der auch Theriakskraut und Katzenwurzel genannt wird; wächst sowohl an Sümpfen und an feuchten Hecken, als auch auf trocknen, steinigten Orten. Der Stengel ist oft halb Manns hoch, hohl, hat Blätter, wo an einem langen Stiel immer 2 und 2 einander gegenüber stehen (gefiederte). Die Blümlein sehen röthlich oder weißlich aus, riechen ziemlich stark apothekenartig, und die Wurzel ist in vielen Nervenkrankheiten und Krämpfen ein heilsames Mittel.

2) Zu dem Geschlecht des Baldrians rechnete man sonst auch den Acker- oder Rissellsalat, der an manchen

Digitized by Google

Orten auch Schaafmäulersalat und (wiewohl fälschlich) Rapunzel genannt wird (**Fedia Locusta oder olitoria**). Er unterscheidet sich aber vom Baldrian durch den nicht wie bei diesem in eine Haarkrone ausgewachsenen, sondern unbewehrten Kelch.

3) Der Safran (**Crocus sativus**), ist von gelblicher, blaulicher oder weißlicher Farbe, und sieht in der Gestalt seiner Blume der Herbstzeitlose (davon unten) gleich, die im Herbst, wenn schon die Wiesen gemäht sind, fast auf allen Auen so häufig wächst. Die eine Art (**Cr. vernus**), die man zur Zierde in unsern Gärten hält, kommt im Frühling fast vor allen andern Blumen zum Vorschein. Oben ist die Blumenkrone in 6 Theile getheilt, sie hat eine lange Röhre und nur 3 Staubfäden, statt daß die Zeitlose 6 hat.

Das Pistill ist es, was bei der einen veredelten Art von Crocus, die in vielen Ländern angebaut wird, zu dem als Gewürz und zum Gelbfärben so bekannten Safran angewendet wird. Man nimmt es im Herbste aus den Blumen, die man frühmorgens, noch ehe sie sich geöffnet haben, abschneidet. So ein Pistill ist freilich nicht sehr groß, darum braucht man gar viele zu einem Loth, und deßhalb ist auch der Safran so theuer. Er wirkt schmerzstillend und beruhigend.

4) Die Schwertlilien (**Iris**), z. B. die Art, die auf unsern Wiesen wächst, und auch die Arten, die man in den Gärten zieht, sind meistens blau; die Schwertlilie aber, die sich in stehenden Gräben und Teichen findet (**Iris pseudacorus**), hat gelbe Blüthen. Drei Blumenblätter stehen gerade hinauf, drei sind herabgerollt. Bei vielen Arten ist an jenen ein gelber Bart zu finden, der nach unten gekehrt ist. Die Blätter sind schwertförmige. Von der einen Iris (der Florentinischen) ist die wohlriechende Wurzel unter dem Namen Veilchenwurzel bekannt.

5) Der runde Allermannsharnisch (**Gladiolus communis**), der auch Siegwurz heißt, hat schöne, purpurrothe, röhrige und fast rachenförmige Blumen, die auf einer Seite des Schaftes stehen, und schwertförmige gestreifte Blätter.

Die fast runde, wie mit einem Netz umzogene Zwiebel wurde sonst in den Apotheken, und noch jetzt hie und da als Hausmittel gegen Geschwülste, und zum Zusammenziehen der

Digitized by Google

Wunden gebraucht. Abergläubische Leute glaubten vormals, wenn sie eine solche Zwiebel bei sich trügen, wären sie gegen Hieb und Stich, so wie gegen böse Geister und giftige Dämpfe verwahrt, daher hieß man sie Allermannsharnisch. Sie wächst schon hie und da in Deutschland wild; meist zieht man sie aber in Gärten, als Zierblume. Unwissende und unaufmerksame Menschen haben je zuweilen schon den rothen Allermannsharnisch mit dem (giftigen) rothen Fingerhut verwechselt, der doch weder ein Zwiebelgewächs ist, noch auch 3 Staubfäden hat.

6) Die Quellenmontie (**Montia fontana**), wächst in Quellen und auf sumpfigen Wiesen. Das kleine ungleich fünfspaltige Blüthchen öffnet sich nur am Mittage. Die Stengel sind im Wasser oft wie zu Polstern verwebt.

7) Die Binse (**Scirpus**), z. B. die große, hohe Teichbinse (**Sc. lacustris**), deren runde, glatte Stengel zu so vielem Binsenflechtwerk, das Mark zuweilen als Docht zu Lampen benutzt wird, gehört auch hieher, eben so:

8) Das Cypergras oder die Erdmandel (**Cyperus esculentus**), die oben schöne längliche Blüthenährchen, an der Wurzel die Knollen hat, welche fast wie Mandeln schmecken, und als Zusatz zum Caffee gebrannt werden. Die Blätter, so wie alle Theile des Gewächses, sind grasartig.

Zu diesem Geschlecht gehört auch das schöne, hohe Papiergras (**Cyperus Papyrus**), welches in warmen Ländern, wie Aegypten und Palästina, wächst, und aus dessen feinen Häutchen (den Halmrohrscheiden) und Mark vor Alters ein Papier bereitet wurde.

9) Das Knopfgras, das weiße wie das schwarze (**Schoenus albus** und **nigricans**), wachsen an sumpfigen Orten, und zeichnen sich durch ihre schönen, büschelförmig beisammenstehenden, knopfartigen Aehrchen aus, deren Schuppenbälglein dachziegelartig übereinander liegen.

10) Das Wollgras (**Eriophorum**), ist ein Gras, das oben an der Aehre, und um die Saamen her, schöne weiße Wolle hat, die man schon hie und da mit unter andern Wollenarbeiten verwebt und versponnen hat. Wenn man sich etwa auf der Jagd, oder

Digitized by Google

bei andrer Gelegenheit verbrannt hat, oder verwundet, und dann die Wolle dieses Grases auf die Wunde legt, soll dieses heilsam wirken. Auch zum Ausstopfen von Kissen und Polstern kann man sie sammeln und zu Dochten brauchen. Manche Gebirgswiesen sehen ganz weiß davon aus. Die gemeinste Art ist das vielährige Wollgras (**E. polystachyon**), welches nach der Breite seiner Blätter in breit- und in schmalblättriges (**E. latifolium** und **angustifolium**) unterschieden wird.

11) Das Borsten- oder Pfriemengras (**Nardus stricta**), das mit seinen steifen, eckigen, borstenartig emporstarrenden Blättern den unfruchtbaren Sand- und Kiesboden unserer vaterländischen kleinen Wüsten öfters wie ein mattgrüner Teppich bedeckt, hat Fingerslange, an feuchten Orten auch wohl Fußes hohe Halme, an deren Spitze die 15 bis 20 zweispelzigen Blüthlein, welche alle nach einer Seite hin stehen, ein lange einfache Aehre bilden. Die weidenden Schaafe reißen oft ganze Büschel dieses Grases aus. Von der flachliegenden dickschuppigen Wurzel leben die Larven der Wiesenschnacke: die Krähe wieder von diesen Larven, und zwischen und neben jenen Wurzeln keimen die Saamen anderer nutzbarer Gräser auf, welche allmählich die Stelle des Pfriemengrases einnehmen, das ihnen den ersten Anhaltspunkt und Schutz gab.

B. Mit 2 Staubwegen (Digynia).

12) Unter dem Namen Schmeelen begreift man in manchen Gegenden von Deutschland 2 Grasgattungen, davon die eine Art den Liebhabern vom Tabakrauchen als das Gras, womit man die Pfeifenröhren reinigt, gar wohl bekannt sind. Die Ackerschmeele, das große Straußgras oder der Windhalm, **Agrostis spica venti**, wächst im Sommer häufig auf Feldern und Ackerrändern, und wird halb Mannes hoch. Die meist röthlichen Blüthenspelzlein stehen oben in einer großen Rispe oder ausgebreitetem Strauße beisammen. Diese Spelzlein (m. v. oben S. 119 die Anmerkung) enthalten aber, wie man dieß beim Blühen des Straußgrases, oder beim Auseinandernehmen eines noch unaufgeblühten Knöpfleins sieht, nicht 2,

Digitized by Google

sondern nur ein Blüthchen, und dieß ist eben der Unterschied von der eigentlichen:

13) Schmeele (**Aira**), deren Spelzlein 2 Blüthchen in sich enthalten, und wovon die eine Art, die Glanzschmeele (**Aira caespitosa**), wenn sie der Wind bewegt, und die Sonne darauf scheint, seidenartig an ihren Blüthenrispen glänzt. Sie wächst gern auf feuchten Wiesen und auf Aeckern und wird da auch halb Mannes hoch; während eine andere Art, deren Blüthenstiele viele kleine Bögen haben: die bogige Schmeele (**Aira flexuosa**), die an Waldrändern und auf Sand und Kiesboden wächst, nur halb so hoch wird. Alle Schmeelen und Straußgräser sind, besonders so lange sie jung sind, ein gutes und angenehmes Futter für das Vieh, und wo auf dürrem Sandboden fast kein anderes nahrhaftes Gras mehr gedeiht, da wachsen wenigstens noch mehrere kleinere oder größere Arten von Straußgräsern und Schmeelen für die dort weidenden Schaafe.

14) Das gemeine Rohrschilf (**Phragmites communis**), das sich häufig am Ufer der Teiche, Flüsse, Gräben findet, ist das höchste deutsche Gras, denn es wird 3, ja 5 Ellen hoch; die überhängende, sehr ästige Rispe ist öfters 1 Fuß lang. Es hat breite Blätter; in dem Kelch stehen 5 Blüthlein beisammen. Dieses Gewächs wird zur Streu, zum Dachdecken und zum Berohren der Gypsdecken benutzt.

15) Die blaue Sesleria (**Sesleria coerulea**), welche freilich nur auf Kalkgebirgen und trockenen Orten gedeiht, zeichnet sich durch die meist blaue (zuweilen auch weiße) Farbe der unteren feinhaarigen Spelze aus, an welcher 1 bis 5 Grannen wimpernartig sitzen.

16) Der Wiesenfuchsschwanz (**Alopecurus pratensis**), der im Frühling und Sommer auf unsern Wiesen blüht, hat eine Aehre, die, wenn ihre röthlichen oder gelblich röthlichen Staubfädlein in der Zeit der Blüthe heraushängen, einem Fuchsschwanz ähnlich sieht. Es ist ein nutzbares Gras.

17) Das Lieschgras (**Phleum pratense**), ein Lieblingsfutter der Pferde, denen es freilich bei uns

Digitized by Google

meist nur unter dem Grummet zu Theil wird, erkennt man leicht an der langen, walzenförmigen Kolbenähre, welche oben am Halme steht, der öfters mit seinem untersten Gelenk knieend auf dem Boden aufliegt. Der Kelch, der die Blüthlein umfaßt, besteht aus 2 Klappen, die oben zweispitzig endigen. Die einzelnen Theilchen (Aehrchen) der langen Kolbenähre sind länglich, oben quer abgeschnitten und gehörnt.

18) Das Bandgras, Glanzgras (**Phalaris arundinacea**), davon die Abart mit geblich weißen oder hellgrünen, sowie dunkelgrünen Streifen in unsern Gärten gezogen wird, wächst gewöhnlich als ein mannshoher Halm am Ufer des Wassers. Die Blümchen haben 2 Kelchklappen, mit einer erhabenen Rückenschärfe und 2 Spelzlein, unterhalb des fruchtbaren stehen noch 2 unfruchtbare Blüthlein.

19) Das Hirsegras (**Milium effusum**), hat seine grannenlosen Blüthen in bauchigen (rundlichen) Kelchlein stehen und gleicht hierin etwas dem Hirse (N. 29). Es wächst gern an Waldrändern.

20) Das Bartgras, Hühnerfußgras (**Andropogon Ischaemum**), dessen röthliche Aehrchen meist zu 5 bis 7, zehen- oder fingerartig beisammenstehen, hat an jedem Zähnchen seiner Aehren, neben dem fruchtbaren ein unfruchtbares, blos männliches Blüthchen. Mit dieser Grasart ist das in den warmen Morgenländern wachsende Nardengras (**Andropogon Nardus**), mit lieblich duftender Wurzel, verwandt.

21) Das Honiggras, Roßgras (**Holcus mollis**), mit weichhaarigen Blättern und eirunder Aehre, hat innen ein fruchtbares, mit einer Granne versehenes Blüthchen und ein unfruchtbares, grannenfreies beisammenstehen.

22) Das Knauelgras (**Dactylis glomerata**), erkennt man an der Zertheilung seiner Blumenähre in mehrere Knäuel, welche fast wie Zehen an den Hasenpfoten aussehen, sich aber nicht weich anfühlen, sondern straff und steif. Es kommt häufig vor.

23) Das Flitterchen oder Zittergras (**Briza**) ist fast jedem Kinde bekannt, wenn es auch den

Digitized by Google

rechten Namen nicht dazu weiß. Denn das ist jenes schöne Gras, welches fast auf allen Wiesen wächst, und kleine Herzchen (Aehrchen) an dünnen zarten Stielchen hängen hat. Nach der Größe seiner Aehren theilt man es in großes, mittleres und kleines (**Br. major, media, minor**). Das mittlere ist das gemeinste.

24) Das Perlgras (**Melica nutans**), zeichnet sich durch seine nach einer Seite hin überhängenden, eirunden, bauchigen, zierlichen Aehrchen (Knöpfchen) aus.

25) Das Kammgras (**Cynosurus cristatus**), mit fast sägenartig ausgezackten Aehren, unterscheidet sich schon durch die engen, kammförmigen Deckblättlein, die reihenweis an der hintern Seite der Aehre beisammen stehen.

26) Das Mannagras, die Schwade (**Festuca** oder auch **Poa fluitans**), wächst fast überall bei uns in Deutschland, in Sümpfen, Wassergräben und an andern feuchten Plätzen, und hat lange, in Aeste zertheilte dünne Aehren, an denen keine Bartgrannen zu sehen sind. Es blüht den ganzen Sommer hindurch, und hat an einem und demselben Stocke zugleich Blüthen und reife Saamen. Der Saame wird in ein ausgebreitetes Tuch, womit man an die Aehren streift, eingesammelt, und als Mannagrütz oder polnischer Schwaden (der meist über Frankfurt an der Oder zu uns kommt) in Milch oder Wein gekocht, verspeißt. Dies ist dann ein sehr nahrhaftes und wohlschmeckendes Essen, wie Sagogrütze, und könnte fast überall in Deutschland eingesammelt werden. Das frische Gras ist besonders den Pferden ein angenehmes Futter, und auch die Fische, sogar die Forellen, die doch meist von Thieren leben, gedeihen da vorzüglich gut, wo dieses Gras wächst und seinen Saamen ins Wasser fallen läßt.

27) Der Hafer (**Avena sativa**), der sich hauptsächlich durch die knieartig- oder zurückgebogene Blüthenborste oder Granne unterscheidet, ist die Getreideart, welche unsere deutschen Vorfahren vor schon 2000 Jahren am meisten und fast allein angebaut haben, als sie weder den Weizen, noch den Roggen, und noch weniger den Hirsen hatten. Denn in ihren kal-

Digitized by Google

ten, feuchten Waldgegenden (fast ganz Deutschland war ja damals nur ein großer Wald) gedihen alle jene Getreidearten nicht, wohl aber der Hafer. Daher sieht man noch jetzt, wenn z. B. die Mauern von alten deutschen Götzentempeln (Druidentempeln) ausgegraben werden, auf einmal Hafer aufgehen. Es giebt auch auf unsern Wiesen und Ackerrändern mehrere wilde Haferarten,, die man gleich an ihrer Aehnlichkeit mit dem Saathafer, an dem gestielten Blüthchen mit zweiklappigem Kelch und an der knieartigen oder zurückgebogenen Granne erkennen kann.

Da der Hafer und die Gerste, wenn ihr Wachsthum in die warme Jahreszeit fällt, nur kurze Zeit (2 bis 3 Monate) von der Aussaat bis zur Reife brauchen, werden sie auch noch in hochnördlichen Gegenden (unter 70° Breite) gebaut, wo die mittlere Temperatur des Jahres am oder unter dem Gefrierpunkt und die Winterkälte sehr groß so wie anhaltend, dagegen auch der Sommer zwar sehr kurz, zugleich aber auch wegen der langen Tage sehr warm ist.

28) Die Trespe, der Twalch (**Bromus secalinus**), ist ein bekanntes, für unsere Saatfelder öfters sehr überlästiges Unkraut, dessen Blüthchen in länglichrunden, zweizeiligen Knöpfchen (Aehrchen) an den langen Aesten des Halmgipfels beisammen stehen, und eine unterhalb der Spitze stehende Granne (Aehrenborste) haben. Eben durch ihre längliche, bei manchen Arten auch eirunde Gestalt, gleichen sie in etwas dem Hafer. Man schreibt dem Trespensaamen eine schwache betäubende Kraft zu.

29) Der Hirse (**Panicum miliaceum**), der sich durch einen aus drei Spelzen, zwei größeren und einer kleineren, bestehenden Kelch unterscheidet, will schon warme Sonne und warmen Boden haben und unsere norddeutschen Landsleute kennen daher den Hirsebrei kaum dem Namen nach, den wir uns hier so gut schmecken lassen. Die Blümchen hängen wie Perlenschnüre, die sich unter ihrer Last beugen, an dem behaarten Schaft herunter.

30) Das Zuckerrohr (**Sacharum officinarum**), welches sich schon durch seine lange, außer dem Kelch stehende Wolle und seine zweispelzige Krone von andren

Digitized by Google

Grasarten auszeichnet, wächst ursprünglich in Ostindien, wird aber jetzt in vielen warmen Ländern von Amerika, Afrika, u. s. w. gezogen, wohin es durch die Europäer gebracht ist.

Es wächst an feuchten Orten und im Wasser wohl zweimal mannshoch, und hat, besonders wenn es ganz reif ist, etwa fünf Vierteljahr nachher, nachdem man ein Stück der gegliederten Wurzel in das feuchte Erdreich gelegt hat, ein schönes, süßes, saftreiches Mark in sich, aus dem der Zucker durch Walzen, die ein Räderwerk gegeneinander drückt und umdreht, ausgepreßt wird. Das ist aber eine gar beschwerliche Arbeit und gefährlich zugleich. Denn da sich das Zuckerrohr nicht aufbewahren läßt, sondern schon nach 24 Stunden verdirbt, müssen die Neger in der Zeit der Zuckerrohr-Ernte oftmals Tag und Nacht vor den Walzen stehen, und das Zuckerrohr hinanhalten; da werden sie dann öfters schläfrig und kommen, ohne es zu merken, mit einem Finger zwischen die Walzen, die dann sogleich den Finger, und darauf auch die Hand zwischen sich hineinrädern und ganz zerquetschen. Darum steht immer einer mit einem scharfen Beil dabei, der sogleich den Finger oder die Hand abhaut, wenn sie hineingekommen ist, damit nicht der ganze Mensch gerädert wird. Wir alle lassen uns den Zucker gut schmecken: und wissen nicht, wie sauer es bei seiner Zubereitung unsern armen schwarzen Brüdern geworden ist.

Wenn der Zuckersaft, der so nahrhaft ist, daß die Neger, in der Zeit der Zuckerernte von seinem Genuß ganz wohlbeleibt werden, aus dem Rohre ausgepreßt ist, wird er in Kesseln eingesotten, und am Ende, durch Thon gereinigt, zum Zucker gemacht.

31) Das Rohrgras, Dachschilf (**Arundo**), hat unten am Grunde des Blümchens lange Haare und ein federartiges Pistill. Dahin gehört das nützliche, in wärmeren Gegenden wildwachsende spanische Riet (**A. Donax**), das in heißen Ländern Baumhöhe erreicht und zu Stäben und allerhand Befestigungen (z. B. für Weinstöcke), so wie zu Pfeifenrohren, Weberspulen u. a. gebraucht wird.

Unser hierländisches Rohr (sonst **Arundo Phragmites** genannt) ist schon oben, unter Nr. 14 beschrieben.

32) Die Sandgerste (**Elymus arenarius**), sieht fast aus wie die Gerste, ist aber viel größer und höher. Sie wächst auf ganz feinem, losen Sande, an den Küsten des Meeres und auch noch sonst hie und da im aufgeschwemmten Sandlande. Durch ihre zähen,

Digitized by Google

weit fortlaufenden Wurzeln kann solcher lose Sand öfters ganz zum Stehen gebracht und zu festem Boden gemacht werden, daher man auch die Sandgerste in den Dünensand hie und da ordentlich aussäet, um den Sand fest zu machen.

33) Die Gerste (**Hordeum vulgare**), ist schon seit uralten Zeiten als Getreide benutzt worden. Nimm sie in die Hand und vergleiche sie mit dem Waizen und sag dir dann selber, wodurch sich die beiden von einander unterscheiden, denn die Stadtleute verwechseln manchmal beide mit einander, worüber freilich einer, der auf dem Dorfe auferzogen ist, lachen muß. Die Gelehrten unterscheiden die Gerste durch die je drei und drei seitwärts bei einander stehenden, aus zwei Bälglein zusammengesetzten Knöpfe, welche nur ein fruchtbares Blüthchen einschließen.

34) Der Roggen oder das gemeine Korn (**Secale cereale**) hat einen aus zwei gefranzten Bälglein bestehenden Kelch, in welchem zwei Blüthen und ein gestielter Ansatz zu einer unvollkommenen dritten enthalten sind. Dieser Kelch sitzt ungestielt an einem Ausschnitt der Aehrenspindel auf, und ihm gerade gegenüber steht auch einer. Er ist dabei der Spindel mit der Seite zugekehrt und hat eine Granne.

Unser Roggen oder Korn war freilich den Griechen und Römern, auch den Israeliten, in ihren schönen warmen Ländern noch nicht bekannt, denn diese bauten Weizen und Dinkelkorn zu ihrem Brode, uns Deutschen aber, die wir meistentheils das kräftige Schwarzbrod oder Kornbrod für gewöhnlich viel lieber essen, als das Weißbrod oder Weizengebäck, thut das Korn gar gute Dienste, besonders den wackern Leuten nach der Nordsee-Gegend hin, die daraus den vortrefflichen Pumpernickel zu bereiten wissen. Wir verdanken den Anbau des Kornes wahrscheinlich den Mongolischen Völkern, die zur Zeit des Hunnenkönigs Attila unser ganzes Vaterland so gar arg verwüsteten und verheerten. Denn diese brachten das Korn mit sich nach Europa herüber und lehrten seinen Anbau unsern Vorfahren. Und so ist denn öfters ein großes Unglück auch wieder zu etwas gut und nütze.

Aus dem Korn macht man auch Branntwein. Der ist nun wohl, mäßig genossen, nicht schädlich, und kann sogar, besonders wenn man manche bittere, oder gewürzhafte Sachen dazu nimmt, zu einem Arzneimittel werden. Aber gar viele

Digitized by Google

Menschen trinken den Branntwein, weil sie glauben, sich dadurch ein sehr fröhliches Herz machen zu können. Es giebt aber nur ein einziges Mittel, sich ein recht fröhliches Herz und Muth zu machen, wenn man sich vor Gott und Menschen ein gut Gewissen erhält, gegen keinen Menschen auf der Welt einen Groll in seinem Herzen leidet, und den lieben Gott recht von Herzen lieb hat. Dann ist man vom Morgen bis zum Abend und immerfort fröhlich, und das ist eine wahrhaftige und selige Fröhlichkeit des Herzens, denn man hat dabei alle Menschen, auch die, welche feindlich gegen einen sind, lieb, und ist mit Allen friedfertig.

Bei den Leuten aber, die Branntwein getrunken haben, ist eigentlich nicht das Herz, sondern nur der Bauch (den freilich solche Leute für ihr Herz halten) und die Glieder fröhlich. Und seht nur einmal hin, wie garstig sich solche Menschen geberden, bei denen der Bauch lustig geworden ist und nicht das Herz. Wie sie schreien und sich zanken und gar schlagen, und wie es ihnen nachher schlimmer ergeht als den Hunden und Schweinen. Wie ernstlich man dem Laster der Trunkenheit ausweichen solle, das haben neuerlich in Nordamerika und auch anderwärts viele edle Menschen durch die That gezeigt, indem sie auf einmal das Branntweintrinken unter sich und den Ihrigen ganz abschafften.

35) Der Weizen (**Triticum sativum**), hat nur einen einzeln stehenden, gekielten Kelch (nicht wie die Gerste je drei beisammen) mit 2 Bälglein, in denen meist 3 Blüthchen enthalten sind, an denen sich, z. B. beim Winterweizen, öfters gar keine Grannen finden. Dieses Getreide ist schon seit den ältesten Zeiten, man kann gewiß sagen, seit 4 tausend Jahren, von den Menschen auf den Feldern angebaut und Brod und Kuchen daraus gebacken worden, und das Mehl, welches der Altvater Abraham den drei von oben herkommenden Fremdlingen zu Kuchen backen ließ, war wahrscheinlich Weizenmehl. Die Alten bauten auch bereits das Dinkelkorn oder den Spelzweizen (**Tr. Spelta**) an, welcher, so wie die Gerste, festsitzende Schaalen (Spelzen) um die Körner hat und in Süddeutschland häufig gezogen wird. Eine Grasart, die man das Queckengras nennt, gehört auch zum Geschlechte des Weizens. Man braucht seine Wurzeln in der Apotheke. Es ist aber ein beschwerliches Unkraut.

36) Der Lolch (**Lolium temulentum**), ist das einzige, einigermaßen giftige Gras, welches man kennt.

Digitized by Google

Die lange Aehre sieht aus, als wenn sie am Rande wie eine Säge eingezackt wäre, und ist breitgedrückt. Die eine Art, die an Ackerrändern steht, und keine Borsten oder Grannen oben an der Aehre hat, ist nicht giftig, sondern blos ein hartes, nur den Pferden (wenigstens in England) genießbares Gras, die andere Art hat Borsten oder Grannen an den Aehren, steht öfters in den Ackerfeldern, und das ist eben die Art, von der man glaubt, daß ihr Saame, unter das Brod gebacken, allerhand Krankheiten, auch Taumel und Schwindel errege. Es muß aber damit so arg nicht seyn, und jene Krankheiten, die man dem Lolch zuschreibt, mögen wohl eher von den sehr nassen Sommern selber herkommen, in denen der Lolch häufig wächst. Auch nimmt man seine Körner hie und da zum Bierbrauen und Branntweinbrennen, ohne daß es den Leuten, die davon genießen, merklich schadet.

C. Mit 3 Griffeln (**Trigynia**). Dahin gehört

37) Die **Spurre** (**Holosteum umbellatum**), deren weißliche Blüthchen schirmartig (doldenartig) beisammenstehen und einen dreikantigen rothbraunen Saamen hinterlassen. Sie findet sich auf Aeckern.

§. 20. Die 4te Klasse (**Tetrandria**) enthält solche Pflanzen, in deren Blüthen 4 Staubfäden stehen. Dabei ist auch meistentheils die Blumenkrone in vier getheilt und eben so der Kelch. Denn das ist überhaupt zu merken, daß die Pflanzen, welche 2 oder 4, oder 8, oder 12 Staubfäden haben, meistens auch an der Blumenkrone und am Kelch eine Theilung in 4 Lappen oder Blätter zeigen, oder in 2, in 3 mal 4; dagegen bei denen, welche 3 oder 6, oder 9 Staubfäden haben, theilt sich auch meistens der Kelch und die Krone in 3 oder 6, oder 9 Stücke; die, welche 5 oder 10 und auch 20 Staubfäden haben, zeigen meist eine Theilung der Blumen in 5 oder 10 Theile. Man kann daher recht oft, wenn man eine Blumenkrone sieht, die einen 5 getheilten Kelch und eine 5 getheilte oder 5blättrige Krone hat, den Schluß machen, daß die Blume 5 oder 10 Staubfäden haben müsse, und

Digitized by Google

wo man, wie bei dem türkischen Hollunder, oder bei der Corneliuskirsche, oder beim Seidelbast, eine Theilung der Blumenkrone in 4 Theile bemerkt, da kann man darauf schließen, daß entweder 2 oder 4, oder 8 Staubfäden darinnen seyn müssen. Doch giebt es auch Ausnahmen von dieser Regel und schon der Baldrian ist nach Seite 126, eine solche, denn der hat eine meistens 5 getheilte Blumenkrone und doch nicht 5 oder 10, sondern nur drei Staubfäden. Auch in dieser Klasse giebt es, so wie in der 2ten, ziemlich viele Sträucher und Bäume, während in der ersten Klasse gar keine eigentlichen Bäume, in der 3ten auch nur ausländische (z. B. die baumartigen Gräser der wärmeren Länder) vorkommen. Damit hier Niemand, der nur die Staubfäden zählt, und nicht auf den Bau der Blumenkrone sieht, irre werde, wollen wir erwähnen, daß auch in der 14ten Klasse 4 Staubfäden, diese aber von ungleicher Länge und in einer Rachenblume stehend, zu finden sind.

Es gehören hieher:

A. Mit 1 Staubweg oder Griffel (Monogynia).

1) Die gemeine Kugelblume (**Globularia vulgaris**), die in steinigen Gegenden, auf Anhöhen, auch Haiden wächst, hat hellblaue, in einer Kugel beisammenstehende Blüthchen und kreisartig ausgebreitete Wurzelblätter.

2) Der Cornelius-Kirschenbaum (**Cornus mascula**), auch Dürle oder Dürlitzenbaum genannt; dessen kleine, schöne gelbe Blüthlein gleich im ersten Frühling, bei uns schon im März oder Anfang Aprils aufzubrechen anfangen, wenn noch kein anderer Baum blühen will, und dessen walzenförmig längliche schöne rothe Kirsche, wenn sie recht reif ist, angenehm säuerlich und kühlend schmeckt, steht bei uns öfters in den Gärten oder seine Sträucher sind zu Gartenhecken geschnitten. Als Baum wird er nicht sehr hoch und wächst langsam; das Holz ist aber dafür auch desto fester und dauerhafter, daher man den Baum auch Hartriegel nennt und das Holz zu mancherlei Ma-

Digitized by Google

schinen und zu jenen kleinen Theilen, die in das Räderwerk der Mühlen gehören, gar gerne hat.

Es giebt bei uns in Deutschland auch noch einen andern Strauch oder Baum, der zu diesem Geschlecht gehört:

den wilden Hartriegel oder Dürlitzenbaum (**Cornus sanguinea**), der auch Hundsbeerenstrauch heißt. Wenn er jung ist, sind seine Zweige ganz blutroth, was auch sein lateinischer Beiname, **sanguinea** (blutroth), andeuten soll. Die Blümlein sind weißlich, und stehen fast in einem solchen Schirm beisammen, wie beim Theeholunder, sind aber viel größer als bei diesem, und man kann sie ja überhaupt schon dadurch von allen den vielen weißblühenden Sträuchern, die es bei uns giebt, unterscheiden, daß die kleine Blume des wilden Hartriegels sich in vier gerade auseinander stehende Blättlein zertheilt und vier Staubfäden hat. Die Beeren sehen schwarz, fast wie Wachholderbeeren, aus, und haben ein übel schmeckendes, graues Fleisch, doch macht man in manchen Gegenden ein Brennöl daraus, und das Holz ist sehr gut und hart.

In unsern Gartenanlagen zieht man auch häufig den weißfrüchtigen Cornelbaum (C. alba), der eigentlich im nördlichen Amerika und Asien zu Hause ist. Er unterscheidet sich durch seine zurückgekrümmten Aeste (der Dürlitzenbaum hat gerade Aeste), die besonders im Winter durch ihre Röthe ins Auge fallen und durch die weiße Farbe seiner kleinen Kirschen. Die Wurzelsprossen liegen auf der Erde auf und haben nicht blos die Farbe, sondern auch den Geruch der Rosen.

3) Die Tuch- oder Weberkarten (**Dipsacus fullonum**), die man in der Gegend von Nürnberg so häufig auf den Feldern baut, gehören auch hieher. Die lichte blaulichen Blümlein stehen oben in einem eirunden Kopf beisammen, und zwischen den Blümchen stehen die stachlichen, steifen Haken, womit die Tuchmacher ihre Wolle kratzen. Es giebt auch eine wilde Art (**D. sylvestris**), die in den Wäldern und anderwärts wächst, deren Stacheln aber stehen an der Spitze gerade aus, machen keinen krummen Haken, und sind daher nicht zu gebrauchen.

Wenn man die Schößlinge einiger Kartenarten mit Erde zudeckt, und so den Zutritt des Lichtes von ihnen abhält, kann man ein den Artischoken ähnlich schmeckendes Gemüse aus ihnen erhalten.

4) Das Scabiosen- oder Grindkraut (**Scabiosa**). Davon wachsen mehrere Arten bei uns, die

Digitized by Google

ſich an den Blättern, und die eine auch an der Wurzel, unterſcheiden. Die blauröthlichen Blümchen ſtehen oben in einem flachen Knopfe beiſammen, der unten mit einem aus vielen Blättchen beſtehenden Kelche eingefaßt iſt. Jedes Blümlein hat eine 4-, bei manchen Arten auch eine 5-ſpaltige Blumenkrone und die 4 Staubfäden ſind weder oben an den Staubbeuteln, noch mit den Fäden verwachſen. Die gemeinſte Scabioſe, die am öfterſten auf den Wieſen ſteht (**Scabiosa arvensis**), iſt zugleich auch die beſte und heilſamſte, gegen Geſchwüre der Haut und auch gegen manche Bruſtkrankheiten. Man kocht ſie ab und thut Honig dazu. Der Stengel bei dieſer gemeinen Scabioſa ſteht gerade auf, iſt borſtig, die Blätter theilen ſich nach beiden Seiten in Querſtücke, die tief ausgezackt ſind, die Blümchen ſind 4ſpaltig.

Eine andere Art, die man in Schwaben Hirſchzunge nennt, heißt auch im gemeinen Leben Teufelsabbiß (**Scabiosa succisa**), weil die Wurzel unten ausſieht, als wäre ſie abgebiſſen. Sie hat ebenfalls 4ſpaltige Blümlein, dabei aber eirunde Blätter. Man kocht die Wurzeln und Blätter ab und giebt ſie ſolchen Leuten, die langwierige Geſchwülſte im Halſe haben, zum Ausgurgeln, auch heilen die Hufſchmiede vernagelte Pferde damit, und es wäre manchmal wohl gut, wenn man ſolche vernagelte Jungen, denen das Lernen gar nicht in den Kopf will, auch damit heilen könnte. Uebrigens giebt dieſes Gewächs den armen Eskimos eine ſehr beliebte Nahrung, indem ſie Wurzel und junge Blätter als Gemüſe verſpeiſen.

5) Das Waldmeiſterlein (**Asperula odorata**), iſt kaum eine Spanne hoch, hat ſternförmig um den Stengel herumſtehende Blättchen und weiße Blüthen, die ziemlich angenehm riechen und im Mai oder Juni in ſchattigen Waldgegenden gefunden werden. Die Kühe ſollen mehr Milch geben, wenn ſie von dieſem Kraute freſſen. Ein Aufguß des Waldmeiſterleins giebt, wenn man ihn mit ſüßem Aepfelmoſt vermiſcht, eine Art Champagner, auch nimmt man dieſes Gewächs in ſeiner Blüthenzeit als Zuſatz zu dem beliebten und geſunden Maientrank.

6) Das Labkraut (**Galium**), hat auch meiſtens ſolche ſternförmig um den Stengel ſtehende Blätter

Digitized by Google

wie das Waldmeisterlein. Die Blüthen sind sehr klein, weiß oder gelb, stehen an mehreren Zweigen, haben viergetheilte Kelche und Kronen.

Das gemeine, weiße Labkraut (G. Mollugo) trägt kahle und runzliche Früchtchen, das Klebkraut (G. Aparine) dagegen hat sowohl an den Früchten als an den Blättern krummhakige Borsten, wodurch es an Kleidern klettenartig festklebt; das mit den gelben Blüthen (Galium verum), welches mitten im Sommer blüht, heißt auch gelbes Wald- oder Bettstroh. Man färbt mit dem Kraut und den Blumen gelb, mit der Wurzel, wenn man Alaun dazu nimmt, schön roth. Auch hat man dieß Kraut gegen die Gicht gebraucht. Noch besser kann man aber färben mit der:

7) Färberröthe (Rubia tinctorum), die zwar in den Rheingegenden und in der Schweiz an manchen Orten wild wächst, aber in allen nicht gar zu kalten Ländern noch überdieß mit Sorgfalt auf den Feldern und in Gärten angebaut wird. Der Stengel wird dann mehrere Fuß, ja wenn man ihn unterstützt, manneshoch. Die Blätter stehen zu 4 bis 5 zum Theil sternförmig am Stengel, die Blumen sind schon viel größer als beim Labkraut und schön gelb.

Ein Acker, der recht fetten Boden hat, ist zum Anbau der Färberröthe am besten, man gewinnt dann auf einem Feld, das etwa 30 Ellen lang, und eben so breit ist, wohl 2 bis 3000 Pfund, während ein eben so großer, aber magerer Sandboden oft kaum zum 5ten bis 6ten Theil so viel giebt. Die Wurzeln müssen 3 bis 4 Jahre alt seyn, ehe man sie herausnimmt. Dann reinigt man sie von der Rinde durch Dreschen. Die rothe Farbe, die man daraus gewinnt, ist gar dauerhaft und beständig, und namentlich ist das schöne rothe türkische Garn damit gefärbt. Man braucht den Aufguß davon auch gegen Gelbsucht. Das Vieh frißt das Kraut gern, und giebt viel Milch darnach.

8) Kleinding oder Kleinling (Centunculus minimus), heißt ein Blümchen, das an sandigen und dabei feuchten Orten wächst und eines der kleinsten unter allen unsern vaterländischen Kräutern ist. Denn sein Stengel, so dünn wie ein Fädchen, wird selten über einen Zoll hoch, die Blättlein werden eine Linie lang, und in ihren Achseln sitzen die sehr kleinen weißlichen Blümchen, die sich meist nur am Mittag öffnen.

9) Das bunte Sternkraut (Sherardia arvensis), das auf Aeckern wächst, heißt so, weil die

steifhaarigen Blätter sternförmig um den Stengel sitzen und die kleinen Blümchen, deren Büschel sich ganz oben am Stiele von einer 8blättrigen Hülle umgeben finden, meist blau (auch röthlich) aussehen.

10) Bei dem Wiesenknopf oder Wiesen-Bibernell (**Sanguisorba officinalis**) stehen die Blüthlein in eirunden, braunröthlichen Knöpfen beisammen die Blätter sind gefiedert.

11) Der Frauenmantel (**Alchemilla vulgaris**), heißt so, weil die nierenförmig gespalteten Blätter am Rande 7 bis 9 runde Ausschnitte, wie die Krägen mancher Mäntel haben, und dabei etwas gefaltet sind. Die kleinen Blüthchen haben nur einen röhrenförmigen 8spaltigen Kelch und sind hell- oder gelblich-grün. Man nennt das Gewächs auch Sinau.

12) Der Wegerich (**Plantago**), zerfällt in mehrere Arten, die sich durchs Blatt unterscheiden. Die Blüthchen, die bei manchen schön blauröthliche Staubfäden haben, stehen in einer Art von Würstchen oder fuchsschwänzchenartig, oder bei einigen Arten auch in einem eirunden Knöpfchen beisammen.

a) Der große Wegerich (Pl. **major**) hat große, recht breite Blätter, die man, so wie Wurzel und Saamen, wider Blutflüsse und auch äußerlich bei Quetschungen als zusammenziehendes Mittel empfiehlt. Die Blüthen sind blauröthlich. — b) Der mittlere Wegerich (Pl. **media**) trägt weißliche Blumenwürstchen, die kürzer sind als beim großen, so wie auch etwas schmälere Blätter. c) Der spitzige Wegerich (Pl. **lanceolata**) hat ganz schmale Blätter, fast wie ein Schuhband so schmal. Die beiden letztern Arten werden eben so benutzt wie die erste, auch fressen die Canarienvögel und viele andere Stubenvögel den Wegerichsaamen gern.

13) Die Klimmenstaude (**Cissus**), die wie Epheu an der Mauer hinaufrankt, und wovon die Blätter der einen Art (**C. trifoliata**) zu je drei und drei beisammen stehen, sieht man manchmal in den Gärten, wohin man sie verpflanzte. Eigentlich kommt sie aus heißen Ländern. Sie blüht im Sommer.

14) Die Teichnuß (**Trapa natans**), trägt eine vierzackigte Nuß, größer wie eine gewöhnliche Haselnuß, in der ein mehliger Kern steckt, den man, wenn man die Nüsse kocht, genießen kann, und der fast wie

Digitized by Google

Kartoffeln schmeckt. Die Teichnuß hat gar vieles Merkwürdige an sich. Aus ihrer Nuß, wenn diese im Schlamme, keimt, treibt blos ein Stengel, keine Wurzel heraus und die Stelle der Wurzel vertreten einige untere haarförmig fein zertheilte Blätter, während die obern (rautenförmig viereckten) Blätter die Nuß tragen helfen, indem sich ihr anfangs schlanker Blattstiel in der Mitte aufbläst, sobald die Nuß anfängt sich zu bilden, und um desto mehr, je schwerer die Nuß wird, bis diese endlich, wenn sie ganz reif ist und nun des Sonnenlichtes nicht mehr bedarf, doch das Uebergewicht bekommt, und zu Boden in den Schlamm sinkt, von wo sie neue Keime treibt. Dieses widerfährt indeß nur den fruchtbaren Nüssen, während die unfruchtbaren oben schwimmen bleiben.

Eine Art von Wassernuß, welche in den Seen von Kaschemir wächst, dienet vielen Bewohnern des Landes zum Hauptnahrungsmittel.

B. Mit 2 Griffeln (Digynia).

15) Die Flachsseide, das Filzkraut, auch Zwirnwinde genannt (Cuscuta europaea), hat freilich auch zuweilen fünf Staubfäden, gewöhnlicher aber doch nur 4 in ihrer, dann auch vierspaltigen, eirunden, röthlichen Blumenkrone, welche ein 4spaltiger, becherförmiger Kelch umgiebt. Die Zwirnwinde besteht wirklich, wie der Name sagt, aus einem Büschelgewinde von lauter röthlichen Fäden, die sich um Brennesseln, Hopfen, Flachs, und um allerhand Gesträuche schlingen. Weil der untere Stengel, sobald sich das Gewächs empor gerankt hat, abstirbt, sieht man es oft, ohne ein im Boden wurzelndes Ende, an den andern Kräutern hängen, in die es kleine Wurzelfäserchen schlägt und sie aussaugt und erstickt. Die Art, welche den Flachs umwindet und da die bärtigen Trauben bildet, heißt Cuscuta epilinum. Alle Arten sind ein sehr schädliches Unkraut.

C. Mit 4 Staubwegen (Tetragynia).

16) Das Mastkraut, der Vierling (Sagina procumbens), ein kleines Unkraut mit ausgebreitet 4blättrigem Kelch und 4 sehr kleinen Blüthenblättlein,

Digitized by Google

wächst an feuchten Orten, in Feldern und Wäldern, auch an Mauern und Wegen. Die Stengel und ihre Aeste strecken sich zum Theil zum Boden. Die Stiele der reifen Fruchtkapseln sind abwärts gebogen.

17) Das Weiherblatt, schwimmende Saamkraut (**Potamogeton natans**), hat an seinem, oben in einer dünnen Blüthenähre endenden Stengel zweierlei Blätter. Nämlich unter dem Wasser vielfach fein zertheilte, auf der Wasserfläche, eirunde, dunkelgrüne, gegen 3 Zoll lange. Die Blüthchen haben keinen Kelch, 4 sehr kurze Staubfädchen, und statt der eigentlichen Pistille blos 4 Narbenöffnungen.

18) Der Hulstbaum, oder Stechblattbaum (**Ilex aquifolium**), wächst durch einen großen Theil von Europa und Asien, doch in Deutschland nicht überall. Das Blatt ist lederartig zähe, schön glänzend grün, und hat steife Stacheln an sich, die Blüthen sehen weiß aus, das Holz, das sehr langsam wächst, und bei uns fast immer nur strauchartige Stämmchen bildet, ist überaus hart und zähe; aus der Rinde macht man, indem man sie zu Brei zerstößt und mit Mistelbeeren vermischt, einen guten Vogelleim, die rothen Beeren aber purgiren und führen den Schleim ab, wenn man 10 bis 12 davon einnimmt. In dem Blüthchen stehen zwischen den 4 Staubfäden 4 Pistille.

§. 21. In die 5te Klasse (**Pentandria**), deren Blumen fünf Staubfäden in sich haben, gehören so viele Sträucher und Kräuter, die bei uns wachsen, daß sie nebst der 19ten Klasse wohl die allerweitläufigste ist. Man muß daher bei dieser Klasse schon recht aufpassen, wenn man die vielen Blumen sich merken und sie unterscheiden will, besonders muß man recht auf die Beschaffenheit der Blumenkrone und der Frucht Achtung geben. Dahin gehören denn:

A. Mit 1 Staubweg (**Monogynia**).

1) Das Vergißmeinnicht (**Myosotis palustris**), das an nassen Orten wächst, ein tellerartig

Digitized by Google

ausgebreitetes 5randiges Blümchen hat, das außen schön himmelblau, inwendig gelb aussieht, ist wohl jedem bekannt.

2) Das Lungenkraut (**Pulmonaria officinalis**), hat eine trichterförmige, erst rothe, dann blaue Blume mit prismatisch fünfeckigem, fünfzähnigem Kelche und rauhe Blätter. Es kommt gleich im ersten Frühling in Wäldern und schattigen Orten zur Blüthe und wurde sonst gegen Blutspeien gebraucht.

3) Das Scharfkraut (**Asperugo procumbens**), mit eckigem, auf dem Boden liegenden, borstigen Stengel und blauen, trichterförmigen Blümchen, unterscheidet sich durch den 5zähnigen Kelch, der nach dem Verblühen breitgedrückt erscheint und alsdann fast einem Gänsefuße gleichet. In ihm sitzen die 4 breitgedrückten Saamen.

4) Der Steinsaame, Steinhirse (**Lithospermum officinale**), trägt weißliche, in den Winkeln der etwas rauh anzufühlenden Blätter sitzende fünfspaltige Blüthen und glatte, weiße steinartig harte Saamen, die wie kleine Perlen glänzen. Wächst in Aeckern.

5) Die Ochsenzunge (**Anchusa officinalis**), zeigt anfangs röthliche, dann blaue, trichterförmige Blumen, mit geschlossenem Schlunde, so wie rauhborstige Stengel und Blätter. Man hat den Saft gegen das Seitenstechen gebraucht.

6) Der Krummhals (**Lycopsis avensis**), ein sehr gemeines Unkraut, heißt so, weil die Röhre (der Hals) der blauen, trichterförmigen Blume krumm gebogen ist. Blätter und Stengel sind borstig.

7) Die Hundszunge (**Cynoglossum officinale**), hat weichhaarige Blätter, geformt wie breite Bänder, welche vorne spitzig zugeschnitten sind und der Stengel ist auch sanfthaarig. Die Blüthen sind viel größer als bei der Ochsenzunge, und roth, oder vielmehr fast violett. Sie stinkt etwas, wirkt aber, wenn man den Saft oder auch einen Thee von den trocknen Blättern und Wurzeln eingiebt, als schmerzstillendes Mittel, auch macht sie Schlaf. Einer, der

Digitized by Google

eine ganze Schüssel voll gekochter Hundszungenblätter als Gemüse gegessen hatte, schlief 40 Stunden in einem weg; ein Anderer, der wohl noch mehr gegessen hatte, ist bis jetzt noch nicht wieder aufgewacht. Mit solchem Gemüseessen soll man ja vorsichtig seyn.

8) Gurkenkräutig oder Boretsch (**Borago officinalis**), dessen Saft, wenn man die borsthaarigen Stengel oder Blätter drückt, eben so riecht wie Kümmerlinge oder Gurken, hat eine schöne hellblaue, wie ein Rad mit 5 Speichen, ausgebreitete Blumenkrone.

Man kann den Boretsch gut als Salat und Gemüse essen, und wenn es dann fast so schmeckt, wie Gurken, nur viel schlechter, dann hat man das rechte Kraut erwischt. Es geht einem aber mit einem solchen falschen Gurkensalat, wie den Hunden, die kein trocken Brod fressen wollen. Wenn man ihnen ein wenig Butter an die Nase streicht, fressen sie das Brod trocken, weil sie den Geruch der Butter in die Nase bekommen und glauben, es ist Butter auf dem Brode. So hat auch ein solcher Salat den Geruch oder Geschmack von guten frischen Kümmerlingen; ordentliche Gurken wären mir aber doch lieber. Uebrigens ist ein solcher Salat von Boretsch sehr gesund und der ausgepreßte Saft der Pflanze lindert, sagt man, das Seitenstechen.

9) Der Beinwell, die Wallwurz (**Symphytum**), mit walzenförmiger, glockenartig sich mündender Blume, die am Schlunde durch 5 Läppchen geschlossen und meist röthlich gefärbt ist, wächst häufig an feuchten Orten. Die rauhen Blätter setzen sich über den Stengel hinab fort und bilden an diesem Seitenlappen. Die dickfleischige Wurzel enthält viel Schleim.

10) Die Wachsblume (**Cerinthe**), führt diesen Namen nicht blos von den glatten, wachsartig schimmernden, meergrünen und weißfleckigen Blättern, sondern deßhalb, weil die in niederwärtshängenden Büscheln wachsenden, meist gelblichen, glockenartig röhrigen Blumen den Bienen vielen Stoff zum Wachs geben.

11) Die Natternkopfblume (**Echium vulgare**), hat einen etliche Fuß langen, mit recht steifen, fast stachlichten Borsten und mit dunklen Höckerchen bedeckten Stengel und auch steifborstige Blätter. Die zuerst rothen, dann blauen Blumen sind fast rachen-

Digitized by Google

artig, oder laufen wie eine unregelmäßige Glocke zu, die eine ungleich fünfspaltige Mündung hat. Die Blumen stehen nach einer Seite, und wie in einer langen zeräſtelten Aehre, die wieder aus kleineren, dicht mit Blumen besetzten zurückgekrümmten Aehrchen besteht. Man sieht es dem ganzen Gewächs, das auf steinigen, dürren, sandigen Orten wächst, fast an, daß es, wenigstens mit vielen seiner Arten in heißeren Ländern auf dürrem, steinigem Boden zu Hause ist, z. B. im Morgenlande; denn die ganze Pflanze erinnert einen an heiße, steinigte Wüsten. Dort sind dergleichen Gewächse den armen genügsamen Kameelen ein gar angenehmes Futter, und das Bienchen, das der Wind in die Wüste verschleudert hat, findet doch am Abend in den honigreichen Blumen, die auch von unsern Bienen sehr gern und oft besucht werden, ein Nachtlager, auch Nahrung genug, und dadurch Stärkung zu dem Heimwege.

12) Die Primeln oder Schlüsselblümchen (**Primula**), wovon die eine buntfarbige Art unter dem Namen Aurikelchen (**Pr. Auricula**) im Frühling unsere Gärten ziert und wohlriechend macht, sieht schön gelb, und die eine in den Alpengegenden wachsende Art, die **Primula farinosa** oder staubblättrige Primel (weil die Blätter unten wie sammetartig bestaubt sind) schön roth aus. Das gelbe Himmelsschlüsselchen kommt auf unsern Wiesen im Frühling gleich zuerst hervor, und schließt uns freilich gleichsam den irdischen Himmel der schönen Blumenwelt auf. Die Art, die vorzüglich gut riecht und die man am liebsten zu Thee, gegen Husten und Brustbeschwerden nimmt (**Pr. officinalis**), zeigt gelb röthlichte Tüpfelchen in dem gelben Blümchen, das bei allen Arten eine trichterförmige Röhre hat und tellerartig ausgebreitet ist.

13) Die Erdscheibe oder das Schweinsbrod (**Cyclamen europaeum**), bekommt man in Nord- und Mittel-Deutschland freilich noch nicht viel anders als in Gärten oder in Blumenscherben zu sehen, desto öfter aber in Kärnthen, in Salzburg, in Tyrol und andern südlichen Gebirgsländern an trocknen, schattigen

Digitized by Google

Orten. Die Blumen sind schön röthlich oder weiß und roth, die Läppchen der Blumenmündung sind nach oben hinauf gestülpt, die Mündung schaut nach unten. Sie stehen auf langen Stielen, blühen noch im Herbste und duften gar angenehm. Die Blätter haben einen fast nierenförmigen Umriß, und sind meist unten roth, oben grün. Die Wurzel, eine rundknollige Rübe, schmeckt sehr scharf und purgirt, wenn sie frisch genossen wird, auch zertheilt sie, wenn man sie auflegt, geschwollene Drüsen. Wenn man sie aber bratet, wird sie ganz unschädlich und schmeckt dann fast castanienartig. Den Schweinen braucht man sie übrigens nicht zu braten, diese fressen sie auch roh mit Vergnügen und sie schadet ihnen gar nichts, darum hat die schöne Blume auch den häßlichen Namen: Schweinsbrod bekommen.

14) Der Fieber- oder Bitterklee (**Menyanthes trifoliata**), steht im Wasser oder auf sumpfigen Wiesen. Er trägt ziemlich große, wie beim Klee zu 3 und 3 beisammen stehende Blätter. Die Blumen sind schön röthlich weiß und inwendig mit einem Bärtchen geziert. Sie blühen schon im April oder Mai. Die Blätter schmecken gar auffallend bitter, und wenn man sie kostet, merkt man wohl gleich, daß man ein Arzneimittel vor sich hat. Man braucht sie als Thee und als eingekochten Dicksaft gegen Fieber, Wassersucht, Scharbock, und mancherlei Krankheiten. Für schwindsüchtige Schaafe sind sie sehr heilsam, denn diese werden meist gesund davon, wenn man ihnen die Blätter unter ihr Futter mischt. Auch Hasen und Rennhirsche fressen sie gern, besonders wenn sie angeschossen sind. Denn jedes Thier ist draußen in der freien Natur sein eigener Doktor, und der liebe Gott hat in jedes einen Trieb hineingelegt, der ihm sagt, was ihm gut und nützlich ist.

15) Der gelbe Weiderich (**Lysimachia vulgaris**), hat schöne gelbe 5theilige, radförmige Blumen.

16) Der Gauchheil, Gansheil (**Anagallis arvensis**), ist ein kleines rothes oder blaues, radförmig-fünftheiliges Blümchen, das auf Feldern wächst.

Digitized by Google

Die glatten Blätter sind an der untern Seite meist schwarz getüpfelt.

17) Die Sumpfhottonia oder der Wasserveiel (**Hottonia palustris**), mit weiß und rothen Blüthen, und fast federartig zertheilten Blättern, ist auch eine schöne Blume, — aber man kann in einem so kleinen Büchelchen unmöglich alle schönen Pflanzen nennen und beschreiben.

18) Die Winde (**Convolvulus**), die an Zäunen wächst (**C. sepium**), hat eine schöne, große, weiße Blume, die wie eine Glocke gestaltet ist, und windet sich wie Bohnen oder Hopfen an allem hinauf, was sie finden kann. Eine andere Windenart, die Batatenwinde (**Convolvulus Batatas**), welche in allen wärmeren Ländern, namentlich von Amerika und Asien gezogen wird, hat freilich keine so ansehnlichen, schönen, sondern nur kleine weiße oder röthliche Blüthen, auch windet sie sich nicht in die Höhe hinan, sondern liegt mit ihrem Stengel am Boden, dagegen trägt sie, verborgen vor dem Auge eines vorübergehenden Beobachters eine Gabe mit sich, welche köstlicher ist, als die schönste Blüthe. Ihr niedrig am Boden liegender Stengel ist in Gelenke getheilt, deren jedes einzelne Wurzeln schlägt, daran mehrere längliche, zuweilen etwas gekrümmte Knollen hängen, die so mehlreich, nahrhaft und zugleich wohlschmeckend sind, daß man sie den besten Kartoffeln nicht nur gleichstellen, sondern noch vorziehen muß. Eine einzelne Knolle wird oft mehr als spannenlang und erreicht ein Gewicht von einem Pfund, und man bereitet sie nicht nur gekocht oder geröstet für die menschliche Tafel, sondern kann sie auch roh genießen; selbst die Blätter, welche denen des Arons gleichen, geben ein eßbares Gemüse. Bemerkenswerth ist es noch an den Bataten, daß sie nur in armen, magerem Boden ihre reichhaltigen Knollen erzeugen.

Von einer Art von Winde, der Jalapenwinde, **C. Purga**, die im wärmeren Amerika wächst, kommt die ächte Jalapenwurzel, die in den Apotheken als ein sehr vorzügliches Purgirmittel gebraucht wird. Eine solche Wurzel soll oft gegen 20 Pfund und noch darüber wiegen. In den Gärten

Digitized by Google

baut man öfters unter dem Namen der Jalapenpflanze eine andere schöne amerikanische Pflanze, mit trichterförmigen, bunten Blumen (die **Mirabilis Jalapa** und **longiflora**). Die Wurzel davon purgirt auch.

19) Die eigentlichen Glockenblumenarten (**Campanula**), sehen blau aus, und ihre mehreren Arten stehen auf allen Wiesen und Ackerrändern. Man färbt grün mit den Blumen, das Kraut frißt das Vieh gern und giebt (besonders Schaafe) viel Milch darnach. An der, nach der weiten Oeffnung hin in 5 Spitzchen ausgehenden, übrigens aber ganz vollkommenen Glocke der Blumen, erkennt man diese Gewächsart am besten.

20) Das blaue Sperrkraut (**Polemonium caeruleum**), das man wenigstens oft in Gärten sehen kann, hat gefiederte Blätter und schöne hellblaue Blumen, mit rundlichen, stumpfen Blumenblättern. Es wird mehrere Fuß hoch; die Blumen stehen in einer flachen Rispe beisammen.

21) Der Fieberrindenbaum (**Cinchona**), von dem die bittere Chinarinde kommt, die in Fiebern und manchen andern Krankheiten ein so gutes Heilmittel abgiebt, wächst im südlichen Amerika auf Bergen, so hoch wie ein Eichbaum. Die Blüthe hat einen glockenförmigen Kelch, und eine langröhrige, trichterförmige Blumenkrone.

22) Der Kaffeebaum (**Coffea arabica**), der auch in diese Klasse gehört, muß hier doch auch mit erwähnt werden. Die Blätter sehen fast wie Pomeranzenblätter aus, nur sind sie viel länger, die Blumen sind weiß, die Frucht ist eine kleine Kirsche, in der zwei Kaffee-Bohnen statt des Kerns zusammen gewachsen sind.

Dieser Baum wächst ursprünglich in Arabien und Abyssinien, wo er in vielen Gegenden eben so häufig angepflanzt wird, als bei uns die Zwetschgenbäume. Und gewiß ist die dortige die edelste und beste Kaffeesorte in der ganzen Welt. Wenn man aber meint, daß nun auch in jenen Gegenden immer und überall, in jedem Dorfe und in jedem Wirthshause, der beste Kaffee getrunken werde, da irrt man sehr. Gerade dort, wo sie den edelsten Kaffee haben, und in der größten Menge selber anbauen, trinken die meisten Leute den

Digitized by Google

schlechtesten Kaffee in der ganzen Welt. Denn wenn man auf der Reise nach und in den arabischen Kaffeebergen in ein Wirthshaus kommt und Kaffee verlangt, geben sie einem ein gar dünnes warmes Getränk, das nicht von Kaffeebohnen, sondern von den Schaalen (den Ueberbleibseln der zusammengedörrten Kirsche, in der die Bohnen staken) bereitet wird. So genießen die, welche jene Naturgabe am leichtesten haben könnten, sie am wenigsten, vielleicht aus ähnlichem Grunde, aus welchem unsere armen Winzer gewöhnlich nur Leire trinken, und die Bergleute, die das schönste Silber herausgraben, oft kaum Kupfergeld im Hause haben — nämlich aus Armuth, vielleicht aber auch deßwegen, weil die, die den Kaffee so nahe haben, ihn am wenigsten achten. Und es wäre zu wünschen, daß eine solche Nichtachtung dessen, was man immer haben kann, nur im Leiblichen, und nicht so oft auch im Geistlichen vorkäme. Und besonders wäre in unserm Vaterlande hie und da dem Kaffee eine solche Nichtachtung zu wünschen, denn er ist nicht so gesund, und giebt nicht so viele Kräfte, als die Suppen, die unsere Alten statt seiner genossen.

23) Der Mangobaum (**Mangifera indica**), ein stattlicher Baum, weniger durch seine Höhe als durch die Dicke seines Stammes und durch die weite Ausbreitung seiner immergrünenden, mit handförmigen Blättern gezierten Aeste, scheint ursprünglich in Indien zu Hause zu seyn, wird aber auch in andren warmen Gegenden von Asien und Amerika gezogen. Seine meist nierenförmig gestaltete, gelbliche, öfters faustgroße Frucht, schließt in ihrem überaus wohlschmeckenden, saftreichen Fleisch einen Kern ein, der wie eine Mandel in holzige, zweiklappige Schalen gespalten und welcher auch eßbar ist. Von den 5 Staubfäden der traubenförmig beisammenstehenden, wohlriechenden Blüthen, trägt gewöhnlich nur einer einen vollkommenen Staubbeutel. In Indien, wo man doch so viele köstliche Früchte hat, ziehen Viele die Mangofrucht ihres Wohlgeschmackes wegen allen andren Früchten vor.

24) Der Sternapfel oder Goldblattbaum (**Chrysophyllum Cainito**), der in Westindien zu Hause ist, hat den letzteren Namen wegen seiner wunderschönen Blätter erhalten, die an ihrer unteren Fläche glänzend goldfarbig erscheinen. Außer seinen prachtvollen Blättern hat dieser Baum auch an seinen

Digitized by Google

purpurrothen rundlichen Blüthen und an ſeinen roth-farbigen Früchten, die einem großen Apfel gleichen, eine Zierde, die dem Auge wohlthut, die Früchte aber ſind nicht allein ſchön anzuſehen, ſondern ſind dabei auch von köſtlichem Geſchmack. Ihr lieblich ſüßes Fleiſch iſt ſo zart, daß es faſt wie Gallert auf der Zunge zerfließt; wenn man ſie quer durchſchneidet, ſieht man das Samenbehältniß in der Geſtalt eines zehnſtrahlichen Sternes, darinnen die bräunlich ſchwarzen, glänzenden Kerne liegen.

Auf dieſe außereuropäiſchen Gewächſe laſſen wir nun wieder die Beſchreibung von mehreren inländiſchen folgen, welche in dieſe Klaſſe gehören.

25) Das Leinkraut (**Thesium**) fällt dem Auge durch die zierlichen, faſt fädchenartigen Blätter und ſeine Blüthlein auf, die vor dem Aufblühen gelblich-grün und von der Geſtalt eines Traubenkernes ſind, nach dem Aufblühen ein zartes, weißes fünfſtrahliches Sternchen bilden.

26) Das Gaisblatt (**Lonicera**), auch Je länger je lieber genannt, iſt mit ſeinen wohlriechenden, meiſt röthlichen und weißlichen, auch gelblichen Blüthen, die in 4 ſeichter und in einen tiefer abgeſonderten, mithin in 5 ungleiche Lappen zertheilt ſind, und in einer langen Röhre endigen, bekannt genug. Die eine Art (**L. caprifolium**), hat nach oben hinauf Blätter, welche ſo zuſammengewachſen ſind, daß der Stengel mitten durch geht. Die Blumen riechen gut.

27) Die ſchöne gelbe Königskerze, Wollblume (**Verbascum Thapsus**) hat ſehr haarige Staubfäden. Die Blumen geben einen Bruſtthee, die Wurzel taugt gut, um die Hühner damit fett zu machen, der Saame betäubt, wenn er ins Waſſer geworfen wird, die Fiſche, ſo daß man ſie mit der Hand fangen kann.

28) Das Bilſenkraut (**Hyoscyamus niger**), verräth ſchon durch ſeinen häßlichen Geruch, und durch die traurige braun geaderte, ſchmutzig-gelbliche Farbe ſeiner Blüthen, weß Geiſtes Kind es ſey. Denn es iſt ein ziemlich giftiges Kraut, das zur Noth auch wohl

Digitized by Google

einen tödten könnte, wenn er viel von dem schwarzen Saamen genießen wollte. Aber ordentlich angewendet ist das Bilsenkrautextract und Pflaster auch eine wirksame Arzenei, welche Schmerzen stillt, Krämpfe lindert und Schlaf macht. In Rußland thun sich die Leute aus Schabernack manchmal eine solche Pflanze in die Badestuben oder auf die Oefen. Dann werden die Menschen, die in einem solchen Zimmer sind, wie toll. Das ist aber gar kein feiner Spaß!

29) Der Teufelsapfel oder Stechapfel (**Datura Strammonium**), ist noch viel schlimmer. Das Bilsenkraut sucht sich doch wenigstens nicht bei den Leuten durch ein schönes Aussehen einzuschmeicheln, sondern sagt es einem schon durch seine Farbe, daß es kein sehr umgängliches Gemüß sey, aber dieser häßliche Stechapfel hat eine so schöne weiße, große Blüthe, daß man von weitem fast meinen könnte, es stünde eine Lilie da. Die Fruchtkapsel ist mit Stacheln bedeckt, fast wie bei der Roßkastanie, und inwendig liegen kleine schwarze Saamenkörner, die eines der abscheulichsten, tückischsten Gifte sind, welche es in der Welt giebt, weil sie die edelsten Kräfte im Menschen angreifen und einen viehischen Wahnsinn erzeugen. Dennoch hat sich der Mensch auch schon aus diesem giftigen Gewächs ein Heilmittel gegen Raserei, fallende Sucht und heftiges Zucken der Glieder bereiten gelernt. Man sagt, daß der Stechapfel durch die Zigeuner, die ihn aus den Morgenländern mit sich brachten, bei uns eingeführt worden sey.

30) Der Tabak (**Nicotiana**), mit einem 5spaltigen Kelch, einer trichterförmigen, fünfspaltigen, an der Mündung gefalteten Blumenkrone, rundköpfigem Pistill und zweifächeriger Saamenkapsel, ist aus Amerika zu uns gekommen, doch giebt es auch in Asien Tabaksstaudenarten, die dort ursprünglich wachsen, und das Rauchen scheint auch nicht aus Amerika durch Europa nach dem östlichen Asien gekommen, sondern dort schon länger im Gebrauch gewesen zu seyn. Man raucht und schnupft den Tabak, und das ist wohl keine Sünde, aber hübsch ist es auch nicht. Jungen

Digitized by Google

Leuten, die noch wachsen, ist das Tabakrauchen schädlich, überhaupt betäubt der Tabak, und schläfert die innern Sinne ein. Und diese sollten doch immer wach seyn!

Die größere Art von Tabak, welche bei uns angebaut wird, die mit blaßrothen Blüthen, heißt **N. Tabacum**; die kleinere mit grünlich gelben Blüthen, heißt **N. rustica**. Beide kommen ursprünglich aus Amerika. Ein Franzos: Johann Nicot, hat zuerst, im Jahre 1560, den Saamen des Tabaks im Pariser Gewächsgarten aussäen lassen, nach ihm ist er **Nicotiana** genannt.

31) Die Tollkirsche (**Atropa Belladonna**), ist allerdings, wie der griechische Name sagt, eine wahre Todesgöttin. Denn von ihren bläulichschwarzen, glänzenden, fade süßlich schmeckenden Kirschen (Beeren) ist schon manches Kind, das sie im Walde stehen fand und aus Unwissenheit aß, getödtet worden. Die Blume sieht bräunlich aus, ist glockenförmig fünfspaltig und trägt an ihren Wänden die fünf, von einander abstehenden Staubfäden; das Kraut wächst manchmal etliche Ellen hoch.

32) Die Judenkirsche (**Physalis Alkekengi**), kann dagegen Jeder ohne Nachtheil essen, der sich durch ihre schönen rothen, in den bauschigen Kelch eingehüllte Kirschen, die im Herbst häufig in unsern Berggegenden reifen, dazu angelockt fühlt.

33) Der Kartoffel (**Solanum tuberosum**), trägt an den vielfach zertheilten Blumenstielen, die an seinem krautartigen, mit gefiederten Blättern versehenem Stengel sitzen, radförmig ausgebreitete, fünfspaltige Blüthenkronen, mit fünf Staubfäden, deren Staubbeutel gegen einander geneigt und ein wenig mit einander verwachsen sind. An der Spitze jedes Staubbeutels zeigen sich zwei kleine Oeffnungen.

Dieses nützliche Gewächs kam erst vor etlichen 100 Jahren aus Amerika zu uns. Und zwar zuerst, wahrscheinlich durch genuesische Schiffe nach Italien, dann durch Walter Raleigh und Franz Drake nach England, wo übrigens die Kartoffeln anfangs nur als Seltenheit in einzelnen Gärten gebaut wurden. Denn fast hätte sie der Freund von Franz Dracke, dem dieser aus Amerika Kartoffeln zur Aussaat schickte, und dazu schrieb: „die Frucht dieses Gewächses sey so treff-

Digitized by Google

lich und nahrhaft, daß er ihren Anbau für sein Vaterland für höchst nützlich halte," aus seinem Garten wieder herausreißen und wegwerfen lassen. Denn er dachte: Franz Dracke habe mit dem Worte „Frucht" die Saamenknollen gemeint, die oben am Kräutrich hängen. Da es nun Herbst war, und die Saamenknollen waren gelb, lud er eine Menge vornehmer Herren zu einem Gastmahle ein, wobei es hoch hergieng. Am Ende kam auch eine zugedeckte Schüssel, und der Hausherr stund auf und hielt eine schöne Rede an die Gäste, worinnen er diesen sagte: er habe hier die Ehre, ihnen eine Frucht mitzutheilen, wozu er den Saamen von seinem Freunde, dem berühmten Dracke, mit der Versicherung erhalten hätte, daß ihr Anbau für England höchst wichtig werden könne. Die Herren aus dem Parlament kosteten nun die Frucht, die in Butter gebacken und mit Zucker und Zimmt bestreut war, aber sie schmeckte abscheulich und es war nur schade um den Zucker. Darauf urtheilten sie alle, die Frucht könne wohl für Amerika gut seyn, aber in England werde sie nicht reif. Da ließ denn der Gutsherr einige Zeit nachher die Kartoffelsträuche herausreißen und wollte sie wegwerfen lassen. Aber eines Morgens, im Herbste, gieng er auch durch seinen Garten und sah in der Asche eines Feuers, das sich der Gärtner angemacht hatte schwarze runde Knollen liegen. Er zertrat einen und sieh, der duftete so lieblich wie ein gebratener Kartoffel. Er fragte den Gärtner, was das für Knollen wären? und der sagte ihm, daß sie unten an der Wurzel des fremden amerikanischen Gewächses gehangen seyen. Nun gieng dem Herrn erst das rechte Licht auf. Er ließ die Knollen sammeln, zubereiten, und lud dann die Parlamentsherrn wieder zu Gaste, wobei er wohl wieder eine Rede gehalten haben mag, von welcher der Inhalt der gewesen seyn wird: daß der Mensch, wenn er blos nach dem urtheilt, was oben an der Oberfläche ist, und nicht auch tiefer gräbt, manchmal gar sehr irren könne. — Zu der Gattung **Solanum** gehört auch der sogenannte **Liebesapfel** (**S. Lycopersicum**), mit weichen, etwas gefurchten, meist röthlichen Früchten (Beeren), die zuweilen die Größe einer Orange erreichen und in den wärmern Ländern von Europa zu Saucen benutzt werden. Bei uns zieht man ihn in Gärten und Zimmern, in Südfrankreich säet man ganze Felder damit an. — Auch das **Bittersüß** oder die **Alfsranke** (**Sol. Dulcamara**) gehört hieher, die man bei uns oft an feuchten Stellen unter anderm Gesträuch findet, an welches sie rebenartig sich anrankt. Die Blüthen sind meist violblau, die eirunde Beere ist roth.

34) Der **Faulbaum** (**Rhamnus frangula**) wächst bei uns freilich mit seinen kleinen, grünlich gelben Blüthlein, die aus einem röhrenförmigen Kelch

bestehen, innerhalb welchem statt der Blüthenblätter nur 5 kleine Schüppchen sitzen, und mit seinen schwarzen Beeren an allen Orten, wo es feucht genug für ihn ist. Zu Irkutzk in Sibirien zieht man ihn aber als Zierbaum in den Lustgärten. Die Rinde purgirt stark.

Der eigentliche Kreuz-Dorn (**Rhamnus catharticus**) gehört auch daher. Die unreifen Beeren geben eine dauerhafte gelbe, die reifen eine dunkle grüne Farbe, die unter dem Namen des Saftgrünes bekannt ist.

35) Das Pfaffenhütchen (**Evonymus europaeus**), hat diesen Namen wegen seiner, einem 4- oder 5eckigen Barett (Magisterhut) gleichenden Saamenkapseln, in denen die rothgelblich oder orangefarbenen Kerne stecken, erhalten.

36) Die Stachelbeere und Johannisbeere (**Ribes Grossularia** und **R. rubrum**), mit einem stehenbleibenden, 5spaltigen Kelche, fünf kleinen Blumenblättchen und einem von einander gespalteten Griffel, wachsen in mehreren Arten bei uns, sowohl wild als auch in Gärten. Die vorzüglichste Heimath dieser angenehmen und nützlichen Pflanzengattung ist aber in jenen kalten und nördlichen Ländern, wo kein Wein mehr wächst. Und dort sind diese Beeren wirklich den armen Nordländern eine Art von Ersatz für den Wein, und werden von ihnen, statt der Trauben, sowohl frisch gegessen, als auch zur Bereitung eines weinartigen Getränkes angewendet. Die Art von Johannisbeeren, welche auf der Insel Rügen und so herab bis zu unsern süddeutschen Alpengegenden öfters in den Gebirgs-Wäldern wild wachsend gefunden wird, und deren rothe Beeren mehlicht süß schmecken, heißt Alpen-Johannisbeere, **Ribes Alpinum**.

37) Der Epheu (**Hedera Helix**) überzieht mit seinen langen, holzigen, sehr biegsamen Zweigen und Stengeln, an denen die immer grünen Blätter sitzen, Bäume und altes Gemäuer. Die Blätter an den fruchttragenden Zweigen sind unzertheilt, die andern sind in mehrere Lappen gesondert.

Er trägt bei uns erst im Herbst Blüthen und im darauf folgenden Frühling reifen dann die Beeren. Die grün-

Digitized by Google

lichen Blüthen, welche einen häufigen, den Insekten sehr angenehmen Nektarsaft enthalten, haben einen kleinen, fünfzähnigen Kelch, fünf längliche, dicke Blumenblättchen, pfriemenförmige Staubfäden und einen sehr kurzen Griffel. Die schwärzliche, säuerliche Beere ist die erste Frucht des Jahres, die man, meist noch vor den Frühlingskirschen, in unsern Gärten reifen sieht. Sie wird zwar nicht von Menschen, mit desto mehr Lust und Begierde aber von den Vögeln genossen. In Schweden, wo der Epheu im Herbst blos Blüthenknospen treibt, die erst im Frühling aufblühen, reift die Frucht gar erst im zweiten Jahre. In wärmern Ländern ist der Epheu nicht immer ein so armes, ohnmächtig am Boden fortkriechendes, oder mit seinen Wurzelzasern beständig an Bäumen und Mauern sich anhaltendes Gewächs, sondern dort erhebt er sich selbstständig, als ein schöner Baum, mit dickbuschiger Krone vom Boden. Dort giebt sein Stamm auch das schwärzliche Epheugummi von sich, das beim Anzünden balsamisch riecht und (in Weingeist aufgelöst) ein gutes Wundmittel ist. — Der Epheu wird sehr alt. So stehen bei der Abtei Fountair Epheubäume, welche das Kloster schon im Jahr 1132 beschützten und gewiß über 900 Jahre alt sind.

38) **Der Weinstock (Vitis vinifera), hat ein Blüthchen mit 5 kleinen, an der Spitze zusammenhängenden Blumenblättchen, innerhalb welchem man einen Fruchtknoten, ohne Griffel sieht. Die Blätter sind lappicht und am Rande eingebuchtet.**

Das eigentliche Vaterland des Weins ist in Asien, besonders die Gegenden im Süden vom Ararat. Von dort ist er aber schon in alter Zeit nach Europa verpflanzt worden, wo er in allen wärmern Gegenden gebaut wird. Für die Erzeugung eines guten Weines kommt das Meiste nicht sowohl auf die mittlere Temperatur des Jahres, als auf die der Sommermonate an, während denen der Weinstock blühet und seine Beeren reift. So ist z. B. die jährliche mittlere Temperatur von Amsterdam und London noch höher als die von Ofen, und doch wächst nicht bei jenen Städten, wohl aber in Ungarn ein guter, feuriger Wein, weil da der Winter zwar kälter, der Sommer aber desto heißer ist. Der Wein kann wohl als ein herrliches, den Müden und Kranken erquickendes, den Niedergeschlagenen erfreuendes Geschenk Gottes betrachtet werden, und wer es haben kann, mag dieß täglich genießen. Nur muß man es so genießen, daß wirklich nur das Herz erfreut wird, und nicht, wie wir oben vom Branntweintrinken sagten, der Bauch dabei in seine tolle Lustigkeit geräth, wobei er mit dem Verstande und dem Herzen durchgeht, und beide zu Sachen hinreißt die nicht gut und recht sind.

Digitized by Google

Es giebt gar viele Abarten vom Weinstock, die wohl meistens durch Kultur entstanden sind. Eine solche Abart, die Vitis vinifera apyrena, hat ganz kleine Beerlein, in denen gar keine Kerne sind. Daraus werden, wenn man sie trocknet, die sogenannten kleinen Rosinen gemacht, während die großen Rosinen getrocknete Weinbeeren von den gewöhnlicheren Traubenarten mit länglichen Beeren sind.

39) Das Veilchen (**Viola odorata**), mit zusammengewachsnen Staubbeuteln und einer unregelmäßigen, nach hinten in einen hörnchenartigen Fortsatz endigenden Blumenkrone, soll hier auch nicht übergangen werden, obgleich es Jeder kennt, und auch leicht an der ganzen Gestalt merken kann, daß das schöne 3farbige Veilchen oder Stiefmütterchen (**V. tricolor**), auf unsern Feld- und Gartenbeeten, ebenfalls eine Veilchen-Art sey.

40) Die Berg-Jasione (**Jasione montana**), deren längliche, in fünf riemenförmige nach unten verwachsene Stücklein zertheilbare, hellblaue Blümchen zu einem flachen Kopf zusammengedrängt sind, findet sich im Sommer an trockenen Rändern und auf Sandboden.

41) Die Rapwurzel oder unächte Rapunzel (**Phyteuma spicatum**), welche eine lange, außen gelbe, inwendig weiße, unten mit einigen eirund rübenförmigen Knollen versehene Wurzel hat, unterscheidet sich durch ihre in einer Aehre beisammenstehenden gelblichen Blüthen, deren riemenförmige Stücke oben und unten verwachsen, in der Mitte auseinanderstehend sind. Die Blätter sind oval und am Rande gezähnt. Sie wächst meist an schattigen Orten. Die Wurzel ist eßbar.

42) In feuchten Wäldern, so wie an schattigen Wassergräben und andern feuchten Oertern, wächst eine Pflanze, welche meist röthlich aussehende, saftige, hohle Stengel mit angeschwollenen Gelenken, und gar schöne, zarte, gelbe Blüthen hat, davon an jedem Blüthenstiel etwa 4 herabhängen. Hinten ist an den Blümchen ein hohler, herabgekrümmter Sporn, und überhaupt bemerkt man, wenn man die Blume recht ansieht, gar bald, daß sie der schönen, rothen Balsamine, die wir vor den Fenstern und in Gärten

Digitized by Google

ziehen, ganz ähnlich sey. Und sie ist auch eine Balsaminenart und heißt **Impatiens noli me tangere**, wilde Balsamine oder Springsaame. Den letztern Namen hat sie deßwegen, weil ihre kleinen schötchenartigen Saamenkaspeln, sobald sie nur einigermaßen reif sind, bei der geringsten Berührung aufspringen, und den Saamen von sich schießen. Die gewöhnliche Garten-Balsamine (**Impatiens Balsamina**) kommt ursprünglich aus Ostindien und China, wo sie auf den Wiesen wächst. Wer gern die kleinen, zarten Saftgefäße der Pflanzen sehen möchte, der hat an der Balsamine gute Gelegenheit dazu, wenn er den abgeschnittenen Stengel, oder eine ganze Pflanze mit der Wurzel in ein roth oder blau oder gelb gefärbtes Wasser setzt, welches dann bald in den Gefäßen aufsteigt und diese gleich Adern färbt.

43) Das Immergrün (**Vinca major** und **minor**), dessen schöne blaue, wie ein Präsentirteller auseinander gebreitete Blumen gleich in der ersten Frühlingszeit, niedrig auf felsigem Boden oder an Mauern zum Vorschein kommen, hat ein immerfort (Sommer und Winter hindurch) grünendes Laub. Die Blumen sind eben so schön (nur etwas dunkler) blau als die der Hepatika oder Leberblume, von der bei der 13ten Klasse die Rede seyn wird. Das Immergrün war sonst gegen Blutflüsse im Gebrauch.

44) Das Tausendgüldenkraut (**Chironia Centaureum**), hat röthliche, trichterförmige Blüthchen, die an einem ästigen Stengel mit schmalen Blättlein stehen, der etwa eine Spanne hoch ist. Die Blätter schmecken sehr bitter und geben, so wie der zarte Stengel, eine treffliche Arzenei, die in Fiebern und auch in andern Krankheiten gute Dienste leistet.

B. Mit 2 Pistillen (**Digynia**).

45) Der Enzian (**Gentiana**), mit einer, an ihrem Grunde in eine Röhre endigenden Blumenkrone, hat viele Arten, davon etliche gleich im ersten Frühling, etliche im Spätsommer und Herbst an bergigten Orten wachsen. Die Blumen sind herrlich blau (meist königsblau) wie bei dem kleinen Frühlings-En-

Digitized by Google

zian (G. verna), dem einblüthigen, glockenförmigen (G. acaulis) und dem schwalbenwurzblättrigen (G. asclepiadea), oder auch gelb, wie bei dem hochwüchsigen prächtigen Alpenenzian (G. lutea), dessen bittere Wurzel ein kräftiges Heilmittel abgiebt. Bei noch andren hat die Blüthe eine violette Färbung, wie bei dem fast allenthalben bei uns wachsenden, gemeinen Bitterlings-Enzian (G. amarella). Bei manchen Arten dieses Geschlechts, z. B. dem gefranzten und dem Kreuz-Enzian (G. ciliata und cruciata), sind die Blumen vierspaltig statt fünfspaltig und diese haben dann auch nur 4 Staubfäden. In jeder Jahreszeit bilden einzelne Arten des Enzians einen Schmuck der Gebirgswiesen und noch spät im Herbste sieht man da die (Gentiana Pneumonanthe) mit ihren fünftheiligen an der Innenseite gefranzten Blüthen. Fast alle enthalten einen bittren Stoff in sich.

46) Die Schwalbenwurz oder Aesculapie (Asclepias Vincetoxicum), unterscheidet man bald durch die 5 eirunden, hohlen gelblichen Neetarien oder Honiggefäße, aus deren jedem ein kleines Hörnchen hervorragt, und welche in der weißlichen, fünftheiligen, radförmigen Blüthenkrone sitzen. Die Staubbeutel, welche ohne deutliche Staubfäden aufsitzen, so wie die beiden Fruchtknoten, an denen ebenfalls nur Narbenöffnungen, keine eigentliche Griffel sind, bemerkt man erst, wenn man die Decke, unter der sie liegen, hinwegnimmt. Die Blumen stehen in einer Dolde beisammen, die dickknotige, bittere Wurzel wirkt schweistreibend und wurde (sonst) bei bösartigen Blattern, Pest und Wassersucht empfohlen.

Zu diesem Geschlecht gehört auch die sogenannte Seidenpflanze (Ascl. syriaca) mit weichhaarigen Blättern und rothen, doldenförmig beisammen stehenden Blüthen, aus denen sich eine Kapsel erzeugt, an deren Saamen sich eine baumwollenartig feine Haarkrone befindet, welche man unter andere Wolle oder Seide verarbeiten, oder in Betten füllen kann. Aus den Stielen dringt beim Abschneiden ein milchicht weisser Saft hervor, die jungen Schossen genießt man in Amerika, wie bei uns den Spargel, die Stengel benutzt man wie Hanf; die Blüthen, die deshalb auch von den Bienen sehr gesucht werden, sind so zuckerhaltig, daß man sie am

Digitized by Google

Morgen, wenn der Thau noch darauf liegt, einsammelt, dann auspreßt und aus dem Saft, durch Eindicken, einen bräunlichen, wohlschmeckenden Zucker bereitet.

47) Nur im Vorbeigehen erwähnen wir hier auch des merkwürdigen amerikanischen Hoa=hya oder Milch=baumes, welcher wahrscheinlich zu dem in diese Abtheilung gehörigen Geschlecht der Tabernamontanen (**Tabernaemontana**) gezählt werden muß. Dieser Baum giebt in noch auffallenderem Maaße als der Kuhbaum (**Galactodendron**) aus seinen Einschnitten und abgerissenen Blattstielen einen so nahrhaften, wohlschmeckenden Milchsaft von sich, daß man ihn, unter Kaffee gemischt, kaum vom Kuhmilch=Rahm unterscheiden kann.

48) Der gute Heinrich (**Chenopodium bonus Henricus**) wächst fast an allen Wegen, Mauern und Schutthaufen und hat eine Fuchsschwanz= (oder Amaranthen=) artige Blumenähre, deren obere Enden herabwärts hängen und an welcher kleine grünliche Blümchen sitzen, die keine Blumenkrone, sondern blos einen fünfeckigen, fünfblättrigen Kelch haben, und einen linsenförmigen Saamen erzeugen. Die Blätter sind dreieckig oder pfeilförmig und werden nach oben immer kleiner. Die ganze Pflanze ist mit einem fettig anzufühlenden Staube überzogen und wird äußerlich, als kühlendes Mittel, empfohlen, die Blätter auch wohl als Gemüse (wie Spinat) genossen. Die ziemlich dicke, gelblichte Wurzel war sonst gegen die Schwindsucht der Schaafe im Gebrauch.

49) Der Ulmbaum oder Rüster (**Ulmus**), dieser gute, nutzbare, deutsche Baum trägt wohl unter allen Bäumen, die bei uns wachsen, zu allererst reife Früchte. Denn seine kleinen, in ausgebreitete Häute eingeschlossenen, fast wie die Wiesenpfenniglein, nur viel dünner gestalteten Saamen, fliegen schon am Ende des Frühlings aus. Wir haben bei uns vorzüglich zwei Arten: den Feldrüster (**U. campestris**), dessen doppelt=gesägte Blätter nach dem Stiel zu etwas ungleichseitig sind und von welcher der Korkrüster (**U. suberosa**) mit korkartig aufgesprungenen Aesten nur

Digitized by Google

eine Abart ist; dann den Flatterrüster, U. effusa, mit langgestielten Blüthen und mit Früchten, die am Rande „zottig gewimpert" sind.

50) Das Salzkraut (Salsola Kali), auch Sodakraut genannt, wächst mit seinem darniederliegenden Stengel und pfriemenförmigen, an der Spitze stehenden Blättern, an unsern Seeküsten und in der Nähe von Salzquellen. Es hat kleine, grünliche, unansehnliche Blümchen, die in den Winkeln der Blätter sitzen. Man gewinnt daraus Soda, zum Seifensieden und Glasmachen.

Nun gehören noch in diese Abtheilung der 5ten Klasse die Schirm- oder Doldenpflanzen, welche wir hier (von Nr. 49 bis 70) in fortlaufender Ordnung, wie eine zusammengehörige Familie beschreiben wollen. Bei ihnen allen stehen, wie die allgemeine Benennung sagt, die kleinen Blüthlein oben, wie ein flacher Teller oder wie ein Schirm beisammen (wie z. B. am Feldkümmel), und in jedem Blüthchen finden sich zwischen den 5 Staubfäden 2 Pistille oder Griffel. Die Frucht spaltet sich in 2 Saamen. Ein recht in die Augen fallendes Gewächs dieser Familie ist:

51) Der unächte Bärenklau oder das Heilkraut (Heracleum Spondylium). Dieses wächst auf feuchten Wiesen, in Gärten, Gebüschen und andern schattigen Lagen öfters fast mannshoch, hat einen dicken, gefurchten Stengel, gefiederte Blätter, eine dicke, ästige Wurzel, und Blätter und Stengel sind rauchhaarig. Die Blüthendolde hat weiße oder röthliche Blüthchen und die Randblümchen sind viel größer, als die inwendig in der Dolde stehenden. Die Früchte sind scheibenförmig. Die jungen Blätter und Stengel frißt das Vieh gern; inwendig in den jungen Stengeln ist ein zuckersüßes Mark, das die armen Kamtschadalen als Leckerbissen essen; die äußere grüne Rinde, so wie die Wurzel und die Früchte, führen eine große Schärfe bei sich.

52) Der Pastinak (Pastinaca sativa), der wegen seiner gewürzhaft süßen Wurzel auch in Gärten gezogen wird, hat kleine gelbliche Blüthchen mit

Digitized by Google

eingerollten Blättlein, die Dolde ist flach, die Saamen ebenfalls flach, am Rande häutig, die spitzzähnigen Blätter gefiedert. Die Blätter haben eine Schärfe in sich, weshalb sie selbst das Vieh nicht frißt.

53) Der Dill (**Anethum graveolens**), wird als Zuthat zu einigen Speisen benützt, hat aber etwas Betäubendes, Einschläferndes bei sich, so daß man mit dem destillirten Wasser desselben die Bettstellen der Kranken bespritzt, um ihnen Schlaf zu machen. Die Früchte sind zusammengedrückt, haben fadenförmige Riefchen, die Blumenblättlein sind abgestutzt, eingerollt. Hierzu gehört als Art der gemeine Fenchel (**A. Foeniculum**).

54) Der Haarstrang (**Peucedanum officinale**), welcher auf Wiesen wächst, hat ganz unten am Stengel, von der Wurzel heraus, einen Busch von Fasern. Die Wurzel ist mehrere Fuß lang, außen schwärzlich, innen weiß, hat einen üblen Geruch, und wenn man (besonders im Frühling oder Herbst) in dieselbe hineinschneidet, läuft ein schwefelgelber Saft heraus, der sich bald zu einem Harz verdichtet. Die Blätter sind doppelt gefiedert, die Blüthlein der Dolde sind gelblich, haben längliche Blättchen, nur die äußern Blüthen erzeugen den länglich eirunden, häutig eingefaßten, 5 gestreiften Saamen, die in der Mitte stehenden sind unfruchtbar. Zu den Doldengewächsen gehört ferner

55) Die Angelika (**Angelica Archangelica**), deren Früchtchen von flügelartig hervortretenden Reifchen umgeben, deren Blätter gefiedert sind, und welche angenehm gewürzhaft riechende Stengel und Wurzeln hat. Sie wächst selbst in Grönland und Lappland, und ist den dort wohnenden armen Menschen, die gar wenig Gewächse haben, eine wahre Erquickung und Leckerbissen, den sie oft mit großer Lebensgefahr auf den gähesten Felsen aufsuchen. Sie ist auch ein sehr vorzügliches Arzeneigewächs.

56) Die Silge (**Selinum palustre**), hat herzförmige, gleichgroße Blumenblättlein, flachgedrückten Saamen mit flügelhäutig hervorstehenden Reifchen,

Digitized by Google

3fach gefiederte Blätter und enthält einen milchigen, scharfen Saft. Die Lappländer kauen die Wurzel wie Ingwer.

57) Das Laserkraut, die weiße Hirschwurzel (**Laserpitium latifolium**), das auf Bergen und in Wäldern wächst, trägt eine convexe Dolde mit weißlichen Blüthchen, große, längliche Saamen mit hautflüglich hervorstehenden Nebenreifchen, am Stengel einfache, unten nach der Wurzel hin gefiederte Blätter. In ihren Kräften gleicht sie der Angelika.

58) Die Häftdolden (**Caucalis**), die mit ihren zierlich röthlichen Blüthchen in Aeckern wachsen, haben Saamen, deren Reifchen stachlich und borstig sind.

59) Die gelbe Rübe oder Möhre (**Daucus Carota**), die in unsern Wäldern wild wächst und von dort erst in die Gärten verpflanzt und da veredelt worden scheint, hat ebenfalls stachlich borstige Riefchen der Saamen, und eine wie ein Vogelnest ausgehöhlte Dolde.

60) Die Sterndolde (**Astrantia major** und **minor**), die im südlichen Deutschland in schattigen Wäldern vorkommt, trägt eine kleine Dolde, in welcher aber ziemlich große, zierliche weiße Blüthchen stehen, die eine schlauchige Frucht mit hohen, aufgeblasenen Reifen hinterlassen. Die Blättlein an den Stengeln der Dolden sind meist roth.

61) Der gemeine Schierling (**Conium maculatum**), mit einer dicklichen, von der Seite zusammengedrückten Frucht, ist zwar sehr giftig, es wird aber aus ihm ein heilsames Pflaster gemacht. Er wächst an Bachrändern, besonders gern bei Schneidemühlen, und überhaupt in der Nähe der Dörfer. Dagegen wächst

62) Die Hunds-Petersilie oder der Gartenschierling (**Aethusa Cynapium**) in Gärten, und ist der gemeinen Petersilie sehr ähnlich, nur hat sie spitzigere Blätter, eine eirund kugliche Frucht und verkehrt herzförmige Blumenblättchen mit einwärts gebogenen Lippchen. Der Gartenschierling ist sehr giftig.

63) Das Körbelkraut (**Scandix odorata**), das

Digitized by Google

man an Suppen nimmt, hat längliche, eirund pfriemenförmige, glatte Saamen und wird in Gärten gezogen.

64) Die Peterſilie (**Apium Petroselinum**), erzeugt eirunde geſtreifte Saamen; zu ihrem Geſchlecht gehört auch der Sellerie (**A. graveolens**).

65) Die ächte Pimpernell oder Steinbibernell (m. v. oben bei der 4ten Klaſſe Nr. 10.) (**Pimpinella saxifraga**), die an dürren Rändern und auf Sandboden wächſt, und die man leicht am gewürzhaften Geruch und Geſchmack ihrer Wurzel (welche ein gutes Arzeneimittel beim Halsweh abgiebt) und an den rundlichen, ſcharf gezähnten Wurzelblättern erkennt, trägt eine von der Seite her zuſammengezogene Frucht. Auch die Anispimpinelle (**P. Anisum**) wird bei uns angebaut, deren Saamen als Aniskörner eben ſo beliebt ſind, als die ganz runden:

66) des Corianders (**Coriandrum sativum**), deſſen Kraut gar unangenehm nach Wanzen riecht, während die Saamen ſo angenehm gewürzhaft ſchmekken und riechen.

67) Der Kümmel (**Carum Carvi**), hat eine längliche, von einer Seite ſtark zuſammengedrückte Frucht.

68 Der ſehr giftige Waſſerſchierling (**Cicuta virosa**), hat eine inwendig fächerartig abgetheilte Wurzel, an deren Genuß erſt noch vor wenig Jahren in Nürnberg ein Mann mit ſeiner Frau ſtarb. Denn der Mann hatte die Wurzel in der Pegnitz ſchwimmen ſehen, hielt ſie für Sellerie und ließ ſie ſich am Mittag an ſeine Klöſe kochen. Das kleine Kind, was die Leute hatten, ſtarb aber nicht, denn dem hatte die Waſſerſchierlingswurzel gar nicht ſchmecken wollen, es hatte daher nur wenig davon genoſſen. Der Waſſerſchierling trägt eine rundliche, von der Seite ſtark zuſammengedrückte, zweiknotige Frucht.

69) Der Kälberkropf, Kälberkern (**Chaerophyllum sylvestre**), wächſt oft in Obſtgärten, hat einen mehrere Fuß hohen Stengel, der an ſeinen gelenkartigen Knoten etwas röthlich und behaart iſt, die Blümlein ſind weiß, die Frucht iſt länglich, glatt

Digitized by Google

und wenn sie reif ist, ganz schwarz. Die Wurzel besitzt stark betäubende und berauschende Kräfte.

70) Der Klettenkerbel (**Anthriscus sylvestris**), zeichnet sich durch seine geschnabelten Früchte aus.

71) Das Hasenöhrchen (**Bupleurum**), trägt unzertheilte Blättlein an seinen gelben Blüthchen; die Frucht ist rundlich, zusammengedrückt und gestreift. Bei der einen Art ist der Stengel durch die rundlichen Blätter hindurchgewachsen. Diese heißt rundblättriges Hasenöhrchen (**B. roduntifolium**).

72) Der Geißfuß, die Gärsche, der Strenzel, (**Aegopodium Podagraria**), deren Blätter das Vieh sehr gerne frißt, wächst an Hecken und Mauern und wird, wegen ihrer kriechenden Wurzel, oft zum lästigen Unkraut. Die Blumenblättchen sind umgekehrt eirund, hohl an der Spitze eingebogen, die Saamen eirund länglich und gestreift. Die Blätter gleichen ein wenig den Angelikablättern.

C. Mit 3 Pistillen oder Staubwegen (**Trigynia.**)

73) Die Tamariske (**Tamarix**), wovon freilich die bei uns wachsende Art: die deutsche Tamariske (**T. germanica**) gewöhnlich zehn Staubfäden: fünf längere und fünf kürzere hat, wird dennoch auch von den Kräuterkundigen hieher gestellt. Es ist ein Strauch mit fast cypressenartigen, dicht beisammen stehenden Blättlein, der an Flußufern und überhaupt gern auf feuchtem und zugleich steinigem Boden wächst. Die Saamen sind mit Haarkronen versehen. Die balsamisch bittern Blätter nimmt man in Schweden zuweilen statt des Hopfens zum Bierbrauen. Aus den Zweigen einer andern Tamariskenart, die vorzüglich auf der Halbinsel des Sinai wächst und Manna-Tamariske heißt (**T. mannifera**), fließt in den heißen Monaten des Jahres, auf den Stich eines Insekts eine fast honigsüße, körnige Masse heraus, welche manche Gelehrte mit dem Manna vergleichen wollten, das die Israeliten in der Wüste ernährte.

74) Der Schneeballen-Baum (**Viburnum Opulus**). Von diesen giebt es draußen im Freien

Digitized by Google

eine wilde Art, woran rothe Beeren wachsen und wovon die gelblichweißen Blümchen am Rande der Blüthendolde ausgebreiteter als die andern und zugleich unfruchtbar sind. Die Art mit den schönen, in runden Ballen beisammenstehenden, unfruchtbaren, weißen Blüthchen wird in den Gärten gezogen.

75) Der Theehollunder (**Sambucus nigra**), auch Küchleins-Hollunder genannt, weil man in manchen Gegenden die Blüthenschirme mit einem Eierteig überzieht und bäckt, ist in seinen Blüthen und Beeren ein sehr wohlthätiges, schweistreibendes Arzneimittel. Viele kleine Vögel fressen seine Beeren sehr gern, unsere Haushühner werden aber krank davon und sterben wohl gar daran.

76) Die Pimpernuß (**Staphylea pinnata**), deren hellbraune Nüßchen in einer blasenartigen, grünen Kapsel sitzen, deren weißliche Blüthen, die fast den Mayenblüthchen gleichen, traubenartig beisammenhängen und deren Blätter gefiedert sind, bildet einen schönen Strauch, der in manchen unserer bergigen Gegenden wild wächst, übrigens auch in Gärten gezogen wird. Man benutzt die Stämmchen zu Pfeifenröhren.

D. Mit 4 Pistillen (Tetragynia).

77) Die Parnassia oder weiße Leberblume (**Parnassia palustris**), steht im Spätsommer und Herbst auf gar vielen feuchten Wiesen, besonders in gebirgigten Gegenden. Man sehe nur in diese Blume hinein, wie schön sie inwendig ausgeschmückt und geziert ist. Da stehen 5 gelbliche Strahlenbündel, davon jeder oben in 12 bis 16 Fädchen zertheilt ist, an deren Endchen sich ein gelbes, durchsichtiges, rundes Knöpflein zeigt, innerhalb der Blume; dann kommen die 5 Staubfäden, die sich einzeln nach dem Pistill hinneigen, das in ihrer Mitte wie ein kleiner weißlicher Berg steht. In Schweden braucht man die Pflanze, mit Bier gekocht, gegen Magenschmerzen.

E. Mit 5 Griffeln (Pentagynia).

78) Der Flachs (**Linum usitatissimum**), mit seinen schönen blauen Blümchen, ist wohl auch Jedem

Digitized by Google

bekannt. Das, was man eigentlich aus diesem Gewächs zu Fäden schlägt, und dann zur Leinwandbereitung gebraucht, sind die Längsgefäße, die oben im §. 16 erwähnt wurden, und die bei manchen Gewächsen gar sehr dauerhaft und zähe sind. Eine Art Flachs mit röthlichen, blaugeaderten Blumen, so wie mit klebrichten Blättern und Stengeln (**Linum viscosum**), wächst in unsren Gebirgsländern.

79) Der rundblättrige Sonnenthau (**Drosera rotundifolia**), wird von Manchem übersehen, der ihn mit Füßen tritt. Denn die kleinen weißen Blüthchen sehen nach nicht viel aus, und die wahrhaft schön ausgezierten gelblich grünen, rundlichen Blätter, an denen viele rothe Haare mit einem drüsigen Knöpfchen stehen, die meist (besonders des Morgens) an ihrer Spitze einen schönen durchsichtigen, etwas klebrichten Thautropfen hängen haben, liegen dicht an dem Boden. Man blicke aber nur an einem feuchten, moosigen Orte, in Wäldern oder Wiesen recht genau nieder, so wird man sie wohl zu sehen bekommen. In manchen Gegenden braucht man die Blätter zu Thee, der gegen Unordnungen im Blutumlauf gut sein soll.

§. 22. Die 6te Klasse (**Hexandria**), deren Blüthen 6 Staubfäden in sich tragen, enthält sehr schöne Blumen, von denen zwar nur wenige bei uns im Freien wachsen, mehrere aber in den Gärten gezogen werden. Es sind meistens solche, die mit den Lilienarten nahe verwandt sind oder gar zu ihnen gehören.

A. Mit 1 Pistill oder Griffel (Monogynia).

1) Die Pisang- und Bananenfeige (**Musa paradisiaca** und **M. sapientum**) welche man bei uns nur in Gewächshäusern sieht, gehören zu den besten, nahrhaftesten und darum nützlichsten Naturgaben der heißen Länder, sie sind deshalb aus ihrem wahrscheinlich ursprünglichen Vaterland Ostindien überall hin, wo das Klima für sie heiß genug ist, verpflanzt worden. Das Gewächs, das diese Früchte trägt ist von baumartiger Gestalt, kann mit dem Schopf seiner Blätter eine Höhe von 20 Fuß erreichen;

Digitized by Google

sein ziemlich dicker Stamm ist aber von so zarter Structur daß man ihn mit einem Schwert durchhauen kann. Seine länglich runden Blätter, die sich sehr schnell entwicklen, werden öfters bis gegen 10 Fuß lang, aus ihrer Mitte tritt der mehrere Fuß lange Kolben mit den traubenartig beisammenstehenden Blüthen hervor, aus denen sich die zahlreichen Früchte erzeugen die nicht auf einmal sondern nach einander (die untersten Reihen zuerst) zur Reife kommen. Diese Früchte sind von etwas dreieckiger Gestalt, länglich wie eine Gurke, werden einen halben Schuh groß und darüber, und sind schon in unreifem Zustand, wegen ihres wohlschmeckenden mehligen Inhaltes als Gebäck und geröstet genießbar. Bei der Reife werden sie weinartig saftig und lieblich süß. Ein einziger Kolben enthält so viele (bis über 100) Früchte, daß eine kleine Negerfamilie eine ganze Woche lang ihr Brodgebäck und ihr Gemüse davon hat, und mit Beihülfe einer kleinen Portion von Reis davon reichlich sich zu sättigen vermag.

2) Das Schneeglöckchen (**Galanthus nivalis**), auch Märzenblümchen genannt, hat fast Jeder, wenigstens in Gärten, gesehen. Ein schönes schneeweißes Blümchen, das außen 3 ganz weiße Blätter, inwendig aber ein kleines weißes, oben grün eingesäumtes, in 3 ausgezackte Stücke getheiltes Krönchen hat. Im südlicheren Europa, am Fuß der Gebirge wächst es von selber im Freien, und ist überall, wo es wächst, fast das erste Frühlingsblümchen, welches noch unter dem Schnee seine Knospen treibt.

3) Das Frühlingsweiß (**Leucoium vernum**), ist dem Schneeglöckchen wohl sehr ähnlich, so daß man es auch in Gärten das große Schneeglöckchen heißt, unterscheidet sich aber doch leicht. Denn es hat eine viel größere, glockenförmige, in 6 an ihren Spitzen etwas verdickte und da auch meistens grün gefärbte Blätter getheilte Blumenkrone. Es wächst auch schon in Ebenen und niedrigen Berggegenden an feuchten Orten, und blüht etwas später als das Schneeglöckchen.

Zwei Arten dieser Blumen giebt es noch, wovon die eine mitten im Sommer, die andere im Herbste blüht. Von bei-

Digitized by Google

den letztern kommt aber nur die Sommerart bei uns in Deutschland vor.

4) Die Narzisse (**Narcissus**), unterscheidet sich vorzüglich durch das kleine runde, oben etwas gefaltete Krönchen, welches mitten in ihrer 6blättrigen Blume steht, und das bei der weißen Narzisse oder dem Josephsstern, einen schönen rothen Saum hat. Diese weiße Narzisse (**N. poëticus**), die man fast in allen Gärten sehen kann, wächst in den wärmeren Ländern von Europa wild, bei uns findet man nur die gelbe (**N. pseudonarcissus**), von selber im Freien wachsend.

5) Die Zwiebel und der Knoblauch (**Allium Cepa** und **A. sativum**), mit Blüthchen, die schirmartig (in einer Dolde) beisammenstehen, kann sich Jeder von seiner Mutter zeigen lassen.

In Aegypten schmecken die Zwiebeln freilich besser als hier bei uns, gar nicht so scharf, sondern lieblich, fast wie Nußkern. Dort ißt man sie roh und gebraten und die Türken sind so sehr an diese Speise gewöhnt, daß sie sagen: sie möchten nicht einmal im Himmel seyn, wenn es dort keine Zwiebeln zu essen gäbe. Ich denke aber, wer einmal ordentlich in den Himmel käme, der würde dort gerne Zwiebeln und Knoblauch vergessen, und noch mehr dazu, und die Kinder Israel hätten sich in der Wüste auch nicht so ungeberdig gestellt, wegen der Zwiebeln und des Knoblauchs, wenn sie verstanden hätten, sich in ihrem Gott zu freuen.

Vor einigen Jahren entdeckte man einmal in der ganz zusammengetrockneten Hand einer ägyptischen Mumie eine ganz verdorrte, kaum mehr erkennbare Zwiebel. Da machte man mit dieser den Versuch, feuchtete sie an und bemerkte in Kurzem, daß sie anfing, ein wenig auszukeimen. Man brachte sie nun in den Boden und siehe, die Zwiebel, die doch gewiß seit länger als 2000 Jahren mit dem Menschenleichnam begraben und verdorrt war, lebte wieder auf, grünte und schlug aus. Solche Auferstehungskräfte hat Gott in den armseligen Leib einer ägyptischen Zwiebel gelegt; sollte er sie in andere Leiber, die schon bei ihrem Leben viel reicher sind an Wundern als die Zwiebel, nicht auch haben legen können?

6) Die weiße Lilie (**Lilium candidum**), ist freilich vor allen meine Lieblingsblume, und scheint mir die schönste in der Welt, weil auch jemand Anders auf die Lilien auf dem Felde, als auf das herrlichst Bekleidete, hingewiesen hat. Sie wächst ursprünglich in den Gebirgen und Thälern des gelobten Landes

Digitized by Google

und Arabiens wild, ist aber wenigstens seit den Zeiten der Kreuzfahrer nach Europa in die Gärten gekommen. Alle ihre Theile sind heilsam, stillen Schmerzen und Entzündungen, heilen Geschwülste und Geschwüre, auch soll der Saft der Zwiebeln, mit Brodteig gemischt, Wassersüchtige geheilt haben. Aus den gebratenen Zwiebeln kann man ein nahrhaftes Mus bereiten. Denn überhaupt enthalten die Wurzeln aller Lilienarten viel Nährendes, so z. B.

a) Die Türkenbundlilie (**Lilium Martagon**), die so viele, fast kupferrothe, angenehm duftende Blumen, mit zurückgestülpten Blumenblättern, und eine schöne, citrongelbe schuppige Zwiebel hat. Sie wächst in unsern Gebirgen, in Wäldern wild. Ihr ist nahe verwandt:

b) die Kamtschatkalilie (**L. camtschatkense**), deren Zwiebel nächst den Fischen das Hauptnahrungsmittel der Bewohner von Kamtschatka ist. Da erzählt nun ein Naturforscher, Namens Steller, der ziemlich lange dort war, daß es immer in solchen Jahren, wo diese Zwiebel nicht gut gerathen sey, rechten Ueberfluß an Fischen gäbe, und jedesmal, wenn ein schlechtes Jahr für den Fischfang sey, wüchsen die Zwiebeln in ungemeiner Menge. So hat Der, der selbst das Schreien der jungen Raben hört um Speise, immer dafür gesorgt, daß die armen Menschen etwas zu essen haben.

7) Die Tulpe (**Tulipa Gesneriana**), mit dreieckigem Fruchtknoten, an welchem oben drei rückwärts gebogene Narben sind, zeigt in unsern Gärten viele schöne Farben, und war sonst eine solche Lieblingsblume der Reichen, daß im Jahr 1635 einmal eine Zwiebel von einer vorzüglich schönen Tulpenart für 5000 fl. verkauft wurde, eine andere für 2000 fl.

8) Die Kaiserkrone (**Fritillaria imperialis**) hat an ihrem schmucken Stengel, oben, in der Nähe der Blüthen, einen Strauß von aufrecht stehenden Blättern, und gleicht hierinnen fast einer kleinen Palme. Am Gipfel des Stengels kommen die glockenartigen, meist bräunlichen, glänzend geaderten Blüthen hervor, die nach unten hängen, und inwendig, an ihren Blumenblättern, 6 zierliche Honigbehältnisse haben. Die Kaiserkrone wächst ursprünglich in Persien, gehört aber nun schon längst zu unsern schönsten Gartenblumen.

9) Die Meerzwiebel (**Scilla maritima**) ist bei uns nicht einheimisch, sondern wächst ursprünglich

Digitized by Google

an wärmeren Seeküsten, hat weiße, in langen Trauben beisammenstehende Blumen und eine 2 Fäuste große, meist bräunliche Zwiebel. Uebrigens gleicht die Blüthe an Gestalt der bei uns hie und da wachsenden zweiblättrigen Meerzwiebel (**Sc. bifolia**), mit schönen blauen, flach ausgebreiteten Blümchen, deren 6 Blättlein an dem untern Ende, womit sie angewachsen sind, grün erscheinen.

Die alten Aegyptier hielten so viel von den Heilkräften der auch in unsern Apotheken noch sehr geschätzten Meerzwiebel, daß sie ihr (statt dem Gott, der sie ihnen gab) Tempel bauten, und sie selber wie eine Gottheit ehrten.

10) Wenn man im Frühling die vielen gelben Blümchen, die es dann auf den Wiesen giebt, genauer ansieht, wird man auch eines darunter finden, das einer kleinen Lilie ähnlich ist, drei breitere und drei schmälere Staubfäden und grasartig-schmale Blätter hat. Dieß ist die gelbe Vogelmilch (**Ornithogalum luteum**). Es giebt auch eine schmutzig (grünlich weiße Art (**O. umbellatum**).

11) Der Neuseeländische Flachs (**Phormium tenax**), welcher durch seine schwertförmigen, an ihren Rändern wie auf der Rückenschärfe rothfarbigen Blätter den Schwertlilien gleicht, und dessen zierliche, gelbe oder rothe Blüthen 6 Blätter haben, davon die 3 inneren länger sind als die äußern, ist ein gar nützliches Gewächs. Die Neuseeländer bereiten nämlich aus den Fasern seiner schwertförmigen Blätter, die man so behandelt wie bei uns den Flachs oder Hanf, sehr haltbare und feine Gewebe. Auch für manche unsere mitteleuropäischen Länder, in denen dieses Gewächs gedeihen würde, ist der Anbau desselben sehr wünschenswerth. Es bedarf aber zu seinem Gedeihen der feuchten Standorte, namentlich an solchen Seeküsten, wo der Winter sehr gelind ist.

12) Die Amaryllis (**Amaryllis formosissima**) mit ihrer herrlich rothen, wie mit Goldfädchen durchzogenen Blüthe, deren 6 Blätter etwas ungleich und nach unten gebogen sind und deren Pistill-Narbe dreispaltig ist, sieht man oft in Zimmern und Gewächshäusern. Ihr Vaterland ist Westindien.

Digitized by Google

Zu dieser Gattung gehört auch die Riesenzwiebel (Amaryllis gigantea). Mit Recht so genannt, denn die sehr große, einen giftig scharfen Saft enthaltende, frei über die Erde herausstehende Zwiebel fällt, wenn man sie zum ersten Male in einem Gewächshaus sieht, riesenhaft ins Auge.

13) **Asparagus officinalis**, der allbekannte Spargel, mit büschelartig (je 6 bis 12) beisammenstehenden, fadenförmigen Blättern und kleinen grünlich gelben Blüthen, deren 3 innere Blumenblättlein an der Spitze zurückgebogen sind und deren Frucht eine Beere ist, gehört auch daher, so wie

14) Das schöne wohlriechende weiße Mayenglöckchen oder Mayenblümchen (**Convallaria majalis**), das auch Zauken heißt, dann

15) Die Garten-Hyazinthe (**Hyacinthus orientalis**), die Jeder kennt.

16) Die Zaunlilie (**Anthericum Liliago**) gleicht einer kleinen weißen Lilie. Der zarte Schaft ist gegen eine Elle hoch, oben stehen (meist 10) Lilienblümchen, mit nach unten gebogenem Pistill. Die 3 innern Blumenblätter sind ganz weiß, die 3 äußern etwas schmälern, mit einem grünen Streifen bezeichnet. Bei einer andern Art theilt sich der Schaft oben in Aeste, sie heißt deshalb ästige Zaunlilie (**A. ramosum**).

17) Der Teichcalamus (**Acorus Calamus**), den man wenigstens beim Zerreiben schon durch den Geruch erkennen kann, und dessen kleine sechsblätterige Blümchen an einer Kolbe beisammen sitzen, ist auch als gutes Hausmittel zur Stärkung des Magens und zur Verfertigung des Calamusbranntweins überall bekannt.

18) Eine Art von Pflanzen, die auch Calamus heißt, der Rotang-Calamus (**Calamus Rotang**), wächst wohl am höchsten unter allen Pflanzen in der Welt. Denn sie findet sich in den ostindischen Morästen zuweilen mehrere hundert Fuß hoch, ja doppelt so hoch als mancher hochgeachteter Thurm bei uns zu Lande. Dabei ist der Stamm kaum 1 Zoll dick.

Theile von dieser merkwürdigen Pflanze hat schon Mancher in den Händen gehabt, ohne es vielleicht zu wissen,

Digitized by Google

Denn aus dem Stamme werden die meisten sogenannten spanischen Röhre gemacht; die Wurzeln geben knotige Spazierstöcke. Auch kommt aus dem rothen Safte dieser oder einer nahe verwandten Art vom ostindischen Calamus, eine Art von Drachenblut, während eine andere Art dieses beim Lackiren und Malen, so wie zur Stärkung des Zahnfleisches gebräuchlichen Harzes herkommt, von dem:

19) Drachenbaum (**Dracaena Draco**), dessen Blüthen fast denen des Mayenblümchens gleichen, und der auch in Ostindien wächst. Der rothe Saft fließt heraus, wenn man den glatten, fast wie ein Schlangenkörper aussehenden Stamm ritzt. Der Drachenbaum kann sehr alt werden. Denn so war der berühmte Drachenbaum im Garten zu Orotawa auf Teneriffa, der im Umfange gegen 46 Fuß misset, und über 70 Fuß hoch ist, schon im Jahr 1496, als Teneriffa erobert wurde, als ein mächtiger Baum von hohem Alter den Eroberern aufgefallen. Eben so wie aus dem Drachenbaum fließt auch aus der

20) Aloë (**Aloë**), deren meiste Arten in Afrika und Arabien wachsen, ein bitterer Saft heraus, der ein treffliches Arzneimittel giebt. Die Aloëpflanzen haben sehr fleischige, saftige Blätter. Sie wachsen ursprünglich meist auf trockenem, steinigtem Boden.

21) Die Simse (**Juncus**), ist ein Gras, das mehrere Arten hat, bei denen man aber überall in den regelmäßigen kleinen Blüthen die 6 Staubfäden deutlich zählen und unterscheiden, und dadurch dieses Gras vor allen andern Grasarten heraus kennen kann.

Namentlich die eine Art, die große Knopfsimse (J. **conglomeratus**), wächst häufig in Sümpfen, und ihr weicher innerer Kern (Mark) wird öfter noch als jener der Binse (S. 128) zu Dochten für Nachtlampen u. s. benutzt.

22) Das Bambusrohr (**Bambusa arundinacea**), wovon die gegliederten Bambusrohre und von deren dünneren Zweigen die Rohrstiele in den Regenschirmen kommen, findet sich in Ostindien. Es wächst außerordentlich schnell, so lange es noch jung ist, und hat dann auch viel Zuckersaft in sich. Die Blüthen stehen an blattlosen Zweigen.

23) Der Berberisstrauch (**Berberis vulgaris**), mit gelben, süß und gleichsam nach Schmalz

Digitized by Google

riechenden, in Träublein beisammenstehenden Blüthen und langen, rothen, saueren Beeren, die man statt der Citronen brauchen kann, hat gelbes Holz, und giebt, besonders aus der Wurzel, eine gelbe Farbe, mit der man unter andern auch, weil sie ganz unschädlich ist, die hölzernen Spielwaaren der Kinder gelb färbt. Auch die Blätter schmecken säuerlich, und sind dem Zahnfleisch gesund.

24) Zu dieser Abtheilung der 6ten Klasse gehört auch noch der Breiapfelbaum (**Achras Sapota**), der im wärmeren Amerika wächst und dessen große, bald rundlich, bald länglich gestaltete, mit einer braunen, weichen Schaale bedeckte Frucht, wenn sie taig ist, ein sehr wohlschmeckendes, saftvolles Fleisch enthält. So süß aber auch dieses von Geschmack ist, haben dennoch die darin liegenden schwarzen Kerne eine große Bitterkeit. Man nennt diesen Baum auch den amerikanischen Mispelbaum.

B. Mit 2 Griffeln (**Digynia**).

25) Der Reis (**Oryza sativa**), eine Gras- oder Getreideart mit einem einblumigen, aus 2 Bälglein zusammengesetzten Kelch und einer 2spelzigen, an dem Saamen angewachsenen Krone, wird nur in wärmern Ländern auf Feldern gebaut, die sehr feucht stehen müssen. Er ist das Hauptnahrungsmittel von vielen Völkern in Asien und auch für die Bewohner unseres Welttheiles höchst schätzbar.

C. Mit 3 Pistillen.

26) Der Sauerampfer (**Rumex acetosa**), hat auch Blüthchen mit 6 Staubfäden. Eine Art von Ampfer, der krause Ampfer (**R. crispus**), der auch Wallwurz, und Halbgaul heißt, ist ein gutes Wundmittel.

27) Die Herbstzeitlose (**Colchicum autumnale**), sieht schön fleischroth aus und einer kleinen Lilie mit recht langem Halse gleich. Kommt in den wärmeren Gegenden von Deutschland, im Herbste, wenn alles Gras abgemäht ist, zu vielen Tausenden und ohne Blätter aus der Erde, und welkt dann, ohne daß man Früchte zu sehen bekommt, so daß man

Digitized by Google

glauben möchte, es sey Alles dahin. Aber im nächsten Frühling kommen die Blätter und Saamenkapseln, die sich den Winter über tief in der warmen Erde entwickelt haben, hervor. Sie haben wohl eine Schärfe bei sich, können aber fast zu einem eben so nützlichen Heilmittel werden, als die Meerzwiebel. Ein Aufguß von Wein auf die Zwiebel hilft auch gegen Zahnweh.

28) Die grasartige Zaunlilie (**Tofielda calyculata** oder **palustris**), hat allerdings an ihren kleinen, gelblichen Blüthchen einige Aehnlichkeit mit der unter 16 beschriebenen Zaunlilie. Die 6 Blumenblättlein umschließt ein dreilappiger Kelch, die Blüthen stehen traubenartig beisammen. Die gelblich grünen Blätter haben im Kleinen Aehnlichkeit mit den Blättern der Schwertlilien.

29) Die Sumpfscheuchzeria (**Scheuchzeria palustris**), trägt ein kleines tief-sechstheiliges, grünlich gelbes Blüthchen, dreiblasig aufgetriebene Fruchtkapseln und linienförmig schmale, nach unten den Stengel rinnenartig umfassende Blätter. Sie wächst in Sümpfen.

D. Mit vielen Staubwegen, Polygynia.

30) Der Froschlöffel (**Alisma Plantago**) zeigt sich mit seinem quirlartig ästigen, aufrechten Schafte, an welchem die kleinen röthlich weißen (innen gelben) Blüthlein mit 3 Kelch- und 3 Blumenblättern quirlartig beisammenstehen, öfters in und an unsern Sümpfen und langsam fließenden Wassern. Die Blätter sind eirund oder lanzettförmig. Man hält dieses Gewächs in Rußland für heilsam gegen die Folgen des tollen Hundsbisses.

§. 23. In die 7te Klasse (**Heptandria**), also unter die Blumen mit 7 Staubfäden, gehören überhaupt sehr wenige Pflanzen. Bei uns nur:

1) Das Dreifaltigkeitsblümchen (**Trientalis europaea**), das so heißt, weil es ohngefähr um die Zeit des Dreifaltigkeitsfestes blüht. Wer dieses in Deutschland gar nicht überall wachsende, schöne weiße Blümchen, das kaum eine Querhand hoch wächst und so groß ist wie ein Sechs-Kreuzerstück, im nörd-

Digitized by Google

lichen Deutschland oder im Fichtelgebirge und nahe bei Baireuth oder Thurnau im Walde und im Freien stehen sieht, dem fällt es gewiß so auf, daß er es abpflückt. Denn es sieht aus, wie ein schöner, regelmäßiger, weißer Stern. Betrachtet man es genauer, so zählt man daran 7 Kelchblättlein, eine in 7 Theile gesonderte Blumenkrone, 7 Staubfäden. In die 7te Klasse gehört auch:

2) Die Roßkastanie (**Aesculus Hippocastanum**) mit ihren weiß, roth und gelb gemalten Straußblumen und 5 getheilten Blättern, deren Stiel wie ein Pferdefuß aussieht, so wie mit den meist stachlichen Früchten, in denen die schönen braunen Roßkastanien liegen, die freilich fast den ordentlichen Kastanien ähnlich sehen, (nur die Spitze fehlt ihnen) aber widrig bitter schmecken und daher nur dem Vieh genießbar sind. Dieser schöne Allee- und Waldbaum (man pflanzt ihn, den Hirschen und Schweinen zu Gefallen, die seine Nüsse gar gerne fressen, auch in Wälder) ist vor etlichen hundert Jahren aus dem Morgenlande zu uns gekommen. Das Holz ist weich wie Lindenholz. Die Rinde hat fast ähnliche Kräfte als die Chinarinde (nach S. 149), und giebt beim Verbrennen eine sehr gute Potasche.

§. 24. Die Pflanzen der 8ten Klasse (**Octandria**) haben eigentlich 8 Staubfäden in ihrer Blumenkrone. Aber:

1) Bei der Schwarzbeere oder Heidelbeere (**Vaccinium Myrtillus**), welche nicht blos uns, sondern selbst den Eskimo's und Grönländern einen erquickenden Genuß gewährt, sieht man in dem schönen röthlich weißen Blüthenglöckchen öfters statt 8 auch 10 Staubfäden stehen, eben so in

Der Preiselbeere (Vacc. vitis idaea), welche weiße Blüthentrauben und rothe Beeren hat, die manche Leute einmachen und essen. Freilich giebt sie kein so wohlschmeckendes Gericht, als die Schwarzbeere, die, wenn sie besonders an der Sonne getrocknet wird, sehr gesund und gegen Durchfall sehr heilsam ist, doch gilt auch die Preiselbeere mit Recht für ein gesundes, magenstärkendes Mittel. Noch andere Arten von **Vaccinium** sind:

Digitized by Google

Die Moosbeere (V. Oxycoccos), deren große, rothe oder gelb und roth getüpfelte Beeren an ganz fadendünnen Stielchen hängen, an feuchten Orten auf der Erde aufliegend vorkommen, und wegen ihrer Säure von den Goldschmieden zum Weißkochen des Silbers benutzt werden.

Die Sumpfbeere (V. uliginosum), eine große, bläulichschwarze Beere, die der Heidelbeere sehr ähnlich ist, aber etwas betäuben soll beim Genuß. Sie wächst in Sümpfen und hat keine solche gezähnte Blätter wie die Heidelbeere, sondern glatträndige, ungezähnte.

2) Die gelbe Rapunzelblume, oder Nachtkerze (Oenothera biennis), hat einen oben 4 getheilten röhrigen Kelch und schöne gelbe Blumen, welche sich gegen Abend öffnen und angenehm duften. Sie wächst an Gräben und andern feuchten Orten, und ist ursprünglich aus Amerika zu uns gekommen. Die rübenartige Wurzel wird gegessen.

3) Der Weiderich (Epilobium), mit schöner, rother, vierblättriger Blumenkrone und einer schotenartigen Saamenkapsel, in welcher Saamen sind, die eine große Haarkrone haben, welche versponnen werden kann, gehört auch hieher. Eben so

4) Die Blumenkresse, oder die Capuzinerblume (Tropaeolum minus und majus). Diese ist aus Amerika zu uns gekommen; sie hat einen Stengel, der sich gern an andren Körpern hinanrankt, und fast scheibenrunde mit ihrer Mitte auf dem Stiele aufsitzende Blätter; ihre Blumen, die man als Salat verspeisen kann, sind orangengelb mit rothen Streifen, haben nach hinten einen Sporn und 5 Blumenblättchen, davon die 3 untern an ihrem spitzigen Ende gefranzt sind. Bei Abend bemerkt man an dieser Blume zuweilen kleine Lichtblitze.

5) Der Seidelbast (Daphne Mezereum), auch Kellerhals genannt, hat eine gar wohlriechende rothe, oben 4 gespaltene, trichterförmige Blume und ist ein Strauchgewächs das schon im März blüht. Die Rinde enthält einen so scharfen Saft, daß sie auf der Haut starke Blasen zieht, und der Saft der Beeren ist eben so scharf.

6) Das gemeine Haidekraut (Erica vulgaris), mit seinen rosenrothen Blüthchen, und dicht an

Digitized by Google

einander gedrängten ungestielten Blättchen, die am Stengel herauf 4 Reihen bilden, findet sich durch ganz Deutschland häufig in Wäldern und auf Haiden, dient dem Vieh zur Streue, den Schaafen in manchen weidearmen Ländern zum Futter, und gewährt den Bienen reiche Nahrung in seinen Blüthen, daher auch da, wo viel Haidekraut wächst, die meiste Bienenzucht und der beste Honig ist.

Von dem Saamen nährt sich im Winter mancher kleine Vogel, und man sagt, daß in solchen Jahren, wo ein recht strenger Winter eintritt, das Haidekraut vorher immer ganz ungewöhnlich häufig blühe und Saamen ansetze. So wird auch für die kleinen Vögel schon im voraus, noch ehe der strenge Winter kommt, die nöthige Nahrung besorgt, und in unseres Gottes großem Haushalten wird nicht einmal ein Thierlein übersehen und vergessen, geschweige ein Mensch.

Alle die hier, von 1 bis 6, erwähnten Pflanzen sind solche, welche nur 1 Pistill haben (**Monogynia**) und nach der Beschaffenheit eines großen Theils seiner Blüthen könnte man hieher auch den unter der 23ten Klasse beschriebenen Ahornbaum zählen. Dagegen gehört:

B. in die Abtheilung mit 2 Griffeln (**Digynia**)

7) Die Möhringia (**Mochringia muscosa**); ein kleines, unansehnliches Pflänzchen, das in hohen Gebirgsgegenden unter dem feuchten Moos an alten Bäumen und Felsen wächst. Die Blättlein sind fast haarförmig, die weißen Blümchen haben 4 Blumenblätter sowie einen vierblättrigen Kelch.

C. 3 Pistille oder Griffel hat

8) Das Haidekorn (**Polygonum Fagopyrum**), mit schönen rothen Blüthen und Pfeilblättern. Es ist unter dem Namen Buchweizen überall bekannt, und seine mehlichen Saamen werden als Grütze bereitet und verspeist.

4 Griffel hat:

9) Die Einbeere (**Paris quadrifolia**), die in schattigen Wäldern wächst, am Stengel mit 4 Blättern, und eben so am Kelch und an der Krone mit 4 schmalen Blättlein. Die schwarze Beere ist etwas giftig.

§. 25. Von den Kräutern mit 9 Staub-

Digitized by Google

fäden (**Enneandria**) in der Blume, haben wir nur ein einziges bei uns einheimisch, das ist:

1) Der schöne Wasserliesch oder die Blumenbinse (**Butomus umbellatus**), mit röthlichen, in einem Schirm beisammenstehenden Blumen, an denen sich 6 Blumenblätter finden. Der Schaft oder Stengel der Blumenbinse wird oft über eine Elle hoch. Sie wächst im Wasser.

Es gehören in diese Klasse auch

2) Die Arten des Lorbeerbaumes (**Laurus**) nämlich:

a) Der Zimmetbaum (**Laurus Cinnamomum**), von dessen Rinde der ächte feine Zimmet kommt, wächst, besonders auf der heißen Insel Ceylon, überall in den Wäldern, und sein Stamm wird wohl ¾ Ellen dick und 12 bis 15 Ellen hoch. Das ist ein gar sonderbarer Baum, der sein Köstliches recht verborgen in sich trägt. Denn gerade das, was andere Bäume zu ihrer Empfehlung öffentlich zur Schau tragen: die Blüthe, ist klein, und riecht widerlich, die Früchte sind auch nur für die Vögel genießbar und die äußere Rinde des Baumes ist grau und fast ganz geschmack- und geruchlos. Zieht man aber diese herunter, dann kommt eine zweite Rinde, die etwas scharf, jedoch nicht zimmtartig schmeckt und erst unter dieser Rinde liegt die feine dritte, welche den Zimmet giebt. Auch das Holz der Wurzel enthält einen sehr guten Campher. Um das Anpflanzen dieses kostbaren Baumes brauchen sich die Leute auf Ceylon fast gar nicht zu bekümmern. Denn sobald seine Früchte (kleine Pfläumchen) reifen, was jährlich 2 mal geschieht, werden dieselben von einer Art von Krähen und von wilden Tauben aufgefressen und wo diese dann den unverdauten, harten Kern auf dem natürlichen Wege von sich geben, schlägt derselbe in dem warmen Boden, wohin er den nöthigen Dünger gleich mitbringt, gar bald Wurzel, und es geht da ein neues Bäumchen auf, was nach wenig Jahren schon guten Zimmet giebt. Ferner gehört hieher

b) Der Cassienbaum (**L. Cassia**), dessen innere Rinde auch eine Art Zimmet liefert, die aber gröber und schlechter ist, als der ächte. Die Fruchtansätze unten an der Blüthe dieses Baumes, und wohl auch die an der Blüthe des eigentlichen Zimmetbaumes, liefern durchs Trocknen die Zimmtnäglein oder sogenannten Zimmtblüthen.

c) Der Campherbaum (**L. Camphora**), wächst in Japan so groß wie ein mittelmäßiger Lindenbaum. Aus seinem Stamme, Zweigen, Blättern, vorzüglich aber aus den Wurzeln destilliren die Bauern in Japan den sogenann-

Digitized by Google

ten rohen Campher, der dann bei uns in Europa erst gereinigt wird.

d) Der gemeine Lorbeerbaum (L. nobilis), kam ursprünglich aus Asien, wächst aber jetzt auch in Italien, Frankreich und Südtyrol im Freien.

e) Auch das Sassafras- oder Fenchelholz, kommt von einer Art von Lorbeerbaum, die im wärmern Nordamerika wächst, dem **Laurus Sassafras.**

3) Der Avogatobaum (**Persea gratissima**), war früher auch als **Laurus Persea** zu dem Geschlecht des Lorbeers gezählt, von welchem er sich aber durch die Beschaffenheit der Blüthe und der Frucht unterscheidet. Diese letztere, die Frucht gleicht an Gestalt einer mächtig großen dunkelfarbigen Birne, in deren grünlichem fast butterweichen Fleische ein Kern liegt, welcher größer als eine Wallnuß ist. Das zarte Fleisch der Frucht hat zwar keinen ausgezeichneten weder süßen noch sauren Geschmack, ist aber sehr nahrhaft und annehmlich für den Magen, so daß es von Menschen und Thieren (selbst Hunden) sehr gern genossen wird. Der Avogatobaum ist ursprünglich in Westindien zu Hause, ist aber von da nach Ostindien und Afrika, so wie in einige der wärmsten Gegenden von Europa verpflanzt worden, wo er indeß nur an wenig Orten z. B. bei Valencia reife Früchte trägt. Man zieht ihn aus seinen frischen Kernen.

In diese Klasse gehört auch noch:

4) Der Gartenrhabarber (**Rheum**), der ursprünglich in Gebirgsgegenden von Asien zu Hause ist, jetzt aber vielfältig in unsern Gärten angebaut wird. Seine Wurzel wird zum Gelbfärben und als Purgirmittel gebraucht.

5) Der Nierenbaum (**Anacardium**), mit einer nierenförmigen Nuß auf dem fleischigen apfelförmigen Fruchtboden, der voll wohlschmeckenden Saftes ist, wird wohl auch zur 9ten Klasse gezählt, weil unter den 10 Staubfäden seiner Blüthe eine ist, an der sich keine Spur des Staubbeutels zeigt. Dieser ansehnliche Baum wächst in 2 Arten in Ost- und Westindien; die Nuß, deren Kern sehr gern roh und geröstet genossen wird, ist von einer Schaale umgeben

Digitized by Google

in der sich eine Fülle von scharfschmeckenden ätherischem Oel befindet. Dem Kern schreibt man eine kräftige Einwirkung auf Gehirn und Nerven zu.

§. 26. In der zehnten Klasse (**Decandria**) stehen solche Blumen, welche 10 Staubfäden und auch meistens eine Blumenkrone oder Kelch haben, die in 1 oder 2mal 5 Lappen oder Blätter getheilt sind.

A. Mit einem Griffel oder Pistill (**Monogynia**).

1) Der Sennesblätterstrauch (**Cassia Senna**), von dem die purgirenden Sennesblätter kommen, wächst in Aegypten und Arabien, wird aber auch in den heißeren Ländern von Europa gezogen. Er hat gelbe Blüthen, deren Staubbeutel von sehr ungleicher Gestalt und Größe sind. Denn die 3 oberen sind sehr klein und haben fast gar keinen Blüthenstaub in sich, die 3 unteren sind viel größer als die andern, und haben einen Schnabelansatz, der in den 4 mittleren, die zu beiden Seiten stehen, fehlt.

2) Der Fernambuck-Baum (**Caesalpinia echinata**), von dem das schön roth färbende Fernambukholz und daraus die rothe Tinte kommt, wächst als ein 10 bis 12 Ellen hoher, überall stachlicher Baum, in Südamerika. Er hat weiß und gelb gesprenkelte, wohlriechende Blüthen mit filzigrauhen Kelchen. Zu dieser Baumgattung gehört auch noch eine andere Art: Das Brasilienholz (**C. Sapan**), womit gleichfalls gefärbt wird.

3) Der Guajacbaum (**Guajacum officinale**), wächst im heißen Amerika als ein Baum, fast so stark und groß als eine Eiche. Davon kommt das Quajac-Holz und das Quajac-Harz, die beide als Arzeneimittel gebraucht werden.

4) Der Diptam (**Dictamnus albus**), auch Fraxinella genannt, wächst schon in manchen wärmern Gegenden von Deutschland, noch mehr aber in Italien, in der Schweiz u. s. w. in Wäldern und auf Gebirgen, bei uns aber wird er häufig in den Gärten gezogen. Er wird wohl 1½ Ellen hoch und bringt im Juni oder Juli schöne große Blüthen, die in einer

Digitized by Google

aufrechten Traube beisammenstehen, und einen rothen 5blättrigen Kelch, sowie 5 Blumenblätter haben, welche meist auf hellem Grunde dunkelroth gestreift, zuweilen aber auch ganz weiß sind, und deren beide obere etwas näher an einander stehen, als die andern drei. Der Kelch, die Blumenstiele und der obere Theil des Stengels haben rothe, klebrichte Haare, 3 bis 4 Paar Blättlein stehen an einem gemeinschaftlichen Blattstiel einander gegenüber und am Ende noch eins allein (man nennt dieß ein gefiedertes Blatt mit einem Endblättchen.)

Die ganze Pflanze riecht recht angenehm nach Citronen. Wenn sie blüht und man kommt ihr in einer warmen Sommernacht mit einem brennenden Lichte oder Holzspahn zu nahe, dann entzündet sich auf einmal die Luft um die Pflanze her, besonders wenn man zugleich am Stengel ein wenig schüttelt. Doch gelingt der Versuch nicht immer. Die lange Wurzel wird als Arznei gegen Faulfieber, Krämpfe, Würmer, ehedem sogar gegen die Pest anempfohlen.

5) Das Campecheholz, kommt von einem dornichten Baume, dem **Haematoxylon campechianum**, der in Mexico und überhaupt in den wärmern Theilen von Amerika wächst: dem Blauholz-Baum. Die Stücklein, die wir zum Färben brauchen, sind nur der innere Kern des Stammes. Eben so wächst auch in den wärmern Ländern von Amerika:

6) Der Mahagonybaum (**Swietenia Mahagony**), welcher das bekannte treffliche Mahagony-Holz giebt, und

7) Der Quassienbaum (**Quassia excelsa**), ein schöner, wohl hundert Fuß hoher Baum, unsrer Edelesche ähnlich, von welchem das bittere Quassienholz kommt, welches, so wie die Rinde, ein wirksames Arzeneimittel abgiebt.

8) Zu dieser Abtheilung der Gewächse zählt man auch noch den Storaxbaum (**Styrax officinale**), obgleich er öfters in seiner schönen, weißen, angenehm duftenden, trichterförmigen Blumenkrone 12 Staubfäden hat. Der Storaxbaum, dessen Harz, welches nach gemachten Einschnitten oder Insektenstichen ausfließt, den bekannten Storax liefert, wächst in Palästina

und mehreren andern Ländern von Asien, so wie im wärmeren Europa. Seine einfächrige Steinfrucht enthält 2 harte Kerne.

9) Der Azedarachbaum (**Melia Axedarach**), der durch seine hohe Gestalt und seine (doppelt) gefiederten Blätter an unsere Edelesche erinnert, wächst ebenfalls im Morgenlande wie im südlichen Europa. Seine kleinen, blauen oder lilafarbenen Blüthchen, die in Büscheln beisammen stehen, haben einen 5 gezähnten Kelch, 5 Blumenblättlein und ein cylindrisches Nectarium; die gelbliche Steinfrucht enthält scharfe, schädliche Säfte; ihr Kern, mit 5 tiefen Furchen, wird zu Rosenkränzen benutzt; ein Aufguß der Blätter wurde sonst gegen die Pest und gegen die Wirkungen des Schlangenbisses empfohlen.

Alle diese Pflanzenarten, den Diptam ausgenommen, bekommt man bei uns so leicht nicht im frischen Zustande zu sehen, desto leichter aber

10) Den Fichtenspargel (**Monotropa Hypopithys**) mit schmutzig gelblich weißem, schuppigen Stengel, an welchem etwa 9 Blüthlein von derselben Farbe stehen, davon eigentlich nur das oberste 10 Staubfäden und eine zehnblättrige Blume hat, die andern aber achttheilig sind. Die knollige Wurzel sitzt tief unten an einer Baumwurzel oder einem alten Stock fest, woraus sie ihre Nahrung saugt. Man findet den Fichtenspargel in Wäldern, besonders häufig aber in dichtschattigen Fichtenwäldern.

11) Das Wintergrün, der Waldmangold (**Pyrola**), hat, wie schon der Name sagt, auch im Winter, unter dem Schnee, frische, grünende Blätter. Die angenehm, fast wie Mayenglöckchen duftende Blüthe der einen Art, welche das einblüthige Wintergrün heißt, weil nur eine Blume an jedem Stengel steht, ist eine der schönsten unter allen Waldblumen. Denn sie ist fast einen Zoll groß, die gelblich weißen oder auch schneeweißen Blumenblätter sind fast radförmig, weit ausgebreitet, die Staubbeutel, die auf kurzen Staubfäden stehen, sind sehr groß, das Pistill, das sich nach oben verdickt und in eine 5strahliche Narbe endigt,

Digitized by Google

ragt weit und lang aus der nach unten geneigten Blume hervor. Der kleine 5theilige Kelch legt sich zierlich an die große Blumenkrone an und umfaßt später die fünffächerige Kapsel. Bei den andern Arten von Wintergrün sind die weißen oder röthlich weißen Blüthen nicht so groß, die 5 niedlichen, napfförmig hohlen Blumenblättlein sind nicht so flach von einander gebreitet und es stehen immer mehrere Blumen beisammen, die bei dem einseitig blüthigen Wintergrün (**P. secunda**) mit eiförmigen, kurzspitzigen Blättern alle nach einer Seite hin stehen, bei dem rundblättrigen Wintergrün (**P. rotundifolia**) ein großes, nach unten gebogenes Pistill haben.

12) Die Gartenraute (**Ruta graveolens**), die auch Weinraute heißt, wächst ursprünglich im südlichen Europa. In ihren schmutzig (graulich) gelblichen Blumen, mit an dem Rande umgebogenen (hohlen) Blumenblättlein, finden sich sehr oft auch nur 8 Staubfäden, und der 9te und 10te werden meist nur in der oben an der Spitze stehenden Hauptblume entwickelt. Die an langen Haupt- und Nebenstielen reihenweis immer zwei und zwei einander gegenübergestellten Blätter bleiben auch im Winter grün. Man ißt sie, so lange sie noch jung sind, auf Butterbrod, und hält sie für sehr gesund.

13) Der Sumpfporst (**Ledum palustre**), der hin und wieder, besonders im nördlichen Deutschland in Sümpfen wächst, ist ein kleines Strauchgewächs mit weißlichen Blüthen, mit 5, flach ausgebreiteten Blumenblättchen, und Blättern, die unten filzig sind und fast den Rosmarinblättern gleichen, daher der Sumpfporst auch wilder Rosmarin heißt. Er riecht angenehm (fast wie Citrone), betäubt aber zugleich, und das Bier, in welches man zuweilen betrügerischer Weise Sumpfporst hineinbraut, macht Kopfweh und Schwindel. Ehedem hat man die Blätter und Blüthen gegen den Keichhusten gebraucht; mit der Birkenrinde vermischt, dienen sie zum Gerben des Juchtenleders.

14) Der falsche Sumpfporst oder die poley-

Digitized by Google

blättrige Andromeda (Andromeda polifolia), heißt, wegen einer Aehnlichkeit mit dem Ledum, auch der kleine wilde Rosmarin. Aber die Aehnlichkeit mit dem eigentlichen Sumpfporst besteht nur etwa in der strauchartigen Beschaffenheit und in dem ohngefähren Umriß der lanzettförmigen, unten filzig grauen Blättchen, deren Rand etwas umgerollt ist. Die wachsartig glänzende blaßrothe Blüthe mit ihrem sehr kleinen, fünftheiligen Kelch und ihrer bauchig-eiförmigen Blumenkrone, deren Saum fünfspaltig und nach außen gebogen ist, gleichet mehr den Blüthen des Haidekrauts. Sie trägt eine 5fächerige Saamenkapsel. Die Andromeda wächst in sumpfig-moosigen Waldgegenden. Sie ist für die Schaafe ein sehr schädliches Futter.

15) Die Bärentraube (Arbutus uva ursi), unterscheidet sich schon dadurch von der Andromeda, daß ihre Frucht eine Beere, (die der Andromeda eine Kapsel) ist. Von dieser rothen, glatten, mehlichten Beere hat die Bärentraube auch den Namen Sandbeere erhalten, denn sie wächst und gedeiht am besten an unfruchtbaren, sandigen oder steinigen Orten, auf Haidegrund. Die blaß rosenrothe Blumenkrone ist glockenartig eiförmig und fünfspaltig. Das Stämmchen, das meist niedergekrümmt ist und am Boden kriecht, hat in der Nähe der Wurzel öfters die Dicke eines Daumens. Die kleinen, immergrünen Blätter werden, als Pulver oder Thee, gegen Steinschmerzen empfohlen. —

Zu diesem Pflanzengeschlecht gehört auch der Erdbeerbaum (Arbutus Unedo), der in wärmeren Ländern von Europa und in Asien wächst, immergrüne, denen des Lorbeers gleichende Blätter und Früchte, fast wie die Erdbeere, trägt, welche ein ganzes Jahr zu ihrer Reife brauchen, so daß man in der Blüthezeit zugleich die schönen rothen Früchte am Baum (oder Strauch) findet.

16) Das Alpenröschen (Rhododendron), mit trichterförmiger, zuweilen auch radförmig ausgebreiteter, in 5 rundliche Abschnitte zerspaltener Blumenkrone, und mit 10 herabwärts gebogenen Staubfäden, zwischen denen der 5eckige Fruchtknoten, mit langem, fadenförmigen Griffel steht, wächst in den Felsenklüften

Digitized by Google

und Wäldern der Hochgebirge. Die Blüthen sind schön rosenroth und haben bei dem Alpenröschen mit langbehaartem Blattrand (**R. hirsutum**) einen angenehmen, bei dem rostfarbenen (**R. ferrugineum**), dessen Blätter unten bräunliche Rostflecken haben, fast keinen Geruch. Beim radförmigen Alpenröschen (**R. Chamaecistus**) ist die große Blumenkrone radförmig ausgebreitet.

Da wächst auch eine Art (Rh. chrisanthum) in Sibirien in den Gebirgsgegenden, von denen die Glimmergräber den Tafelglimmer zu Fensterscheiben holen. Wenn diese Leute im Frühling auf die Berge hinaufkommen, werden sie gewöhnlich von einer gar schmerzhaften Krankheit: vom Gliederreißen, befallen. Aber dagegen brauchen sie dann die Arzenei nicht weit zu suchen, sondern es ist schon weislich dafür gesorgt, daß da, wo die Krankheit entsteht, auch das Heilmittel gleich zu finden sey. Das ist denn eben jenes sibirische Alpenröschen, dessen Blätter einen Thee geben, der gegen ein solches Gliederreißen gewöhnlich sehr bald hilft und den armen abgematteten Leuten für den ganzen Sommer Stärkung und Munterkeit gewährt.

B. Mit 2 Griffeln.

17) Die **Hortensia** (**Hydrangea hortensis**), die jeder Blumenliebhaber kennt, stammt aus China her.

18) Der **Steinbrech** (**Saxifraga**), hat bei der einen im Frühling weiß und roth blühenden Art (**S. granulata**) unten an der Wurzel lauter kleine, röthliche Körnlein, wie Zwiebelchen.

19) Das **Seifenkraut** (**Saponaria officinalis**), trägt weiße Blüthen mit 5 ausgeschnittenen Blumenblättern, die nach der Mitte hin 2 Zähnchen haben, und einen röhrenförmigen, fein behaarten Kelch.

20) Die **Gartennelke** (**Dianthus Caryophyllus**), die schon in der Schweiz hie und da wild wächst, erzeugt freilich in unsern Gärten meistens gefüllte Blumen, worin die Staubfäden nicht mehr zu sehen sind; sie hat aber eigentlich auch 10, wie man dies an den bei uns wild wachsenden Arten z. B. der wilden Blutnelke, der Cartheuser-, der Federnelke, deutlich sehen kann.

21) Der **Taubenkropf** (**Cucubalus Behen**), hat einen aufgeblasenen Kelch und meist weiße Blumen.

C) Mit 3 Griffeln (Trigynia.)

Digitized by Google

22) Die Silene (**Silene**), zeigt 5 Blumenblätter, die jedes in einem schmalen Stiel (Nagel), der so lang ist als der bauchige Kelch, zulaufen und oben, am Becher der Blumenkrone zwei kleine Blättchen haben, welche dann zusammen einen kleinen Kranz bilden. Die eine Art, mit ziemlich großen, nach einer Seite des Stengels hin stehenden Blumen, heißt Nachtsilene (**S. nocturna**), eine andere Art, mit kleinern, ebenfalls weißlichen Blüthen, die alle nach einer Seite herunterhängen, ist die **S. nutans.**

23) Das Sternkraut (**Stellaria**), hat seinen Namen von den sternförmigen weißen Blüthchen, deren 5 Blumenblätter zweitheilig sind. Die bekannteste Art ist das Vogelsternkraut (**Stellaria** oder **Alsine media**), das auch Vogelmeierich und Hühnerdarm heißt, und als ein Unkraut an Mauern und Gartenwänden wächst. Selbst im Winter unter dem Schnee erhält sich dieses Kraut frisch und grün und gewährt so das ganze Jahr hindurch nicht blos unsern Canarienvögeln, sondern manchen andern kleinen Vögeln, sowie den Hühnern, ein angenehmes Futter.

D. Mit 4 Griffeln (**Tetragynia**).

24) Dahin gehört das kleine Bisamkräutchen (**Adoxa moschatellina**), dessen Blümchen in einem Köpfchen beisammenstehen. Die Blättchen sind doppelt dreitheilig zerschnitten, die Blümchen riechen nach Moschus. Es wächst an Gebüschen und schattigen Rändern.

E. Mit 5 Staubwegen (**Pentagynia**).

25) Der Mauerpfeffer (**Sedum acre**), trägt gelbe Blüthen und kleine fleischige Blätter, mit denen man, wenn man sie daran reibt und zerdrückt, Warzen vertreiben kann. Ist nur etwa Fingers hoch und wächst an dürren, sandigen Orten.

26) Der amerikanische Myrobalanenbaum, (**Spondias Myrobalanus**), trägt purpurfarbige und gelbe Früchte, fast von Gestalt einer kleinen Pflaume, welche zwar nur wenig Fleisch haben, dabei aber durch lieblichen Geruch und Geschmack sich auszeichnen. In der Mitte liegt ein großer, faseriger Kern. Der Baum hat dicke, zum Boden herabhängende Aeste;

Digitized by Google

wenn man einen Zweig desselben in den Boden pflanzt, schlägt er da alsbald Wurzel, so daß man im wärmeren Amerika Hecken davon anlegt, die nach wenig Monaten Blüthen und Früchte tragen. Die ächten, die in unsern Apotheken vorkommenden Myrobalanen sind die Früchte einiger ostindischen Gewächse.

27) Am Sauerklee (**Oxalis**), der weiß (eine Art auch gelb) blüht, stehen 3 Blättlein wie beim Klee beisammen, welche sauer schmecken und angenehm kühlen. Man gewinnt aus ihm das Sauerklee-Salz und aus diesem die sogenannte Kleesäure. Beide sind in der Färberei sowie als Arzeneimittel benutzbar, obgleich sie hier in Uebermaaß eingegeben, dem Kranken schädlich, ja lebensgefährlich werden können.

28) Die Ackerrade (**Agrostemma Githago**), ist die bekannte hohe sammetartige rothe Kornblume, mit haarigem Kelche.

29) Die Lichtnelke, Pechnelke (**Lychnis viscaria**), wird so genannt, weil der Stengel mit einer dunklen, harzig klebrichten Flüssigkeit überzogen ist. Der röhrenartige, 5zähnige Kelch hat zehn dunkelrothe Streifen, die Blume ist roth.

Die gemeine Wiesen-Lichtnelke, auch Fleischblume und in manchen Gegenden Kukuksblume genannt, (**L. flos Cuculi**) blüht von da an, wo der Kukuk zuerst sein Rufen in den Wäldern hören läßt, häufig, auf allen etwas feucht gelegenen Wiesen. Man unterscheidet diese ziemlich hohe, rothe Blume sogleich an ihren zierlich zertheilten Blumenblättern. Denn jedes Blumenblatt ist in 4 bis 5 geradlinigte Läppchen zerschnitten, die ganze Blume hat mithin 20 — 25 solche Theilchen.

F. Mit 8 bis 10 Griffeln (**Decagynia**).

30) Die Kermesbeere (**Phytolacca decandra**) treibt aus ihrer dicken, fleischigen Wurzel mehrere purpurrothe, zuweilen mehr als manneshohe Stengel von der Dicke eines Mannsfingers, welche sich nach oben in viele Zweige theilen. Die purpurrothen Blumen stehen traubenförmig beisammen und erzeugen eine glänzend violette, saftige Beere, welche eine schöne rothe, jedoch nicht dauerhafte Farbe giebt. Der ausgepreßte Saft des Krautes, wie der Wurzel, hat eine große Schärfe, wurde aber sonst auch bei uns, wie jetzt

Digitized by Google

noch in der Türkei, als Purgirmittel benutzt. Durch das Kochen verliert sich diese Schärfe, so daß man die jungen Blätter wie Spinat genießt. Die Kermesbeere wird häufig in unsern Gärten, so wie in wärmeren Ländern von Europa und in der asiatischen Türkei im Freien wachsend gefunden. Angeblich sollte sie aus Amerika zu uns gebracht worden seyn.

§. 27. Nun wird es mit dem Zählen der Staubfäden bald aus seyn, denn wir kommen jetzt an Klassen, wo entweder manche Zahlen ganz übersprungen, oder wo die Art der Zusammenfügung der Staubfäden und der Bau der Blumenkrone recht ins Auge gefaßt werden muß, wenn man anders die Klasse errathen will, wohin sie gehören. Gleich bei der 11ten Klasse (**Dodecandria**) wird die Zahl 11 (die überhaupt in der Natur nicht viel vorkommt) übersprungen und in diese Klasse gehören solche Blumen, welche 12 bis 20 Staubfäden oder auch mehrere darüber haben, so daß ihre Zahl zwischen 12 und bis nahe 20 fallen kann.

A. Mit 1 Pistill oder Staubweg (**Monogynia**).

1) Dahin gehört vor allem der **Mangle** oder **Tausendfußbaum, Rhizophora Mangle**, eines der wunderlichsten und merkwürdigsten Gewächse der Erde, das in Ost- und Westindien so wie in den heißen Ländern von Afrika an den Seeküsten vorkommt. Die fleißigen Holländer haben durch künstliche, mühsam angelegte Dämme dem Meere große Strecken abgewonnen, die sie allmälig zu einem fruchtbaren Wiesenland oder zu Feldern gemacht haben und ähnliche Werke zur Abwehr der Meereswogen vom Lande, hat der Mensch in mehreren Gegenden der Erde begründet. Aber auch ohne sein Zuthun kommt ihm zu solchen nützlichen Unternehmungen die Natur in mannichfacher Weise zu Hülfe und namentlich geschieht dies durch den Manglebaum dessen Waldungen sich nicht nur am Wasser sondern an seichten Stellen selbst in dieses hinein so ausbreiten und ein so dicht verschlungenes Flechtwerk ihre Stämme, Zweige und

Digitized by Google

Wurzeln bilden, daß sie das Ufer vor dem Anschlagen und Einbrechen der Wogen schützen und dem gefahrdrohenden Element des Meeres unverbrüchliche Gränzen setzen. Hiezu ist der merkwürdige Baum in ganz besonderer Weise geeignet, denn wie sein griechischer Name **Rhizophora**, als Wurzelträger ihn bezeichnet, so geht auch der Haupttrieb seines Wachsthums nur aufs Erzeugen von Wurzeln hinaus. Nicht nur unten am Boden, wie bei andern Bäumen, sondern überall aus der Rinde des jungen Stammes so wie aus den Zweigen und Aesten brechen Triebe hervor die sich hinab beugen und in dem feuchten Grunde Wurzeln schlagen und auch die ganz eigenthümlich gebildete Frucht, die aus einem fleischigen Grundstück besteht auf welchem der Saame, von der Gestalt eines etwas gekrümmten Hornes, mittelst eines Schenkels aufsitzt nimmt schon am Baume an dem Geschäft der Wurzelbildung Antheil. Denn der Saame, der bis zu seiner vollkommenen Ausbildung ein Jahr lang am Stamme bleibt, treibt bereits hier aus seinem spitzen Ende einen Wurzelkeim und senkt sich durch seine Schwere so tief in den sumpfichen Grund hinein, daß er hier sogleich zum neuen Baum sich entwickeln kann. Daraus entsteht dann das enggedrängte Flechtwerk der Bäume mit ihren unzähligen Wurzeln. Die weiße Blüthe des Manglebaumes enthält in der Regel nur 8 Staubfäden, bei andren Arten dieses Geschlechtes zählt man jedoch 12, deshalb stellt man auch diese Art in die 11te Klasse.

2) Die Haselwurz (**Asarum europaeum**), deren meist 3spaltig, bräunlich gefärbte, niedrig an der Erde wachsende Glockenblume vielleicht schon Mancher übersehen hat, der im Frühling, wann sie blüht, an die Berge und Wälder kam, wo sie wächst, und der ihren überaus gewürzhaften Geruch bemerkte. Die Blätter sind nierenförmig rund, und, so wie die Blume, behaart. Getrocknet und zu Pulver gestoßen sind diese Blätter, und noch mehr die Wurzel, welche purgirt und Schweiß treibt, für die Pferde in mancherlei Krankheiten ein gar wohlthätiges Heilmittel.

Digitized by Google

3) Das Blutkraut (**Lythrum salicaria**) wächst am Wasser, blüht vom Juli an mit wirtelförmig in eine Aehre zusammen gestellten rothen Blumen, welche 6 Blättlein haben. Das ist eine von denen Pflanzen, die man fast in allen Welttheilen, sogar in Neuholland, findet. Sie besitzt einige heilsame Kräfte.

B. Mit 2 Griffeln (Digynia).

4) Der Odermennich (**Agrimonia odorata**), hat schöne gelbe Blümchen mit 5 Blumenblättlein, reihenförmig gepaarte (gefiederte) Blätter und ist behaart. Er wächst an Ackerrändern, Hügeln und Waldblößen, riecht schwach angenehm, war sonst als Heilmittel bei Verwundungen und auch innerlich gerühmt.

C. Mit 3 Griffeln (Trigynia).

5) Die Wolfsmilch (**Euphorbia Cyparissias**), trägt die gelben Blüthlein oben zu einem Schirm vereint, und die vielen schmalen Blättchen stehen wie die Nadeln an einem Kiefern- (Föhren-) Zweig beisammen. Ist giftig durch ihren weißen Milchsaft, der, wenn man einen Zweig abreißt, in Menge herausläuft. Und doch fressen das Kraut manche Raupen, den Saamen kleine Vögel. So kann das, was dem Einen ein Gift ist, dem Andern heilsam und nützlich werden.

Von einer Art von Euphorbia (**E. officinarum**), die ein Strauchgewächs ist und in Afrika wächst, kommt das giftige Euphorbiumharz, das zum Reinigen alter Geschwüre und gegen Beinfras angewendet wird.

6) Die Garten-Reseda (**Reseda odorata**), mit unregelmäßiger, 4—6blättriger Blumenkrone, deren Blätter zerschlitzt sind und einer 3eckigen, aufgeblasenen, oben offenen Fruchtkapsel, gehört auch hieher. Sie riecht allerdings in gewisser Ferne sehr gut, feine Nasen bemerken aber in der Nähe, daß sie eigentlich zugleich auch ein wenig stinkt. Eine Art Reseda wächst auch wild bei uns und wird mehrere Schuh hoch. Dieses ist die gelbliche Reseda (**R. luteola**), auch Wau genannt, womit man gelb färbt.

D. Mit 12 Griffeln (Dodecagynia).

7 Das rothblühende Hauslaub, auch Hauswurz genannt, (**Sempervivum tectorum**), das auf

Digitized by Google

ganz dürren Dächern wächst, wo es fast gar keine Nahrung findet, und dem man dabei doch keine Noth anmerkt, weil es ganz besonders saftig, fleischige Blätter hat, gehört daher.

Es ist oft, als ob solche Pflanzen, deren es besonders in dürren, heißen Ländern viele giebt, einem lehren wollten: daß es bei dem innerlichen und äußerlichen Wachsen nicht auf's viel Haben, sondern auf's Gedeihen ankommt. Der frische Saft dient gegen Mundschwämmchen, Halsentzündungen, Bienenstiche u. s. w., und wenn man ihn mit Weingeist vermischt, wird eine Art von weißer Pomade daraus, die gegen die Sommersprossen helfen soll.

§. 28. In der 12ten Klasse (Icosandria) stehen gar viele nützliche und schöne Gewächse beisammen, nämlich unsere Obstbäume, Rosen, Erdbeeren, Himbeeren u. s. w.

Bei dieser Klasse hat man, wie bereits oben erwähnt, vorzüglich auf die Art und den Ort zu sehen, wie und wo die Staubfäden angewachsen sind, und nicht auf die Zahl derselben. Denn diese beträgt zwar allerdings zuweilen nur 20 (einige auf oder ab), manchmal aber auch, z. B. bei der Rose, wohl über 100. Der Zahl der Staubfäden nach wären dann solche Pflanzen der 12ten von denen der 13ten Klasse, worinnen viele Staubfäden sind, gar nicht verschieden. Nimmt man aber eine Pflanze aus der 13ten Klasse, z. B. eine Mohnblüthe, und eine aus der 12ten, z. B. eine Rose in die Hand, und betrachtet beide genauer, so sieht man, daß bei der Rose die Staubfäden am Kelch, bei dem Mohn an der Fruchtkapsel und den Blüthenblättern angewachsen sind. Und dieses ist eben das Kennzeichen der 12ten Klasse, daß bei den Blumen, die da hinein gehören, die 20 und mehr als 20 Staubfäden auf dem grünen Kelchrand aufgewachsen sind.

Die Gewächse, welche zu der Familie der rosenartigen und der Obstbäume gehören, sind dem Bau ihrer Blüthe und Früchte nach die vollkommensten im ganzen Gewächsreich. Sie gleichen auch darinnen der vollkommensten Klasse des Thierreiches: jener der Säugethiere, daß sie, wie diese, die erste Nahrung für ihre Jungen, oder Saamen bei sich tragen in Gestalt der fleischigen Frucht, die den Kern umgiebt.

A. Mit einem Staubweg oder Griffel (Monogynia).

1) Der Cujavabaum (Psidium pyriferum) mag hier den Anfang machen, obgleich er weder durch Schönheit, noch durch die Köstlichkeit seiner Früchte den ersten Rang unter den Gewächsen seiner

Digitized by Google

Klasse einnimmt. Er erreicht nur selten die Höhe eines mittelmäßigen Apfelbaumes, meist nur die von ein oder zwei Mannslängen, ist öfters krumm gewachsen, hat sehr biegsame Zweige von zähem Holze, schöne, weiße, angenehm duftende Blüthen und birnenförmige Früchte, die in ihrem wohlschmeckenden Fleisch die klumpenartig zusammengehäufte Masse der zahlreichen Kerne einschließen. Der Cujavabaum ist im heißeren Amerika zu Hause.

2) Die Fackeldisteln (**Cactus**), sind wohl Jedem aufgefallen, der sie zum ersten Male in einem Blumenscherben vor den Fenstern stehen, oder in Gewächshäusern gesehen hat. Da ist bei den meisten Arten entweder eine fleischige Scheibe, aus der hie und da kleine Büschel von Stacheln herauswachsen, oder ein kugliches oder walzenförmiges Glied an und auf das andere gewachsen, und es hängt bei manchen Arten der fast rundliche oder eckige, meist stachliche Stengel, wie eine Schlange herunter. Unmittelbar aus der fleischigen, saftigen Masse der Pflanze, wächst die Blüthe heraus, die einen einblättrigen, schuppigen Kelch und viele Blüthenblätter hat, welche bei den meisten Arten schön roth, bei andern gelb u. s. w. aussehen, und wovon die innern länger sind als die äußeren. Die Früchte sind bei vielen eßbar, recht wohlschmeckend und kühlend.

Alle Arten wuchsen wohl ursprünglich in den wärmeren Gegenden des Festlandes und der Inseln von Amerika, manche sind aber jetzt auch in Europa so gut als einheimisch. Sie wachsen meistens auf dem dürrsten, ärmsten Boden, wo keine andere Pflanze gedeihen kann, und der ihnen auch kein Tröpflein Nahrungssaft darzureichen vermag. Und doch haben gerade diese Pflanzen (m. v. S. 188) einen solchen Ueberfluß und Fülle von Saft in sich, daß die Thiere der Wüste, und auch der Mensch, dem Verschmachten nahe, in der schatten- und wasserlosesten Gegend sich nur eine Fackeldistel (besonders von den rundlichen gegliederten Arten, die man Melonencacten nennt) aufsuchen, wovon dann selbst die Maulthiere die Stacheln sehr geschickt mit ihren Hufen herunter zu streifen verstehen, und darin alsbald eine Menge von erfrischendem, gesunden Safte, zur Stillung ihres Durstes finden. Dabei bereiten dann auch die sehr häufigen Früchte

Digitized by Google

für den Menschen, mitten in der Einöde, einen gedeckten Tisch. Es gehören unter die Cactusarten:

a) Die indianische Feige oder gemeine Opuntia (**Cactus Opuntia**). Diese hat eirunde fleischige Scheibengelenke, wovon immer eins aus dem andern wächst, die Blume ist gelblich, die wohlschmeckende und gesunde Feige mit kleinen Stacheln bedeckt. Diese Art, die man aus Südamerika gebracht hat, wächst jetzt fast überall im südlichen Europa; in Sicilien gedeiht sie selbst in den Spalten der allerhärtesten und nahrungslosesten Lava, und bereitet dann auch andern Pflanzen allmählig einen gedeihlichen Boden. Man zieht sie dort, wie im Morgenlande, auch zu Hecken.

b) Die Cochenillen-Fackeldistel (**C. coccinellifer**) hat länglich eiförmige Scheibengelenke und fast gar keine Stacheln, die Blüthen sind rosenroth. Auf dieser Pflanze, die auch im südlichen Amerika wächst, lebt das kleine Cochenillenthierchen (eine Art von Schildlaus), aus welchem die kostbare Cochenillen-Farbe bereitet wird. Man pflegt dort das Cochenillenwürmchen auf dieser Fackeldistel, wie bei uns in Europa die Seidenwürmer auf den Maulbeerbäumen.

3) Der wilde Jasmin oder Pfeifenstrauch (**Philadelphus coronarius**), trägt schöne weiße (ein wenig ins Gelbliche fallende) Blüthen, welche 4 und 5 Blumenblätter haben und sehr wohl riechen. Sein Vaterland ist im mittleren Asien, er wird aber jetzt bei uns überall in Gärten gezogen.

4) Der Gewürznägeleinbaum (**Eugenia caryophyllata**), dessen unaufgeschlossene Blüthenknospen unsere Gewürznägelein sind, wächst auf den Moluckischen Inseln an besonders heißen Stellen.

Einmal hatten die holländischen Kaufleute alle Gewürznägeleinbäume, die sie auf den Molucken zu Gesichte bekamen, ausrotten lassen, und baueten nur in ihren Pflanzungen auf Banda und Ternate noch welche, damit sie den Handel mit Gewürznägelein allein treiben könnten. Die Franzosen fanden aber doch späterhin noch solche Bäumchen auf einer Insel, wo sie die Holländer nicht bemerkt hatten, und nun wird der Gewürznägeleinbaum von Engländern und Franzosen in verschiedenen heißen Ländern gebaut. Die unreife Frucht giebt die sogenannten Mutternelken.

5) Der Myrtenbaum (**Myrtus communis**) mit seinen schönen, weißen, einzeln stehenden, von 2 Hüllblättchen umgebenen Blüthen und kleinen Blättern, ist fast in jedem Kunstgarten bekannt, und seine schönen grünen Zweige werden an manchen Orten zu

Digitized by Google

Brautkränzen geflochten. Er hat in allen seinen Theilen etwas Stärkendes und Gewürzhaftes, besonders aber sind die Beeren, mit Wein übergossen, ein vortreffliches magenstärkendes Mittel.

Noch mehr ist dieß der Fall bei einer andern Art von Myrte, dem Pimentenbaum (**Myrtus Pimenta**), der in Westindien wächst, und dessen Frucht der Nelkenpfeffer oder das englische Gewürz ist, welches man in manchen Gegenden neue Würze, auch Almodigewürze, nennt.

6) Der Granatapfelbaum (**Punica Granatum**) wird bei uns nur wegen seiner schönen, herrlich scharlachrothen Blüthen, die bei unserer Gewächshausart meist gefüllt sind, in Kunstgärten gezogen, und erscheint daselbst nur als ein kleines Bäumchen. Schon in Welschtyrol und noch mehr in Italien, wächst er aber so groß als ein Apfelbaum, und trägt dort schöne große scharlachrothe Aepfel, die in ihren vielen Fächern Kerne enthalten, welche von einem saftigen angenehm säuerlich schmeckenden, kühlenden Fleische umgeben sind.

7) Der Mandelbaum (**Amygdalus communis**) ist auch eigentlich in wärmeren Gegenden zu Hause, kommt aber schon bei uns im Freien fort. Seinen Kern umgiebt eine grübchenreiche Schaale und über diese noch eine Hülle, die bei der einen Art, bei der Pfirsiche (**Amygdalus persica**) fleischig, bei der Mandel saftlos und lederartig ist. Die süßen Mandeln sind nahrhaft und gesund und sollen beim Weintrinken den nüchternen Muth erhalten. Seine schönen Blüthen sind im Frühling sehr zeitig da.

8) Die Kirschen- und die Zwetschgenbäume (**Prunus Cerasus** und **domestica**) mit ihren tausendfältig vielen Abarten, sind zum Theil auch, wie fast alle Obstbäume und Getreidearten, aus Asien vor alten Zeiten zu uns herüber gebracht worden. Wir haben aber doch auch namentlich eine Art (**Prunus avium**), die kleine Vogelkirsche, aus der man den besten Kirschgeist macht, bei uns einheimisch. Die Schaale, die den Kern umgiebt, ist ziemlich glatt und hat 2 Näthe.

Digitized by Google

Auch die Aprikose (**Prunus armeniaca**) gehört zu dem Geschlecht der pflaumenartigen Früchte.

10) Die Coccopflaume oder Chrysobalane (**Chrysobalanus Icaco**), eine Frucht, die im wärmeren Amerika wächst, unterscheidet sich vorzüglich durch die Gestalt ihres 5fächerigen, wie aus 5 Schalenstücken zusammengesetzten Kernes von unserer Pflaume und Aprikose. Die gelb und roth gefärbte Frucht ist rundlich und hat einen sehr angenehmen Geschmack, welcher an den der gebratenen Aepfel erinnert. Sie bildet ein Hauptnahrungsmittel mancher Indianerstämme an der Handurasbai.

B. Mit drei Griffeln (**Trigynia**).

9) Der Ebereschen- oder Ebschbeerbaum, auch als rother Vogelbeerbaum bekannt (**Sorbus aucuparia**) ist bei uns freilich durch seine schönen rothen Beerenbüschel und gefiederten Blätter mehr nur zur Zierde als zum Nutzen da, jenen für die Vogelsteller etwa abgerechnet, die dadurch Drosseln und andere Vögel anlocken. Dem armen Lappländer aber sind diese Beeren eine wahre Erquickung und Delikatesse. Auch kann man starken Branntwein davon brennen.

Von einer Art von **Sorbus**, die **Sorbus domestica**, Speierlingsbaum, heißt, kommen die sogenannten Atels- oder Atlasbeeren, die im Herbst in Büscheln zusammen gebunden zu Markt gebracht, und von vielen Leuten gern gegessen, auch zur Bereitung eines dem Aepfelmost gleichenden Getränkes benutzt werden. Der Speierlingsbaum, der in Franken, Böhmen u. s. hin und wieder gefunden wird, wächst höher als der gemeine Ebereschenbaum; seine gefiederten Blätter sind unten wollig.

11) Das Mehlfäßchen (**Crataegus Oxyacantha**), das an Zäunen und in Wäldern steht, ist auch als Weißdorn bekannt. Die rothe Fäßchenbeere hat mehrere Kerne. Sie wird zum Branntweinbrennen benutzt.

C. Mit 5 Griffeln (**Pentagynia**).

12) Die Mispel- oder Sperbelblüthe (**Mespilus germanica**) hat mitten unter den Staubfäden nicht ein Pistill, wie die Kirsche, oder 2, wie das Mehl-

Digitized by Google

fäßchen, sondern eben so wie die Apfelblüthe, 5 Pistille stehen. In der angenehm schmeckenden Frucht, die man erst ißt, wenn sie teig ist, sind 5 Saamen. Sie wird bei Ruhr und Durchfall für sehr heilsam gehalten. Zu dieser oder der nächstfolgenden Gattung stellt man auch die in gebirgigen Gegenden oft vorkommende Quittenmispel (**M. Cotoneaster**) mit unschmackhaften Früchten.

13) Der Apfel- und Birnbaum (**Pyrus Malus** und **communis**) unterscheidet sich dadurch, daß die Kerne in eine mehrfächerige Kapsel eingeschlossen sind, und daß diese Kapsel wieder von einer fleischigen Frucht umgeben ist. Da hat man in den Gärten auch eine unzählige Menge von Arten daraus gezogen. Ursprünglich sollen auch wenigstens die veredelten Aepfel- und Birnbäume aus Asien herübergebracht seyn. Zu dem Geschlecht der Birnen und Aepfel gehört auch die Quitte (**P. cydonia**).

14) Die Spierstaude (**Spiraea**) hat eine Blume mit 5spaltigem Kelch und 5 Blumenblättlein, welche die (meist 5) Fruchtknoten umfasset, und trägt statt der fleischigen Früchte nur Saamenkapseln. Mehrere Arten, wie die weidenblättrige Spiräa (**Sp. salicifolia**) so wie die mit punktirten oder getüpfelten Blättern, gleich dem Johanniskraut (**Sp. hypericifolia**) auch die Ulmen- und Schneeballen-blättrige Spiräa werden als Heckengesträuch in unsern Gärten und (englischen) Anlagen gesehen. Andere Arten, wie der Johanniswedel oder gemeine Geißbart (**Sp. Ulmaria**) mit gefiederten Blättern, deren äußerstes Blättlein größer als die andern, und in Lappen zertheilt ist; dann der schöne, hohe Berggeißwedel oder Straußfeder-Geißbart (**Sp. Aruncus**), dessen weißliche, zarte Blüthenrispen einen großen Busch bilden, der den schönsten Federbusch unsrer Damen an Zierlichkeit übertrifft, so wie die Filipendel (**Sp. Filipendula**) wachsen bei uns. Doch ist nur der gemeine Geißbart überall, fast in allen feuchten und schattigen Gegenden anzutreffen; die andren beiden Arten finden sich meist nur in gebirgigten Gegenden.

Digitized by Google

D. Mit vielen Griffeln (Polygynia).

15) Die Rose (**Rosa**), hat auch gar viele Arten, von denen manche bei uns wild wachsen. Die schöne gefüllte Gartenrose soll aus einer ungefüllten dadurch entstanden seyn, daß sich die Staubfäden durch zu reichliche Nahrung in Blumenblätter verwandelt haben. Doch findet man in Asien und im südöstlichen Europa auch wildwachsende gefüllte Rosen.

Die Früchte der Rosen nennt man Hagebutten oder Hiften und nimmt ihr Fleisch getrocknet zu Suppen oder bereitet auch den sogenannten Hiftensaft daraus. Aus den Blüthenblättern gewinnt man das Rosenwasser, den Rosenhonig und durch Vermischung mit andren wohlriechenden Stoffen so wie mit einem gummiartigen oder erdigen Bindemittel die im Morgenland gebräuchliche, zu Halsgehängen benutzte und auch den Tabaksrauchern beliebte Rosenpaste. Um die Rosenblätter länger aufzubewahren, salzt man sie zuweilen beim Trocknen ein. Dieses mag besonders den Morgenländern nöthig seyn, wenn sie das kostbare Rosenöl bereiten wollen. Denn um etwa, höchstens ein Quentchen solches Oel zu gewinnen, hat man einen Zentner getrockneter Rosenblätter nöthig und dabei ist es nicht hinreichend, daß man das Rosenwasser nur einmal über die Blätter destillirt, sondern man muß dies mehrmals wiederholen, weßhalb man auch, um die Mühe zu ersparen und einen sicherern Erfolg zu haben, gleich sehr große Massen Rosenblätter auf einmal in Bearbeitung nimmt.

Die Arten der wilden Rosen theilt man nach der Gestalt ihrer Hagebutten in solche mit eirunden und in solche mit kuglich runden Früchten. Eine der gemeinsten Arten mit eirunder Frucht ist die Heckenrose (**R. canina**), an deren 5 Kelchblättchen das Kennzeichen der Art sich nach folgenden Reimen erkennen läßt:

Fünf Brüder sind's, zu gleicher Zeit geboren,
Doch zweien nur erwuchs ein voller Bart;
Zwei andren blieb die Wange unbehaart,
Dem fünften ist der Bart zur Hälft' geschoren.

Wenn man nämlich die Kelchblättchen vergleicht, dann bemerkt man, daß sich an zweien von ihnen zu beiden Seiten franzenartige Ansätze finden, während bei 2 andren die Ränder ganz glatt und ungefasert sind, bei einem fünften nur an einer Seite dergleichen Ansätze stehen. Außer der Heckenrose hat auch die Alpenrose (**R. alpina**), deren Stamm und Zweige fast ganz stachellos, die Blüthen hoch karmesinroth sind, eirunde Früchte. Dagegen haben fast kugelrunde Früchte: die gelbliche Weinrose, **R. lutea**, an welcher mehr die Blätter als die Blumen einen angenehmen Geruch haben, dann die Borstenrose, **R. villosa**, an welcher die Früchte

Digitized by Google

mit Borsten, die Blätter wie mit feinem Filz bedeckt sind, eben so gehört hieher die weißlichroth blühende Ackerrose, R. arvensis, und die stachliche R. spinosissima.

16) Die Himbeer- und Brombeerstauden (**Rubus Idaeus** und **R. fruticosus**) sind durch ihre wohlschmeckend süßen rothen und schwarzen Beeren gar sehr bekannt.

Namentlich dient die Himbeere durch den aus ihr bereiteten Syrup und Essig zur Erquickung, auch der Kranken; in Polen und in Rußland macht man aus dem gegohrenen Saft dieser Frucht ein weinartiges Getränk. Selbst im höchsten Norden gewähren die Früchte des Polar-Brombeerstrauches (R. arcticus so wie R. Chamaemorus) dem dortigen armen Volk eine große Labung, beide gedeihen dort reichlich.

17) Die Erdbeeere (**Fragaria vesca**), von der es in unsern Gärten viele Spielarten giebt, hat einen oben spitzig zulaufenden Fruchtboden, der beim Reifen der Saamen sehr fleischig und saftig wird und dann (als Erdbeere) den Saamen in sich schließt. Dagegen hat

17) die gelbe Gänseblume oder das Fingerkraut (**Potentilla anserina**), die mit ihren schönen gelben Blumen und fein glänzenden gefiederten Blättern auf dem Boden kriecht, trockenen Saamen.

Die Arten des Fingerkrautes (**Potentilla**) unterscheiden sich nur dadurch von denen der Gerbwurzel (**Tormentilla**), daß bei jener 5, bei dieser 4 Blumenblätter gefunden werden. Der holzige Wurzelstock der Tormentille enthält einen sehr wirksamen Gerbestoff, welcher den der Galläpfel noch übertrifft.

18) Die Nelkenwurzel (**Geum urbanum**) blüht auf Schutt und an Hecken, wird etwa 1 Elle hoch und trägt gelbe Blümchen und Saamen, an denen oben ein Häkchen steht. Die Wurzel von diesem Gewächs riecht und schmeckt gewürzhaft, und wird in der Medizin unter dem Namen **Caryophyllata** oder Nelkenwurzel gebraucht. Sie soll oft in Fiebern und bei Schwäche fast so gut thun als die Chinarinde.

19) Die Dryade (**Dryas octopetala**) findet sich meist nur in hochgebirgigen Gegenden oder in der Nähe derselben. Sie hat schöne, ansehnlich große, weiße Blüthen, meist mit 8, zuweilen auch 9 Blu-

Digitized by Google

menblättern und einen 8 bis 9 spaltigen Kelch. Die immergrünenden Blätter gleichen den Blättern des Gamander. Die Saamen haben sehr lange, federartige Grannen.

§. 29. In der 13ten Klasse (**Polyandria**) finden sich viele (oft über 100) Staubfäden in einer Blume, sie sind aber immer an den Fruchtboden oder an die Blumenblätter angewachsen. Der Kelch fehlt bei vielen hieher gehörigen Arten ganz, oder fällt bei andren sehr bald ab. Dahin gehören:

A. Mit einen Staubweg oder Griffel (**Monogynia**):

1) Der Cappernstrauch (**Capparis spinosa**), der im südlichen Europa und im Morgenlande an sonnigt-steinigen Plätzen wächst und dessen Blüthenknospen die Cappern sind, die man in Essig eingemacht ans Essen nimmt. Die Zweige sind dornig, die schönen großen Blüthen sehen weiß oder blaßroth aus.

2) Das Schöllkraut (**Chelidonium majus**), findet sich an Mauern und Hecken; es hat rund und bogenartig ausgeschnittene Blätter (fast wie die Eichen, nur länger) und gelbe Blumen. Reißt man ein Blatt oder ein Stückchen vom Stengel ab, so läuft ein gelber, sehr ätzend scharfer Saft heraus. Und doch hat dieser giftige Saft, auf gezupfte Leinwandfasern gelegt, manchmal zur Heilung alter Geschwüre bei Pferden und auch bei Menschen gedient.

Ein berühmter Arzt in der Schweiz ist einst durch dieses Kraut zum Doctor geworden. Denn er hatte dasselbe, als er kaum dem Knabenalter entwachsen war, aus einem alten Kräuterbuche kennen gelernt, heilte dann den offenen Fuß einer Frauensperson damit, und nun kamen in seinem einsamen Gebirge, wo rings umher kein Arzt wohnte, so viele Kranke, die auch geheilt sein wollten, daß sein altes Kräuterbuch nicht mehr aushelfen wollte, und er daher sich mit Einwilligung seiner Verwandten aus Studiren begab, und nachmals gar ein trefflichet Arzt wurde.

3) Der Mohn (**Papaver**) unterscheidet sich durch den zweiblättrigen, bald abfallenden Kelch und durch die vielstrahliche Narbe, welche auf dem Fruchtknoten sitzt. Die Frucht ist eine vielsaamige Kapsel, die sich beim Reifwerden unter jeder Narbe mit einem kleinen

Digitized by Google

Löchlein öffnet. Schon unser gemeiner Feldmohn (P. Rhoeas) hat eine schwache einschläfernde und schmerzstillende Wirkung, noch mehr aber

Der Schlafmohn, Gartenmohn (P. somniferum) der mit seinen schönen, gefüllten Blüthen oft in unsern Gärten gezogen und durch seine glatten Kelchblätter unterschieden wird. Aus dieser Art bereitet man im Morgenlande, wo sie freilich viel kräftiger gedeiht als bei uns, das Opium, welches als ein gummiartiger Saft aus den Einschnitten hervordringt, die man in die unreife Kapsel macht. Dieses berauschende Mittel lieben mehrere orientalische Völker so sehr, als manche rohe Europäer den Branntwein. Viele Leute können dort gar nicht einmal mehr ohne jenes Gift leben, und ein persischer Prinz, der eine weite Reise durch eine unbewohnte Gegend machte, mußte blos daran sterben, daß sein Bedienter vergessen hatte, den Beutel mit dem Opium mitzunehmen, und er also keines zu seiner Stärkung haben konnte. So macht sich der Mensch mit so manchem schädlichen Gifte gemein, und liebt es wohl als etwas Heilsames und Gutes. Uebrigens kann unter gewissen Umständen auch das Opium als ein wirksames, Schmerzen stillendes und Krämpfe linderndes Mittel, innerlich gegeben werden. Bei uns benutzt man den häufigen Saamen des Mohns ganz besonders zur Bereitung eines wohlschmekkenden Oeles.

4) Das Christophskraut (**Actaea spicata**), hat einen Kelch, dessen 4 Blättlein bald abfallen, eirunde weißliche Blumentrauben und trägt erbsengroße, schwarze Beeren. Es wächst in schattigen Wäldern, und wird oft über 2 Schuh hoch. Es hat giftige Eigenschaften.

5) Die Teichrose (**Nymphaea**), wovon es eine schöne große weiße (**N. alba**), aber auch eine gelbe Art (**N. lutea**), beide mit runden Blättern, bei uns im Wasser giebt, gehört auch daher. Die weiße, mit ihrem goldgelb gefärbten Innern, riecht angenehm. Der zuweilen armesdicke, fleischige Wurzelstock der Teichrosen enthält Gerbestoff und einen ziemlich großen Antheil von Stärkmehl, das sich in Zeiten der Noth als Nahrungsmittel verwenden läßt. Einige mit unsern Teichrosen verwandte Arten: das Nelumbium und der See-lotus, die in Aegypten und Indien wachsen, waren bei den alten Aegyptiern sehr hoch gehalten, und sind dies noch jetzt bei den Indiern.

6) Der Lindenbaum (**Tilia europaea**). Von

Digitized by Google

diesem giebt es 2 Arten, eine frühe und eine spät blühende. Er wird sehr alt (wohl 1000 Jahr), weßhalb man in Deutschland viele Lindenbäume findet, welche ganz besonders dick und groß sind, und die schon vor vielen Jahrhunderten (wie man aus den Chroniken weiß) an demselben Orte gestanden sind. Solche berühmte Linden giebt es in und bei Nürnberg, zu Neustadt am Kocher, zur Phantasie bei Bayreuth u. s. w.

Die große Linde, die zu Neustadt am Kocher steht, war schon im Jahr 1229 ein großer Baum. Denn nach der alten Urkunde wurde damals die neue Stadt hinauf an die Heerstraße an den großen Baum erbaut, nachdem schon im Jahr 1226 die alte Stadt Helmbundt, deren Ruinen man noch zwischen Neustadt und Sulzbach sieht, in einem Aufruhr zerstört war. Vom Jahr 1408 heißt es: „Vor dem Thor eine Linde staht, die 67 Säulen hat." Den spätern vierfachen Säulengang mit 115 steinernen Säulen, ließ Herzog Christoph im Jahre 1558 bauen. Jetzt hat dieser merkwürdige Baum, an dem Jeder, der ihn sieht, seine Freude haben muß, an seinem Stamme einen Umfang von 32 Werkschuhen, und der Raum, über den sich seine Aeste ausbreiten, beträgt gegen 400 Schuhe im Umkreis. Die 2 Arten von Linden, die es bei uns giebt, heißen: a) die Sommerlinde, mit großen Blättern (T. grandifolia) und b) die Steinlinde (T. parvifolia) mit kleinen Blättern. Von beiden Arten benutzen das weiche, weiße Holz die Formschneider und Drechsler; aus dem allbekannten Bast der Linde fertigt sich das Landvolk in Rußland sogar Schuhe; die Blüthen geben den Bienen einen reichen Stoff zur Honigbereitung und werden als Thee gebraucht; die nüßchenartigen Früchte enthalten, freilich nur in geringer Menge, ein süßes Oel.

7) Der Topfbaum (Lecythis ollaria) ist ein ansehnlicher Baum, der in den Waldungen der heißeren Länder von Amerika wächst und dort in manchen Gegenden so häufig vorkommt, als bei uns die Eichen. Sein Holz ist so dauerhaft und fest, daß man es zu den Achsen der Zuckermühlen verarbeitet, aus dem Bast der Rinde macht man ein Werg zum Verstopfen der schadhaften Stellen der Schiffe. Das Beachtenswertheste und zugleich Merkwürdigste an ihm sind aber seine Früchte. Diese haben die Gestalt eines großen etwas länglich runden Bechers dessen Oeffnung durch einen dicht anpassenden Deckel verschlossen ist. Die

Digitized by Google

Masse des Bechers ist holzig fest, gelblich braun von Farbe, und sein innerer Raum ist so groß, daß er mehrere Pfund Wasser fassen könnte. Dieser Raum ist in 4 Fächer getheilt, deren jedes einen nußartigen Saamen von der Größe einer Kastanie enthält. Die Schaale der Nuß ist dünn, der Kern ist weiß und hat einen sehr angenehmen Geschmack, fast wie die Pistazien, ist dabei sehr nahrhaft. Man genießt sie roh und gekocht, preßt auch ein Oel daraus. Die Topffrucht hängt an einem festen, holzigen Stiele; wenn sie reif ist, fällt der Deckel von selber ab.

8) Der Mammeibaum (**Mammea americana**), hat mit dem Topfbaum dasselbe heiße Vaterland; er erwächst zur ansehnlichen Höhe einer Eiche, hat wohlriechende weiße Blüthen und eine Frucht vom Umfang eines großen Apfels und etwas eckiger Gestalt, die ein festes, wohlschmeckendes Fleisch enthält, während die innere Hautschicht, welche dieses Fleisch umgiebt, so wie die in ihm liegenden Saamenkörner einen überaus widerwärtigen, lange nachhaltenden, gallenbittren Geschmack haben.

9) Der Orleansbaum (**Bixa orellana**), von welchem der Orleans, welchen die Färber und Drucker brauchen, kommt, wächst in Südamerika, so wie auf den Ost- und Westindischen Inseln, an Wassergräben und andern feuchten Orten. Der Orleans wird aus dem rothen Taige bereitet, welcher in den Kapseln die einzelnen röthlichen Saamen umgiebt.

10) Die Theestaude (**Thea**) wächst vornemlich in China, und es ging sonst gar viel Geld aus Europa in jenes stolze Land für Thee, den unser einer nur trinkt, wenn er krank ist. In neuerer Zeit haben übrigens die Europäer den Anbau der Theestaude in mehreren ihrer Herrschaft unterworfenen heißen Ländern mit sehr günstigem Erfolg versucht.

Einer besondern Erwähnung verdient es, daß der unschädliche und gelind aufregende (munter machende) Thee hin und wieder den Genuß des schädlichen Branntweins verdrängt hat.

11) Das Cistusröslein (**Cistus Helianthe-**

Digitized by Google

mum) sieht schön citronengelb aus, wächst auf Bergen und in bergigten Gegenden, an niedrigen Sträuchlein. Wenn man die Staubfädlein unten mit einer Nadel anrührt, bewegen sie sich schnell gegen die Pistille hin.

12) Der Orangen- und Citronenbaum (**Citrus**), ward früher zu den Gewächsen der 18ten Klasse gerechnet, weil die (vielen) Staubfäden seiner Blüthen zum Theil in mehrere Bündel verwachsen sind. Die Frucht enthält in ihrer lederartigen Schaale viele, mit saftigem Fleisch ausgefüllte, 1 bis 3saamige Fächer; die immergrünen Blätter, wie die Fruchtschaalen und Blüthen sind reich an ätherischen Stoffen, aus denen man wohlriechende Wasser und Oele bereitet und die von heilkräftiger, magenstärkender Wirksamkeit sind; das feinfasrige Holz wird zu Geräthschaften verarbeitet. Der Citronenbaum (**Citrus media**) kam schon zu den Zeiten der alten Römer aus seinem Vaterland (Ostindien) nach Europa; den Orangenbaum (**C. Aurantium**) brachte im J. 1520 der Portugiese Juan de Castro aus China nach Portugal; aus der Schaale der Pompelmuse (**C. decumana**), welche sehr große, verschiedentlich gestaltete Früchte hat, wird hauptsächlich das Citronat; aus der Bergamottenorange (**C. Bergamia**) das Bergamotöl gewonnen. Alle diese Arten fordern zum Ausdauern im Freien ein warmes Klima.

B. Mit 2 Staubwegen (Digynia).

13) Die Päonie oder Pfundrose, auch Pfingstrose, Kindlesweh- und Gichtrose genannt (**Paeonia officinalis**), wovon man die gefüllte Art überall in Deutschland in den Gärten sieht, ist und bleibt wohl die Lieblingsblume der Kinder, wegen der 2 bis 3 kleinen Hühnchen mit einem rothen Kamm, und mit sammetartigem, gelblichweißem Leibe, die mitten in den vielen purpurrothen Blättern, wie in einem Neste, sitzen. Macht man ein solches Hühnchen auf, so sind lauter kleine Eier darinnen. Diese Eier sind eben der Saamen, und mithin der rothe Kamm des Hühnchens das Pistill. Die Saamen bleiben aber unfruchtbar, weil alle Staubfäden in unsern Gärten

Digitized by Google

zu Blüthenblättern werden. Die Wurzel hat große Knollen, aus denen im Frühling das Gewächs, welches zuweilen fast eine Elle hoch wird, mit rothem Keime hervorgeht. Die Blumenblätter der Pfingstrose, welche syrupartig riechen, sind sonst gegen Gicht, Krämpfe und selbst gegen fallende Sucht (als Thee) im Gebrauch gewesen.

C. Mit 3 Staubwegen (**Trigynia**).

14) Der Ritterſporn (**Delphinium Consolida**) mit seinen blauen Blümchen und langem Sporn, gehört hieher. Eine Art davon wächst in den Feldern, die andern in Gärten.

15) Das Eisenhütchen (**Aconitum**), ist die schöne blaue Blume, welche hinten einen Schuh hat, in dem, wenn man ihn wegzieht, die Nectarien gleich zwei Täubchen sich zeigen, welche jedes an eine Deichsel, diese aber an einen Wagen (an den mittleren Theil, an dem die vielen Staubfäden und die Pistille sitzen) angewachsen sind. Das Eisenhütchen ist in allen seinen Theilen sehr giftig, und theilt diese tödtlich giftige Eigenschaft selbst dem Honig mit, den zuweilen die Erdhummeln aus ihm sammlen. Essig wirkt gegen solche Vergiftungen als Gegengift. Auch aus dem Eisenhütchen (von welchem es mehrere Arten giebt) wird übrigens, wie aus so manchem Gift, Arznei bereitet.

D. Solche mit 4 Staubwegen (**Tetragynia**).

16) Aus dieser Abtheilung führen wir nur den merkwürdigen Labetrunkſtrauch (**Tetracera potatoria**) an, welcher in Guinea als lebendiges Wasserbehältniß angepflanzt wird. Denn aus den Einschnitten, die man in seine Zweige macht, fließt eine solche Fülle des trinkbaren Wassers hervor, daß ein einziger Strauch den Durst mehrerer Wanderer zu stillen vermag und daß mithin jene strauchartige Schlingpflanze den Bewohner der heißen Guineaküste eben so statt eines unversiegbaren Wasserquelles dienen kann, wie die riesenhafte **Phytocrene gigantea** denen von Ostindien und die **Thoa urens** denen von Guiana. Die

Digitized by Google

Labetrunkpflanze hat einen 6 blättrigen Kelch und 6 Blumenblätter; sie erzeugt nach dem Verblühen 4 Saamenkapseln, von denen jede ein Saamenkorn enthält.

17) Der Peckeabaum (**Caryocar nuciferum**), der in den heißeren Gegenden von Amerika zu Hause ist, ergötzt das Auge durch seine schönen, purpurrothen Blüthen und den Gaumen durch seine wie Mandeln schmeckenden Nüsse, die von der Größe einer Kastanie sind. Die grüne Schale, welche diese Nüsse umgiebt, ist bei einer hiehergehörigen Art von einem butterähnlichen Mark durchdrungen.

E. Mit 5 Griffeln (**Pentagynia**).

18) Die Ageley (**Aquilegia vulgaris**) heißt auch bei einigen Glockenblume, weil sie wie eine blaue Glocke mit 5 eingebogenen Handhaben aussieht. Die Handhaben endigen unten in hohle Duten und zwischen ihnen stehen die 5 blauen Kronenblätter und die vielen Staubfäden und 5 Pistille. Die Handhaben sind Honiggefäße. Die Ageley wächst in bergigen Gegenden (besonders in Kalkgebirgen) wild. Die Saamen, die hie und da den Kindern gegen den Schorf und Ausschlag gegeben werden, so wie alle Theile der Pflanze sind giftig oder doch wegen ihrer Schärfe verdächtig.

19) Die Nigelle, auch Gretchen im Busch oder Jungfer im Gras genannt (**Nigella damascena**), hat ziemlich große blauliche Blumen, in denen (zwischen den 5 Blumenblättern und den Staubfäden) Honiggefäße stehen, welche dreispaltig sind. Die Blumen sind mit haarförmigen Blättlein umgeben. Der schwarze Saame der einen Art, der **N. sativa**, giebt den sogenannten Schwarzkümmel, den man als ein die Milch vermehrendes Mittel rühmt. Man giebt ihn aber jetzt fast blos noch den Kühen, und öfters ist es geschehen, daß die giftigen Saamen des Stechapfels unter den Schwarzkümmel gemischt waren und zugleich mit ihm verkauft wurden.

F. Mit vielen Griffeln (**Polygynia**).

20) Die Waldrebe (**Clematis Vitalba**), auch

Digitized by Google

Linnen und alter Mannsbart genannt, schlingt sich mit ihren langen, schlanken Stengeln in unsere Hecken hinein, so wie an Bäumen hinauf. Die gelblich weiße, süßlich riechende Blume hat blos vier weißliche Kelchblätter, keine Blumenkrone. Die silberweißen, haarigen Federbüsche, die an den Saamen sitzen, geben der Pflanze ein ausgezeichnetes Ansehen und machen sie, selbst noch im Winter, zu einem ländlichen Schmuck unserer Vorwälder und Hecken.

21) Die Wiesenraute (**Thalictrum**), davon die eine Art Blätter wie die Ageley hat und deßhalb **Thalictrum aquilegifolium** heißt, wächst vorzüglich in Gebirgsgegenden. Die Staubfäden sind an ihrem Ende ganz (federartig) breitgedrückt. Eine andere Art ist die gelbblühende (**Th. flavum**) und die kleine gelbliche (**Th. minus**), deren Blätter wie mit blaulichem Anfluge überzogen scheinen.

22) Von Anemonen (**Anemone**) und Pulsatillen oder Küchenschellen (**Pulsatilla**) giebt es mehrere Arten bei uns. Sie haben nur einen gefärbten Kelch, und die ersteren sind schöne weiße Blumen, wovon die kleinere Art (die **A. nemorosa**) gleich in den ersten Frühlingstagen, die andere großblumige (die **silvatica**) etwas später zur Blüthe kommt. Die Pulsatillen sind sammetartig violett und ihre großen schönen Glocken sind auch gleich im ersten Frühlinge da. Die Wurzel und auch andere Theile der Pulsatillen sind giftig und selbst die Blätter der weißen Anemone sollen den Schaafen Blutharnen machen.

23) Das Leberblümchen (**Hepatica nobilis**), unterscheidet sich von den Anemonen nur durch seine 3 kelchähnlichen Hüllblättlein. Das ist ein gar schönes, himmelblaues Frühlingsblümchen, mit zierlich 3lappigen Blättern. Man empfahl es sonst in mehreren Krankheiten der Brust und des Unterleibes, als eröffnend und stärkend.

24) Die Schmalzblume (**Caltha palustris**) ist die ziemlich große, gelbe Blume, die man, bald nachdem der Schnee weg ist, in Sümpfen und Gräben und an Bächen sieht. Sie blüht oftmals im Herbst

Digitized by Google

zum 2ten Male. Sie hat nach unten ganz runde Blätter.

25) Die Ranunkeln (Ranunculus), die man auch Hahnenfuß nennt, sind auch gelb, haben aber inwendig am untern Ende der Blumenblätter ein kleines, offenes, immer feuchtes Schüppchen, was die Schmalzblume nicht hat. Sie führen alle (eine Art mehr, die andere weniger) viel Schärfe bei sich, und machen, wenn man sie auf die Haut legt, Blasen. Die Ranunkeln, die übrigens, wie z. B. der scharfe Hahnenfuß (R. acris), auf allen Wiesen wachsen, haben nur 5 Blumenblätter, dagegen hat das schöne

26) Wiesengoldröschen, die Rollblume (Trollius europaeus), wie ein gefülltes Röschen, gewöhnlich 14 in 4 Reihen stehende Blumenblättchen, ist aber im ebenen Lande seltener zu finden als in Gebirgsländern.

27) Die Nieswurz oder Christwurz (Helleborus niger), die ihre weißlichen, großen 5blättrigen Blüthen, in welchen etwa 20 zweilappige, röhrige Honiggefäße stehen, öfters schon im Christmonat, selbst unter dem Schnee treibt, wächst in unsern südlichern Gebirgsgegenden hie und da wild, man zieht sie aber auch in Gärten. Die Wurzelfasern werden unter dem Namen Nieswurz (weil ihr Pulver heftiges Niesen erregt) als Arzeneimittel gebraucht.

28) In diese Abtheilung der 13ten Linneischen Klasse gehört auch der schöne, amerikanische Tulpenbaum Liriodendron tulipifera, eben so ausgezeichnet durch seine zierlich geformten Blätter als durch seine ansehnlichen Blüthen.

29) Interessanter jedoch und ungleich nutzbarer als der Tulpenbaum ist der Flaschenbaum (Annona americana), welche ebenso wie der Topfbaum in den heißen Ländern, namentlich von Amerika wächst. Seine Frucht hat allerdings einige entfernte Aehnlichkeit mit einer Flasche, indem sie nach dem Stiele hin von größerem Durchmesser (dicker) ist, nach ihrem Ende hin sich verdünnt. Ihre Außenfläche ist netzförmig von vorragenden Leisten durchzogen und überdies mit weichen Zacken besetzt. In dieser weichen

Digitized by Google

Hülle ist ein saftiges Mark enthalten, das einen Geschmack wie säuerlicher Milchrahm, mit Zimmt vermischt, hat, und eine lieblich kühlende Wirkung besitzt. Mit Ausnahme der Frucht geben die übrigen Theile des Baumes einen widerwärtigen Geruch von sich. Eine einzige solche Flaschenfrucht reicht eine hinlängliche Menge des Markes zum Nachtisch für etliche Personen dar, denn sie hat an ihrem untren Ende ½ Fuß im Durchmesser, während ihre Länge gegen ¾ Fuß beträgt. Noch größer und von noch ungleich köstlicherem Geschmack als die Frucht des eben beschriebenen gemeinen, ist die des Chirimoya-Flaschenbaums (A. tripetala), der im westlichen Südamerika zu Hause ist. Diese Frucht erreicht manchmal ein Gewicht von 14 — 16 Pfunden.

§. 30. Die 14te Klasse (Didynamia) ist eine gar ausgezeichnete Klasse, die zum Theil ein Blinder durch Geruch und Gefühl herausfinden könnte. Denn besonders die erste Abtheilung, welche nackte Saamen trägt, zeichnet sich fast in allen ihren Arten durch starke Gerüche, durch einen 4eckigen Stengel und einander gegenüberstehende Blätter aus, deren Paare wiederum kreuzweis, einmal an der einen, das andre mal an der andern Seitenfläche des Stengels sitzen. Die Blume ist bei allen mehr oder minder deutlich rachenartig gebaut, hat 4 bis 5 Einschnitte. In ihr stehen 4 Staubfäden, deren 2 länger als die andern 2 sind (also ein langes und ein kurzes Paar).

Unter die erste Abtheilung (Gymnospermia), bei der die Saamen ohne alle Hülle (nackt) unten am Boden des Kelches liegen, gehören fast lauter gewürzhafte Pflanzen, z. B.

1) Der Thymian (Thymus), davon die eine ganz kleine Art, der Kunold oder Quendel (Th. Serpillum), allenthalben an trocknen Rändern und auf Sandboden, mit seinem kaum eine halbe Querhand hohen Stengelchen wächst, die andere (Th. vulgaris) bei uns in Gärten steht. Der Kelch ist inwendig durch steife Haare verschlossen, die 2 längeren Staubgefäße

Digitized by Google

stehen an ihren Enden auseinander, die 2 kürzeren zusammen geneigt.

2) Von der Münze (**Mentha**) giebt es nicht blos die bekannte Pfeffermünze (**M. Piperita**) und Krausemünze (**M. crispa**), die man in unsern Gärten zu Thee zieht, sondern auch noch manche wilde, an feuchten Orten wachsende Arten. Bei der Münze ist die Mündung der Blumenkrone in 4 ziemlich gleiche Abschnitte getheilt.

3) Die Melisse (**Melissa officinalis**) steht auch als Thee- und Arzeneikraut in Gärten, und wächst schon in Süddeutschland, z. B. bei Hohentwiel im Würtembergischen und in der Schweiz wild. Der Kelch sieht wie vertrocknet aus, die Blümen sind weißlich oder röthlich, das Kraut riecht angenehm wie Citronen.

4) Der Lavendel (**Lavandula Spica**) oder Spick hat blaue Blümlein und einen ungleich 5zähnigen Kelch; Staubgefäße und Griffel ragen nicht über die Blume heraus, sondern sind tief in ihrer Röhre verborgen. Man bereitet aus dem Lavendel ein wohlriechendes Wasser und ein aromatisches Oel.

5) Vom Majoran (**Origanum Majorana**), der ein gar beliebtes Küchengewürz ist, giebt es auch eine wilde, nicht so kräftige Art im Freien draußen: den Feldmajoran oder Wohlgemuth (**O. vulgare**). Die Blumen stehen bei dem Majoran in 4seitigen, kurzen Aehren beisammen, die Oberlippe der Blume ist aufrecht, ausgerandet, die Unterlippe dreispaltig.

6) Der Gamander (**Teucrium**), zeigt an seiner Blume gar keine Oberlippe, sondern nur eine 3lappige Unterlippe. Die Blume bei der gemeinen Art (**T. Botrys**) ist roth, hat aber auf der Unterlippe einen weißen Fleck mit rothen Tüpfelchen und einen geraden, in die Höhe stehenden Stengel. Das ganze Pflänzchen riecht sehr balsamisch. Die andere Art (**T. Chamaepithys**), welche gelbliche Blüthchen mit 2 Reihen hellrother Pünktchen an der Unterlippe, dabei einen auf der Erde liegenden Stengel hat, ist noch balsamischer und gehört unter die sehr geschätzten Thee-

Digitized by Google

pflanzen gegen Gicht und Gliederschmerzen. Beide wachsen auf Bergen.

Auch das sogenannte Katzenkraut oder Marum Verum (Teucrium Marum) ist eine Gamanderart. Es wächst wild in Italien und Spanien. Bei uns wird es in Blumentöpfen gezogen. Die Katzen gehen diesem Kraut sehr nach, und machen doch, wenn man es ihnen giebt, wegen des scharfen Geruchs, gar viele Sprünge und wunderliche Grimassen.

Eben so ist der Bergpoley eine Gamanderart. Der ächte Bergpoley (T. Polium) wächst im südlichen Europa, unser deutscher Bergpoley (T. montanum) mit weißlichen Blüthen und am Rande umgebogenen, unten filzigen Blättern, thut aber fast dieselbigen Dienste.

7) Das Bohnenkraut (**Satureja hortensis**), auch Pfefferkraut genannt, das man als gewürzhaften Zusatz an die Bohnen kocht, wird bei uns in den Gärten gezogen, und kommt ursprünglich aus südlichern Gegenden. Es hat ganz schmale Blätter und hellblaue Blümchen, die zu 2 und 2 an den Blumenstielen stehen, und aus den Blattwinkeln hervorkommen.

8) Der Ysop (**Hyssopus officinalis**) wächst schon in den wärmern Gegenden von Deutschland auf Felsenbergen und Steintrümmern. Die blauen Blüthchen, welche einen walzenförmigen Kelch und eine aufrecht stehende Oberlippe haben, stehen in Aehrenbüscheln zusammengehäuft, alle nach der einen Seite des Stengels hin. Man braucht den Ysop, wie so viele Gewächse dieser Klasse, als Thee. Die Blätter sind auf der untern Seite scharf punktirt.

9) Die Katzenmünze, das Katzenkraut (**Nepeta cataria**), mit weißen, nach der Röhre hinein roth getüpfelten Blüthen, deren aufrechte Oberlippe ausgerandet, die Unterlippe gekerbt ist, und die in kurzgestielten Quirl-Haufen zusammengedrängt stehen, riecht sehr stark. Die Katzen haben zu diesem Kraute, das sie begierig aufsuchen, eine Zuneigung von ganz besonderer Art, denn wenn sie es gefunden haben, zerstören und verderben sie es (man vergleiche hiebei Nr. 6). Ein Aufguß der Katzenmünzenblätter soll sich beim Zahnweh sehr lindernd und heilsam erweisen.

Digitized by Google

10) Das Basilienkraut (**Ocymum Basilicum**), an dessen Blume sich ein kurzer Kelch mit breiter, scheibenrunder Oberlippe, und niederwärts gebogene Staubfäden finden, an deren größeren ganz unten ein zurückgebogener Fortsatz steht, wächst ursprünglich in Ostindien, wo man es als gewürzhaften Zusatz zu den Speisen und zur Bestreuung der Särge und Grabstätten gebraucht. Bei uns wird es in den Gärten gezogen.

11) Der kriechende Günsel (**Ajuga reptans**), hat nur eine ganz kleine Oberlippe, dabei blaue Blümchen, die je zu 12 bis 14 um den Stengel herumstehen. Seine Wurzelsprossen laufen kriechend am Boden fort. Er wird zur Heilung äußerlicher Geschwüre empfohlen, und ist ein gar gemeines Gewächs, das von der ersten Frühlingszeit an, überall an Hecken und in Wäldern zu finden ist.

12) Die Taubnessel (**Lamium**), die auch Bienensaug heißt, kommt auch mit ihren 2 Arten, einer weißen (**L. album**) und einer rothen (**L. rubrum**), gleich im Anfange des Frühlings zur Blüthe. Der Schlund der Blumenkrone ist etwas aufgeblasen. Die Taubnessel (sie heißt so, weil die Blätter, besonders der weißen Art, wie Nesseln aussehen) riecht wohl auch ziemlich stark, aber nicht sehr gut. Man benutzt die Blüthen der weißen Art zum Thee gegen Husten.

13) Die Hanfnessel (**Galeopsis**), heißt auch Hohlzahn, weil sich an der 3spaltigen Unterlippe ihrer Rachenblume zwei hervorragende, von außen oder unten her eingetiefte (hohle) zahnartige Voragungen zeigen. Die 5 Abtheilungen des Kelches enden in lange Borsten, die Unterlippe der meist rothen Blume ist weiß und roth gefleckt. Die eine Art, mit Knotengelenken am Stengel, die nach oben hinauf dicker, ihre Blumenwirtel aber zugleich sehr eng zusammengedrängt sind, ist die breitblättrige Hanfnessel (**G. Tetrahit**), eine andere die schmalblättrige (**G. Ladanum**). Beide wachsen als Unkraut in Feldern. Hieran reihet sich auch die gelbe Taubnessel oder Waldnessel (**Galeobdolon luteum**).

Digitized by Google

14) Das Gundermännlein oder die Gundelrebe (**Glechoma hederacea**), ein kleines blaues Blümchen mit fast epheuartigen (nierenförmigen, eingekerbten) Blättern, einem 5zähnigen Kelch und kreuzweise zusammenstoßenden Staubbeuteln, wächst überall an schattigen Wegen und Zäunen, so wie als Unkraut auf den Aeckern. Sie wurde sonst wegen ihrer heilsamen Säfte bei Menschen und Thieren als Arzenei gebraucht.

15) Der Roßpoley (**Stachys**) hat einen röhrenförmigen, eckigen in 5 pfriemenartige Spitzen endigenden Kelch; die Oberlippe der Blume ist gewölbt, die Unterlippe 3lappig, die beiden Seitenlappen abwärts gebogen; die verblühten Staubgefäße beugen sich zu beiden Seiten nach außen herum. Besonders die eine Art, die Wald-Stocknessel (**St. Sylvatica**) mit purpurrothen, an der Unterlippe weiß linirten Blumen, hat einen sehr unangenehmen Geruch. Man nennt diese Art auch Krötenkraut, weil sich die Kröten, durch den Geruch herbeigelockt, gern in seiner Nähe aufhalten sollen.

16) Auch die Ballote (**Ballota nigra**), die auch schwarzer Widerwart heißt, hat einen solchen widerlichen Geruch. Sie ist ein sehr gemeines Unkraut, das man durch den röhrenförmigen, 5eckigen, mit 10 erhabenen Leisten versehenen Kelch und die gekerbte Oberlippe der Blume unterscheidet. Die dunkelgrünen, herzförmigen Blätter sind, wie die Blumen, etwas wollhaarig.

17) Der weiße Andorn (**Marrubium album**) zeigt eine zweispaltige schmale Oberlippe an seiner Blume; die Spitzen der 10 Kelchzähne sind hakenförmig gebogen. Die Blätter sind wollenartig behaart und weißlich; die ganze Pflanze giebt einen aromatischen, nicht unangenehmen Duft von sich.

18) Das Schildkraut, Helmkraut (**Scutellaria galericulata**) mit je 2 und 2, immer nach einer Seite hin stehenden, schönen blauen Blümchen, unterscheidet sich durch den unzertheilten blos zweilip-

Digitized by Google

pigen Kelch, der nach dem Verblühen der Blume sich mit einem schildartigen Deckel schließt.

19) Das Braunellenkraut (**Prunella vulgaris**), mit violetten Blumen deren Kelche röthlich sind, unterscheidet sich durch die Staubfäden, welche nach vorn gabelartig in 2 Spitzen endigen, an deren einer der Staubbeutel sitzt.

20) Der Wirbelborsten oder Weichsattel (**Clinopodium vulgare**), zeichnet sich durch die vielen Borsten aus, welche die Blumenwirtel wie eine Hülle umgeben. Die Blüthlein sind röthlich; die weißlichhaarigen Blätter sind weich anzufühlen, man hat sie hin und wieder als ein Ersatzmittel des grünen Thees empfohlen.

B) Die andere Abtheilung der 14ten Klasse (**Angiospermia**) hat ihren Saamen in einer Art von Kapsel liegen, z. B. bei dem

21) Pfennigkraut (**Rhinanthus crista galli**), Klaffen- oder gelben Hahnenkammblume, die als ein Unkraut in manchen Feldern unter dem Getreide, das durch diese lose Gesellschaft leicht und mehlarm wird, und auch auf Wiesen wächst, fast wie ein Pfenniglein gestaltet ist, und fast eben so beim

22) Läusekraut (**Pedicularis**), das in Sümpfen und auf feuchten Wiesen wächst, eine schöne rothe Blume, und sehr zierlich vielgetheilte Blätter hat.

Die gemeinste Art ist das Sumpfläusekraut: **P. palustris**, mit ästigem Stengel, und gefiederten Blättern, deren Seitenblättlein wieder gefiedert zertheilt sind.

23) Die Schuppenwurz (**Lathraea squamaria**) ist die sonderbar aussehende, am ganzen Stengel mit dicht aneinanderliegenden, eirunden Schuppen bedeckte Pflanze, die gleich in der ersten Frühlingszeit, wenn die Birke blüht, mit ihren schmutzig fleisch- oder pfirsichblüth-rothen Blumen aus der Erde kommt. Sie findet sich nur in manchen Gegenden von Deutschland an sumpfigt schattigen Orten, besonders in Laubwäldern, und ihre perlschnurförmige Wurzel sitzt in der Tiefe gewöhnlich auf einem alten Stock, z. B. von einer Buche, auf. Die einblättrig-rachenförmigen,

Digitized by Google

von einem glockenartig vierspaltigen Kelche umgebenen Blüthen, stehen alle nach einer Seite hin. Man nennt die Pflanze auch das Ohnblatt, weil sie, wie schon erwähnt, am Stengel keine eigentliche Blätter, sondern nur Schuppen hat. Man brauchte sie sonst gegen die Zuckungen (das sogenannte Gefreisch) der kleinen Kinder.

24) Der Augentrost (**Euphrasia**), davon die kleinere Art (**E. officinalis**), deren Blümchen gelb und purpurn gesprenkelt sind, auf Wiesen, die größere (**E. Odontites**), mit dunkelpurpurrothen Blüthen in Feldern wächst, unterscheidet sich durch eine Granne (Borste) am Grunde der unteren Staubbeutel.

25) Der Kuhweizen (**Melampyrum**) sieht oben am Stengel schön violblau oder röthlich aus, worauf dann die gelben Blüthen (denn das Blaue oder Röthliche sind nur Deckblätter) recht schön abstechen. Er wächst auch in Feldern.

Bei der einen Art, dem kammartigen Kuhweizen (**M. cristatum**), ist die Blumenähre viereckig gestaltet, bei dem Ackerkuhweizen (**M. arvense**) ist sie schlaff und kegelförmig, bei andern Arten, wie bei **M. nemorosum, pratense, sylvaticum** stehen die Blümchen alle nach einer Seite hin.

26) Das Löwenmaul (**Antirrhinum**), das seinen Namen von der Gestalt seiner Blumenkrone hat, die besonders bei der großen Art (**A. majus**) mit roth und gelben Blumen, welche in unsern Gärten gezogen wird, einem Löwenmaul sehr ähnlich ist, theilt sich in gar viele Arten, davon die eine, gemeinste, welche Frauenflachs oder Leinkraut (**Linaria**) heißt, schöne gelbe Blumen mit Sporen, und Blätter wie der Flachs hat. Diese Art ist als ein schmerzstillendes und erweichendes Hausmittel gegen mancherlei Krankheiten allenthalben bekannt, und wird zu Dampfbädern und Umschlägen, sowie als Thee angewendet.

27) Der Fingerhut (**Digitalis**), wovon die eine Art (**D. purpurea**) schöne purpurrothe Blüthen trägt, welche jedoch manchmal auch weiß sind, die andern Arten aber gelbe, wächst hin und wieder in Deutschland auf waldigen Bergen. Die Blumenkrone ist

Digitized by Google

glockenförmig und faſt wie ein Fingerhut geſtaltet. Die Blätter des rothen Fingerhuts ſind zwar ſehr giftig, geben aber auch zugleich ein kräftiges Heilmittel in verſchiedenen Krankheiten ab.

28) Das Ervenwürgerkraut, die Sommerwurz (**Orobanche**), wächſt an trocknen Stellen, Waldrainen und auf dürren Aeckern, an den Wurzeln andrer Gewächſe, namentlich der Hülſenfrüchte. Die ganze Pflanze ſieht nicht grün, ſondern röthlich oder bräunlich aus und iſt mit bräunlicher Wolle überzogen; ſtatt der Blätter hat ſie eirunde Schuppen, auch die knollige Wurzel iſt ſchuppig. Die meiſt gelbfarbige Blumenkrone iſt rachenförmig und hat eine eingebogene, weite, bauchige Röhre.

Bei der einen Art, der Gewürznelken-Sommerwurz (O. **caryophyllacea**), riecht, beſonders die Wurzel, nach Gewürznelken. Dieſe wächſt auf trocknen Wieſen und Feldern; O. **major** in Wäldern und Büſchen, O. **ramosa** in Hanffeldern, O. **caerulea** iſt blau.

29) Die Braunwurz (**Scrophularia officinalis**) wächſt an feuchten, ſchattigen Orten und zeichnet ſich durch ihre bauchigen, kugelförmigen, röthlich braunen Blüthchen und runde Kapſel aus. Die eine Art, die am Waſſer wächſt (**Scr. aquatica**), hat einen Stamm mit häutiger flügelartiger Einſäumung. Dieſe Art heißt auch St. Antonskraut.

Von außereuropäiſchen Gewächſen, welche in dieſe Abtheilung gehören, erwähnen wir hier nur noch im Vorübergehen den Seſam (**Sesamum orientale**), aus deſſen Saamen ein vortreffliches Oel gepreßt wird, dann den Zuckerſtrauch (**Lippia dulcis**) aus deſſen jüngeren Zweigen, Blättern und Kelchen beſtändig, ſo lange ſie kräftig ſind, ein reiner Zuckerſtoff ausſchwitzt, ferner den Trompetenbaum (**Catalpa cordifolia**) mit langen, ſchotenförmigen Fruchtkapſeln, der ſchon bei Padua in Alleen gezogen wird und den mächtig großen Tiektbaum (**Tectona grandis**), der in Oſtindien wächſt und das beſte Schiffsbauholz liefert.

§. 31. Die Pflanzen der 15ten Klaſſe (**Tetradynamia**) ſind auch leicht zu kennen. Sie haben an ihrer Blumenkrone 4 Blumenblätter, die meiſt an langen Stielen (Nägeln) ſtehen, und durch ihre Stellung eine Art von Kreuz bilden, weshalb die Pflanzen dieſer Familie auch Kreuzblüthige heißen,

Digitized by Google

dabei 4 lange und 2 kurze Staubfäden, und wenn sie abgeblüht haben, ist die Frucht entweder ein Schötchen, das fast eben so breit als lang, oder eine Schote, die lang und walzenförmig ist. Dahin gehören unsere meisten Kohl- und Gemüsearten, so wie unsere meisten ölgebenden, überhaupt aber gar manche vortreffliche und heilsame Pflanzen, z. B.

A. Schötchen tragende (Siliculosa).

1) Das Steinkraut (Alyssum calycinum), hat kleine gelbe Blüthchen, runde Schötchen, Zähnchen an den Staubfäden und wächst auf dürrem, sandigem oder steinigem Boden.

2) Das Löffelkraut (Cochlearia officinalis), das freilich eigentlich mehr an der Meeresküste der nördlichsten, kältesten Länder zu Hause ist, wird auch bei uns in Gärten gezogen. Es wird nicht viel über eine Spanne hoch, die untersten Blätter haben durch ihre langen Stiele eine fast löffelartige Gestalt, das etwas dicke, breite Schötchen ist mit Höckerchen besetzt.

Dieses ist gar ein treffliches, heilsames Gewächs, das gerade für die kalten Gegenden, in denen es so häufig wächst, daß an feuchten Orten der ganze Boden davon bedeckt ist, ein unschätzbares Gut genannt werden kann. Denn in jenen kalten Ländern bekommen die Menschen gar oft eine Krankheit, welche alle ihre Lebenskräfte so ganz mitnimmt, daß sie kaum ein Glied regen können; dabei fault das Zahnfleisch, alle Säfte verderben, und die Kranken sterben oft in kurzer Zeit, wenn ihnen nicht Hülfe geschieht. Da thut nun das frische Löffelkraut, was noch dazu in jenen kalten Ländern einen gar angenehmen Geschmack hat, wahre Wunder, und schon manchmal sind solche arme, von der Scharbock-Krankheit gelähmte, Seefahrer, die den Winter in jenen kalten Gegenden hatten hinbringen müssen, und wovon am Ende nur noch wenige am Leben geblieben waren, auf allen Vieren hinausgekrochen ins Freie, wenn der Frühling gekommen war, haben ein wenig Löffelkraut gegessen, und konnten heimwärts nach ihrer Hütte schon wieder aufrecht gehen, so gestärkt hatte sie das frische Kraut. So hat der liebe Gott überall für seine hülfsbedürftigen Menschen schon eine Apotheke angelegt, ehe noch der Kranke hinkommt, und die schöne Erde ist allerdings die am vollkommensten eingerichtete Heilanstalt.

Eine Art von Cochlearia, die C. armoracia, ist unser bekannter Meerrettig.

3) Die gemeine Gartenkresse (Lepidium

Digitized by Google

sativum), auch Naſturtium genannt, trägt Blätter, die in lauter kleine, ſchmale Läppchen zerſchnitten ſind, und eirunde, zuſammengedrückte Schötchen. Man zieht ſie in den Gärten zu Salat, und braucht ihren Saft auch bei Frühlingskuren.

4) Das Hirtentäſchlein (**Thlaspi bursa pastoris**), iſt wohl nicht ſo nützlich, aber wegen ſeiner artigen, 3eckig herzförmigen Schötchen den Kindern überall bekannt. Es wächſt allenthalben, und giebt, beſonders ſo lange es jung iſt, ein gutes Viehfutter. Hieher gehört auch

5) Die Jerichoroſe (**Anastatica hierochuntica**). Es mag ſchon auffallen, wie eine Roſe neben das Hirtentäſchchen zu ſtehen kommt, indeß wird Jeder, der dieſe merkwürdige Pflanze, deren eigentliche Heimath die ſandigen und ſteinigen Wüſten am Jordan und todten Meere, ſo wie Arabiens und Aegyptens (oſtwärts vom Nile) ſind, nur in dem zuſammengetrockneten Zuſtand geſehen hat, in welchem ſie gewöhnlich zu uns gebracht wird, ſchon der Form wegen, welche die Pflanze dann hat, den Beinamen einer Roſe begreiflich finden. Denn die Stiele ihrer in Doldengeſtalt beiſammenſtehenden Saamenkapſeln ſind dann öfters ſo zierlich übereinandergelegt, wie die Knospe, oder kreisförmig halbgeöffnet, wie die ſich eben aufſchließende Blüthe einer hundertblättrigen Roſe. Wenn man aber dagegen die Jerichoroſe in ihrem jüngeren, friſchen Zuſtande, mit ihren kleinen weißen Blüthen ſieht, verräth ſie allerdings dem Auge ihre Verwandtſchaft mit den Pflanzenfamilien der 15ten Klaſſe.

In dieſer alltäglicheren Geſtalt würde ſie von den Pilgern des gelobten Landes ſchwerlich beachtet worden ſeyn; ſie empfängt ihre merkwürdigen Eigenſchaften erſt dann, wenn ſie alt und erſtorben iſt, erſt dann, wenn ihre zahlreichen Zweige ſich kuglich oder vogelneſtartig zuſammengezogen haben. Denn wenn man eine ſolche Pflanze, die der Sturm entwurzelt hat, und über den Wüſtenſand hin und hertreibt, ſo wie ſie dann einem dürren Todtengebein ähnlich vor Augen liegt, bis an ihre Mitte ins Waſſer ſetzt, da ſcheinen auf einmal ihre todten Zweige ein neues Leben zu bekommen; ſie breiten ſich aus; ihre kleinen Enden bekommen eine roſenrothe Färbung. Man läßt ſie dann behutſam trocknen und kann den Verſuch

Digitized by Google

mit demselben Erfolg wiederholen, so oft man will. Aus diesem Grunde hat sie den Namen Anastatica, Auferstehungsblume, auch Osternachtsrose erhalten.

5) Der Färberwaid (Isatis tinctoria). Dieser wird in manchen Gegenden von Deutschland auf den Feldern und in den Gärten in großer Menge gebaut, so daß wohl die Meisten die gelbblühende Pflanze, deren Schötchen gerade so wie die Saamen der Edelesche gestaltet sind, werden gesehen haben, besonders da sie am Rhein und in mehreren gebirgigten Gegenden wild wächst. Man benutzt die Blätter, die man vorher trocknet, stampft, und dann angefeuchtet zu rundlichen Ballen bildet, zum Blaufärben der Tücher und Zeuge. Die anfänglich grüne Farbe wandelt sich durch Kalkwasser in Blau um. Und da denn der Mensch einmal die Art hat, daß er durchaus entweder (wenn er ein Indianer ist) den Leib unmittelbar, oder wenigstens seine Bekleidung bunt angestrichen haben will, so läßt man sich eine solche bescheidene blaue Farbe noch immer am liebsten gefallen.

7) Der Strandkohl, Meerkohl (Crambe maritima), dessen junge Sprossen im Frühling ein sehr gesundes Gemüse geben, unterscheidet sich dadurch, daß die vier längeren Staubfäden seiner Blüthen gabelförmig, jeder in 2 Zinken endigen, an deren einer der Staubbeutel sitzt. Er wächst an unserm deutschen Meeresstrand der Ost- und Nordsee.

B. Es kommen nun jene Pflanzen der 15ten Klasse, welche lange Schoten haben (Siliquosa).

8) Da sollte denn doch Jeder, der ein wenig lateinisch verstehen will, auch wissen, daß das sogenannte Wiesenschaumkraut, welches im Frühling auf allen Wiesen wächst, ziemlich große weiße oder röthliche Blumen, einen etwas aufgesperrten Kelch und gefiederte Blätter hat, Cardamine pratensis heiße; eine andere, in Wäldern wachsende, ihr ziemlich ähnliche Art mit bittern Blättern C. amara. Diese letztere wird oft verwechselt mit der edlen

9) Brunnenkresse (Sisymbrium Nasturtium), die sich schon dadurch vom Schaumkraut unterscheidet,

Digitized by Google

daß sich bei diesem die Schaalenstücke der Schote beim Aufspringen zurückrollen, während sie bei der Brunnenkresse gerade bleiben. Die Brunnenkresse wächst an vielen Orten in Europa, und sogar im heißen Morgenlande, in frischen Quellen und Bächlein, und man kennt sie gleich an ihrem angenehm scharfen (fast senfartigen) Geschmacke. Sie hat in Wäldern schon manchen vom Herumirren und von Hunger ganz Ermatteten so gestärkt, daß er weiter gehen, und sich wieder zu Leuten finden konnte; ist ein guter Frühlingssalat und Heilmittel gegen scorbutische Krankheiten. Auch Gewächse in der Nase (Nasenpolypen) sind durch Einziehen des Brunnenkreßsaftes geheilt worden.

Eine Art von **Sisymbrium**, der **Waldknoblauch** oder **Läuchelhederich** (Sisymbrium, oder auch **Erysimum alliaria**), hat weiße Blüthen und riecht frisch stark nach Knoblauch. Besonders thun dieß die rund eingeschnittenen und gezähnten Blätter. Der Waldknoblauch wächst in Gebüschen.

10) Auch der weltbekannte **Levkoi** oder **Veil** (**Cheiranthus Cheiri**) gehört daher, so wie

11) Die Arten des **Kohles** (**Brassica**), mit aufrecht stehendem, oben zusammengebogenem Kelch, kugelrunden Saamenkörnern und mit Drüsen zwischen dem Pistill und den 2 kürzeren, so wie zwischen dem Kelch und den 4 längeren Staubfäden, unter andern

a) der schön gelb blühende Rübsaamen (**Br. Napus**), dessen Rübe, so lange sie noch jung ist, unter dem Namen Fettrübe, auch Federrübe, wegen der gefiederten Blätter, und Steckrübe, verspeist wird, und aus dessen Saamen das Rüböl oder Brennöl gemacht wird.

b) Die weiße Rübe (Br. Rapa) und

c) die ungemein vielen Arten des gemeinen Weißkrautes und Küchenkohls (Br. oleracea), den schon der alte Pythagoras als ein vorzüglich gesundes, dem Menschen gar zuträgliches Gemüse empfiehlt, das ihn bei heiterem, ruhigen Sinn und Muthe erhalte. Und das ist wohl recht gut und löblich, wenn der Mensch sich vor solchen Speisen und vor solchen Uebermaaßen sehr in Acht nimmt, die den Leib sehr aufreizen, oder träg und verdrossen machen, und sich lieber an solche hält, wobei der Leib hübsch leicht und still bleibt; was aber den heitern, ruhigen Sinn betrifft, so kommt der freilich von etwas anderm her, als vom Kohlessen.

Digitized by Google

12) Der Senf (Sinapis), unterscheidet sich an seiner Blüthe von der Blüthe der Kohlarten dadurch, daß die Blättlein seines Kelches nicht so wie bei jenen oben zusammengebogen und an die Blume angeschlossen sind, sondern weit von einander abstehen, und flach ausgebreitet sind. Der eigentliche Senf, den man in der Küche und in den Apotheken, z. B. zum Senfpflaster gebraucht, ist der schwarze Senf (S. nigra).

13) Der Rettig (Raphanus sativus), welcher selbst noch in Labrador und in Grönland gedeiht, hat eine knotige Schote, die fast wie in runde Gelenke getheilt aussieht, und zusammengeschlossene Kelchblättlein wie der Kohl. Aus dem gemeinen Rettig hat der Mensch durch seine Gartenkunst auch die Radieschen erzogen, eben so wie aus dem Küchenkohl oder Blaukohl den Kohlrabi, den Wirsching und Blumenkohl.

Die Chinesen sind doch ein wirthschaftliches Volk, die pressen nicht blos aus dem Saamen einer solchen Rettigart das Oel, woraus sie mit Kalk zusammengeknetet, ihren dauerhaften Kitt zum Verkitten ihrer Fahrzeuge machen, und das sie in ihren Lampen brennen, sondern fangen auch den Rauchdampf der Lampen in weiten Trichtern auf, und machen dann zum Theil ihre schwarze Tusche daraus.

Eine wilde Rettigart (R. raphanistrum) wächst in den Saatfeldern.

§. 32. In der 16ten Klasse (Monadelphia) sind, wie man gleich an den Blumen der Käsepappeln oder Malven sehen kann, die Staubfäden unten alle miteinander zusammengewachsen. Es gehören dahin:

1) Die Passionsblume (Passiflora), die man öfters in Blumenscherben vor den Fenstern stehen sieht. Dies ist eine schöne, ansehnliche Blume, welche inwendig eine Art von Krone oder Kranz hat, und deren 3 Pistille an einer Säule stehend, fast so aussehen wie Nägel, welche oben in einen runden Kopf endigen. Sie ist aus Amerika gebracht worden. Jene Art, die man am häufigsten bei uns sieht, ist die Passionsblume mit blauer Nectarienkrone (P. caerulea). Die meisten Arten dieser Gattung sind rankende Gewächse. Mehrere

Digitized by Google

von ihnen tragen Früchte, die ein breiartig weiches, wohlschmeckendes Mark enthalten, und welche unter dem Namen der Grenadillas im südlichen Amerika allgemein bekannt und sehr beliebt sind.

2) Die Arten des Pelargoniums (Pelargonium) mit 7 und

3) die des Geraniums (Geranium) mit 10 Staubfäden sind beide unter dem Namen Storchschnabel bekannt. Von den letzteren giebt es manche wilde Arten mit schönen blauen und rothen Blumen auf unsern Wiesen und Bergen (z. B. G. pratense, sylvaticum u. s.). Die ersteren vornehmlich sind in neuerer Zeit zu einer rechten Mode und Lieblingsblume der Kunst- und Lustgärten geworden. Ihre vielen, durch allerhand Gärtnerkunststückchen immer häufiger werdenden Spielarten und Arten sehen zwar so bunt, aber zugleich auch so unbedeutend aus, wie die geputzten Stadtleute, wenn sie in eine Komödie oder zu einem Seiltänzer gehen wollen, und nicht einmal gegen die Tulpen, noch weniger gegen Aurikeln, Hyazinthen oder gar weiße Lilien kann sich jene Modeblume halten.

Dagegen lobe ich mir doch noch viel mehr die freilich altmodische, aber schöne, und wegen ihrer Arzeneikräfte auch sehr nützliche

4) Rosenpappel (Alcea rosea), deren Schönheiten nicht so ins Kleine gehen, wie bei den meisten Pelargonien, sondern so stark ins Auge fallen, daß es Bürgern und Bauern wohlthut, und die auch dabei kein so verwöhnter Zärtling ist, wie die meisten Geranien, welche immer hinterm Ofen sitzen wollen, sondern die mit jedem Ort im Garten oder auf dem Felde zufrieden ist. Sie wird wohl mannshoch, trägt rothe, gelbe, weiße, auch violette und braune Blumen, die fast so groß sind wie ein mittlerer Apfel, und um die Blume steht ein doppelter Kelch, wovon der äußere 3spaltig ist. Die Rosenpappel ist aus dem Morgenland, wo sie wild wächst, zu uns gebracht worden.

5) Der Eibisch (Althaea officinalis), der viel auf den Feldern gezogen wird, dessen Wurzeln und

Digitized by Google

Blätter man dann in die Apotheke verkauft, von wo sie als erweichendes Mittel gar oft verlangt werden, hat einen ungleich 9spaltigen äußern und halb 5spaltigen innern Kelch.

6) Die Malven (Malva), zu denen das fünftheilig blättrige Sigmarskraut (M. alcea), dann die krausblättrige (M. crispa) und rundblättrige Malve (M. rotundifolia) und noch manche andere im Freien wachsende Arten gehören, haben an dem äußeren Kelche 3 Blätter. Die Saamenkapseln, die wie kleine runde Kuchen aussehen, sind den Kindern wohl bekannt.

7) Die Baumwollenpflanze (Gossypium) blüht auch fast wie eine Malve, erzeugt aber in ihrer 4fächerigen Saamenkapsel viele Wolle, die auf den Saamen festgewachsen ist. Sie kommt nur in wärmeren Ländern fort, dort baut man sie in großer Menge auf den Feldern und in Gärten.

8) Auch der Wollenbaum (Bombax), der nur in den heißesten Ländern der Erde wächst, enthält in seiner Fruchtkapsel eine feine Wolle, die sich jedoch nicht verspinnen läßt, weil ihren Faserchen jene feinen Widerhäkchen fehlen, die sich an denen der ächten Baumwollenpflanzen finden.

In diese Klasse gehört auch noch:

9) Der riesenhaft dickstämmige Affenbrodbaum, oder die Adansonia (Adansonia digitata), deren Stämme bei einer geringen Höhe öfters einen Umfang von fast 80 Fuß (im Durchmesser 25 Fuß) haben, und wie man aus eingeschnittenen Jahreszahlen aus dem 15ten Jahrhundert in nur etwa 5 Fuß dicken Stämmen berechnet hat, vielleicht mehrere Jahrtausende alt seyn mögen, wenn sie jene riesenhafte Dicke zeigen. Die Frucht ist säuerlich mehlich und eßbar. Seine hohlen Stämme geben Wohnungen für ganze große Negerfamilien ab.

10) Auch des Handbaumes aus Mexiko (Cheirostemon platanoides), so genannt, weil seine 5 Staubgefäße zur Form einer Hand verwachsen sind, erwähnen wir noch im Vorübergehen, wegen der

Digitized by Google

großen Heilkraft, welche seinen Blüthen gegen die Epilepsie zugeschrieben wird.

§. 33. Die 17te Klasse (**Diadelphia**) ist eine gar augenfällige Klasse, denn dahin gehören alle unsere Hülsenfrüchte: die Erbsen, die Linsen, die Wicken, Bohnen, Kichererbsen, u. s. w. Man nennt eine solche Blüthe, wie z. B. unsere Bohnen und Gartenwicken haben, eine Schmetterlings-förmige Blüthe, und pflegt als Theile derselben zu unterscheiden: das nach oben stehende Blumenblatt, welches die Fahne (**vexillum**) heißt; zwei zur Seite stehende Blumenblätter, welche man als Flügel (**alae**) benannt hat, und das meist zu einem gemeinsamen, kahnförmig gebildeten, bauchig hohlem Stücke verwachsene untere Paar der Blüthenblätter: das Schiff oder den Kiel (**Carina**). In diesem Kiel finden sich die Staubfäden, deren bei den vollkommen schmetterlingsblüthigen zehn sind und welche gleich einer in 2 ungleiche Stücke (Bündel) getheilten Scheide die künftige Saamenhülse umfassen. Von dieser Theilung der mit einander verwachsenen Staubfäden in 2 Bündel, (davon der eine meist nur 1 oder 2 Staubfäden, der andere 8 und selbst 9 enthält) hat man die 17te Klasse als die zweibrüderschaftliche (**Diadelphia**), nach der Gestalt aber der Frucht als die Familie der Hülsenpflanzen (**Leguminosa**) benannt. Man zählt hieher folgende:

A. Mit 6 Staubfäden (Hexandria).

1) Der Erdrauch (**Fumaria** und **Corydalis**), wovon die eine Art, die auch im ersten Frühling mit hübschen rothen Blüthen und gefiederten Blättern fast an allen schattigen Orten vorkommt, Hohlwurz (**Cor. cava**) heißt, weil ihr runder Wurzelknollen, den man tief aus der Erde holen muß, meistens hohl ist, die andere gewöhnliche (**Fum. officinalis**) aber in Feldern und Gärten wächst, und noch in der Arzneikunde angewendet wird.

B. Mit 8 Staubfäden (Octandria).

2) Das Bitterkraut oder die Kreuzblume (**Polygala vulgaris und amara**), trägt ein bärtiges, kammförmiges, blaues Blümlein, welches aber so

wenig als das des Erdrauchs, den vollkommen schmetterlingsförmigen gleicht, und bittere Blätter, die gegen Wassersucht, Verschleimung, ja sogar gegen die angehende Schwindsucht angerathen werden. Eine Art (**Polygala Chamaebuxus**), mit gelb und weißen, oder roth und weißen Blüthen und buxusartigen Sträuchlein, wächst im Frühling auf manchen Gebirgshaiden und in Wäldern, von dem Berge hinter Weissenburg an bis nach München u. s. w.

C. Mit 10 Staubfäden (**Decandria**) und eigentlichen Schmetterlingsblumen.

3) Der Santelbaum (**Pterocarpus santalinus**), von welchem das schöne rothe Santelholz kommt, wächst als ein ansehnlich hoher Baum in Ostindien. Seine Hülsen sind sichelförmig und haben einen Flügelansatz, die Blätter stehen zu 3 beisammen.

4) Der Besenginster oder Pfriemen (**Spartium Scoparium**), leicht unterscheidbar durch seine ansehnlichen gelben Blüthen und seinen öfters mehrere Ellen hohem, besenartigen Strauch mit eckigen Zweigen. Dieser blüht im Mai als ein schönes, aber sehr gemeines Waldunkraut, fast überall in Deutschland, wo es Sand, Haide und steinige Hügel giebt. Nur auf Kalkgebirgen findet man ihn in der Regel nicht. Die eine Art, die Blumenbinse genannt, trägt sehr wohlriechende gelbe Blumen und runde, binsenartige Aeste. Sie wird in unsern Gärten gezogen.

5) Der Färberginster (**Genista tinctoria**), den man zum Grün- und Gelbfärben braucht, unterscheidet sich vom vorigen durch ein rückwärts und nach unten gebogenes Fähnlein seiner dicht und ährenförmig zusammengedrängt stehenden, gelben Blüthen. Er findet sich in Wäldern und auf Wiesen und bildet ein etliche Spannen hohes Gestrüpp.

6) Der Heckſaamen-Strauch, in manchen Gegenden auch Stech- oder Haideginster genannt (**Ulex europaeus**), wächst hin und wieder in Deutschland (besonders im nördlichen) auf ganz dürrem, sandigen Boden. Es ist ein in sehr viele Aeste zertheilter Strauch, mit rauhen, spitzigen Blättern und zer-

Digitized by Google

streuten scharfen Stacheln, welcher gleich bei Anfang des Frühlings schöne gelbe Blüthen trägt, die sich dadurch von der Blüthe des Ginsters unterscheiden, daß ihr Kelch aus 2 Blättlein besteht, während der Kelch des Ginsters nur einblättrig ist. Auch ist die Saamenschote (Hülse) des Heckſaamens so kurz, daß sie größtentheils vom Kelch bedeckt wird. Der Heckſaamenstrauch ist recht ausschließend ein Eigenthum der dürren Sandgegenden, auf denen nur wenig andere Gewächse gedeihen, und deren Holzmangel er ersetzt. Denn in solchem Boden säet er sich so häufig an, daß er gar nicht auszurotten ist, in gutem Boden aber erfriert er bei uns im Winter.

7) Der Gaisklee oder Bohnenbaum, auch Goldregen (Cytisus Laburnum), wächst nur in südlicheren und meist in gebirgigen Gegenden, und wird durch seine zu 3 und 3 zusammenstehenden sammetnen Blätter und gelben Blumentrauben leicht kenntlich.

Während wir den gewöhnlich sogenannten Gaisklee bei uns nur in Gärten und angepflanzten Hecken finden, giebt es dagegen in unsren Waldungen noch einige wilde Arten von Cytisus: z. B. den aufrecht traubigen (C. nigricans) mit wohlriechenden gelben Blüthen, und den kriechenden, stärker behaarten, mit fast doldenartig beisammenstehenden Blüthen (C. supinus).

8) Der sogenannte Akazienbaum, oder der gemeine Robinienbaum (Robinia Pseudacacia), dessen wohlriechende weiße Blüthen in niederwärtshängenden Trauben beisammen stehen, und dessen Blätter gefiedert sind, ist ursprünglich in Amerika zu Hause, wird aber, wegen seines, so lange er jung ist, sehr schnellen Wuchses, und wegen seines guten, harten Holzes, das man zum Gelbfärben brauchen kann, auch bei uns an vielen Orten angepflanzt. Seine Blätter sind dem Vieh ein sehr angenehmes Futter. Der Baum ist aber gegen solche Angriffe durch die starken Stacheln (dornenartige Afterblätter) geschützt, die an seinen Zweigabtheilungen stehen.

9) Der Blasenstrauch (Colutea), der oft in den Lustgärten steht, hat blasenartig dünn aufgetriebene Hülsen, die man mit einem Knall zwischen den Fingern

Digitized by Google

zerdrücken kann, was aber die Gärtner nicht eben gerne haben, weil dann der Saame nicht reif wird.

10) Die Hauhechel (**Ononis**), die schön roth blüht, macht sich, die eine Art durch ihre Stacheln (**O. spinosa**), die andere (**O. hircina**) durch bocksartigen Geruch, kund. Die Blume hat ein gestreiftes Fähnchen.

11) Der Wundklee, Berufskraut (**Anthyllis vulneraria**), ist die Wiesenblume, deren gelbe Schmetterlingsblüthen mit bauchigen Kelchen in einen doppelten Kopf oder Knoten zusammengedrängt stehen. Die kleine Hülse, die nur 1 bis 2 Saamen enthält, bleibt im Kelch verborgen.

12) Die Feigbohne (**Lupinus**), wovon die schöne, wohlriechende, gelbe Art (**L. luteus**), auch unter dem Namen türkischer oder spanischer Veil, auch gelber Veil, bekannt ist, wird häufig in Gärten gebaut. Es giebt gelb=, weiß= und blau=blühende Arten. Die Blüthen stehen oben an dem Stengel in Form einer Pyramide, die Blätter sind in schmale Abschnitte getheilt, die wie die Strahlen eines Sonnenfächers (fingerförmig) beisammen stehen. Die Blätter der Feigbohnen kehren sich immer nach der Sonne hin, so daß man auch bei trübem Wetter daraus den Stand der Sonne bemerken kann. Die meisten Arten wachsen in Spanien, Sicilien und andern warmen Ländern von Europa wild, auf den Getraidefeldern. Die Saamenkerne, die besonders bei der gelben Art schwarz getüpfelt sind, führen viel Mehl in sich, und werden hie und da als Viehfutter benutzt. Die unreifen Schoten, erst abgekocht, dann geröstet, werden zuweilen als Zusatz unter den Kaffee benutzt.

13) Die Bohne (**Phaseolus vulgaris**), wird in unsern Gärten in vielen Spielarten gezogen, und ihre grüne, noch unreife Hülse, so wie auch von der einen Art die kleinen, weißen Kerne, als ein gutes, gesundes Gemüse genossen. Ursprünglich soll sie aus Ostindien und Aegypten gekommen seyn. Dagegen war

14) Die Saubohne (**Vicia Faba**), die auch Puffbohne heißt, und weiße, schwarzgefleckte Blüthen

Digitized by Google

trägt, welche, wenn man an einem Felde vorbeigeht, das ganz voll solcher Bohnen steht, gar angenehm riechen, aber den Kopf betäuben, schon unsern alten Deutschen bekannt. Man genießt die unreifen Kerne als Gemüse, und baut sie besonders in Norddeutschland, wo der gute Pumpernickel, den die Leute dort statt Brod essen, die Mägen so stark und kräftig macht, daß sie die schwere Bohne leicht verarbeiten können. Uns Weißbrodmännlein in Süddeutschland will sie weder gut schmecken, noch auch gut bekommen; wir lassens daher mit ihrem Anbau fast ganz anstehen. Für das arme Volk in Aegypten ist die Puffbohne ein Hauptnahrungsmittel.

Die Puffbohne hat am Pistill ein kleines Bärtchen, und das hat die Futterwicke (V. sativa), deren Körner man als Taubenfutter baut und in theuern Jahren zu Mehl vermahlt, auch, darum wird sie, so wie die Zaunwicke, mit hieher gerechnet.

15) Die Linse (**Ervum Lens**), trägt etwas platt gedrückte Saamen. Sie wird in Süddeutschland viel auf den Feldern gebaut.

16) Die Erbse (**Pisum sativum**), mit länglicher, aufgeblasener Hülse und 3kantigem Griffel oder Pistill, wird überall gebaut, als Zuckerschote so wie als gemeine Erbse, und grün so wie getrocknet gegessen.

17) Das Süßholz (**Glycyrrhiza glabra**), hat eine eirunde, zusammengedrückte Hülse. Es wird hin und wieder auf den Feldern und in Gärten gezogen, weil seine inwendig gelbe Wurzel das Süßholz, und der eingedickte Saft davon den Liquiritiensaft giebt.

18) Die Esparsette oder der gemeine Hahnenkammklee (**Hedysarum Onobrychis** oder **Onobrychis sativa**), mit schönen, rothen, gestreiften Blüthen, gefiederten Blättern und gegliederten stachlichten Saamenhülsen, wächst auf Kalk- und Kreideboden hie und da wild, wird aber auch als ein gutes Viehfutter angebaut. Ein Esparsettenacker giebt, vom 2ten Jahre an, zwanzig Jahre und länger reichlichen Ertrag, braucht nur alle 3 bis 4 Jahre gedüngt zu werden und leidet, weil seine Wurzeln sehr tief gehen, auch wenig von der Dürre.

Digitized by Google

Bei einer Art von Hahnenkammklee, dem beweglichen (**H. gyrans**), stehen 3 Blätter, ein größeres in der Mitte und 2 kleinere dem zur Seite, beisammen. Die beiden kleinen sind von selber in einer immerwährenden, auf und niedersteigenden Bewegung.

19) Der Pferdehufklee (**Hippocrepis comosa**), unterscheidet sich durch seine pferdehufartig gegliederte, gekrümmte Hülse.

20) Die Frühlings-Walderbse (**Orobus vernus**), die mit ihrer violblauen und purpurrothen, ziemlich großen Schmetterlingsblume, gleich in der ersten Frühlingszeit ein Schmuck unserer Waldungen ist, hat gefiedert eirunde Blätter, einen 5spaltigen Blumenkelch, dessen beide obere Lappen kürzer sind; der Griffel ist schlank, linienförmig, an der Spitze bartig, die Hülse walzenförmig.

21) Die Platterbse (**Lathyrus**), mit einem flachen, nach vorne breiteren, bärtigen Griffel, ist vorzüglich durch die schöne, wohlriechende, eigentlich aus Sicilien stammende Art (**L. odoratus**), bekannt, die unter dem Namen Gartenwicke eine Zierpflanze unsrer meisten Gärten ist, und welche große, weiße oder blaue und rothe Blumen hat. Eine auf Wiesen und in Hecken, bei uns wildwachsende Art (**L. pratensis**), mit gelben Blüthen, rankt sich mit ihren gabelförmigen Zweigen an andre Gewächse an. — Dahin gehört auch die Ackernuß (**L. tuberosus**), welche hochrothe, wohlriechende Blumen trägt und an ihren Wurzeln eßbare Knollen (Erdeicheln genannt) erzeugt. Diese hat ebenfalls rankende Stämmchen und Zweige.

22) Bei der Indigopflanze (**Indigofera Anil und tinctoria**), aus deren Blättern der Indigo zum Blaufärben bereitet wird, hat das Schiffchen auf beiden Seiten einen pfriemenförmigen Sporen und ist, so wie das Fähnchen, bei der **I. tinctoria** gelb, die Flügel roth. Beide Arten sind in Ostindien zu Hause, werden aber auch in Westindien häufig angebaut, zur Farbenbereitung.

23) Der Krautgartenkaffee, die Kaffeewicke (**Astragalus baeticus**), deren braune fast viereckige Saamen, wenn sie geröstet werden, dem

Digitized by Google

Kaffee etwas ähnlich schmecken, und die man daher auch hie und da in den Gärten anbaut, hat 3eckige, längliche, an der Spitze mit einem krummen Hacken versehene Hülsen (Schoten). Die Stengel stehen beim Blühen aufrecht, werden aber, wenn die Früchte groß geworden sind, durch diese zu Boden gezogen. Diese Pflanze heißt auch spanischer Tragant, weil sie ursprünglich aus Spanien kommt und weil aus einer Art dieser Pflanzengattung, dem **Astragalus creticus** oder Tragantstrauch, welcher Stacheln an den Blattstielen hat, der Gummi-Tragant kommt.

24) Die bunten Peltschen (**Coronilla varia**), die an Hügeln und Ackerrainen stehen, blühen roth und weiß, die Blumen wachsen aber in runden Knäueln oder Köpfen zusammen. Die Hülse oder Schote hat 5 Gelenke.

Dieß Kraut ist giftig, wie man das zum Theil aus sehr trauriger Erfahrung weiß. Unwissende Afterärzte sollen nämlich schon zuweilen die Peltschen, die freilich damit gar keine Aehnlichkeit haben, für den Seite 48 beschriebenen Fieberklee gehalten, und kranken Kindern einen Thee davon gegeben haben, auf welche dieser dann freilich sehr schädlich einwirkte. So geht es, wenn einer auf die Hirschenjagd gehen will, der noch nicht weiß, ob der Hirsch ein Thier ist, das auf den Bäumen sitzt und Flügel hat, wie ein Storch, oder das kriecht wie eine Eidechs, oder auf 4 langen Füßen springt, wie ein Kalb.

25) Der Goldklee (**Lotus corniculatus**), dessen prächtig gelbe Blüthchen in niederwärts gebogenen Köpfchen oder Dolden beisammen stehen, und walzenförmige, an ihrer Spitze eingedrückte Hülsen erzeugen, findet sich an allen Fußsteigen und Ackerrändern, so wie auf trocknen Wiesen. Die Blumen riechen angenehm.

Eine Art, mit einzeln stehenden, großen, hellgelben Blumen, deren Narbe trichterförmig und schief geschnabelt ist, und deren Schote 4 blattartige Flügelvorsprünge hat, heißt Flügelschote, **Lotus siliquosus** und **Tetragonolobus siliquosus.**

26) Der Steinklee (**Melilotus officinalis**) dessen gelbe oder weiße Blüthchen in langen Trauben beisammenstehen, trägt lederartige Hülsen, die länger als der Kelch sind.

Digitized by Google

Aus dem officinellen Steinklee bereitet man das Melilotenpflaster; eine blau blühende Art (**M. caerulea**) wird, besonders in der Schweiz, als Futterkraut angebaut; das Pulver der getrockneten Blätter von dieser, wie von der weißblühenden Art wird unter den Käse gemischt und so der bekannte Kräuterkäse oder Schabzieger bereitet.

27) Der gemeine Klee (**Trifolium pratense**), dessen kleine Blüthchen in Köpfen beisammenstehen, gehört mit allen seinen vielen Arten auch hieher, so wie

28) Der Schneckenklee (**Medicago**), so genannt wegen seiner sichelförmig gebognen oder schnekkenartig gewundnen Hülse, dessen bekannteste Art die Luzerne (**M. sativa**) ist. Beide Geschlechter von Pflanzen sind unserm Vieh eben so viel werth, wie uns die eßbaren Hülsenfrüchte.

§. 34. Die 18te Klasse (**Polyadelphia**), enthält bei uns hier nur eine einzige im Freien wachsende Gattung von Pflanzen: das Hartheu. Diese Klasse soll sich dadurch unterscheiden, daß die Staubfäden der Blume in mehrere Bündel verwachsen sind. Das Hartheu (**Hypericum**), trägt schöne gelbe Blüthen. Wenn man die Blättlein der einen Art, des **H. perforatum**, gegen das Licht hält, sehen sie aus, als wenn mit einer Nadelspitze lauter kleine Löchlein durchgestochen wären. Diese durchsichtigen Pünktlein sind Oeldrüschen. Man kann, besonders mit den Blüthen, roth färben; die Knospen geben eine freilich nicht sehr dauerhafte gelbe Farbe.

Das Hartheu heißt auch Johanniskraut, weil abergläubische Leute sonst und wohl auch noch jetzt dasselbe in der Johannisnacht einsammelten und dann glaubten, vor Hexerei sicher zu seyn. Leider sitzt aber solcher Hexenspuk nicht in den Häusern, sondern in den Köpfen und Herzen der Leute, wohin man das Johanniskraut nicht bringen kann. Denn jener Bauer in Poppenreuth, der erst am Morgen den Topf mit dem Sauerkraute zerbrach, und dann das Kalb, das, während er sich noch hinter den Ohren kratzte, den Milchtopf umwarf, aus Zorn darüber mit einem Scheit Holz todt schlug, war weder behext, wie die Nachbarn glaubten, noch ein Hexenmeister, sondern es war Alles ganz natürlich zugegangen.

Unter die ausländischen Gewächse dieser Klasse, deren übrigens auch nicht viele sind, rechnet man den

Digitized by Google

Cacaobaum (**Theobroma Cacao**), aus dessen Bohnen man die Chocolade macht; ein braunes Getränke, welches süß und ein wenig nach allerhand neuer Würze schmeckt. So auch früher den Orangen- und Citronenbaum, den wir schon oben bei der 13ten Klasse Seite 205 beschrieben haben. Auch der ostindische Baum, aus dessen Blättern das Cajeputöl gemacht wird: der Cajeputbaum (**Melaleuca Cajeput**) gehört hieher.

§. 35. Die 19te Klasse (**Syngenesia**), enthält gar viele Pflanzenarten, die in unsern Ländern freilich fast alle nur krautartig sind, bis auf wenige Ausnahmen, wo sie strauchartig oder (in heißeren Ländern) sogar baumartig werden. Auch die Blumen dieser Klasse sind nicht schwer zu unterscheiden. Es stehen nämlich sehr viele ganz kleine Blümchen so vereint beisammen, daß sie mit einander wie eine einzige, größere Blume aussehen, die sehr oft einen anders gefärbten Rand hat, z. B. bei den Gartenastern, wo die Randblättlein (Randblümlein) roth oder blau, die in der Scheibe stehenden gelb sind. Der eigentliche künstliche Unterschied dieser Klasse besteht aber darinnen, daß die Staubbeutel (nicht die Staubfäden) in ein hohles Röhrchen zusammengewachsen sind, aus dessen oberer Oeffnung das Pistill herausragt. Man kann dieß leicht sehen, wenn man eine von den Blumen, die in diesem §. angeführt werden, auseinander nehmen und dann die kleinern Blümchen, die in der grossen Blume beisammen stehen, genauer betrachten will. Man theilt zur leichtern Uebersicht die Blumen dieser Klasse in mehrere Ordnungen:

I. Solche, wo die am Rande stehenden kleinen zungenförmigen Blümchen eben so vollkommene Staubfäden und Pistille haben, als die in der Scheibe stehenden (**Syngenesia aequalis**).

1) Die Scorzonere oder Schwarzwurzel (**Scorzonera hispanica**), die in Spanien und auch im Morgenlande, z. B. auf dem Libanon zu Hause ist, hat eine fleischige, außen schwarze, innen schön weiße und saftige Wurzel, die als wohlschmeckendes

Zugemüse in den Gärten und Feldern gebaut wird. Die Blume ist gelb, der gemeinschaftliche Kelch, der um alle kleinen zungenförmigen Blümchen herumgeht, besteht aus Stücken, welche eines länger, das andere kürzer, dachziegelförmig übereinander liegen, woran man auch die bei uns wild wachsenden Scorzoneren: die niedrige, gelbe Wiesenscorzonere (**Sc. humilis**) und die blaulichrothe (**Sc. purpurea**) unterscheiden kann. Dagegen hat:

2) Der Wiesenbocksbart (**Tragopogon pratense**), dessen schöne gelbe Blumen denen der Scorzonere ziemlich ähnlich sehen, einen vielblättrigen Kelch dessen Blätter alle von gleicher Länge sind. Die Wurzel, die man auch, wie bei Nr. 1, hie und da Schwarzwurzel nennt, ist wohlschmeckend, und wird als gesundes Gemüse und Salat genossen.

3) Der Gartensalat (**Lactuca sativa**), trägt kleine gelbe Blüthchen, die ein gemeinschaftlicher walzenförmiger, dachzieglich gebildeter Kelch einschließt. Die alten Griechen und Römer bauten davon eine so breitblättrige Art, daß man sie als Thür zu den Gärten brauchen konnte. Den Kaiser Augustus heilte einmal ein Arzt durch den Gartensalat von einer langen Kränklichkeit, und wurde gar hoch dafür belohnt.

Wo unser gemeiner Gartensalat eigentlich und ursprünglich zu Hause war und wild wuchs, oder noch wächst, weiß man nicht. Freilich wachsen noch jetzt im südlichen Europa und auch bei uns hin und wieder zwei wilde Arten von Salat: der Zaunlattig (**L. Scariola**) und der Giftlattig (**L. virosa**), beide mit Blättern, deren Mittelrippe unten stachlich ist, die aber bei der ersten Art scheitelrecht in die Höhe stehen, bei der andern wagrecht ausgebreitet sind, beide auch mit eben solchen Blüthchen, wie der gemeine Salat hat, an denen der Kelch walzenförmig, dachziegelartig geschuppt und am Rande häutig, der Saame aber nackt ist. Aber beide wilde Arten sind betäubend giftig, besonders der eigentliche Giftlattig, und man kann aus ihrem Milchsafte eine Art von Opium bereiten. Wenn daher der gemeine Salat, der übrigens auch in schwachem und unschädlichem Grade eine schlafmachende Eigenschaft besitzt, von einer jener giftigen, wilden Arten abstammt, so muß er in der Pflege des Menschen seine schädliche und wilde Natur abgelegt haben; oder umgekehrt, der Mensch besitzt noch die ursprüngliche, ihm zur gesunden Speise verliehene Art, aus deren Saamen draußen,

Digitized by Google

in der anders gewordenen Natur, die giftigen Arten entstanden sind.

4) Der Löwenzahn (**Leontodon Taraxacum**), der auch Kühblume und wegen seiner röhrenartig hohlen Blumenstiele, wovon die Kinder das eine Ende ins andere stecken, und so Ringe und Ketten daraus machen, Pfaffenröhrlein heißt, ist die schöne große gelbe Blume, mit einem dachzieglichen Kelch, welchen nach unten noch ein kurzer Nebenkelch umfasset; die Blume, welche gleich im Frühling, und zwar fast überall zu sehen ist, und aus der, wenn man sie abrupft, ein weißer bitterer Saft herausläuft. Wenn sie verblüht hat, sitzen an dem Saamen auf einem langen Stiele runde Schirmlein von lauter kleinen Federchen. Bläst man dann an die Blume, so fliegen die Saamen, getragen von ihrem Feder-Flugschirm, über weite Strecken weg, und säen sich selber wieder aus. Daher findet man auch diese Blume in manchen ganz fernen, öden Inseln und Ländern. Und es ist ein gar nützliches Gewächs für das Vieh, welches dasselbe sehr gerne frißt und viel Milch darnach giebt. Auch braucht man das Extrakt als magenstärkende Arznei.

5) Der Herbstlöwenzahn (**Apargia autumnalis**), der später im Sommer blüht, hat zwar nicht am Stengel, wohl aber an der Blume Aehnlichkeit mit dem ächten Löwenzahn, nur sitzt die Federkrone (der **pappus** genannt) nicht wie bei diesem mittelst eines Stieles, sondern unmittelbar auf dem Saamen fest.

6) Der stinkende Schweinssalat (**Hyoseris oder Lapsana foetida**), hat seinen üblen Namen durch den widerwärtigen Geruch seiner Wurzel und der in Querstücke getheilten (großzackigen) auf dem Boden liegenden Blätter erhalten. Er findet sich in Gebirgswäldern. Die Blume ist gelb, der Saame steht, wie beim eigentlichen Rainkohl (**Lapsana**), gerade, trägt wie dieser keine eigentliche Haarkrone, den größeren Kelch umgiebt unten noch ein kürzerer, kleinerer.

7) Auch das Habichts-Bitterkraut (**Picris hieracioides**), das mit hohem, ästigen Stamme und

Digitized by Google

unzertheilten Blättern im Sommer und Herbst auf unsern Rainen und trocknen Wiesen wächst, hat einen doppelten Kelch, zugleich aber auch auf den quergestreiften Saamen eine Federkrone sitzen. Die gelben Blumen stehen in Sträußen beisammen, der Blumenstiel ist in der Nähe der Blume geschuppt.

8) Die Gänsedistel (**Sonchus**), davon die eine Art: die Ackergänsedistel (**S. arvensis**), mit ihren ziemlich großen, gelben, fast doldenartigen Blumen, federartig und ungleich eingeschnittenen Blättern und rauchborstigen Stengeln, ein wucherndes Unkraut unsrer Felder ist, unterscheidet sich durch den bauchigen, geschuppten Kelch und die haarige Saamenkrone. Eine andere Art, mit etwas kleineren Blüthen, ist ein beschwerliches Unkraut unsrer Gemüßgärten. Sie heißt Gänsekohl (**S. oleraceus**). Alle Arten führen einen weißlichen, bittern Milchsaft in sich.

9) Das Habichtskraut (**Hieracium**), mit einförmig dachzieglichem Kelche, und einem einfachen, ungestielten Federchen, hat gar viele Arten. Die bekannteste darunter ist das Mauseöhrlein oder Nagelkraut (**H. pilosella**), das mit seinen gelben Blüthchen, haarigen Stielen und Blättern an sonnigen, trocknen Plätzen auf dem Boden aufliegt (gleichsam kriecht) und den Schäfern nicht angenehm ist, weil es den Schaafen Verstopfung macht, von den Landleuten aber als Thee gegen die Gelbsucht gebraucht wird, so wie die feinen Wurzelfasern davon gegen das Fieber.

10) Der gemeine Pipau (**Crepis tectorum**), der mit seinem, in Lange, sparrig ausgebreitete Aeste zertheilten, Stamme zu Anfang des Sommers an allen dürren Rainen, mageren Wiesen, so wie auf altem Gemäuer gesehen wird, öffnet seine gelben, aufrecht stehenden Blümchen früh um 4 Uhr und schließt sie des Mittags um 12. An dem vielblättrigen, eiförmigen Kelche finden sich klebrichte Härchen; die schneeweiße Saamenkrone sitzt ungestielt auf dem Saamen fest.

11) Der Hasensalat (**Prenanthes muralis**), trägt an seinem ästigen Stamme sehr kleine, gelbe Blüthen, die nur aus fünf Blümlein zusammengesetzt

Digitized by Google

sind. Der Kelch ist walzenförmig und hat noch einen kleinern Kelch um sich. Der Hasensalat findet sich an Hecken, Mauern, und in Wäldern.

12) Der kahle Knorpelsalat (**Chondrilla juncea**), dessen Blätter bald nach ihrem Hervorkommen wieder verwelken und dann das ästige Gestripp sehr kahl und binsenartig aussehend zurücklassen, wächst in dürren, sandigen Gegenden. Die Blüthen sind gelb, der gestreifte, oben gezähnte Saame hat eine gestielte Saamenkrone.

13) Das Cichorienkraut (**Cichorium Intybus**), das in vielen Gegenden an unbebauten Orten von selber wächst und sich auch durch seine schuppige Saamenkrone aussäet, hat schöne blaue Blumen und eine etwas fleischige Wurzel, welche nahrhaft ist, so daß man sie getrocknet genießen kann, obwohl sie etwas bitter schmeckt. Gebrannt nimmt man sie als Zusatz unter den Kaffee. Den Pferden, denen man die getrocknete Wurzel giebt, den Schaafen, die das junge Kräutrich fressen, und selbst den Menschen, welche das abgezogene Wasser und Extrakt der Pflanze benützen, und die Blättlein, die man im Winter in einer geheizten Stube aus den feucht gehaltenen Wurzeln auskeimen läßt, genießen, ist sie heilsam und gesund.

Zum Geschlecht der Cichorie gehört auch der Endivien-Salat (**C. Endivia**), der bei uns in den Gärten angebaut wird, eigentlich aber in Indien zu Hause ist.

14) Die Färberscharte (**Serratula tinctoria**), die vorzüglich auf Waldwiesen wächst und an ihren halb Mannes hohen, aufrechten Stämmen, violblaue oder purpurfarbene Blumen mit dachziegelförmig über einander greifenden Blättchen trägt, gleicht wegen ihrer scharfzackigen (aber nicht stechenden) Blätter fast einer Distel. Die Wurzel wird zum Gelbfärben benutzt. Die Ackerscharte oder Haberdistel, **S. arvensis**, hat wirklich schon stachelartig gezähnte Blätter. Dieß ist ein beschwerliches Unkraut unsrer Felder und mancher Wiesen. Die Schaafe fressen es nur gern, so lange es jung und zart ist.

Digitized by Google

15) Die große Klette (**Arctium**), mit kugelrundem Kelche, dessen Schuppen mit Widerhaken an ihren Spitzen versehen sind, und der röthliche Blüthen einschließt, hat herzförmige Blätter, welche frisch sehr heilend auf alte Geschwüre wirken. Eigentlich unterscheidet man 2 Arten davon, die eine ist an ihrem Kelche mit einem Spinnweben-Filz überzogen, und heißt deßhalb filzige Klette (**A. Bardana**), die andere, die gemeine Klette (**A. Lappa**), hat keinen solchen Kelchfilz. Die Wurzel von beiden ist unter dem Namen **Bardana** in den Apotheken bekannt; ein Aufguß über dieselbe soll, wenn man den Kopf damit wäscht, das Wachsthum der Haare verstärken.

16) Die gemeine krausblättrige Distel (**Carduus crispus**), mit bauchigem, dachziegelartig-stachlichem Kelch und einem zottig schuppigen Blumenboden, gehört auch hieher. Die haarige Saamenkrone, die der Wind bald nach der Reife verweht, dient im darauf kommenden Frühling manchem kleinen Vogel zum Ausfüttern seines Nestchens, der Saamen im Herbste vielen zur Nahrung, und das genügsame Kameel der Wüste erquickt sich oft in dürren, wasserleeren Gegenden an dem Genuß der da noch einsam gedeihenden Distelarten. Eine bei uns wachsende Art mit weißgefleckten Blättern, ist der **C. leucographus**.

17) Von der vorigen Gattung unterscheidet sich die Kratzdistel (**Cnicus** z. B. **lanceolatus**) durch einen mehr eiförmigen Kelch und federartige Saamenkrone.

18) Die Zellendistel (**Onopordon Acanthium**), deren graulich grüner, scharfstachlicher Stamm wohl mannshoch wird, zeigt auf dem Blumenboden, wenn man die mit einfach haariger Krone versehenen Saamen herauszieht, lauter Zellengruben, gleich den Bienenwaben.

19) Die Artischoke (**Cynara Scolymus**), mit fleischigen Kelchschuppen, von welcher vielleicht Mancher gehört hat, ist auch eine große Distel.

Die reichen Leute lassen sich solche Distelköpfe kochen, und saugen die Stacheln so wie unten den Fruchtboden oder

Digitized by Google

Käse bei Tische zum Zeitvertreib aus. Es schmeckt aber eben nicht sonderlich, und ein Kartoffel mit Salz ist viel besser.

20) Die Silberdistel oder Eberwurzel (**Carlina acaulis**), ist jene schöne, silberartig glänzende, große Distel, welche in Berggegenden ganz niedrig am Boden wächst. Die schmalen, langen, weißen Blätter ihres Kelchrandes stehen wie Strahlen um die Scheibe der Blume herum; ihre starkriechende Wurzel wird von den Schweinen heraus gewühlt und gefressen; den Pferden, denen man sie unter das Futter mischt, ist sie sehr zuträglich, und vor Zeiten glaubten die Leute, daß, wenn man nur den Pferden ein Stück solcher Wurzel an das Mundstück hänge, sie ganz besonders gedeihen und bei Kräften bleiben müßten. Gutes Futter und Ordnung thut aber dazu wohl das Beste.

21) Der Saflor (**Carthamus tinctorius**), bei dem die dachziegelartig über einandergreifenden Schuppen des eiförmigen Kelches in eine blattartige, eirunde Spitze auslaufen, wächst eigentlich in Aegypten und Ostindien, wird aber auch bei uns in den Gärten, und hie und da auf den Feldern gebaut. Denn seine schön safrangelben Blüthen geben, mit Wasser angegossen, eine gelbe, und dann zuletzt auch noch mit Branntwein angegossen, eine scharlachrothe Farbe. Oefters wird von den Verkäufern der Safran mit Saflor vermischt, und dadurch verfälscht.

22) Die falche Cypresse, Scherbencypresse (**Santolina Chamaecyparissias**), deren gelbe Blümchen einen halbkuglichen Kelch haben, wird bei uns in Blumentöpfen und Gärten gezogen. Sie hat kleine grüne, 4fach gezähnte Blättlein, deren Zähne stumpf sind, Zweiglein, die wie mit einem Filz bedeckt sind, und behaarte Kelche. Sie wächst im südlichen Europa wild und war sonst wegen ihrer gewürzhaft bittern Eigenschaften im Gebrauch.

23) Der Wasserhanf (**Eupatorium cannabinum**), so genannt wegen seiner, den Hanfblättern ähnlichen, gefingerten Blätter, hat rosenrothe oder fleischfarbene, wohlriechende Blüthchen, mit länglichem, dach-

Digitized by Google

zieglichen Kelche. Die Blüthen, die erst im Juli und August hervorkommen, stehen in Sträußen beisammen. Er wächst am Wasser, heißt deßhalb auch Wasserdosten. Angeschossene Hirsche sollen dieß Gewächs als ein Heilmittel aufsuchen; die Waldbienen sammeln sich aus den Blüthen vielen Honig.

24) Der Zweizahn (**Bidens tripartita**), der eine Saamenkrone von **2 — 6** Borstenzähnen oder Grannen hat, zeigt sich auch mit seinen bräunlich gelben Blumen, deren Kelch noch ein Stern von Blättchen umgiebt, und mit seinen dreigetheilten Blättern an und in unsern Wässern. Eine Art mit abwärts geneigten, ziemlich großen, gelben Blumen, wird der nickende Zweizahn (**B. cernua**) genannt.

II. Die am Rande stehenden kleinen Blümchen haben blos ein Pistill, keine Staubbeutel (**Syngenesia superflua**). Die Rand- oder Strahlenblümchen zeichnen sich vor den in der Scheibe stehenden Röhrenblümchen öfter durch eine besondere (zungenförmige) Gestalt, zuweilen auch durch andere, z. B. weiße Farbe aus. Dahin gehört:

25) Der Beifuß und Wermuth (**Artemisia vulgaris** und **Absinthium**). Diese tragen ziemlich unscheinbare Blüthen, welche ein fast kuglich gestalteter Kelch umfaßt. Besonders der letztere ist in der Arzeneikunde gar geehrt, der erstere aber als gewürzhafter Zusatz an Gänsebraten bekannt. Auch der Wurmsaame kommt von einer Beifußart: (**A. Santonicum**), eben so wie der Dragun oder Estragon (**A. Dracunculus**).

26) Der gemeine Huflattig (**Tussilago farfara**), ist die gelbe Blume, welche schon im März an feuchten, thonigen Orten aus der Erde kommt, an einem schuppigen Stiele steht und keine Blätter hat, die jedoch im Sommer noch allein nachkommen. Diese Blätter sind groß und eckig, und werden schon seit Hippokrates Zeiten gegen Brustkrankheiten gerühmt. Es giebt auch eine große, in röthlichen Trauben blühende Art (**T. Petasites**) Straußlattig genannt.

27) Das Katzenpfötchen (**Gnaphalium dioi-**

Digitized by Google

cum) mit rothen und weißen sammetartigen Blümchen, hat auf dem Boden liegende Wurzelsprossen und trockene, häutige, rundliche Randschuppen am Kelch. Die schöne gelbe, im Sande wachsende Art, die sich, eben wegen der trocknen, gelben Randschuppen ihres Kelches, auch dürr ganze Jahre lang bei ihrem natürlichen Aussehen erhält, heißt deshalb Winterblume, auf französisch **Immortelle**, auch gelbes Ruhrkraut, Sand-Katzenpfötchen (**Gn. arenarium**).

Zu diesem Geschlecht von Blumen gehört auch das Edelweis (**Gnaphalium leontopodium**), welches in hohen Alpengegenden wächst und an der Spitze seines einfachen Stengels einen wie mit vieler Wolle überzogenen Blätterstern bildet, in dessen Mitte die bleichgelben Blümchen stehen.

28) In diese Abtheilung der Blumen mit verwachsenen Staubfäden gehört eine für die Südamerikaner sehr wichtige und nützliche Pflanze: die Oelblume (**Madia sativa**), welche in Chili wächst und aus deren Saamen ein Oel gepreßt wird, das süßer und schmackhafter als das beste Baumöl ist.

29) Die Dürrwurz (**Conyza squarrosa**), mit sparrigem Kelch (dessen Schuppen abwärts gebogen sind) und 3spaltigen Randblümchen, wird als Räuchermittel gegen Ungeziefer empfohlen, sogar gegen Schlangen, doch sind ihre Kräfte hierzu unbedeutend. Sie blüht im Juli und August, an trocknen, sonnigen Plätzen, und der Stengel oder Stamm wird etwa 3 Fuß hoch. Von dieser Pflanzengattung giebt es auf den hohen Gebirgen von Südamerika mehrere Arten, welche strauch- und sogar baumartig sind.

30) Die Goldruthe (**Solidago virga aurea**), hat an ihrem oftmals fast Mannshöhe erreichenden, steifen, eckigen Stamme einen langen, pyramidenförmig zulaufenden Strauß von gelben Blumen, mit nur 5 bis 10 zungenförmigen Randblümchen.

31) Bei dem Kreuzkraut (**Senecio vulgaris**) zeigt sich um den walzenförmigen Kelch unten noch ein kleiner Kelch, die gelben Blüthen haben keine Randblümchen (keine Strahlen). Es wächst überall in Gärten und auf Schutthaufen als Unkraut. Die Blätter

Digitized by Google

sind heilsam gegen Quetschungen, leichte Wunden und Geschwüre.

32) Die Gartenaster, Sternblume (**Aster chinensis**), soll aus China in unsere Gärten gekommen seyn, wo sie jetzt eine der schönsten Herbstblumen ist. In einigen Gegenden von Deutschland wächst auch die Amellus-Sternblume (**A. Amellus**) wild, die sich durch ihre großen, violblauen Strahlenblüthchen und den dachzieglichen, etwas sparrigen Kelch als eine Asterart zu erkennen giebt.

33) Der Alant (**Inula Helenium**) unterscheidet sich durch 2 kleine Borsten, welche unten an den Staubfäden sitzen. Der Stamm wird wohl mannshoch, die Blätter sind, besonders unten, ganz wollig, die Blumen gelb. Die Wurzeln werden als ein vortreffliches, magenstärkendes Arzeneimittel gerühmt, und man bereitet aus ihnen den Alantwein, auch (mit Honig) einen Meth, der für die Brust sehr gesund seyn soll.

Eine andre Art des Alantes, mit sparrigem Kelche (**I. squarrosa**) wird von den Bewohnern der Küste von Dalmatien und der benachbarten Inseln, wie man behauptet, mit gutem Erfolg gegen die Wirkungen des Schlangenbisses gebraucht.

34) Das Gold-Aschkraut, die Sumpf-Aster (**Cineraria palustris**) hat schöne, gelbe, in Sträußen an einem ziemlich dicken, gelblichen Stamm beisammenstehende Blumen und wächst vornehmlich in den Sümpfen und Torfmooren des nördlichen Deutschlands. Der Kelch ist einfach, walzenförmig, hat gleichlange, spitzige Blätter, die Saamenkrone ist haarig. — Auch im südlichen Deutschland wächst eine minder augenfällige Art: die Wiesen-Aschblume, **C. pratensis.**

35) Das Flöhkraut (**Erigeron acre**), trägt röthliche, einzeln auf langen Stielen stehende Blüthen, deren Kelch dachzieglich geformt ist und deren Strahlenblümchen linienförmig sind, so wie röthliche Haarkronen der Saamen. Der röthliche Stengel ist mit wollighaarigen Blättern besetzt. Diese Pflanze, die an trockenen, sonnigen Orten wächst, enthält ziemlich scharfe Säfte. — Dahin gehört auch ein allenthalben vor-

Digitized by Google

kommendes Unkraut, das Canadische Flöhkraut (E. canadense) mit schmutzig gelblich weißen, in Traubenbüscheln beisammen stehenden Blümchen und Blättlein, die am Rande behaart sind.

36) Der Bergwohlverlei (Arnica montana), der auch Fallkraut, Mutterwurz, römische Gemswurzel, Laugenkraut, Bluttrieb, Johannisblume heißt, ist eines der wirksamsten, wohlthätigsten Arzeneigewächse, um Stockungen des Blutes, Lähmungen u. s. zu heben, muß aber innerlich mit großer Vorsicht angewendet werden, weil er gar leicht Magenkrampf erregt. Er wächst gerne auf moosigtem Boden, vorzüglich in Berggegenden, sowohl in Europa als Asien. Die Blume ist ziemlich groß und orangegelb, der Stengel etwa einen Fuß hoch und, so wie die Blätter und der Blüthenkelch, stark behaart. Die ganze Pflanze ist klebricht anzufühlen und riecht ausgezeichnet harzig-gewürzhaft.

37) Das Bergmaasliebchen (Bellidiastrum montanum), das der folgenden Art (Nr. 38) sehr ähnlich sieht, hat eine Saamenkrone von haarförmigen Schuppen. Es wächst in hohen waldigen Gegenden des südlichen Deutschlands.

38) Das Maasliebchen oder Tausendschönchen (Bellis perennis), innen gelb, außen mit weißen Randblümchen, deren Farbe oft ins rothe fällt, und in der Gartenart ganz roth wird, ist wohl das gemeinste Blümchen unter allen. Von da an, wo der Schnee vergeht, bis dahin, wo er wieder fällt, sieht man es überall stehen und blühen, auf Triften und Haiden. Und pflückt man es hundertmal ab, so kommt immer wieder ein neues.

39) Die große Käse- oder Wucherblume (Chrysanthemum Leucanthemum), mit halbkuglichem dachzieglichem Kelche, dessen Blättlein an ihren Rändchen lederartig bräunlich aussehen und mit gewölbtem Blumenboden, sieht im Großen fast gerade so aus, wie das Maasliebchen im Kleinen. Steht im Sommer auf allen Wiesen.

40) Die Schaafgarbe (Achillea Millefolium),

Digitized by Google

mit ihrem zierlich vielgetheilten Blatte und weißen Blüthen, wird auch in vielen Krankheiten gebraucht. Eben so

41) Die Feld-Chamille (**Matricaria Chamomilla**), welche, wenn man alle einzelnen Blüthchen herausreißt, einen nackten, kegelförmigen Fruchtboden hat, und bei uns auf Aeckern wächst, und noch mehr

42) Die römische Chamille (**Anthemis nobilis**), bei welcher kleine Spreublättchen auf dem Fruchtboden stehen, und die man bei uns in Gärten baut. Zu diesem Geschlecht gehört auch die Bertramswurzel (**A. Pyrethrum**), deren Rand- oder Strahlenblümchen nach oben (oder innen) weiß, nach außen purpurfarb sind, und welche eine lange, fleischige Wurzel von beißendem Geschmack hat, welche, wenn man sie kaut, gegen Zahnweh, leichte Anfälle von Gesichtsschmerz u. s. w. helfen soll.

43) Der Rainfarren (**Tanacetum vulgare**), dessen gelbe, in flachen Sträußen beisammen stehende Blüthen fast so aussehen, wie eine große Käse- oder Wucherblume, welcher man die weißen Strahlenblümchen ausgerupft und nur die gelbe Scheibe übrig gelassen hat, zeichnet sich durch seine doppelt gefiederten, sägenartig gezahnten Blätter aus. Aus dem bittern Saamen haben sonst die Marktschreier ihre Wurmkuchen verfertigt, daher das Gewächs auch Wurmfarren heißt. Der Stamm wird gegen 5 Schuh hoch.

44) Das Rindsauge (**Buphthalmum salicifolium**), ist eine schöne gelbe Blume mit goldgelben Strahlenblümchen, davon jedes sich mit drei Zähnchen endet, und deren harter, haariger Stengel mit schmalen, rauchhaarigen Blättern besetzt ist. Der Kelch ist vielblättrig, der Fruchtboden mit kleinen Spreublättchen bewachsen, der Saame mit einem kleinen Rändchen gekrönt. Das Rindsauge wächst in Gebirgsgegenden.

III. Die Blümchen am Rande haben weder Staubfäden noch Pistill und sind deßhalb ganz unfruchtbar (**Syngenesia frustranea**).

45) Die große Sonnenblume (**Helianthus**

Digitized by Google

annuus), die in der Zeit eines einzigen Sommers in gutem Boden so hoch wird wie ein Mann, ja in warmen Ländern mehr wie noch einmal so hoch, hat eine Blume, die so groß ist wie ein Teller. Die Saamen, an denen oben eine 2blättrige Saamenkrone steht und welche auf einem flachen, mit spreuartigen Blättlein besetzten Fruchtboden aufsitzen, sind nahrhaft und ölreich, und man mästet mit ihnen nicht nur das Federvieh, sondern preßt ein Oel daraus, das in manchen Gegenden von Nordamerika das gewöhnlichste Oel an Speisen und Salat ist. Die Indianer backen auch aus dem zerstampften Saamen eine Art von Brod.

Eine Art von Sonnenblume trägt unten an der Wurzel süßlich schmeckende Knollen, welche unter dem Namen Erdbirnen bekannt sind, und hie und da gegessen, oder fürs Vieh verfüttert werden. Diese knollige Sonnenblume: **Helianthus tuberosus**, wächst auch ursprünglich in Brasilien.

46) Die gemeine Rudbeckia (**Rudbeckia laciniata**), welche mit ihrem ästigen Stengel, an dem ziemlich große, gelbe Blumen, mit 9 zurückgeschlagenen Randblümchen und kegelförmigen Fruchtboden stehen, Mannshöhe erreicht, wird in unsern Gärten häufig als Zierblume gesehen, obgleich sie eigentlich in Amerika zu Hause ist. Sie hat zerspaltene (zerschlissene) Blätter. Es gehört hierzu eine purpurfarbige Art (**R. purpurea**), deren scharfe Wurzel in Amerika als äußerliches Heilmittel benutzt wird, bei Pferden, welche vom Sattel wund gedrückt sind.

47) Die blaue Kornblume oder Cyane (**Centaurea Cyanus**), hat trichter- oder dütchenförmige Randblümchen, die in 5 Läppchen zertheilt sind. Sie ist ein allbekanntes, aber schönes Unkraut. Es giebt (besonders im Auslande) viele Arten von Centaureen.

IV. Blos die Randblümchen sind fruchtbar, die inwendig in der Scheibe stehenden ganz unfruchtbar (**Syngenesia necessaria**).

48) Die Ringelblume (**Calendula officinalis**), trägt kahnförmig gebogene, zackige Saamen, eine röthlichgelbe Blume, und säet sich, wenn sie einmal

Digitized by Google

in den Gärten war, so leicht aus, daß sie alle Jahre wieder kommt. Sie war sonst sogar gegen die Pest im Gebrauch.

V. Die kleinen Blümchen haben wieder ihren besondern Kelch (**Syngenesia segregata**).

49) Die Kugeldistel (**Echinops**), deren blaue oder weißliche Blümchen in einer runden Kugel beisammen stehen, gehört hieher. Man findet sie in Gärten als Zierblume.

§. 36. In der 20ten Klasse (**Gynandria**) stehen fast lauter sehr auffallend und sonderbar gebildete Blumen, deren Staubbeutel und Staubfäden mit dem Pistill und Fruchtbehälter zusammengewachsen sind. Die Blumenkrone sieht manchmal fast rachenförmig, oder wie ein fliegendes Insekt, oder auch schuhförmig aus. Man könnte diese Familie von Blumen die Affenarten des Gewächsreiches nennen.

1) Das Knabenkraut oder die Ragwurz (**Orchis**), das auch Kukuksblume heißt, wächst mit gar vielen Arten durch ganz Deutschland, und ist im Frühling, wenigstens vom Mai an, eine unserer augenfälligsten Wiesenblumen. Wenn man ihre, meistens rothen oder kupferfarbenen, mit Tüpfelchen gesprenkelten Blumen, die in einem schönen eirunden Schopf beisammen stehen, genauer ansieht, so wird man bemerken: daß sie einen Sporn haben, der bei manchen Arten von Ragwurz stumpf und kürzer, bei andern länger und spitziger ist. Die 2 oder eigentlich der eine in 2 Theile getheilte Staubbeutel ist auf dem Fruchtbehältniß aufgewachsen. Will man die Arten der Ragwurz unterscheiden, so muß man ein Messer nehmen und die Wurzel tief herausschneiden, dann wird man finden: daß einige unten an der Wurzel kleine Händlein, mit 4 oder 5 Fingern, andere aber 2 runde Küglein haben:

Unter die mit 2 runden Kugeln an der Wurzel gehören:

a) Das kleine Knabenkraut (**Orchis Morio**), ist kaum eine Spanne hoch, blüht bläulich roth, die Flügelein

an der Blume sind grün gestreift und ein wenig zusammengeneigt. Blüht gleich in der ersten Frühlingszeit.

b) Das Wanzenknabenkraut (O. coriophora), mit schmutzig röthlichen, oder kupferfarbenen Blüthen, riecht, so lange es blüht, wanzenartig.

c) Das große Knabenkraut (Orch. mascula), sieht dem kleinen sehr ähnlich, doch ist es oft mehr als dreimal so hoch und hat rückwärts gebogene Flügelein an der Krone. Es liebt bergige Gegenden und ist etwas seltener als das kleine. Die Wurzel dieser Pflanze enthält viel nahrhafte Bestandtheile und kann schon zum Saleb (einem nahrhaften Arzeneimittel) benutzt werden, besser aber noch:

d) Der Helmert, oder die Sturmhauben-Orchis (O. militaris). Diese ausgezeichnete, manchmal eine Elle hohe Art, muß wohl Jedem auffallen, der sie im Mai auf den Gebirgswiesen unsers Vaterlandes, auf denen sie hin und wieder wächst, blühen findet. Denn es ist eine der allerschönsten Wiesenblumen. Die Blümchen, welche in einem großen kegelförmigen Schopfe beisammen stehen, haben meistens auf blutrothem Grunde purpurrothe Streifen, und sind oben wie ein Helm gebildet, die Unterlippe hat einen langen schmalen Hals und endigt nach unten in 4 Läpplein, in deren Mitte noch ein 5tes als ein Spitzchen steht. Von einer nahe verwandten Art, die in Persien wächst, soll der ächte Salep kommen.

e) Der weiße Kukuk oder Nachtschatten (O. bifolia), hat weiße pyramidale, mit einem langen spitzigen Sporn versehene Blumen, die bei Nacht gar schön duften, und an seinem Stengel 2 eirunde Blätter.

f) Die Zwergragwurz (O. ustulata), mit weißlich und rothgetüpfelten ganz kleinen Blümchen, die in großer Zahl beisammenstehen, ist die niedlichste von allen und oft kaum wie ein kleiner Finger hoch.

Unter die mit Händlein an der Wurzel gehört:

a) Der Händleinkukuk (O. latifolia), ist wohl in ganz Deutschland die gemeinste Orchisart. Sie hat bläulich rothe Blumen und breite, meist schwärzlich gefärbte Blätter.

b) Der Fleckenkukuk (O. maculata), blüht später, hat weiß und roth gezeichnete Blumen, und die Unterlippe, die bei der vorhergehenden Art rückwärts zusammengeschlagen ist, steht bei dieser flach ausgebreitet; ihre Blätter sind dunkel gefleckt.

c) Der langspornige Kukuk (O. conopsea), hat an seinen niedlichen, rosenrothen Blüthchen einen sehr langen Sporn, der spitz zuläuft, und flügelartig ausgebreitete Kronenblättchen. Er blüht im Juni und riecht angenehm.

d) Noch stärker duftet die wohlriechende Rag-

Digitized by Google

wurz (O. odoratissima), mit Blüthchen, welche denen der vorigen Art sehr ähnlich, nur etwas kürzer gespornt sind.

2) Die Mückenpflanze (Ophrys Myodes), mit schönen bläulich oder bräunlich schwarzen Blümlein, welche fadenartige Kelchblättchen, wie Füßchen, haben, blüht in Gebirgsgegenden und sieht, wie der Name sagt, einer Fliege gleich, während die Bienen-Ophrys (O. apifera) mit einer Biene, die breitblüthige Spinnen-Ophrys (O. arachnites), mit einer großen, gelbbräunlichen Spinne verglichen wird. Hieher gehört auch die Corallenwurz (O. corallorhiza), deren ästige, weißliche Wurzel einer weißen Coralle gleicht. Das Blümchen ist grünlich, die weiße Unterlippe ist roth punktirt. Sie wächst in dichten Gebirgswaldungen. Die Vogelnest-Ophrys (O. nidus avis) mit lederfarbig gelblichem, schuppigen Stengel und Blüthen, hat eine Wurzel, deren gelbliche Zasern knauelartig durcheinander gebogen und geworren sind.

3) Die Stendelwurz (Serapias), deren bleichrothe und weißliche Arten in Gebüschen und feuchten Waldungen, eine große mit purpurrothen Blüthen (S. rubra) an felsigten Orten gefunden werden, zeichnet sich durch ein eirundes höckriges Honigbehältniß (statt des Spornes) mit einer eirunden Lippe aus.

4) Von einem Gewächs dieser Pflanzenfamilie, der Vanillen Pflanze (Epidendron Vanillae), kommt die wohlriechende und gewürzhafte Vanillen-Schote. Die Heimath dieser wohlriechenden Blume ist das südliche Amerika, wo sie an den höchsten Bäumen hinaufrankt, und von der absterbenden Rinde derselben lebt. Eben so wächst auch die merkwürdige

5) Luftblume (Aërides odoratum) in China und Cochinchina auf hohen Bäumen, scheint aber ihre Nahrung unmittelbar aus der Luft nehmen zu können. Denn wenn man sie in einem Zimmer aufhängt, wächst sie mehrere Jahre lang, ohne begossen zu werden, und treibt ihre wohlriechenden Blüthen, deren angenehmer Duft die Zimmer erfüllt.

6) Der Frauenschuh (Cypripedium Calceo-

Digitized by Google

lus), trägt eine Blume, an welcher unten ein gelber hohler Schuh, so groß wie eine welsche Nuß, hängt, und oben bräunliche Blüthenblätter stehen. Ist eine schöne, seltene Gebirgspflanze, die nur in wenigen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes gefunden wird.

7) Der Osterluzey (**Aristolochia Clematitis**), wächst mit seinen am Stiel nierenförmig tief eingeschnittenen Blättern, ziemlich hohem Stengel und kleinen dütchenförmigen gelblichen Blüthen, hie und da an Hecken und Gesträuch. Er besitzt auflösende und reizende Arzeneikräfte, schwächt aber bei längerem Gebrauch den Magen sehr.

§. 37. Die 21te Klasse (**Monoecia**), ist für uns und unser Vaterland eine gar wichtige, merkwürdige Klasse, denn dahin gehören fast alle unsere Holzarten, und auch noch sonst manches nützliche Gewächs. Sie unterscheidet sich dadurch: daß an einem und demselben Baume oder Kraut manche Blüthen blos männlich sind, die nur einen gelben Staub aus ihren Blüthen ausstreuen, andere blos weiblich. So sind z. B. an den Haselnüssen die männlichen Blüthen, jene langen gelben Würstlein, die man gleich im Frühling daran hängen sieht. Wenn diese anfangen ganz gelb zu werden, und gelben Staub auszustreuen, dann muß man den Haselnußstrauch nur recht genau ansehen, da wird man an den Zweiglein viele kleine Knöspchen sitzen sehen, die oben ein schön carminrothes Federbüschchen haben. Das sind die weiblichen Blüthlein, aus denen die Nüsse werden. Reißt man die gelben Würstchen vor dem Aufblühen alle ab, so werden keine Nüsse an dem Strauche. In diese Klasse gehören:

A. Mit 1 Staubfaden (Monandria).

1) Der Brodbaum (**Artocarpus**). Dieser wächst auf den Molluckischen, und auf den heißen Südsee-Inseln; seine mehlreiche Frucht, die aus einem ganzen Haufen von zusammengewachsenen Steinfrüchten besteht, dient den dortigen Insulanern statt des Brodes.

B. Mit 2 Staubfäden.

Digitized by Google

2) Hier erwähnen wir nur beiläufig des zweifädigen Grüblinges (**Omphalea diandra**), eines Gesträuches aus Jamaika, das aus seinen eingeschnittenen oder abgerissenen Zweigenden und Blattstielen, fast wie der oben (S. 200) erwähnte Labetrunkstrauch, eine Menge Wassers von sich giebt.

C. Mit 3 Staubfäden (**Triandria**).

3) Der Wasserkolben, Schmackedungen (**Typha latifolia** und **angustifolia**), mit seinen großen braunen oder schwärzlichen Kolben, in denen die weiblichen Blüthchen mit ihren haarförmig zottigen Kelchen sitzen, wächst fast überall in unsern Teichen und Sümpfen. Eben so

4) Die Igelskolbe (**Sparganium**), mit schwertförmigen Blättern und fuglich runden Früchten, die aus den zusammengedrängten Fruchtknoten der weiblichen Blüthen bestehen, deren Pistille beim Vertrocknen die scheinbaren Stacheln des rundlichen Knollen bilden. Als Arten unterscheidet man den ästigen (**Sp. ramosum**), dann den einfach stänglichen (**Sp. simplex**), und den flachblättrig schwimmenden (**Sp. natans**).

5) Der türkische Weizen oder Mais (**Zea Mays**). Die männlichen Blüthen stehen ganz oben, und sehen wie Kornähren aus, die weiblichen finden sich unten am Stamm, und sind mit langen, dünnen Fäden (den Pistillen) versehen, die aus einer Blattscheide heraushängen, in welcher der Kolben mit den weiblichen Blüthen steht, welche die schönen gelben, oft roth gefärbten Körner tragen. Dieses gar nützliche Getraide, was ein süßlich schmeckendes Mehl giebt, das sehr nahrhaft ist, hat Amerika zu seinem Vaterland, und wurde schon lange, ehe Europäer dahin kamen, von den dortigen Indianern angebaut.

6) Die Segge (**Carex**), auch Riedgras genannt, hat die männlichen Blumen so wie die weiblichen in einer Aehre beisammenstehen, und das Saamenkorn ist in einer Art von aufgeblasenem Honigbehältniß eingeschlossen. Es giebt davon gar viele Arten, die auf Wiesen freilich sehr lästig sind, weil sie

Digitized by Google

dieselben verderben, dagegen in tiefen Moräſten, die ſie austrocknen, und worin ſie den Torf bilden, ſo wie im loſen Sande, dem ſie einen Halt geben, und ihn am Ende auch für andere Gewächſe tragbar machen, ſehr nützlich. Eine der Arten, die im loſen Sande wächſt, die Sand-Segge (**Carex arenaria**), hat eine Wurzel, welche, ſo lange ſie friſch iſt, balſamiſch, faſt wie Terpentin riecht, und ſonſt als Arzeneimittel gebraucht wurde.

D. Mit 4 Staubfäden (Tetrandria).

7) Der Buchsbaum (**Buxus sempervirens**), den wir meiſt in unſern Gärten um die Beete herum ſo klein ſehen, wird in wärmeren Ländern ein ſchöner hoher Strauch oder Baum, welcher ſich durch ein gar treffliches, dauerhaftes, gelbes Holz auszeichnet. Die Kameele ſterben, wenn ſie ſeine Blätter freſſen.

8) Der Maulbeerbaum (**Morus**), deſſen männliche Blüthlein, die in kätzchenartigen Büſchlein beiſammenſtehen, einen in 4 Stücke zertheilten, die weiblichen einen vierblättrigen Kelch und dabei keine Blumenkrone haben, findet ſich in unſern Gärten in 2 Arten, davon die eine, mit ſchief herzförmigen, glatten Blättern, weiße Beeren trägt, und daher der weiße Maulbeerbaum (**M. alba**) heißt; die andere, mit rauhen Blättern, welche ſchwarze, lieblich ſchmeckende Beeren erzeugt, heißt der ſchwarze (**M. nigra**). Der letztere iſt aus Perſien zu uns gekommen, der erſtere, deſſen Blätter man vorzüglich zur Ernährung und Zucht der Seidenwürmer benutzt, aus China.

9) Die Brenneſſel (**Urtica urens**), deren männliche, mit 2 oder 4blättriger Blumenhülle verſehenen Blüthchen ährenartig, die weiblichen kopfförmig beiſammen ſtehen, iſt uns freilich in Gärten hie und da ein läſtiges Gewächs, das aber doch, nicht blos, wenn es ganz jung iſt, als Gemüſe gekocht, oder den jungen Gänſen verfüttert werden kann, ſondern welches aus ſeinen Stengeln ein treffliches Garn, das Neſſelgarn liefert, indem man es ſo wie den Flachs zubereiten kann.

10) In dieſe Abtheilung der Pflanzen gehört

Digitized by Google

auch unser abentheuerlich gebildeter Garten-Fuchsschwanz, **Amaranthus caudatus.**

Die Gattung des Amarants trägt Blümchen, die in Knäueln oder Endrispen beisammenstehen, keinen Kelch, sondern nur eine 3 bis 5blättrige Blumenkrone und 3 bis 5 Antheren (Staubkölbchen) haben. Die Frucht ist eine Hautfrucht, welche ringsherum aufspringt.

11) Die Erle (**Alnus glutinosa** und **incana**), die mit dem schlechtesten Sumpfboden vorlieb nimmt, ist ein gar gutes Holz zum Wasserbau, und fast die ganze Stadt Venedig, so wie der große Münster in Straßburg, sind auf einem Erlenholz-Rost und Pfahlgrund erbaut.

E. Mit 6 Staubfäden (**Hexandria**).

12) Die Cocosnußpalme (**Cocos nucifera**), wächst freilich nicht bei uns, sondern nur in sehr heissen Ländern, ist aber ein gar edler Baum, der über 70 Fuß hoch wird, und das ganze Jahr hindurch Früchte und Blüthen trägt. Aus seinen jungen Blättern wird Palmenöl gemacht, aus dem Blüthenstiel und Blüthentrauben dringt beim Hineinschneiden ein süßer Saft hervor, aus welchem ein vortrefflicher Wein bereitet wird, vor allem aber trägt er Früchte, so groß wie ein halbwüchsiger Kürbis, in deren fädiger Hülle eine Nuß, viel größer als ein Gänsei, liegt, welche eine herrlich schmeckende Milch, und einen großen, zart und lieblich schmeckenden Kern enthält. Daran erquickt sich mancher Seefahrer, der an jene heißen Länder und Inseln kommt, in denen er zu jeder Zeit einen Vorrath von frischen Cocosnüssen findet.

F. Mit mehreren Staubfäden (**Polyandria**).

13) Hieher gehört unter andern die gemeine Becherblume (**Poterium sanguisorba**), welche dem oben (S. 142 u. 163) beschriebenen Wiesenknopf oder Bibernell sehr ähnlich ist, so daß man sie auch schwarzen Bibernell nennt. Die Fruchtblüthen stehen am oberen Theile der knopfförmigen Aehre, die männlichen, oder Staubblüthen, in denen viele Staubfäden sitzen, weiter nach unten. Eine hieher gehörige Art mit stachlichen Blättern und Zweigen (**Poterium spinosum**) bildet

Digitized by Google

ein niederes Strauchgewächs, welches in den südöstlicheren Gegenden von Europa, so wie in den Morgenländern häufig vorkommt.

14) Der Aron (**Arum maculatum**), der auch Zehrwurzel, deutscher Ingwer, heißt, wächst in vielen Gegenden von Deutschland, an feuchten, schattigen Orten. Die Blätter sehen wie die Spitzen der Lanzen oder Wurfspieße aus und haben einen gar beissend scharfen Pfeffergeschmack; die ziemlich große Blume ist von bleichgrüner (innen weißlicher) Farbe, von dutenförmiger Gestalt und endigt in einen spitzigen Zipfel. In ihr drinnen steht ein fleischfarbiger Kolben, der an seinem obersten Ende nackt, dann mit Fäden besetzt ist, auf welche weiter abwärts die männlichen, ganz nach unten die weiblichen Blüthen folgen. Die Wurzel, die man im Herbste oder ganz zeitig im Frühling noch vor dem Blühen, (sie blüht schon im Mai) herausgraben muß, ist zwar von einer giftartigen Schärfe, soll aber dennoch, in der Hand des kunstverständigen Arztes, ein magenstärkendes, auflösendes, in manchen Krankheiten wohlthätiges Mittel seyn, und dieß weiß auch der Bär sehr gut, denn wenn er seine Winterruhe verläßt, in der er gar keine Nahrung zu sich nahm, sucht er immer zuerst die Aronswurzel auf, um sich zu purgiren, und den lange ungebraucht gebliebenen Magen wieder zu stärken. Die scharlachrothen Beeren des Arons färben roth.

Zu dem Geschlecht des Arons gehören auch mehrere in heißen Ländern wachsende Arten, deren im frischen Zustand von scharfen Säften durchdrungene Wurzeln durchs Rösten genießbar und schmackhaft werden.

15) Das äthiopische Schlangenkraut (**Calla aethiopica**) gleicht zwar in der Form seiner dutenförmigen, großen, weißen Blüthenscheiden, in deren Innern der gelbe, von den kleinen Blüthlein überkleidete Kolben steht, dem Aron, unterscheidet sich jedoch dadurch von diesem, daß die Blüthenkolbe auch oben mit Blüthlein versehen (nicht wie bei dem Aron nackt) ist. Das äthiopische Schlangenkraut ist eine gewöhnliche Zierpflanze unsrer Gewächshäuser und

Digitized by Google

Zimmer, die auch im Winter blüht, und durch den angenehmen (obwohl schwachen) Geruch ihrer Blüthen beliebt ist. In unserm Vaterlande findet sich auch eine minder ansehnliche Art des Schlangenkrautes: die Sumpfcalla (**Calla palustris**). Die Frucht des Schlangenkrautes ist eine vielsaamige Beere.

16) Der Wallnußbaum (**Juglans regia**) trägt an den männlichen Blüthenkätzchen in jeder Schuppe ein Blüthlein mit 6theiligem Kelche, innerhalb welchem etwa 18 Staubfäden stehen. Die weiblichen Blüthlein haben einen 4spaltigen Kelch, eine 4theilige Blüthenkrone und 2 Griffel. Dieser Baum ist ursprünglich im gelobten Lande und in Persien zu Hause, wird aber schon seit gar langer Zeit überall in Deutschland angebaut. Das Oel, das man aus den Wallnüssen preßt, nehmen die Maler ganz besonders gern zu ihren Oelfarben, weil es sehr schnell trocknet. Die unreifen Früchte und die äußern grünen Schaalen der reifen gebraucht man gegen die Eingeweidewürmer, ein Absud von den grünen Schaalen und Früchten tödtet auch die Wanzen. So angenehm die Blätter riechen, haben sie dennoch, wenn man im Spätfrühling, wo sie noch frisch sind, unter einem Wallnußbaum schläft, eine den Kopf einnehmende, betäubende Eigenschaft.

17) Die Eiche (**Quercus**), mit 5 bis 10 Staubfäden, wovon die eine Art, welche kurz oder gar nicht gestielte Blätter, dagegen lang gestielte, einzeln stehende große Früchte trägt, die Edel- oder Stieleiche (**Q. peduncalata**); die andere, welche gestielte Blätter, dagegen kleine, haufen- oder traubenweise zusammengewachsene Früchte hat, die Steineiche (**Q. Robur**) heißt. Jene ist schon zuweilen 180 Fuß hoch, und 6 bis 8 Fuß dick gefunden worden, und man hat zuweilen über 30 Klaftern Holz von einer einzigen solchen Eiche bekommen. Die andere wird nicht so groß, ist auch nicht so nutzbar. Beide geben sehr gutes, dauerhaftes Bauholz, aber bei weitem kein so gutes Brennholz, als:

Digitized by Google

18) Die Rothbuche (**Fagus sylvatica**), deren kleine, 3eckige Nüsse, die in einem stachlichen Kelche sitzen, den Kindern, wie den Eichhörnchen wohl bekannt sind, und beim Auspressen ein sehr gutes Oel geben, das sowohl an die Speisen genommen, als auch unters Brod gebacken werden kann, und dann für Leute, die eine sitzende Lebensart führen, sehr gesund seyn soll. Die männlichen Blüthlein der Rothbuche, die aus einem 5spaltigen, glockenförmigen Kelche bestehen, in welchem etwa 12 Staubfäden sitzen, stehen in Kätzlein beisammen, die 4zähnigen, weiblichen Blüthen, mit 3 Pistillen, sitzen auf den Knospen auf.

Der Kastanien-Baum, der die eigentlichen eßbaren Kastanien trägt, und schon in Süddeutschland gut gedeiht, wird von einigen Kräuterkundigen auch mit zum Geschlechte der Buche gezählt, und **F. Castanea** genannt. Der Kastanienbaum wird im südlichen Europa so dickstämmig, als bei uns die stärkste Linde, ja noch dicker als diese.

19) Die Birke (**Betula alba**), auch Maienbaum genannt, ist der Baum, den man, wenn man immer nördlich nach den kalten Polarländern hingeht, am weitesten verbreitet findet. In jenen Ländern ist er zwar kleiner als bei uns, aber sein Saft ist dort auch viel süßer, und dient den daselbst wohnenden armen Leuten statt Zucker und Gewürze, wie sie denn selbst den jungen Splint, der unter der Rinde liegt, zusammenrollen und wie Nudeln verspeisen, wozu aber ein guter Magen gehört. Die Rinde enthält ein Oel, weshalb sie so leicht brennt, und zur Bereitung des Birkentheers benutzt wird.

Der Birkensaft, den man im Frühling aus den abgeschnittenen jungen Zweigen erhalten kann (oder aus dem angebohrten Stamm), ist gesund und wohlschmeckend, auch kann man durch Einkochen einen Syrup, durch die Gährung mit Zucker oder Honig eine Art von Wein daraus bereiten. Wohlhabende Leute machen den Birkenwein so, daß sie erst das abgezapfte Wasser kochen und abschäumen, dann zu 12 Maaß oder Kannen 4 Pfund Zucker und 2 Maaß Franzwein mischen.

20) Die Hainbuche, Weißbuche (**Carpinus Betulus**), ein nicht sehr hoher Baum, den man zu Hecken benutzt und daher auch Hagen- oder Hecken-

Digitized by Google

buche, wegen seines festen Holzes auch Hornbuche nennt, hat faltige Blätter, und Saamenkörner, die zwischen großen, grünen Blätterschuppen stehen. Aus ihm fließt, wenn er angebohrt wird, auch ein süßlicher Saft, welcher durchs Eintrocknen hart und schön roth wie Lack wird.

Die Hopfenhainbuche (Carp. Ostrya oder Ostrya vulgaris), welche schon in Tyrol und andern Nachbargegenden jenseits der Alpen wild wächst, hat eirunde Früchte, deren Schuppen aufgeblasen sind, und welche den Früchten des Hopfens gleichen. Die Blätter sind doppelt gezähnt und gefältet.

21) Der Platanenbaum (**Platanus**), dessen eine, schönere Art im Morgenlande und im südlichen Europa, die andere, welche man auch in unsern Gärten zieht, ursprünglich in Amerika wächst (**Pl. occidentalis**), unterscheidet sich durch die kugelrunde Gestalt seiner männlichen wie weiblichen Blüthenkätzchen. Die erstere Art (**Pl. orientalis**) ist ein ganz besonders schöner, ansehnlicher Baum, mit handförmigen, in 5 große Abschnitte zertheilten Blättern.

22) Der Haselnußstrauch (**Corylus Avellana**) wurde schon oben (S. 249) beschrieben, und wir haben nicht nöthig, von dem Wohlgeschmack seiner bei Menschen wie bei Thieren so beliebten Nüsse zu reden, weil alle Eigenschaften dieses vaterländischen Gewächses zu allgemein bekannt sind. Nicht aber gilt dieses von einem andren Strauchgewächs, das der heißen Zone von Amerika angehört und welches für die Bewohner derselben so wie andrer ähnlicher Erdstriche von ganz unschätzbarem Werthe ist. Es ist dies

23) Der Maniocstrauch (**Jatropha Manihot**). Nur wenig Gewächse kommen dem Manioc an Nutzbarkeit für den menschlichen Haushalt gleich, reichen diesem das tägliche Brod in solcher Fülle und in einer so leicht zu habenden Weise dar. Das, was man an ihm über der Erde sieht, läßt freilich den großen Schatz nicht errathen, den er unter dem Boden verborgen an sich trägt, und auch die rübenartige Wurzel hat in ihrem rohen Zustand Eigenschaf-

Digitized by Google

ten, welche für Menschen wie für Thiere mehr von abschreckender als von empfehlender Art sind. Es ist ein Strauch, der eine Höhe von 6 bis 8 Fuß erreicht, und mit seinen sparrigen Aesten weit sich ausbreitet, der untere Theil des Stammes wird in gutem Boden dicker als ein Mannsarm. Seine langgestielten großen Blätter sind in 3 bis 7 Lappen getheilt, die männlichen und weiblichen Blüthen stehen rispenförmig an den Blattachseln und sind von röthlich gelber Farbe, die Saamen finden sich in einer dreifächrigen Kapsel. Die Wurzel, welche die Gestalt einer Rübe hat, wird 20 bis 30 Pfund schwer und sehr saftreich. Aber eben dieser Saft wirkt im frischeren Zustand auf Menschen wie auf Thiere als ein sehr starkes Gift. Indem man ihm jedoch auspreßt, die fleischige Wurzel wäscht und dann röstet, erhält man aus ihr den Stoff zu dem mehlreichen, nahrhaften Cassada- oder Cassavabrod, das den Bewohnern vieler heißen Länder die Stelle unserer besten Waizenbrode vertritt. Selbst der Saft verliert, wenn man ihn der Siedehitze aussetzt, seine giftige Eigenschaft, und giebt, mit Gewürzen versetzt, eine sehr beliebte Sauce. Auf gutem Boden ist der Ertrag der Maniocpflanzungen so groß, daß ein Stück Landes sechsmal so viel Brod für den Hausbedarf liefert, als ein anderes, eben so großes, das man mit Waizen und Spelz besäet hat. Dazu ist auch der Anbau des Maniocs ganz überaus leicht, denn jeder Zweig, den man in die feuchte Erde steckt, schlägt da eine Wurzel, die nach wenig Monaten schon zu ihrer Ernte reif ist. Bemerkenswerth ist es auch, daß das Cassadabrod niemals von Würmern und Insekten angegriffen wird.

24) Der Wunderbaum (**Ricinus communis**) ist in allen wärmeren Ländern der Erde zu Hause, wird aber auch als Zierpflanze in unsern Gärten gezogen. Seine großen, schönen, schildförmigen Blätter sind nach ihrem Umfang hin in flügelartige Fortsätze getheilt; den Blüthen verleihen die gelben Staubfäden und rothen Pistille ein zierliches Aussehen. Aus sei-

Digitized by Google

nem Saamen wird das für die Arzneikunde wichtige Ricinusöl gewonnen.

G. Mit unten zusammengewachsenen Staubfäden (**Monoecia Monadelphia**).

25) Die Föhre, **Pinus**, und Tanne, **Abies**, unterscheiden sich dadurch, daß ihre männlichen Blüthen, die aus einzelnen Schuppen mit mehreren Staubbeuteln bestehen, in traubenförmigen Büscheln beisammensitzen, während die weiblichen Blumen einen Zapfen bilden, welcher, in der Zeit der Blüthe, an jeder Schuppe 2 Blümlein mit einfachen Staubwegen trägt, und in der Zeit der Reife Nüßchen enthält, die von einer flügelförmigen Haut umgeben sind. Bei den eigentlichen Föhrenarten (**Pinus**) sind die Nadeln zu zweien und mehreren in häutige Scheiden eingeschlossen, die Zapfenschuppen sind nach vornen holzig verdickt, die Frucht reift erst nach 2 Jahren, während dagegen bei den Tannen (**Abies**) die Nadeln, wenn auch nahe zusammenstehend, dennoch von einander abgesondert, die Schuppen der Zapfen nach vornen verdünnt sind, die Früchte in einem Jahre reif werden.

Zu der Föhre, **Pinus**, gehört

a) die gemeine Föhre oder Kiefer (**P. sylvestris**), hat lange Nadelblätter, davon immer 2 aus einer kleinen Scheide kommen und die rings um den Stengel stehen. Ist ein gutes Bau- und Brennholz, das meist auf dem schlechtesten Sand-Boden gedeiht. Nicht blos die Lappländer, sondern auch die norwegischen Bauern in den nördlichsten Waldgegenden, essen manchmal fast das ganze Jahr hindurch kein anderes Brod, als ein größtentheils aus der innern Rinde (Splint) dieses Baumes gebackenes. Und gerade diese Waldbauern sind bei ihrer so geringen Kost, der stärkste, kräftigste Schlag Menschen, den man sich denken kann, und dabei heiter und froh und arbeitsam. Man kann auch hieraus lernen: daß es beim Gedeihen des Leibes nicht auf Vortrefflichkeit der Kost, sondern auf ein heitres Herz und Arbeitsamkeit ankomme, und daß einer, wenn einmal der Bissen des etwas bitterlichen Fichtenbrodes hinter ist, nachher eben so fröhlich singen und arbeiten, und sich seines Gottes und des lieben Sonnenlichtes freuen könne, als ein Anderer, der Brod von Dinkelkorn ißt, und auch wohl gar noch wöchentlich etliche Mal sein Stück Fleisch dazu hat. Zu den Föhrenarten zählt man auch

b) Den Zürbelnußbaum (**P. Cembra**) Dieser

Digitized by Google

hat meist zu 5 beisammenstehende, 3eckige, ziemlich lange Nadeln, und trägt in seinen Zapfen die angenehm schmeckenden Zürbelnüsse. Er wächst in hochgebirgigen Gegenden.

Tannen (Abies) sind:

c) Die Rothtanne (A. excelsa), die auch Fichte heißt, hat kleine, kurze, spitzige, in mehreren Reihen an den Seiten stehende:

d) die Edeltanne, Weißtanne (A. pectinata), trägt breite, lange, vorne ein wenig eingeschnittene, zu beiden Seiten des Zweiges ausgebreitet stehende Nadelblätter. Der letztere Baum kann wohl 160, ja 180 Fuß hoch, und 300 Jahr alt werden.

e) Der Lerchenbaum (A. Larix). Seine Nadelblätter, welche stumpf sind, und viel weicher als die Nadeln der andern Arten, stehen zum Theil zu 20, ja wohl zu 40 in einem Büschel beisammen, welcher auf einer kleinen Warze sitzt. Sie fallen im Winter ab. Das Lerchenbaumholz ist zum Bauen, besonders im Wasser, ein ganz vortreffliches Holz, weil es sehr schwer fault, und dem Wurmfraß nicht unterworfen ist. Der venetianische oder gemeine Terpentin ist das Harz dieses Baumes, das, wenn man ihn anbohrt, in Menge herausfließt.

f) Der Cederbaum (A. Cedrus), ist der edelste Baum unter allen Bäumen dieser Gattung, wird unter allen am ältesten, hat das beste, dauerhafteste Holz, und giebt den schönsten, dichtesten Schatten. Es ist gut, daß es noch am Caukasus Cedernwälder giebt, an denen man sich doch eine Vorstellung machen kann von jenen ehemaligen Cedernwäldern auf dem Libanon, denn an der Stätte von diesen stehen nur noch wenige alte, zum Theil verkrüppelte Stämme und eine Anzahl junger Bäumlein.

g) Eine gar merkwürdige Fichtenart, die Araucaria (Pinus Araucaria oder Araucaria chilensis und brasiliana), welche in den Gebirgsgegenden des heißeren Amerika zu Hause ist, wächst bis 220 Fuß hoch und erreicht zuweilen einem Umfang von mehr als 50 Fuß. Ihre Zapfen, aus deren Früchten sich die Eingebornen eine Art von Kuchen backen, werden 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuß lang.

26) Die Stinkcypresse, Lebensbaum (Thuja occidentalis), welche in Sibirien und in Nordamerika wild wächst, kann man öfters bei uns in englischen Anlagen und andern Gärten zu sehen bekommen. Seine immergrünen, kleinen Blättlein liegen, eins ans andre geschoben und dicht an den breitgedrückten Zweigen an, und geben, wenn man sie zerreibt, einen unangenehmen Geruch von sich. Die männlichen Blüthlein sind Schuppen mit 2 Staubbeuteln; die Nüßchen des

Digitized by Google

Zapfens sind von ausgeschnittenen Häuten umgeben. Das Holz dieses Baumes ist sehr dauerhaft.

27) Die Cypresse (**Cupressus**), ein gar edles, wohlgestaltetes Geschlecht von Bäumen, dessen Arten, z. B. die immergrüne (**C. sempervirens**), man schon aus der Ferne an ihrem schönen pyramidalen Wuchs unterscheidet, hat an ihren männlichen Blüthentheilchen blos Staubbeutel, welche ohne Staubfäden aufsitzen, die Fruchtknoten der weiblichen Zapfen zeigen statt der Staubwege eine Menge kleiner Löchlein und tragen eckige Nüßchen. Die immergrüne Cypresse, deren Vaterland die Insel Creta oder Candien seyn soll, wird jetzt in vielen südlichen europäischen Ländern gezogen, und kommt auch in den wärmeren Gegenden von Deutschland in Gärten fort. Ihre balsamische Ausdünstung ist der Gesundheit sehr zuträglich, weßhalb man sonst die an der Lunge Leidenden nach Creta sendete, damit sie dort in der gesunden Luft genäsen. Das Harz giebt einen guten Terpentin. Die immergrüne Cypresse hat dachziegelförmig übereinander liegende Blättchen und 4eckige Zweiglein. Dagegen sind die Zweiglein der gemeinen amerikanischen Cypresse (**C. thyoïdes**) breitgedrückt und zweischneidig wie beim Lebensbaum; die Zapfenfrüchte sind öfters nur von der Größe der Wachholderbeeren und sehen blau aus. Eine andere amerikanische Art, die 2zeilige Cypresse (**C. disticha**) wirft im Herbst ihre in 2 Reihen an den Zweigen stehenden Blättlein ab.

Bei der Stadt Mexico in Amerika steht noch jetzt eine große, schöne Cypresse, welche die Montezuma-Cypresse heißt, weil sie schon zu den Zeiten des Königs Montezuma, im Jahr 1520, ein großer Baum war, in dessen Schatten jener Fürst wohl oft verweilte.

Nach der Beschreibung so manches schönen, stattlichen Baumes wollen wir jetzt auch die eines sehr curiosen folgen lassen. Dies ist

28) Der Knallbüchsen- oder Streusandbüchsenbaum (**Hura crepitans**), der in Mexiko und andern warmen Ländern von Amerika zu Hause ist, und von den Eingebornen Baruca genannt wird.

Digitized by Google

Dies ist der einzige unter den sonst so stillen Bäumen der Wälder, der einen Lärm machen kann, und zwar einen so lauten, daß schon mancher wandernde Fremdling davon erschreckt worden ist. Denn wenn seine runde, holzige Saamenkapsel, die auswendig 12 Furchen, innen 12 Fächer hat, vollkommen reif ist, und die Sonne strahlt warm darauf, dann zerplatzt sie mit einem Knall, der fast einem Pistolen- oder Flintenschuß gleich kommt, und zugleich wirft sie ihre flachrunden Saamen, die so groß als ein Daumenglied sind, und die Bruchstücke ihrer Schaale mit solcher Heftigkeit um sich her, daß sie, wenn sie in einem Glase verwahrt wird, dieses in Trümmer schlägt, welche, wenn sie unter andren Gläsern stehen, auch diese zerschmettern und noch sonst allerhand Beschädigung anrichten können. Man schneidet in Westindien diese Frucht, ehe sie ganz reif ist, unten am Stiele auf, nimmt die Saamen heraus und bedient sich ihrer zu Streusandbüchsen. Der Baum wird zwischen 20 und 30 Fuß hoch, hat viele Zweige, daran lang gestielte herzförmige, immergrüne Blätter stehen. Die männlichen Blüthen sind Kätzchen (**amenta**), die aus vielen Blumenschüppchen bestehen, in deren jedem ein blutrother Staubfaden sich befindet, an welchem mehrere wirtelförmig zusammengeordnete Paare von Antheren oder Staubbeuteln stehen. Die Fruchtblüthe ist violblau, und hat einen trichterförmigen, nach oben 12theiligen Staubweg oder Griffel. In den jungen Zweigen wie in den frischen Blättern ist ein milchiger, etwas scharfer Saft enthalten, der, wenn man sie abbricht, herausfließt. Dieses Gewächs gehört zur Verwandtschaft des Mancinellenbaumes (**Hippomane Mancinella**), dessen Milchsaft nicht nur scharf, sondern wirklich giftig ist.

29) Auch der Kürbis (**Cucurbita**), mit geränderltem, und die Gurke (**Cucumis sativus**) mit ungerändeltem Saamen, gehören in diese Klasse. Sie sind ursprünglich in wärmeren Ländern zu Hause, und darum gegen jede Kälte so empfindlich.

§. 38. Die 22te Klasse (**Dioecia**), ent-

Digitized by Google

hält solche Gewächse, bei denen manche Pflanzen oder Bäume blos männliche, manche blos weibliche oder fruchtbare Blüthen tragen, wie z. B. der Hanf, die Weiden, der Wachholder u. s. w.

A. Mit 2 Staubfäden (Diandria).

1) Die Weide (Salix), deren Blüthenkätzchen vor dem Aufblühen meist wollig aussehen, und aus lauter schuppenartigen Blüthchen zusammengesetzt sind, hat freilich nicht immer zwei, sondern in ihren verschiedenen Arten 1 bis 5 Staubfäden, indeß wird sie doch auch, nach der Zahl der Antheren bei den meisten ihrer Arten, hieher gestellt. Die Saamen der weiblichen Blüthen, an deren Fruchtknoten 2 Griffel stehen, sind mit Wolle umgeben. Innen, auf dem Grunde der männlichen Blüthlein sitzt eine Honigdrüse, aus welcher sich die Bienen im Frühling eine reichliche Nahrung holen. Von den vielen hieher gehörigen Arten nennen wir nur

a) Die gemeine, weiße Weide (S. alba) mit sägenartig gezähnten, lanzenförmigen, scharf zugespitzten Blättern, welche auf beiden Seiten etwas haarig sind und daher, besonders an der untern Seite, weißlich aussehen, steht bei Städten und Dörfern, auf Wiesen und am Wasser, und wird oft über 60 Fuß hoch. Das Holz ist weiß und fest, wird zu Fässern, so wie das der Aeste zu Faßreifen genommen.

b) Die Palmen- oder Salweide (S. Caprea), hat eirunde, runzlichte, auf ihrer Unterfläche filzige Blätter, wird 10, ja bis 30 Schuh hoch, und giebt, da sie schon im April blüht, den Bienen ein sehr wohlthätiges Frühlingsfutter.

c) Die Goldweide, Dotterweide (S. vitellina), hat sägenartig gezähnte, eirunde, spitzige und glatte Blätter, deren Zähne knorplicht und deren Stiele mit schwieligen Tüpfelchen besetzt sind, zeichnet sich aber am augenfälligsten durch ihre hochgelben oder orangefarbenen, biegsamen und zähen Zweige aus, die zum Korbflechten benutzt werden.

d) Die fünffädige oder Lorbeerweide (S. pentandra), zeichnet sich, wenn sie blüht, durch ihre fünf (zuweilen gar 7) Staubfäden in jedem männlichen Blüthenschüppchen und durch den lorbeerartigen Geruch ihrer Blätter beim Zerreiben aus. Die Zweige sind meist roth.

e) Die Bruchweide (S. fragilis), erkennt man schon daran, daß ihre Zweige so sehr leicht, schon bei einem Druck des Fingers, an ihren Gelenken abbrechen, die

f) babylonische Weide, Hängeweide, (S. baby-

Digitized by Google

lonica), die aus dem Morgenlande zu uns gekommen ist, an ihren lang herabhängenden Zweigen.

2) Die Pistazie (**Pistacia**), deren männliche Schuppenblüthchen 5 Staubfäden haben und lockere Kätzchen bilden, während die weiblichen Blüthlein mit 3spaltigem Kelche einzeln stehen, umfasset freilich nur ausländische Gewächse, die aber ihres Nutzens wegen, auch für uns, hier erwähnt werden sollen. Denn so giebt der Terpentinbaum (**P. Terebinthus**), der in vielen Gegenden des südlichen Europas wächst, den ächten Terpentin, der Mastixbaum (**P. Lentiscus**) den Mastix, die gemeine Pistazie (**P. vera**) liefert uns die eßbaren und wohlschmeckenden Pistaziennüßchen. Der Mastixbaum wird am häufigsten auf der Insel Chios gefunden; er aber, wie die gemeine Pistazie, gedeihen fast auf allen Inseln und Küstengegenden des Mittelmeeres.

B. Mit 3 Staubfäden (**Triandria**).

3) Bei dem Feigenbaum (**Ficus Carica**) stehen die Blümlein, die bei manchen alle männlich, bei manchen lauter weibliche sind, inwendig, in einer etwas hohlen, birnförmigen, fleischigen Frucht, die aber eigentlich nicht Frucht, sondern Blüthenscheide zu nennen ist. Der Saft in den Zweigen, Blättern, ja sogar noch in dem Fruchtstiel ist scharf und giftig, und wird nachher doch in der Frucht in einen so gesunden, wohlschmeckenden umgeschaffen. Die Feigen von solchen Bäumen, die auf gar zu gutem Boden stehen, müssen, auch in warmen Ländern, erst einen Insektenstich erleiden, wenn sie reif und genießbar werden sollen; die, welche auf einem armen Boden wachsen, reifen meistens von selber. In wärmeren Ländern reift der Feigenbaum jährlich mehrere Male seine Früchte. Er wurde schon 600 Jahre vor Christi Geb. aus seiner Heimath, im Morgenlande, durch die Phönizier in das südliche Frankreich und von da in andre südeuropäische Länder verpflanzt.

Zum Geschlecht des Feigenbaumes, obwohl nicht zu der Art des gemeinen, sondern zum indischen (**F. indica**), dessen Zweige sich immer zum Boden niederbeugen und hier Wurzeln schlagen, gehört einer der merkwürdigsten Bäume der Erde,

Digitized by Google

nämlich der in ganz Hindostan berühmte, welcher an den Ufern der Nerbudda wächst. Dieser Baum bedeckt in seinem ganzen Umfange einen Flächenraum von 2000 Fuß und könnte einem Heerhaufen von 7000 Mann Schatten gewähren. Die Forschungen der Engländer machen es wahrscheinlich, daß dieses derselbe Baum noch sey, den schon vor länger als 2000 Jahren der Begleiter Alexanders des Großen: Nearchus, gesehen und bewundert hat. Das Alter des Baumes mag sich daher wohl auf 3000 Jahre belaufen. Zum Geschlecht des Feigenbaumes gehört auch der ägyptische Sycomorusbaum (F. Sycomorus), und der Gummi Feigenbaum (F. elastica), aus dessen verdicktem Milchsaft elastisches Gummi (Gummi elasticum) bereitet wird.

4) Die Dattelpalme (**Phoenix dactylifera**), darf wohl als einer der alleredelsten Bäume in der Welt betrachtet werden. Es giebt manche blos männliche, andere blos weibliche Bäume unter ihnen. Die weiblichen tragen, wenn männliche in ihrer Nähe sind, oder die Araber der Wüste die Blüthenkolben der männlichen Bäume an den weiblichen aufhängen, die herrlichen, nahrhaften, lieblich süßen Datteln in solcher Menge, daß eine ganze Familie von wenig Bäumen das ganze Jahr durch zu leben hat.

Der Saft der süßen Dattel, den man zum Theil auspreßt, wird als wohlschmeckender Zusatz zum Schmalzen und zum Bereiten mancher Speisen gebraucht, und die gemeinen Araber sind so an den täglichen Genuß der Datteln gewöhnt, daß sie uns Europäer mit allen unsern Genüssen und Reichthümern für sehr arm halten, weil wir keine Datteln haben. Indeß haben wir dafür in unsern Ländern etwas anderes, was besser ist als Alles, was den Leib erfreuen kann, was jene nicht haben, und ihr könnt wohl errathen, was das sey? — Die Blätter der Dattelpalme dienen zum Korbflechten, auch schreibt man mit einem Griffel darauf, wie auf Papier. Aus den Blüthenkolben dieser und anderer Palmen fließt ein süßer Saft, der einen herrlichen Wein giebt. So wohlfeil auch die Datteln, namentlich in Aegypten sind, berechnet man dennoch dort den jährlichen Ertrag von einem vollwüchsigen, fruchttragenden Baume auf 10 Gulden.

C. Mit 4 Staubfäden (Tetrandria).

5) Die gemeine Mistel (**Viscum album**), die mit ihrem gabelförmig zerästelten Stämmchen, stumpflanzettförmigen, fleischigen Blättern, welche, so wie die weiße Beere, einen klebrichten Saft enthalten, oben auf Waldbäumen und auch in Gärten namentlich auf

Digitized by Google

Aepfelbäumen wächst, findet sich fast überall in Deutschland. Die männlichen Stämmlein haben Blüthen, in denen sich keine eigentliche Blüthenkrone, sondern nur ein viertheiliger Kelch findet, an welchen die 4 Staubbeutel, ohne Staubfäden aufgewachsen sind. Die Beeren, aus denen man einen guten Vogelleim siedet, werden von Vögeln, z. B. Misteldrosseln, gefressen und dann die unverdauten Saamen von ihnen auf dem natürlichen Wege überall auf Bäumen ausgesäet zum großen Nachtheil der Bäume, denen die Mistel ihre Säfte aussaugt. Unsern alten heidnischen Vorfahren war die Mistelpflanze eine heilige Pflanze, weil sie glaubten, ihr Saame käme vom Himmel hernieder.

6) Der Sanddorn (**Hippophaë rhamnoides**), mit seinen länglichen, weidenartigen, grünlich grauen Blättern, die mit einem zarten, seidenartig glänzenden Filzhaare bedeckt sind, und zwischen denen hie und da an den knotigen Zweigen einzelne lange Dornen stehen, fällt im Herbst und Winter überall, wo er wächst, durch seine schönen gelbrothen Beeren in die Augen. Er wächst aber nicht allenthalben in Deutschland, sondern vorzüglich nur in den Seeküsten-Gegenden und hie und da in den Thälern und an den Flußufern, besonders der Alpengegenden. Die Beeren werden an einigen Orten an die Fischbrühen als Zusatz genommen. Sie sind sehr scharf sauer.

D. Mit 5 Staubfäden (Pentandria).

7) Der Hanf (**Cannabis sativa**), hat männliche, unfruchtbare Blüthen mit 5spaltigem Kelch und weibliche, Früchte tragende, mit einblättrigem, länglichem, an einer Seite aufgeschlitzten Kelch. Die männlichen Pflanzen reißt man, wenn sie geblüht haben, aus. Man benutzt vom Hanf den Bast, oder vielmehr die ganzen Längsgefäße, zu Leinwand, so wie zu Bindfaden und Stricken; die Saamen sind ölgebend und nahrhaft, besonders aber ein angenehmes Futter für Vögel; der Saft der jungen Blätter hat etwas Berauschendes.

8) Der Spinat (**Spinacia oleracea**), das be-

Digitized by Google

kannte Gemüse ist ursprünglich aus dem Morgenlande zu uns gebracht worden.

9) Der Johannisbrodbaum (**Ceratonia siliqua**), dessen Hülsenfrucht das bekannte Johannisbrod ist, das gegen das Sodbrennen hilft, wächst im südlichen Europa und im Orient, namentlich im gelobten Lande. Wenn die Frucht frisch ist, preßt man in ihrem Vaterlande einen Zuckersaft daraus, aus welchem ein guter Wein gemacht wird. Mit den übrig gebliebenen „Träbern" füttert man die Pferde, Schweine und andere Hausthiere.

10) Der Hopfen (**Humulus lupulus**). Seine männlichen Blüthchen haben keine Blumenkrone, sondern nur einen fünfspaltigen Kelch, während die weiblichen Blumen, deren Kelch aus einer eiförmigen Schuppe besteht, Kätzchen mit großen, häutigen Schuppenblättern bilden. Schon die Keimlein dieses Gewächses geben ein gesundes Gemüse; die gewürzhaft riechenden, bittern, weiblichen Blüthenzapfen benutzt man zum Bierbrauen. In Böhmen und England baut man freilich einen vorzüglich edlen, aber der aus der Gegend von Spalt, Hersbruck u. s. w. ist eben so gut und wird alle Jahre veredelter. Die männlichen Blüthen heißen auch wilder Hopfen oder Fimmelhopfen. Man reißt diese größtentheils aus, denn die weiblichen Blüthenzapfen werden zwar größer und stärker, wenn sie von dem männlichen Blüthenstaube befruchtet sind, aber sie streuen darauf auch gar leicht fruchtbaren Saamen aus, und die männlichen Stöcke nehmen dann so überhand, daß sie die zärteren weiblichen am Ende ganz ersticken und verdrängen. Die Wurzel, die auch zu einem Heilmittel verwendet wird, leidet zuweilen sehr durch die Raupe eines Nachtschmetterlinges, der sie zerfrißt, und so die Stöcke unfruchtbar macht. Die Blätter sind dann mit sogenannten Mehlthau bedeckt. Aus den Ranken des Hopfens, die sich nicht so wie die Bohnen rechts, sondern links um ihre Stange winden, wird, vorzüglich in Schweden, eine sehr feste Leinwand gemacht, welche freilich weder so fein noch so weiß, wie die aus Flachs, aber desto dauerhafter ist.

Digitized by Google

E. Mit 6theiligen Blüthen (**Hexandria**).

11) Die Yamswurzel (**Dioscorea alata**), ist für die Bewohner der wärmeren Erdstriche ein eben so nutzbares Gewächs, als für uns der Kartoffel. Der vierseitige, an seinen Ecken mit blattartigen Ansätzen versehene Stengel windet sich an andern Gewächsen oder an Stangen empor, die große, mit feinem Filz bedeckte Wurzel ist so mehlreich, daß man sie zu Mehlspeisen benutzt und zu Brod verbäckt. Sie ist fast so nahrhaft als der Reis. Jedes abgeschnittene Stück derselben erzeugt eine neue Pflanze.

F. Mit 8 Staubfäden (**Octandria**).

12 Die italienische Pappel (**Populus dilatata**), ist wegen ihres schnellen und hohen Wuchses beliebt, das Holz von unserer gemeinen Zitterpappel oder Espe (**P. tremula**), welche rundliche, eingezackte Blätter hat, die an langen Stielen stehen, ist aber besser. Die Pappeln zeichnen sich durch die am Rande geschlitzten Schüppchen ihrer in Kätzchen beisammenstehenden, manchmal bis 30 Staubfäden enthaltenden Blüthchen und durch die Bildung des Saamens aus, der an seiner Spitze mit einem Wollschopf versehen ist.

G. Mit 9 Staubfäden (**Enneandria**).

13) Das Bingelkraut (**Mercurialis**) hat weder an seinen männlichen, noch an den weiblichen Blumen eine eigentliche Blumenkrone, sondern nur einen dreitheiligen Kelch, in den männlichen Blumen 9 bis 12 Staubfäden, zweiknöpfige Staubbeutel, in den weiblichen 2 Pistille und ein Saamengehäus, das aus zweien Knöpfen und eben so vielen Fächern besteht, in deren jedem ein Saame liegt.

Die eine Art, das eigentliche Bingelkraut (**M. annua**), welches wegen seiner heilsamen (erweichenden) Kräfte gerühmt wird, ist eine unansehnliche Pflanze, welche als Unkraut in Gärten und Weinbergen wächst, grünliche Blümchen hat, die bei der männlichen Pflanze ährenförmig, bei der weiblichen je zu 2 beisammenstehen und aus den Blattwinkeln hervorkommen. Das Stämmchen ist armförmig getheilt, die Blätter ganz glatt. Dagegen ist eine andere Art von Bingelkraut: das perennirende (**M. perennis**), welches in Wäldern wächst, einen ungetheilten (ganz einfachen) Stengel und

Digitized by Google

rauhe Blätter hat, wegen seiner giftigen Eigenschaften sehr verdächtig.

H. Mit 10 Staubfäden (Decandria.

14) Hieher gehört der Melonenbaum (Carica Papaya), der in Ost- und Westindien vorkommt und dessen schlanker, gerader Stamm, welcher etwa 20 Fuß hoch und 1 Fuß dick, dabei inwendig hohl ist, zu Dachrinnen, die melonenähnliche Frucht zur lieblich schmeckenden Speise dient.

15) Die Wasserfeder oder Sumpfaloë (Stratiotes aloïdes), ein gar schönes Gewächs, welches mit seinen schwertförmigen, am Rande scharf gezähnten, büschelförmig beisammenstehenden Blättern einer Aloë gleicht, ja etwas Palmenartiges hat, findet sich im nördlichen Deutschland, besonders in den Gegenden an der Ostsee, in sanftfließenden Wässern, Gräben und Teichen. Im Juli etwa treibt sie aus der Mitte ihres Blätterbüschels einen oder etliche Blumenstengel hervor, an deren Ende eine weiße Blüthe (mit 3spaltigem Kelch und 3blättriger Krone) steht, in welcher 20 Nectarien und (in der männlichen Blüthe) gegen 12 Staubfäden sitzen. Die weibliche Blüthe hat 6 zweigetheilte Pistille. Im Herbst senkt sich die Sumpfaloë unter das Wasser, aus welchem sie erst im Frühling wieder herauftaucht.

J. Mit vielen Staubfäden (Polyandria).

16) Die Sagopalme (Cycas), mit gar schönen Blättern, wächst nur in den heißesten Ländern. Aus dem Mark der umgehauenen Bäume, welches sehr weiß und mehlig ist, macht man ein gar gutes Mehl (das Sagomehl), welches verbacken und auch in der Form von kleinen Körnchen verspeißt wird.

K. Mit untenverwachsenen Staubfäden (Monadelphia).

17) Der Wachholder oder Weckholder (Juniperus communis), ist besonders wegen seiner Beeren, die am weiblichen Baume oder Strauch stehen, und erst im zweiten Jahre reif werden, sehr beliebt. Man bereitet daraus in manchen Ländern eine Art

Digitized by Google

Wein und den Wachholdersaft. Die männlichen Blüthchen bilden Kätzchen, deren untere Schuppen unfruchtbar und leer sind.

18) Der Taxusbaum (**Taxus baccata**), auch Eiben- oder Ebenbaum genannt, ist ein gar edler Baum, der sonst in deutschen Wäldern häufig war, jetzt aber ganz selten ist. Sein Nadel-Laub gleicht dem der Edeltanne, ist aber zugespitzt, man kennt ihn überdieß leicht an der rothen, beerenartigen Frucht, die der weibliche Baum trägt. Seine Säfte wirken (besonders auf Pferde, wenn sie von den jungen Zweigen fressen) schädlich, in heißen Ländern sogar als ein starkes Gift. Das Holz ist eine der edelsten Holzarten.

19) Der Muscatennußbaum (**Myristica moschata**), wächst auf den Molucken, besonders auf Banda. Die Saamendecke giebt die Muscatblüthe, der Kern der Nuß, mit Kalk gebeitzt, unsere sogenannte Muscatnuß.

§. 39. Die 23te Klasse ist eine so schwer herauszufindende, und hat einen so unbestimmten Charakter, daß sie in neuerer Zeit von den meisten Botanikern gar nicht mehr als eine besondere Klasse angenommen wird. Auch wir haben deßhalb, nur damit es ihr nicht ganz an Repräsentanten fehle, einige Pflanzengattungen unter diese Klasse aufgeführt, welche Linné unter dem Namen **Polygamia** begreift, und zu der er solche Gewächse zählt, bei denen auf dem einen Stamme vollkommene Blüthen, (in denen Antheren und Pistille vereint sind) auf dem andren blos Fruchtblüthen (mit Pistillen) oder auch auf einem und demselben Stamme vollkommene, so wie getrennte (Antheren- und Pistillblüthen) zugleich gefunden werden.

Man hat wohl damit gethan, daß man in neuerer Zeit die Pflanzen, welche sonst in der 23ten Linnéischen Klasse standen nach der Beschaffenheit ihrer Blüthentheile und ihrer Früchte naturgemäßer unter den andern Klassen angebracht hat, doch beschreiben wir hier einige von denen, die als Beispiele für die oben erwähnte Beschaffenheit der Blüthen gelten.

Digitized by Google

1) Die Edelesche (**Fraxinus excelsior**) hat in ihren kleinen unscheinbaren Blüthen denen Krone wie Kelch fehlen 2 Staubfäden, gehört demnach, wie wir schon oben bei Beschreibung der 2ten Klasse sagten, naturgemäßer zu diesen; ihre Früchte sind Flügelfrüchte. Sie ist ein wunderschöner, sehr majestätisch aussehender Baum. Auf einem langen Blattstiel stehen die kleinen Blättlein einander gegenüber und eins am Ende steht allein, so daß an jedem großen Blattstiel 7, 9, 11, auch 13 Blättlein sind. Dieser Baum, der sich fast überall in Deutschland findet, wird wohl 100 Fuß hoch, und hat ein ganz vortreffliches Holz, das von Wagnern und Drechslern hoch geschätzt ist. Die Blätter sind ein gutes Viehfutter. Aus dem angebohrten Stamme fließt ein süßlicher Saft, den man sonst gegen manche Krankheiten empfahl. Mit der Rinde kann man braun und schillerig blau, auch grün färben. Eine Art von Esche, die rundblättrige (**Fraxinus rotundifolia**), die im südlichen Italien, Ungarn und im Morgenlande wächst, giebt, so wie eigentlich auch schon im geringeren Grade die Edelesche und manche andere Eschenart, aus ihrer Rinde, wenn man im heißen Sommer und in heißeren Ländern einen Einschnitt hinein macht, die weiß aussehende, süßlich schmeckende Apotheker-Manna, die, besonders bei kleinen Kindern als Abführungsmittel gebraucht wird. Davon kommt freilich auch weniger an die Apotheker, als an die Bienen, welche, wenn die Mannaernte ist, in ganzen Wolken in die Wälder fallen und den süßen Saft aufzehren.

2) Der Ahorn (**Acer**) sollte naturgemäßer bei der 8ten Klasse angeführt werden, denn in seinen Blüthen stehen, in der Regel, wenn sie vollkommen ausgebildet sind, 8 sehr augenfältige Staubfäden und ein Pistill mit 2 langen Narben. Es gehören dahin mehrere zum Theil auch bei uns vorkommende Arten, wovon die eine, von niedrigerem Wuchse welche öfters eine tiefrissige Rinde und kleinere in 3 oder 5 stumpfe Lappen zertheilte Blätter hat, der

Digitized by Google

Feldahorn (**A. campestre**); eine andere, als hoher Baum wachsende Art, mit Blättern, die in 5 nur wenig scharf zugespitzte und gezähnelte Lappen getheilt sind, der weiße Ahorn (**A. pseudoplatanus**); eine 3te, bei der die Blätterlappen und die Sägezähne spitziger sind, der Spitzahorn (**A. platanoides**) heißt. Man kennt alle Ahornbäume an ihren Flügelfrüchten, davon immer 2 und 2 mit den Köpfchen, worin ein breitgedrücktes Nüßchen ist, aneinander gewachsen sind. Die beiden letzteren Arten sind schöne hohe Bäume, die ein sehr edles brauchbares Holz geben. Die Blätter sind ein gutes Viehfutter.

Außerdem gehören noch in diese Klasse:

3) Der Guttabaum (**Stalagmites cambogioides**), aus welchem das ächte Gummi Guttä kommt, ein gelber Saft, der aus dem Stamm und der Rinde des Baumes bei jedem Einschnitt hervordringt. Der ächte Guttabaum wächst in Ostindien. Das Gummigutt, das bekanntlich eine schöne gelbe Farbe giebt, ist zwar sehr giftig, wird aber in der Hand geschickter Aerzte ein gutes Heilmittel gegen Wassersucht und Bandwurm. Insgemein hat man in den Apotheken und auch sonst im Handel und Wandel ein andres Gummigutt, das aus dem Cambogia Gutta-Baum, in Ostindien kommt, welcher eben so gelbe Blüthen hat und in dieselbe Klasse gehört als das Schöllkraut, nämlich in die 13te. Dieses sogenannte unächte Gummigutt kommt in seinen Eigenschaften sehr mit dem ächten überein, nur zieht es sich beim Trocknen etwas ins Bräunliche.

4) Die Mimose oder Sinnpflanze (**Mimosa pudica**), deren zarte, gefiederte Blätter beim Berühren sich zusammenziehen, wächst in Brasilien. Hieher gehört auch die eigentliche, ächte Akazie (**Mimosa nilotica** und **Acacia vera**), die als ein stachlicher Baum von mittlerer Höhe in Aegypten und Arabien wächst, aus dessen Stamme von selber das arabische Gummi (**Gummi arabicum**) herausfließt, das sich auch bisweilen in der Erde, an den Wurzeln, in grossen Klumpen findet. Man braucht dieses, das übri-

Digitized by Google

gens noch aus mehreren Arten der Akazien kommt, in der Arzneikunde, und die Seitenwirker geben ihren Zeugen damit Appretur und vortrefflichen Glanz, es ist aber zugleich auch so nahrhaft, daß die Araber öfters, auf ihren mehrtägigen Reisen durch die Wüste, kein anderes Nahrungsmittel mit sich nehmen, als ein Säckchen voll arabischem Gummi.

Der Beschaffenheit ihrer Früchte nach gehören alle eigentliche Akazien und Mimosen in die 17te Linnéische Klasse, unter die Hülsen-Gewächse.

5) Der Dattelpflaumen- oder Ebenholzbaum (**Diospyrus Ebenum**), dessen dichter Kern das feste, schwere Ebenholz giebt, wächst in Ostindien, um Calcutta, so wie in den Wäldern von Ceylon u. a.

§. 40. In der 24ten Linnéischen Klasse (**Cryptogamia**), giebt es lauter solche Gewächse, an denen man bisher weder wahrhafte Staubfäden, noch eigentliche vollkommene Pistille bemerken konnte, die aber deßwegen doch, einen meist nur stäubchenartig kleinen, fruchtbaren Saamen tragen. Es gehören dahin unter andern die Farnkräuter, Moose und Schwämme. Wir wollen auch aus dieser Klasse die merkwürdigsten Pflanzenarten kennen lernen.

1) Das Zinnkraut oder Scheuerkraut (**Equisetum arvense**), welches auch Schaftheu und Schachtelhalm heißt, besteht aus lauter kleinen Gelenklein, die oben an ihren Endchen, wie mit kleinen Krönchen eingesäumt sind, und eins ins andere fassen und gewachsen sind. An den fruchtbaren, gelblich braunen Stengeln, die gleich im ersten Frühling auf Feldern und Wiesen zu sehen sind, steht oben ein kegelförmiges, wie gekräuselt aussehendes Blüthenthürmlein; in dem die Saamen liegen. Das gemeine Zinnkraut ist ein schädliches, überaus tief wurzelndes, den Schaafen und anderm Hornvieh, das es frißt, gefährliches Unkraut, weil es ihnen zuweilen tödtliche Durchfälle erregt. Doch genießen die Pferde es ohne Nachtheil, und in Canada ernähren sich während der Zeit des Mangels im Winter von einer dortigen Art des Scheuerkrautes (dem **Equisetum hyemale**) nicht blos die

Digitized by Google

Hirsche, sondern auch die Kühe. Und selbst unser gemeines Zinnkraut ist für den menschlichen Haushalt nicht ganz unnütz, denn man benutzt es wegen seiner adstringirenden Eigenschaften zum Schwarzfärben wie zum Gerben, und gebraucht seine Schäfte zum Scheuern der zinnernen Gefäße, sowie zum Poliren.

2) Die Farnkräuter (**Filices**), wachsen meistens in heißen Ländern, wo es baumartig hohe unter ihnen giebt, und viele, deren Wurzel und Mark gegessen werden können. Bei uns hat man indeß in Wäldern, an Hecken und in Hohlwegen auch mehrere Arten von Farnkräutern. Wenn man die Blätter solcher Farnkräuter, die meistens sehr groß und aus vielen kleinen Abschnitten zusammengesetzt sind, und fast so aussehen, wie man in den Büchern öfters die Palmblätter abgebildet sieht, umwendet, und auf der untern Seite besieht, wird man da in einer gewissen Jahreszeit die Saamenstäublein in meistens rundlichen Häuflein beisammensitzen sehen. Die mehrsten unsrer Farnkräuter haben einen sonderbaren, nicht sehr angenehmen Geruch. Ihre Wurzeln braucht man in der Arzeneikunde, besonders die des Farnkrautmännleins oder des Tüpfelfarns (**Aspidium filix mas**), gegen den Bandwurm.

3) Die Tangarten (**Fucus**), bekommt einer, der nicht am Meere wohnt, freilich nicht so leicht zu sehen. Denn sie wachsen im Meereswasser und zwar an unsern deutschen Küsten, vorzüglich der Blasentang (**F. vesiculosus**), mit vielen, immer zu 2 und 2 an einander stehenden, rundlichen Blasen, an seinen langen, bandförmigen, gekräuselten Blättern. Unter den Tangarten giebt es gar überaus nützliche Gewächse, wovon manche einen süßen, nahrhaften Zuckerstoff enthalten, und (besonders in nördlichen Gegenden) von Menschen und Vieh genossen werden. Statt daß man bei uns die Schaafe nur im Grünen, auf Feld und Haide weiden sieht, sieht man auf Island sie öfters an der öden Meeresküste stehen und nach dem Tang haschen, den eine Meereswelle ans Ufer hinan hebt. Auf ihren Wanderungen führen manche sibirische Küsten-

Digitized by Google

völker den getrockneten Tang statt des Brodes bei sich. Andere Arten verbrennt man und macht aus der Asche gute Seife oder stopft auch Kissen damit aus.

4) Die Schwämme und Pilse, theilt man, je nachdem sie unten auf ihrer Unterfläche Blätter oder Löcher oder Zasern (weiche Stacheln) haben, in Blätterschwämme (**Agaricus**), Löcherschwämme (**Boletus**), Stachelschwämme (**Hydnum**), außerdem in Aderschwämme oder Morgeln (**Phallus**), und Kugelschwämme (**Lycoperdon**). Unter die ersten gehört der gelbe, eßbare Pfifferling (**Ag. Cantarellus**), so wie der ebenfalls wohlschmeckende Breitling (**Ag. laotifluus**), der einen flachen, gelblichbraunen Hut hat, an dessen unterer Seite zarte, weiße Blättchen stehen, aus denen ein wohlriechender Milchsaft hervorkommt; der ebenfalls eßbare Tännling (**Ag. deliciosus**), mit ziegelrothem Hute und gelblichem Milchsafte, dann der rothe, giftige Fliegenschwamm (**Ag. muscarius**), der an seiner Oberfläche meist mit weißen Wärzchen bedeckt ist, und aus dem manche Völker in Sibirien ein so stark berauschendes Getränk bereiten, daß die, so es trinken, ganz sinnlos davon werden. Unter die Löcherschwämme gehört der, aus dem man den Feuerschwamm macht (**Bol. igniarius**), dessen beste Sorte an Linden wächst, und der hufeisenförmig gebildet, am Rande verdünnt, an seiner oberen Fläche glatt, inwendig von gelber Farbe ist. Auch der schöne, oft mit grünen, gelben, rothen und blaulichen, halb ringförmigen Banden bezeichnete Kokardenschwamm (**B. versicolor**), der zuweilen in zusammengehäuften Massen an alten Baumstrünken und faulen Holzstämmen sitzt, ist ein Löcherschwamm. Von Stachelschwämmen führen wir nur an den grossen Schuppenschwamm (**Hydn. imbricatum**), der an manchen Orten gegessen wird; unter die Kugelschwämme (**Lycoperdon**) gehören die Trüffeln (**L. tuber**), die man, weil sie unter der Erde wachsen, durch Hunde aufspüren läßt, so wie der bekannte Bovist (**L. Bovista**), welcher, wenn man an ihn drückt, ganze Wölkchen seines braunen, für die Augen schädlichen Stau-

Digitized by Google

bes ausstreut. Der Ziegenbart oder Hörnerschwamm ist **Clavaria coralloides.**

5) Der Bärlapp oder das Freselmehlkraut (**Lycopodium**), kriecht mit seinen schönen, grünen Zweiglein, welche eng zusammengedrängte Blättlein haben, auf der Erde. In den Fruchtähren dieser Pflanze erzeugt sich der gelbe Staubsaame, der, wenn man ihn gegen das Licht bläßt, mit einer knisternden Flamme brennt, und der gegen das Wundwerden der Kinder und auch innerlich in manchen Krankheiten gebraucht wird.

6) Laubmoose (**Musci**), giebt es gar viele Arten, die man nur zu Streu brauchen kann, die aber sonst weder für Thiere noch Menschen genießbar sind. Eins der größten und gemeinsten ist das goldne Frauenhaar, oder Widerthonmoos (**Polytrichum commune**). Dieses hat seine Saamenkapseln auf langen gelblichen oder röthlichen Stielen stehen und auf den kleinen Kapselchen sitzt ein gelbliches Filzmützlein, das man herab ziehen kann. Dieses Moos wird oft mehrere Spannen lang.

7) Die Flechten (**Lichenes**), überziehen in gar mannichfacher Gestalt als schuppenartiger Schorf, oder trockenes, lappenartiges Laublager, von Farbe bald schön citronen-, bald schwefelgelb, bald grün, bald grau und schwarz, Baumrinden, alte Bretterwände, Felsen und Mauern, und sind auf ihrer Oberfläche mit kleinen Schüsselchen, Knöpfchen, Schildchen u. s. w. bedeckt, von denen, so wie von den Rissen der Oberfläche selbst, ein Schorfstaub ausgesondert wird, aus welchem neue Flechten der Art entstehen.

Da giebt es sehr nützliche darunter, namentlich wird schon die citronengelbe Wandflechte (**Parmelia parietina**), welche allenthalben bei uns an alten Bretterwänden, Zäunen, Baumrinden, Mauern und dgl. gefunden wird, sowohl zum Färben als in der Arzeneikunde angewendet. Noch mehr im Gebrauche ist die Lackmusschildflechte (**Parmelia Roccella**), die an den Felsenritzen einiger afrikanischen Inseln wächst, und aus der man einen Lackmus zum Blaufärben, und die Orseile bereitet. Vor allen aber nennen wir hier das isländische Moos (**Cetraria islandica**), welches, unter

Digitized by Google

allen Gewächsen in der Welt, eines der nützlichsten ist. Es wächst in den ärmsten nördlichen Ländern, wie Island, Lappland u. s. w. sehr häufig, und auch hin und wieder in unsern deutschen Gebirgswaldungen und auf dürren Haideplätzen. Seine Blätterlappen, welche ziemlich gerade in die Höhe stehen, sind steif, doch biegsam, nach unten breiter, nach oben in schmale Aestlein zertheilt, die sich in noch kleinere, mit zwei Spitzen enden. Die innere Fläche ist hohl, grün und zugleich ins Röthliche fallend, glatt, die hügliche Außenfläche ist bleichfarbig (weißlich oder grünlich gelb). Am bittern Geschmacke, der sehr stark ist, kennt man aber das isländische Moos am besten. In Auszehrungen und Brustkrankheiten ist es ein vortreffliches Mittel, welches oft noch Rettung verschafft. In Krain mästet man Schweine damit; magere Pferde und Ochsen, so wie manche kranke Schaafe werden, wenn man sie isländisches Moos fressen läßt, ganz feist davon. Die Isländer schätzen es fast so hoch als Mehl, indem sie Brod davon backen, oder es mit Milch gekocht genießen. Jenes arme Volk könnte in seinem so wenig hervorbringenden Lande kaum leben ohne das isländische Moos, welches daselbst alle nackten Felsen überzieht, auf denen sonst kein andres Kraut wachsen könnte, und mit Recht von dem dortigen Landmann höher geachtet wird, als alle Bäume und Kräuter seines Landes. Wenn im Anfang, ehe Island von Pflanzen bewohnt war, die Meereswellen, so wie sie es jetzt daselbst noch öfters thun, von einer fernen Küstengegend einen edlen Baum z. B. einen guten Obstbaum, und auf seiner Rinde das arme unscheinbare isländische Moos heran an die Insel getrieben hätten, und beide hätten reden können, da würde wohl der Baum großsprecherisch zum kleinen Moos gesagt haben: „Da komm ich nun, geführt von den Wellen des Oceans, als ein künftiger Wohlthäter an diese Insel und bald werden meine schönen Blüthen und herrlichen Früchte, von Allen, die da wohnen, das gebührende Lob und Verehrung empfahen. Aber was willst du, elendes verächtliches Moos? Dich wird man wegwerfen und mit Füßen treten!" Das arme kleine Moos hätte sich dann geschämt und geschwiegen. Aber siehe, nach wenig Jahren hätte die Sache schon ganz anders ausgesehen. Denn der schöne Baum, den die Einwohner von Island vielleicht mit Jubel in die Erde gepflanzt hatten, kam dort nicht fort, während das von ihnen gar nicht beachtete Moos, das sich ungemein schnell vermehrt, genügsam sich über alle dürre Felsen hinwegzog, und nun den Tausenden, die dort wohnen, ihr tägliches Brod gab.

Als ein fast unentschiedenes Mittelding zwischen Thier- und Pflanzenreich stellen wir hieher an die Gränze beider Reiche:

8) Den Seeschwamm oder Badeschwamm (Spongia marina). Dieser findet sich häufig an den

Digitized by Google

östlicheren Inseln und Buchten des Mittelmeeres und wird von den Tauchern aus der Tiefe heraufgeholt. Im frischen Zustand sind seine Löcher mit einer organischen Gallert erfüllt, von der man ihn reinigen muß, wenn er nicht faulen soll. Mehrere Beobachter wollten an dieser gestaltlosen Gallert ein schwaches (thierisches) Zucken wahrgenommen haben, wenn man das Gewächs frisch aus dem Meere heraufbrachte. Der Seeschwamm wird deshalb von ihnen zu den Formen des niedrigen, an das Gewächsreich angränzenden, Thierreiches zu den Zoophyten gezählt. In jedem Falle steht er zwischen beiden Reichen in einer gleichschwebenden Mitte.

IV.

Die Geschichte des Thierreichs, oder Zoologie.

§. 41. Die Thiere können sich alle, wenn sie auch nur, wie manche Seegeschöpfe, ein leise zuckender Schleim sind, aus eigenem, von innen kommenden Antriebe bewegen, und zwar sehr viele von ihnen, frei von einem Orte zum andern, obgleich manche dagegen auch fest am Boden, oder an einem Strauch- oder Bäumchenartigen Stämmchen, welches von einer ganzen Gesellschaft solcher Thierchen belebt und bewohnt wird, angewachsen sind. Alle Thiere, auch die unvollkommensten, bei denen sich öfters mehrere Saugmündungen finden, haben Magenhöhlen zur Aufnahme der Nahrung, die vollkommneren einen Mund, Magen und Darmkanal, und wenn die Speisen und Getränke verdaut sind, gehen die aus ihnen gezogenen Nahrungssäfte durch eine eigene Art von Gefäßen in die Blutadern, aus diesen ins Herz. Das Herz treibt bei den vollkommensten Thieren erst das Blut in die Lungen, aus diesen kommt es, nachdem es beim Einathmen mit der Lebensluft in Berührung gesetzt und von seiner Kohlensäure (nach §. 11 A.) gereinigt worden, durch die zurückführenden Lungen-Blutadern in die linke Herzkammer, von da durch die Pulsadern

Digitized by Google

nach allen Gliedern und Theilen des Leibes, dann zieht es sich am Ende wieder in die kleinen Zweiglein der Blutadern hinein, aus diesen in die Blutaderstämme, und kommt so von neuem ins Herz, und von da nach den Lungen zurück. Blutadern sind die blauen Gefäße, welche mehr nach außen oder oben unter der Haut, liegen, und die man deshalb durch die Haut, z. B. an der Oberhand durchschimmern sieht. Schon bei den Fischen ist jedoch der Blutumlauf anders, denn diese haben Kiemen statt der Lungen, aus denen das Blut, nach dem Einathmen der im Wasser enthaltenen Luft nicht mehr nach dem Herzen zurückkehrt, sondern sogleich durch die Pulsaderstämme im Körper sich verbreitet. Die eigentlichen Insekten schöpfen die Luft durch kleine Oeffnungen an den Seiten des Körpers, und bei ihnen findet sich statt des rothen Blutes nur ein weißlicher Bildungssaft; ihr Herz ist ein langes, schlauchartiges Gefäß, welches durch Klappen in mehrere (wohl in 8) Kammern getheilt ist. Auch die Thiere der andren Ordnungen athmen alle ohne Ausnahme durch sehr verschiedenartig gestaltete Organe aus und ein; das Athmen ist überall das wesentlichste Zeichen des selbstthätigen Lebens und von der Verbindung der Lebensluft mit dem Kohlenstoff hängt das Entstehen so wie die Erhaltung der thierischen Wärme ab.

Die Thiere bewegen ihre Glieder mittelst der Muskeln oder des sogenannten Fleisches, das sich an allen Theilen ihres Körpers befindet und welches mehr oder minder deutlich aus Fasern gebildet ist. Aber damit der Wille vom Gehirn aus, wo der Ausgangspunkt der bewegenden Kraft, des Willens, so wie der Sammelpunkt aller Empfindung ist, nach den Gliedern hinwirken könne, sind die zarten, aus äußerst feinen, mit einer ölichen Flüssigkeit erfüllten Röhrchen zusammengesetzten Gebilde der Nerven angebracht, welche als (meist gelblichweiße) kleine Fädchen vom Gehirn und Rückenmark, nach allen Theilen des Leibes hinlaufen. Sind die Nerven, die nach einem Gliede hingehen, durchgeschnitten, dann hat das Glied kein Gefühl und keine Bewegung mehr; ist das Rückenmark

Digitized by Google

durchschnitten, oder verletzt, so muß unterhalb der verletzten Stelle der ganze Leib sterben.

Die Sinnen, als Gesichts-, Gehör-, Geruch und Geschmacks-Sinnen, sind wohl bei vollkommnen Thieren leicht zu erkennen und aufzufinden, aber bei vielen unvollkommneren Thieren weiß man oft nicht, ob dieselben besondere Theile haben, durch die sie das Licht wahrnehmen, oder riechen und hören, was sie doch offenbar können, oder ob die ganze äußere Hautfläche ihnen zu solchen Wahrnehmungen dient, was dann freilich nur ein Fühlen des Lichtes, Schalles u. s. w. wäre. Denn bei allen, auch den unvollkommensten Thieren, findet sich doch die Eigenschaft, wodurch das Thier erst zum Thiere wird: das Fühlen (Empfinden).

Die Knochen liegen bei den vollkommneren Thieren inwendig in den fleischigen Theilen, und sind von diesen umgeben, so wie sie ihrerseits wieder das Gehirn und das Rückenmark umschließen. Bei den unvollkommnen Thieren finden sich theils gar keine Knochen oder knochenartig feste Theile, oder sie haben nur eine knochenfeste Schaale, welche den Körper umgiebt und ihm, wie bei der Schnecke, zu einer Art von Wohnung dient.

Die meisten Thiere sind entweder Männchen oder gebährende Weibchen; es giebt aber auch welche unter ihnen, die, wie die Arbeitsbienen, blos unfruchtbare, nicht gebährende Weibchen sind, oder auch solche, unter denen sich gar keine eigentlichen Männchen, sondern lauter fruchtbare Weibchen finden, wie bei manchen Muschelarten. Ein Theil der Thierarten gebiert lebendige Junge, ein andrer Theil legt Eier.

Die besondren Eigenschaften der Thiere im Bau und in der Lebensthätigkeit werden bei den einzelnen Hauptordnungen des Thierreiches erwähnt. Solcher Hauptordnungen sind eigentlich nur 4, davon die erste jene Thiere in sich fasset, welche ein Knochenskelet mit einem Schädel und Rückgrat haben, und deshalb Wirbelthiere heißen, die 2te die Weichthiere, die 3te die gegliederten Thiere, die 4te die Strahlenthiere umfas-

Digitized by Google

set. Man kann aber auch, zur leichteren Uebersicht die Eintheilung in 8 Klassen treffen.

1) Säugethiere (**Mammalia**).
2) Vögel (**Aves**).
3) Amphibien (**Reptilia**).
4) Fische (**Pisces**).
5) Weich- und Schaalenthiere (**Mollusca**).
6) Gegliederte Thiere (**Articulata**) oder Insekten (**Insecta**).
7) Würmer (**Vermes**).
8) Strahlenthiere (**Radiata**), auch Pflanzen- und Aufgußthiere (**Zoophyta** und **Infusoria**). Die vier ersten dieser Klassen bilden die eine Hauptordnung des Thierreiches, jene der Wirbelthiere, die 4 andren enthalten die Ordnungen der Wirbellosen.

Wir fangen dießmal mit den letzten zuerst an, mit den Strahlenthieren, an deren Körper sich die Gliedmaßen, wie die Blätter einer Blume, meist strahlenförmig um einen Mittelpunkt angefügt finden, und welche hierinnen, so wie in ihrer übrigen, oft bäumchenartigen Gestaltung den Pflanzen ähnlich sind. Wie sich diese niederste Thierordnung durch die Form ihres Körpers an das Pflanzenreich anschließt, so steht dieselbe in andrer Hinsicht in einer merkwürdigen Beziehung zu dem Mineralreich. Denn ein großer Theil der Strahlenthiere, zu welchem nach §. 44 die Stein-Corallen gehören, bildet ganze Inseln und Kalkfelsenmassen im Meere; andre, die zu den Infusionsthierchen gezählt werden, geben durch ihre kieslichen Schaalengehäuse, wenn sie zu Millionen absterben, den Stoff zur Bildung der Tuff-ähnlichen kieslichen Massen, woraus ganze große Auflagerungen des Festlandes entstanden sind.

§. 42. Wenn man auf Pflanzensaamen etwas Wasser schüttet und dieß einige Zeit stehen läßt, oder wenn man das verdorbene Wasser aus dem Trinknäpfchen eines Vogels, und überhaupt jedes verdorbene oder sonst nicht ganz reine Wasser, worinnen Pflanzen- oder thierische Theile enthalten waren, unter

Digitized by Google

ein vergrößerndes Gläserrohr oder Microscop bringt, so sieht man in einem einzigen solchen Tröpfchen unzählige, kleine lebendige Wesen sich bewegen. Da giebt es ganz kleine, einfache Kügelchen, die sich eins gegen das andere, oder gegen ein hineingefallenes Körnlein Staub bewegen, sich gegenseitig verfolgen oder fliehen, eins das andere verschlingen und anziehen. Dann giebt es auch größere und zusammengesetzte Kügelchen, bei denen viele (wohl gegen 40) kleine, einfache, lebendige Kugeln in einer größeren enthalten sind, die sich immer um sich selber herum dreht. Auch finden sich solche zusammengesetzte, an denen mehrere Kugeln, z. B. sechszehn, je vier und vier in einer Reihe, zu einem Viereck sich vereinen. Eben so sieht man öfters in solchen Aufgüssen kleine lebendige Stäbchen oder Fäserchen, davon sich auch oft wieder mehrere (gleich den Längs- oder Schlauch-Gefäßen der Pflanzen) an einander legen und ein größeres lebendiges Ganzes bilden. Manche solche Thierlein haben rings um sich her, gleich dem Bild der Sonne mit seinen Strahlen, kleine Fäserchen, mittelst deren sie sich wie ein Rad um sich selber kreisen, oder sie haben (wie die sogenannten Räderthierchen) mehrere dergleichen Räder, statt der Glieder an ihrem Körper, mittelst welchen sie schwimmen.

Dieß sind nun scheinbar die niedrigsten Anfänge des Thierreiches, zum Theil nur kleine Gallertpünktlein und Tröpflein, obgleich man im Innern der meisten Arten einen großentheils in viele Abtheilungen gesonderten Magen, (viele Mägen wie viele Mundöffnungen) so wie andre eingeweideartige Theile und selbst äußere Gliedmaßen, entdeckt hat. Man nennt diese kleinen Wesen Infusionsthiere und hat ihnen auch noch besondere Namen, z. B. Punktthierchen (**Monas**), Kugelthierchen (**Volvox**), Stabthierchen (**Bacillaria**), Quadrat- oder Sechszehntheil-Thierchen (**Gonium pectorale**), Strahlenthierchen (**Trichodes**), gegeben. Namentlich sind es die Stabthierchen, aus deren zweischaaligen, kieselerdigen Panzern sich in alter Zeit viele, weitverbreitete Kie-

Digitized by Google

sel-Ablagerungen gebildet haben, so wie sich noch jetzt da, wo diese Thierchen in stehenden Gewässern und selbst im Meer zu vielen Millionen beisammen wohnen, dergleichen Ablagerungen erzeugen. Selbst zwischen den Eismassen der Polarmeere findet man Arten der Infusionsthiere, welche, ohngeachtet ihrer Kleinheit, ein sehr zähes Leben haben.

§. 43. Etwas mehr in die Augen fallend und vollkommener erscheint der Armpolyp (Hydra), z. B. der schöne grüne (H. viridis), den man in der ersten Hälfte des Frühlings und im Herbste öfters zu sehen bekommen kann, wenn man Wasser aus einem frischen quellenreichen Teiche vorsichtig in ein helles Glas schöpft und dies einige Zeit stehen läßt. Man sieht dann das seltsame Thierchen, wie ein kleines belebtes Pflänzchen, mit seinem unteren Stammende z. B. auf ein Wassergewächs wie fest gewachsen, oder auch wohl den einen kleineren Polypen, an einen größeren, dessen Sohn er ist. Nach oben zertheilt sich ein solcher Polyp in mehrere (8 bis 10) Arme oder lebendig bewegliche Zweiglein, womit das Thier andere kleinere Wasserthierchen erhascht und sie dann zu einem zwischen den Armen stehenden Munde bringt, der zu einer Art von einfachem, sackförmigen Därmchen, das zugleich Magen ist, führt, und eben sowohl zum Einschlucken der Speisen, als auch zum wieder von sich geben des Abgangs oder Unrathes dient.

Das ganze Thierchen ist wie eine belebte Gallert; zerschneidet man es in mehrere Stücke, so wird aus jedem ein neuer, lebendiger Polyp, wendet man es um wie einen Handschuh, so daß das Inwendige herauskommt, so lebt es auch fort und fängt nach Kurzem wieder an zu fressen. Es pflanzt sich fort wie eine Pflanze, welche Ableger und Wurzelsprossen von sich giebt, und ein Polyp wächst aus dem andern, so daß man oft aus dem Großvater den Sohn, aus diesem den Enkel, und mithin alle aus einem Stamme gewachsen, antrifft, wo dann nicht selten der Enkel den Großvater die Speise mit seinen Fangärmchen von dem Munde wegnimmt, weshalb jedoch jener nicht zu hungern braucht, da, so lange sie zusammengewachsen sind, die genossene und verdaute Nahrung von dem einen gallertartigen röhrig-hohlen Leibe in den andern hinüberdringt. Erst im Herbste legt der Polyp ein Ei, und stirbt dann.

Digitized by Google

Der schöne grüne Armpolype wird zuweilen 1 Zoll lang. Seine Arme sind kürzer als der Leib. An seinem unteren Stammende ist eine Scheibe, mittelst welcher er sich an andre Gegenstände festsetzen, aber auch wieder von ihnen losmachen kann. Denn er vermag sich von einem Orte zum andern fortzubewegen, indem er wie eine Spannraupe sich krümmt, und abwechselnd jetzt mit dem Mundende und seinen Fangarmen sich festhält, während er das Schwanzende frei macht, dann wieder mit diesem sich ansaugt, während er das Mundende erhebt. In einem Glase, worein man öfter wieder frisches Wasser mit einigen Wassergewächschen bringt, kann man ihn ziemlich lang am Leben erhalten und beobachten.

Noch gemeiner als der grüne, ist fast überall, wo es Teichlinsen giebt, der gelblich graue Armpolyp (Hydra grisea). Denn wenn man, während des ganzen Sommers eine Hand voll Teichlinsen in ein Bierglas mit Wasser bringt, sieht man gewöhnlich ein oder mehrere solcher Polypen unten an den Teichlinsen oder am Glase hängen. Er fällt aber nicht so gut in die Augen als der grüne, denn er wird nur etwa ½ Zoll lang und seine Farbe ist auch nicht so ausgezeichnet. Seine Arme (zuweilen bis 12) sind halb so lang als der Körper.

§. 44. Im Meere giebt es unzählige dergleichen polypenartige Thierchen mit Fangarmen, die in ganzen großen Gesellschaften beisammen sitzen, und aus ihren Körpersäften allmählig (eben so wie die Pflanzengefäße eines Baumes zu Holz verhärten) eine feste holz- oder horn- oder steinartige Masse nach innen hinein absetzen, die ihnen auch eben so wie das Holz eines Baumes oder Strauches den kleinen Blüthen oder Blattknospen, (die als kleinere Pflänzchen auf der großen stehen) zum festen Ansitzpunkt oder Stamm dient. Man nennt solche Thiergesellschaften mit sammt ihren Stämmchen vorzugsweise: Pflanzenthiere (Zoophyta). Es werden dahin folgende gerechnet:

1) Der Korkschwamm (Alcyonium) wird beim Trocknen korkartig und leicht zerbrechlich, im frischen Zustand ist er fleischig biegsam und ganz von kleinen Polypen durchwachsen, welche mit ihrem achtarmigen Mundtheile aus der Oberfläche hervorragen.

2) Die Gorgonien oder Hornbaumkorallen (Gorgonia), sehen aus wie kleine Bäumchen oder Sträucher, oder wie ein aus festen Zweigen zusammengesetztes Netz. Der holzige Stamm sieht schwärz-

Digitized by Google

lich oder bräunlich aus, und riecht beim Verbrennen fast wie ein verbrennendes Horn. Ueber dem ganzen Gewächs findet sich eine lederartige Rinde mit Zellen oder Löchlein, in denen Polypen mit 8 Fangarmen wohnen. Aus den Polypen setzt sich die lederartige Rinde, aus dieser das inwendige, holzartige Stämmlein ab.

Solche Hornbaumkorallen, an denen die äußere Rinde auch nach dem Abtrocknen noch als kalkartiger Ueberzug zurückbleibt, nennt man **Gorgonia**, die, bei denen er abfällt, **Antipathes.**

3) Die Seefeder (**Pennatula**), ist ein gar merkwürdiges, aus vielen tausenden kleinen Thierlein bestehendes größeres Thier, das gerade so aussieht, wie eine Feder mit ihrem Kiele, und mit dem Fähnchen oben daran. Der frei, im Meeressande steckende Kiel ist knorplicht, hohl und enthält Körnchen, die wie Eier aussehen, die Fähnchen bestehen oben aus vielen tausend polypenartigen Thierlein, die alle nur von einer gemeinsamen Lebenskraft bewegt und beseelt sind.

Im Kleinen, so kann man sagen, sind die verbundenen Thierschaaren der Seefeder ein Bild der ganzen, großen, von unzähligen einzelnen Wesen belebten Natur, davon auch jedes Einzelne seinen eignen Willen, sein eignes Interesse hat, von welchem es den Anschein hat, als müßte das eine dem andern entgegen und hinderlich seyn, es waltet aber durch und um alle nur ein höherer, beseelender Wille, der alle einzelne so harmonisch bewegt, daß aus allen besondern Bewegungen nur eine allgemeine, große, wird, aus allen einzelnen Leben, nur ein verbundenes, gesammtes, großes und ganzes Leben.

Unter den Arten der Seefedern giebt es mehrere sehr buntfarbige und auch solche, welche bei Nacht leuchten.

Als eigentliche Steinkorallen (**Lithophytha**), führen wir namentlich die 3 nachstehenden Gattungen an:

4) Die Milleporen (**Millepora**), sind kalkartige Corallengewächse, über die sich auch eine belebte, aus meist armlosen Polypen bestehende Rinde hinzieht. Der kalkartige Steinkern, der bei manchen so breit und zackig gestaltet ist, wie das Geweih eines Elennhirsches, hat lauter kleine Löchlein, wie mit einer Nadel gestochen.

5) Die Sternkoralle (**Madrepora**), von der

Digitized by Google

man mehrere Arten, z. B. die weiße Cadixkoralle (oculina), und die ästige (ramea) noch in unsern Apotheken sehen kann, haben schöne sternförmige Oeffnungen, mit Blätterzellen. In diesen Sternchen, oder denen des Blätterschwamms ähnlichen, auch wohl, wie bei den sogenannten Hirnkorallen, furchenartig gewundnen Fächern, leben Polypen, welche theils zahlreiche (12 und darüber) Fangarme, oder auch bei einigen Arten zangen- und fast scheerenartig gebildete Glieder haben. Diese, und die schon vorher erwähnten Stein-Corallenarten, bauen sich oft im Meere zu so großen Massen, welche vom Grunde bis zur Oberfläche heraufreichen, an, daß Schiffe daran verunglücken können und aus solchen Corallenriffen nach und nach Inseln entstehen.

6) Die Edelkorallen, oder eigentlichen rothen Corallen (**Corallium rubrum oder Isis nobilis**), stehen meist in großen Tiefen, als ein sehr festes, steinhartes Bäumchen, über welches ein aus achtarmigen Polypen bestehender Ueberzug verbreitet ist, auf dem Meeresgrunde, und werden deshalb nur mit vieler Mühe, durch eine eigne Art von Netzen gewonnen, oder durch Taucher heraufgeholt. Die rothen Corallen werden zu Kügelchen verarbeitet, die dann durchbohrt und an Schnüre gezogen werden. Man hält sie in manchen Ländern, besonders in Afrika, als Schmuck sehr hoch und theuer, und sie nehmen sich auch auf der schwarzen Haut der Negerfräulein noch am besten aus, denn diese lieben überhaupt recht schreiende, wilde Farben.

§. 45. Zu der Klasse der Strahlenthiere oder Pflanzenthiere gehören denn auch die oft ganz blumenartig gestalteten, zum Theil frei, wie abgerissene Blumenköpfe im Wasser herumschwimmenden, zum Theil gleich den Pflanzen festgewachsenen Meernesseln (**Acalephae**). Diese im Meere lebenden Thiere haben ihren Namen daher, daß viele von ihnen, besonders die in den heißeren Weltgegenden, wenn man sie auf die Haut legt, ein eben solches Brennen erregen und die Haut eben so roth machen wie Brennesseln, was

Digitized by Google

von einem scharfen Safte oder auch wohl von einer elektrischen Kraft dieser Thiere herrührt, wodurch sie im Stande sind, kleine Fische und andere Seethiere zu lähmen und zu fangen. Die meisten Meernesseln haben einen gallertartigen durchsichtigen Körper, der bei Tage ein schönes Farbenspiel zeigt, bei Nacht aber bei vielen Arten, gleich den Johanniswürmchen, leuchtet. Dahin gehören folgende Geschlechter:

1) Die Meduse, Qualle (Medusa), kennt wohl Jeder, der einmal an der Ostsee oder Nordsee war, denn da sieht man, besonders im Sommer, die Quallen als größere und kleinere gallertartige, durchsichtige, milchig weißliche Scheiben im Meere auf- und niederschwimmen, und gar oft von den Wellen ans Land geworfen werden.

Die eine Art, die Fadenqualle, M. capillata (Ephyra baltica), hat um den wenig gewölbten Hut der etliche Zoll großen Scheibe einen Schuppenkreis und 16 Strahlen, so wie klafterlange Fäden; eine andere, die Rosenqualle, M. rosea (aurita), hat am Rande kurze Fädchen und in der Scheibe rosenrothe Streifchen (Gefäße) und beide sind in der Ostsee (jene auch in der Nordsee) häufig. Noch eine andere, in den nördlichen Gegenden der Ostsee lebende Art, die gezähnelte Qualle, M. denticulata, zeigt am Rande 32 zähnchenartige Anhänge; die rosenroth gerandete, M. basteriana, in der Nordsee hat 4, die blauliche, 2 Fuß große, M. rhizostoma, im Canal wohnende, mit purpurnem Rande, 8 zweilappige Strahlenarme.

Viel schöner noch als die gemeine Qualle ist:

2) Die Rippenqualle (Beroë). Diese hat über den eirunden, gallertartigen Körper hervorspringende Ecken von Rippen, die z. B. bei der 1 Zoll langen Melonenqualle (B. pileus) in der Nordsee, aus lauter kleinen Querblättchen bestehen, welche in einer beständigen zitternden Bewegung sind, wobei dann der Körper des Thierchens am Tage in alle Farben des Regenbogens spielt, bei Nacht aber etwas leuchtet.

Selbst der plumpe Wallfisch hat, wie jeder andere Sammler, an diesem schönen Thierchen seine Freude, die er freilich nicht anders auszudrücken weiß, als daß er es zu vielen Tausenden verschlingt und auffrißt. Eine, im atlantischen Meere vorkommende Art von Rippenqualle, der Doppler (B. Diphyes), wird immmer wie aus 2 Thieren, oder eigentlich

Digitized by Google

Thierstücken zusammengefügt gefunden. Nur das eine, vordere Thier hat eine Saugröhre mit Fangarmen (stellt also gleichsam das Kopfende dar), das andere, hintere Thierstück, das nur locker am vorderen anliegt, gleicht einem Sacke, der das Seewasser einläßt und ausstößt und durch das Letztere sich und seinem Vorderstück einen Stoß zum Weiterschwimmen giebt. Noch mehr zeigt einen solchen gesellschaftlichen Trieb:

3) Die Segelqualle (**Velella**) mit eiförmigem knorplichten Körper, aus welchem ein segelartiger Kamm vorsteht. Diese segelt meist zu Tausenden reihenweise im Meere. Sie leuchtet stark bei Nacht, und ihre Berührung erregt Jucken.

4) Die Blasenqualle (**Physalia Stephanomia**), schwimmt im Meere, mittelst der mit Luft gefüllten Blasen, die sie an und in ihrem Körper trägt, und welche das Thier willkührlich entleeren und wieder füllen kann. Wenn die Schnabelblasenqualle (**Ph. Megalista**) im atlantischen Meere sich der Küste nähert, so hält man dieß für ein Zeichen von nahe bevorstehenden Stürmen. Die Kranzblasenqualle (**Stephanomia Amphitritis**), ebenfalls im atlantischen Meere, leuchtet bei Nacht gleich einem Sternenkranze.

5) Die Seeanemone (**Actinia**), die öfters einer bunten Blume mit vielen Blättern gleicht und die mit ihrem breiten, platten Unterkörper festsitzt, hat (meist blätterartig breite), hohle Fangarme wie ein Polyp und läßt sich eben so wie dieser durch Theilung vermehren. Außer diesem erzeugt sie auch Eier, welche sie durch die Mundöffnung von sich giebt. Als Beispiel dienen: die rothe Seeanemone des Mittelmeeres: **A. rubra**, so wie die roth und grün gefleckte: **A. equina**.

§. 46. Die Stachelhäuter (**Echinodermata**), sind freilich in ihrem innern Baue viel vollkommner als die Quallen. Denn sie haben schon eine Art von Skelet, deutliche Anfänge eines Nervensystems, Gefäße, die mit Athmungsorganen in Verbindung stehen und deutliche Eingeweide. Dennoch gleichen sie den Quallen darinnen, daß auch bei ihnen die einzelnen Theile (meist 5 an der Zahl) wie bei den regelmäßigen Blumen von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt strahlenartig ausgehen, oder um diesen herumliegen, und wer-

Digitized by Google

den deshalb mit Recht zu den pflanzenähnlichen, oder Strahlenthieren gerechnet. Es gehören hieher:

1) Der Seeigel (Echinus). Dieser ist wie ein Apfel oder wie ein kleiner Türkenbundkürbis gestaltet, das heißt, rundlich, und hat nach unten, in der kalkigen, dünnen Schaale eine runde Mundöffnung, an deren Rande meistens 5 durchbohrte Gestelle für 5 ein- und auswärts bewegliche Zähne stehen, welche viel mehr 5 länglichen Blumenblättlein gleich sehen, als thierischen Zähnen. Dem Munde gegenüber, oder auch in seiner Nähe, ist eine andere Oeffnung, die zu einer Art von Athemholen und zugleich zum Aussondern des Abganges, oder Unrathes, bestimmt scheint. Auf der ganzen dünnen, kalkartigen Schaale sind kleine Warzen, an welche die Stacheln eingelenkt sind, womit das ganze Thierlein bedeckt ist. Das Thier bewegt sich wie eine sich langsam wälzende Kugel auf den Stacheln, mittelst kleiner, beweglicher Fäserchen oder Füßchen, die in den kleinen Löchlein wurzeln, womit die ganze Schaale überall durchbohrt ist. Jedes Füßchen wurzelt in zwei solchen Oeffnungen, und der Klippen-Seeigel (E. saxatilis), an dem man 2400 solche kleine Löcher zählt, hat also 1200 Füßchen. Inwendig im Thiere sind viele Eier, die man bei mehreren Arten ißt.

2) Der Seestern (Asterias) ist wie ein Stern mit meistens 5 Strahlen gestaltet, der nach unten öfters auch einen Mund mit 5 beweglichen Zähnen hat. Den ganzen, knorplichen oder dickhäutigen Körper, bedecken außen kleine steife Fasern oder lederartige Stacheln, auf und mittelst denen sich das Thier drehend bewegt. Die gemeinste Art ist der röthliche Seestern (A. rubens) mit 5 lanzettförmigen kurzgestachelten Strahlen.

3) Der Schlangenstern (Ophiura), zeigt an der runden Scheibe 5 schlangenartige, lange, gegliederte Strahlen, z. B. der schuppige Schlangenstern: O. lacertosa, mit schuppiger Scheibe, der sich fast in allen Meeren findet.

4) Der Medusenstern (Euryala), oder Gorgonocephalus, mit einer an der Mitte der Scheibe stehenden Mundöffnung und schmalen Spalten an der

Digitized by Google

Wurzel der 5 in viele (zuweilen 8000) Zweiglein und Endspitzen zertheilten Hauptstrahlen, findet sich auch in den meisten Meeren. Z. B. E. caput Medusae, das Medusenhaupt.

5) Die Meerpalme (Pentacrinus), ist ein auf einem langen, kalkigen, gegliederten, fünfeckigen Stiele festgewachsener Medusenstern. Um den Stiel stehen in meist 2 Absätzen, quirlförmig, wie bei den Kiefern und Fichten, 5 Aeste und am Ende von diesen ein in 5 Strahlen getheilter Medusenstern, davon jeder Strahl wiederum 5 gabelförmig getheilte Aeste hat, (der ganze Stern mithin 50 einzelne) jeder Ast aber 120 Glieder, (der ganze Stern mithin 6000, das ganze Thier aber gegen 60000). Mit diesem sehr merkwürdigen Thiere, das an den Antillen (Barbados, Cuba, Martinique) lebt, und freilich nur etliche Fuß hoch, der Stengel aber nur so stark als eine Gänsefederspule wird, war eine andere, viel größere Thiergattung nahe verwandt, deren Ueberreste (besonders die einzelnen Glieder des Stieles oder die Rädersteinchen) man sehr oft unter den Versteinerungen trifft, und deren Arten unter dem Namen Pentacrinit und Encrinit bekannt sind.

§. 47. Die Klasse der Würmer unterscheidet sich durch die meist wurmartige Gestalt und enthält solche Thiere, an denen man größtentheils schon deutliche Nerven und Gefäße wahrgenommen hat. Freilich gehören dahin sehr ungleichartige Thiere, davon manche innerlich schon sehr vollkommen, andere aber so unvollkommen gebildet sind, daß sie im Großen nur dasselbe scheinen, was die Kugelbläschen und die Stäbchen oder Fädchen unter den Aufgußthierchen im Kleinen sind. So die Eingeweidewürmer (Entozoa), die in den Leibeshöhlen anderer, größerer Thiere leben, z. B.

1) Der Queesen-Blasenwurm (Coenurus), dessen Arten nach vornen ein sich ansaugendes Kopfende, nach hinten aber einen gestreckten Körper haben, mit welchem viele solche Thierchen, unter sich verbunden in einer gemeinschaftlichen dünnen Wasserblase festsitzen. Die eine Art, der Hirnblasenwurm (C.

Digitized by Google

cerebralis) findet sich öfters in den Gehirnhöhlen der Schafe, und erzeugt dann die Drehkrankheit, bei der sich das Thier immer nach der einen (gelähmten) Seite hindreht. Sitzen sie auf der linken Seite, so wird die rechte Seite des Schafes gelähmt, oder umgekehrt. Die Finnen an Schweinen (**Cysticercus cellulosae**) sind auch Blasenwürmer.

2) Spring- und Spulwürmer (**Ascaris vermicularis** und **lumbricalis**), wohnen sehr oft in den Eingeweiden der Menschen, besonders der Kinder. Jene sind kleine, fadenartig dünne Würmchen, diese sind dick und sehen aus wie Regenwürmer.

3) Der Medinawurm (**Filaria medinensis**), erzeugt sich in den heißen Ländern von Asien und Afrika unter der Haut und im Fleische der Menschen, besonders an den Schienbeinen. Er ist so dick als eine Darmsaite, wird aber dabei gegen **5** bis **6** Ellen lang. Man muß ihn behutsam aus dem Fleisch herauswinden, denn wenn er abreißt, entsteht oftmals der Brand des Gliedes.

4) Der Bandwurm (**Taenia**), ist meist breit gedrückt, wie ein Bändchen, und besteht aus sehr vielen zusammengewachsenen Gliedern, an denen oben bei dem Kettenbandwurm (**T. solium**) ein Kopfende sitzt, das an ein schmales Halsende befestigt ist, welches bei dem mehr in Norden (jenseits der Weichsel) vorkommenden breiten Bandwurm (**T. lata**) fehlt. Die abgerissenen, im Körper zurückbleibenden Glieder, nicht das Kopfende allein, scheinen wieder Thiere für sich werden zu können. Der Bandwurm, der sich auch häufig in den dünnen Gedärmen der Menschen findet, kann bei diesen gar gefährliche und beschwerliche Krankheitszufälle erzeugen. Die Wurzel des Farnkrautes und die daraus gewonnene Filicine scheinen eines der besten Mittel gegen den Bandwurm zu seyn.

§. 48. Die Ringelwürmer (**Annularia**) sind schon viel vollkommener gebaute Thiere, in denen man deutlich Nerven und Gefäße entdeckt hat, welche sogar eine rothe, blutartige Flüssigkeit in sich führen. Man hat sie deshalb auch mit den Insekten, Spinnen und

Digitized by Google

Krebsen zu einer besondern (zur 3ten) Hauptabtheilung des Thierreichs gestellt, welche man nach S. 293 die Ordnung der gegliederten Thiere (**Articulata**) nennt. Hieher gehören:

A) die nackten Ringelwürmer, z. B.

1) Der bekannte Regenwurm (**Lumbricus terrestris**), mit oft mehr als 120 Ringen und Wärzchen so wie steifen Borsten (auf jedem Bauchringe 4 an jeder Seite, die er aus- und einziehen und womit er sich fortbewegen kann).

Er lebt von modriger Erde, nagt aber auch die kleinen Würzelchen der Gartenpflänzchen ab, die dann welken müssen, wodurch er vielen Schaden thut. Der Maulwurf frißt gar manchen Regenwurm auf, eben so fressen ihn mehrere zahme und wilde Vögel sehr gern. Bei Nacht gehen die Regenwürmer aus ihren Löchern heraus, dann kann man sie absuchen und fangen. Sie legen meist Eier, doch gebären sie auch zuweilen lebendige Junge. Im Herbste ziehen die Regenwürmer ganze Bündlein Weidenblätter in ihre Löcher, wo diese gerade unter Weidenbäumen sind, mit den unteren Enden hinein, so daß die oberen wie eine kleine Rose herausragen. Wenn die unteren Enden faul sind, fressen sie sie ab, und ziehen so nach und nach die ganzen Blätter hinein.

2) Der Blutegel (**Hirudo**) bedarf, weil er im Wasser lebt, keiner solchen Fußborsten zu seiner Fortbewegung als der Regenwurm, sondern er bedient sich hierbei der saugnapfartigen Scheibe am hinteren Ende seines Leibes und seines ebenfalls zum Ansaugen geeigneten Mundes, indem er bald mit dem einen, bald mit dem andern sich festsetzt und so spannraupenartig fortkriecht. In seinem Munde stehen 3 knorpliche, halbrunde, mit spitzigen Zähnchen bewaffnete Kiefern, durch die er sich, wenn er Blut saugt, festbeißt. An beiden Seiten des Leibes finden sich rundliche Oeffnungen, die zu kleinen Luftsäckchen führen, durch welche das Thier athmet. Die Arten, deren man sich zum Theil in der Heilkunde bedient, sind:

a) Der Aderlaßblutegel (**H. medicinalis**) der sich vorzüglch in den Sümpfen des nördlicheren Deutschlands findet. Sein Rücken ist schwärzlich grün und zeigt 6 rostrothe, schwarz punktirte Längsstreifen, der Bauch grünlichgelb mit schwarzen Flecken.

b) Der Apothekerblutegel (**H. officinalis**) kommt

mehr in südlicheren Gegenden, besonders in Ungarn vor, von wo aus er in Menge weit versendet und wie die vorige Art zu örtlichen Blutentziehungen gebraucht wird. Der Rücken ist mehr schwärzlich, die 6 rostrothen Streifen sind nicht schwarz punktirt, am Bauche, welcher gelblich ist, finden sich keine schwarzen Flecken.

c) Der Pferdeegel (H. gulo) ist wohl hin und wieder zum Nachtheil der Kranken mit jenen beiden nützlichen Arten verwechselt worden, obgleich er durch seine dunklere Farbe und dadurch, daß er keine, oder nur undeutliche Streifen auf dem Rücken, dabei auch keine Flecken hat, leicht zu unterscheiden ist. Sein Aufsaugen an Menschen erregt leicht Entzündungen und Geschwüre.

B) Ringelwürmer, die in harten Schaalen stecken, sind:

3) Das Meerzähnchen (**Dentalium**), das schon nach oben Fühlfädchen und deutliche Kiemen zum Athemholen hat, und dessen zum Theil glatte, zum Theil tiefgefurchte harte Schaalenröhre oben und unten offen ist.

4) Die Wurmröhre (**Serpula**), worinnen auch ein solcher Wurm lebt, hat eine harte, kalkige, runde Schaalenröhre. Die Kiemenbüschel dieses Thieres sehen wie Federbüsche aus.

Noch vollkommenere Würmer mit äußerlich sichtbaren Kiemen, sind die:

5) Nereide (**Nereis**), ein sehr kleines, zartes Thierlein, mit pinselförmigen Fäden an beiden Seiten des Körpers, die den Füßen der Asseln gleichen. Die eine Art, die **N. noctiluca**, leuchtet bei Nacht. Sie findet sich in allen Meeren.

6) Der Goldwurm oder die schillernde Seeraupe (**Aphrodita aculeata**), die sich auch schon in der Nordsee findet, sieht aus wie eine recht große, mit langen Haaren oder Borstenstacheln besetzte Raupe. Die Haare und Borsten schillern, wenn man sie gegen das Licht hält, gleich einem edlen Opal, in alle mögliche bunte Farben und geben dann dem Thier ein gar prächtiges Ansehen. Die schillernde Seeraupe wohnt meist in leeren Schneckenschaalen und Felsenritzen.

7) Das Wasserschlängelchen (**Nais proboscidea** so wie **vermicularis** und **serpentina**), lebt

Digitized by Google

zum Theil auch schon in unsern süßen Landgewässern, und ist freilich so klein, daß man das zarte Thierchen kaum bemerkt, noch weniger aber seine büschelweise am Körper zerstreuten Borsten, die ihm statt der Glieder dienen, mit bloßen Augen erkennen kann. Das hinterste Ende oder Glied dieses Würmchens wächst nach und nach zu einem neuen Würmchen an und reißt sich dann von dem alten Würmchen los, wie die junge Zwiebel an Zwiebelgewächsen von der alten.

§. 49. Die zweite Hauptabtheilung des Thierreiches umfaßt die Ordnung der gegliederten Thiere (**Articulata**), zu welcher zwar nach S. 291 schon die Ringelwürmer, vor allem aber die Insekten (**Insecta**) gehören. Diese unterscheiden sich durch den meist gegliederten (wie aus Gliedergelenken zusammengesetzten) Leib, gegliederte Füße und in ihrem Innern durch ihren knotig gegliederten Nervenstrang. Die Klasse der Insekten ist unter den unvollkommneren (wirbellosen) Thieren dasselbe, was die Klasse der Vögel unter den vollkommneren (Wirbelthieren) ist; denn der größte Theil der Arten ist leicht geflügelt wie die Vögel. Ueberhaupt sind die Insekten auch in vielen andern Eigenschaften gar merkwürdige Thiere, an denen sich wundervolle Kunsttriebe, Vorausgefühl des Künftigen, und vor allen Dingen eine Verwandlung und gänzliche Umgestaltung zeigen, wodurch ein und dasselbe Thier zu einem ganz andern wird. Erst ist dieses z. B. eine häßliche Raupe, welche ungemein gefräßig und schädlich ist, indem sie eine große Menge von Blättern und Knospen verzehrt, oder auch ein häßlicher Wurm, der vom Kothe lebt. Auf einmal wird die Raupe krank: sie krümmt sich und windet sich, und muß als Raupe sterben, nachdem sie sich öfters noch selber vorher ihr Sterbekleid gesponnen, oder ihren Sarg zurechte gemacht hat. Da liegt sie oder hängt sie dann lange als todt, und die Raupe ist auch wirklich nicht mehr vorhanden. Auf einmal aber bricht der Frühlingssonnenschein herein, da springt der Sarg entzwei, und aus dem Grabe geht nun ein ganz anderes Leben heraus, als das

Digitized by Google

vorige war: ein schöner bunter Schmetterling, der all das Schädliche und Häßliche, was an der Raupe war, abgelegt hat, der gar keine Blätter und keinen Koth mehr essen mag, sondern mit seiner niedlichen, langen Zunge allenfalls blos die Thautröpflein oder auch den Honigsaft aus den Blüthen saugt, sehr oft aber auch gar nichts mehr zu genießen braucht, weil er sich in dieser seiner letzten Gestalt der Welt nur ganz kurze Zeit zeigt. Sehr viele Insekten machen eine solche Absterbung und gänzliche Umwandelung durch und leben nachher zuletzt als schönes, geflügeltes Insekt in der Luft und auf Blumen, während sie vorher als Wurm in der Erde, im Wasser, im Morast und Unrath wohnten; doch können sich auch manche Insekten, z. B. die häßliche Laus, der giftige Scorpion, die Spinne, gleichsam nicht dazu entschließen, so zu sterben, und bleiben daher bis ans Ende das, was sie waren: eine häßliche Spinne oder Laus oder Scorpion.

Bei einer solchen Verwandlung kann man sich allerdings viel denken, und schon die Alten haben deshalb den Schmetterling und seine Verwandlung als ein Sinnbild der Unsterblichkeit der Seele betrachtet, welche auch, wenn der Augenblick und die Umwandlung des Todes glücklich überstanden ist, in hoher Schönheit und Herrlichkeit hervorgehen und aller armen Gebrechen ihres Leibes los, nun ein geistiges Leben führen wird. Man kann aber auch noch aus der Geschichte der Verwandlung der Insekten sehen: wie nahe sich oft innerlich solche Wesen in der Natur stehen mögen, die uns äußerlich als noch so sehr verschieden erscheinen.

Die Insekten athmen durch kleine, meist runde Oeffnungen, welche sich an beiden Seiten des Körpers finden, und müssen sterben, wenn man diese kleinen Oeffnungen zuklebt. Doch haben einige auch Kiemen und sind dann zugleich mit einem Herzen und mit Gefäßen versehen, während die andern statt dessen nur ein langes Schlauchgefäß oben nach dem Rücken zu haben, das sich zusammenzieht und ausdehnt.

Ein Theil der Insekten wird mit Recht zu den für den Menschen und seinen Haushalt schädlichen und plagenden Thieren gezählt. Man darf indeß bei dem großen Schaden, den manche Insekten, wenn ihre Menge zu sehr überhand nimmt, thun, auch den großen Nutzen nicht übersehen, den

Digitized by Google

eben dieselben Thierarten im Haushalt der Natur bringen. Die Termiten oder weißen Ameisen haben freilich in heißen Ländern schon manches Gebäude und Hausgeräthe zerstört, haben sogar einstmals den kostbaren Palast des Generalgouverneurs in Ostindien dem Einstürzen nahe gebracht, aber ohne diese nützlichen, aufräumenden Thiere würde es gar bald sehr übel um die schönen, grünen Waldungen der heißen Länder aussehen. Denn die Termiten fressen, außer andern verdorbenen Pflanzentheilen, vorzüglich das dürre abgestorbene Holz in den Wäldern auf und räumen daher sehr schnell die umgestürzten, oder Umsturz drohenden alten Baumstämme hinweg, die das junge, neuaufgehende Holz niederdrücken und verderben würden. Hierdurch machen sie allenthalben dem jungen Nachwuchse Platz. Auch die Heuschrecken sind allerdings, wenn sie in großen Schaaren kommen, eine furchtbare Plage für ganze Länder. Aber ohne die Heuschrecken würde manche Gegend in den heißen Ländern bald so mit Disteln und Dornen und dürrem, stachlichen Strauchgewächs überdeckt seyn, daß weder Menschen noch Thiere da Zugang und Weide fänden. Denn, wie ein berühmter Reisender (Sparrmann) erzählt, wenn die Heuschreckenschaaren in Südafrika sich nach ihrer gewöhnlichen Weise auf ein Stück Landes geworfen und dieses mehrere Jahre hintereinander ganz abgefressen haben, so kennt man dasselbe ein oder etliche Jahre nachher, nachdem die Plage nachgelassen hat, kaum wieder. Statt der Disteln, Dornen, stachlichten Sträucher und dürren Gräser, welche die Heuschrecken rein abgefressen haben, stehen frisches, junges Gras, viele Liliengewächse und saftvolle Kräuter da, welche vorher von dem Unkraut niedergehalten und erstickt waren. Auch die Larve des Saat-Springkäfers, welche Drathwurm heißt, die des Maikäfers (der Engerling) und die der Wiesenschnacke (Tipula oleracea), thun manchmal, wenn sie in großer Menge da sind, großen Schaden; gewöhnlich aber fressen sie blos die ganz oder halb abgestorbenen, alten und faulichten Wurzeln ab und machen dadurch dem neu aufkeimenden jungen Grase aufs wohlthätigste Raum. Ueberhaupt sind besonders die Insektenlarven dazu da, das Verdorbene und Verwesende hinwegzuschaffen, und wenn man zwei Kübel mit faulem, stinkenden Wasser nimmt, und in den einen Larven von Mücken und Haften (die im Wasser leben) bringt, in den andern nicht, so wird das Wasser im ersteren Kübel bald rein und geruchlos, das andere aber wird immer stinkender. So haben in dem großen Haushalt der Natur, welchem ja Der vorsteht, Der in seinem Regimente niemals was versehen, auch die scheinbar schädlichsten Dinge ihren großen Nutzen.

Die Insekten werden gewöhnlich, wenn man zunächst nur aufs Aeußere, nicht auf innern Bau und Vollkommenheit sieht, auf folgende Weise eingetheilt:

Digitized by Google

I. Käfer (**Coleoptera**), die über ihren, der Queere nach zusammengefalteten Flügeln noch (als 2tes Flügelpaar) harte, lederartige Flügeldecken haben, vorne am Kopfe 2 zusammengesetzte Augen, Fühlhörner, die wahrscheinlich auch zum Hören, Freßspitzen, die mehr zum Fühlen dienen, und Freßzangen (die Kinnladen), statt der zermalmenden Zähne, dabei auch sechs Füße. Die Larve oder der Wurm, welcher meist unter der Erde oder im Holz, oder sonst verborgen lebt, hat bei den meisten auch 6 Füße, und nur bei den Holzböcken ist sie ein Wurm ohne Füße. Man nennt die Käferlarven auch Engerlinge; ein Name, den man zunächst der Larve des Maikäfers giebt. Dahin gehören:

A) Solche mit 5 Gliederstücken am untersten Theil der 3 Fußpaare.

a) Mit verdickten (kolbigen) Enden der Fühlhörner und mit 4 Tastern am Munde.

1) Der Nashornkäfer (**Geotrupes nasicornis**), sieht kastanienbraun aus und hat ein zurückgebogenes Horn auf dem Kopfschilde. Die Larve lebt vorzugsweise gern in der Eichenlohe. Er findet sich auch in Deutschland, namentlich in einigen Gegenden an der Nordseeküste.

2) Der Roßkäfer (**Scarabaeus stercorarius**), ist der blaulichschwarze, große Käfer mit keulenförmigen, oben blättrig auseinander gehenden Fühlhörnern, den man so häufig am thierischen Unrath, besonders am Roßmist sitzen sieht. Seine Larve lebt in den kleinen Kugeln von Mist, welche die Alten zusammenballen, und unter Kuhmist oder in die Erde verbergen. Sie frißt diese Kugeln nach und nach ganz hohl.

3) Der Mondhornkäfer (**Copris lunaris**), wird zwar auch in und unter Kühmist gefunden, wo er seinen Jungen ihren Aufenthalt zubereitet, ist aber ein gar schöner Käfer: ganz schwarz, mit schön gefurchten Flügeldecken und einem ziemlich großen, zurückgekrümmten Horn auf dem halbmondförmigen Kopfschilde. Er ist fast so groß als der Roßkäfer. Es giebt aber auch noch einen viel kleineren schwarzen Käfer, der zu dieser

Digitized by Google

Art gehört. Dieser hat zwei krumm gebogene Hörner, genau so wie ein kleiner Ochse und heißt deshalb der Stierkäfer (C. Taurus).

4) Der große Pillenkäfer (Ateuchus sacer), mit 6zähnigem halbrunden Kopfschild, der sich, so wie einige nahe verwandte Arten, schon im südlichen Europa findet, war als Sinnbild der Sonne bei den alten Aegyptern gar in großen Ehren. Männchen und Weibchen wälzen runde Ballen von Kühmist, in welche die Weibchen ihre Eier gelegt haben, vor sich her, graben dann die Ballen ein, von denen nun die Jungen zu leben haben.

5) Der kleine Mistkäfer (Aphodius) ist eiförmig, meist nur so groß als ein Apfelkern und von rother, schwarzer oder bräunlicher Farbe.

6) Der Maikäfer (Melolontha vulgaris), mit 4eckigem Kopfschild, benagt als Engerling 4 Jahre lang die Wurzeln der Feldgewächse und des Grases, wird dann Puppe, und geht im 5ten Jahre als Käfer aus der Erde hervor, wo er sich freilich auch noch nicht viel besser aufführt, sondern viele Blätter zerstört und abnagt.

Eine größere Art von Maikäfern, der Walker (M. Fullo), mit schönen braun und weißlich marmorirten Flügeldecken, hält sich vorzüglich in sandigen Gegenden auf. Die Larve benagt die Kartoffeln, der Käfer, der in manchen Jahren in ziemlicher Menge erscheint, frißt die Gipfel der Eichen und Pappeln ab, wird aber seltener gefangen als andere Käfer, weil er sehr hoch fliegt.

7) Der Goldkäfer (Cetonia aurata), goldglänzend grün, oben an den Flügeldecken zu beiden Seiten mit kleinen dreieckigen Ansätzen, wohnt als weicher Engerling in den Ameisenhaufen, mitten unter den Ameisen, die doch sonst alles Weiche zernagen und fressen. Ihm aber dürfen sie nichts thun, denn er ist ihnen zur Pflege und Ernährung anvertraut, lebt deshalb mehrere Sommer unter ihnen, und bricht nachher ungehindert als Käfer mitten durch ihren Bau hindurch, mag dann aber nichts mehr von dem Aufenthalt im dünklen Ameisenhaufen wissen, sondern lebt

Digitized by Google

nun gar vergnügt in den schönen Blumen, denen er freilich (besonders den Rosen) Schaden zufügt.

Zu dem meist sehr schönen und ansehnlichen Geschlecht der Cetonien gehören sehr viele, meist in wärmeren Ländern vorkommende Arten. Mit ihm verwandt ist auch das Geschlecht der Goliathkäfer, z. B. der **Goliathus giganteus**, der sich neben unsern Cetonien freilich so ausnimmt, wie der Riese Goliath neben einem Knaben. Dieser mächtige, schöne Käfer, dessen Flügeldecken mit sammetartig-feinhaarigen Streifen oder Borden besetzt sind, kam bis jetzt immer nur in einzelnen Exemplaren aus dem südwestlichen Afrika, z. B. Guinea zu uns, ist deshalb eine theure Zierde der Sammlungen.

8) Der Hirschkäfer (**Lucanus Cervus**), ein gar schöner, dunkelbrauner oder schwärzlicher Käfer, lebt als Engerling 5 bis 6 Jahre in und unter faulen Eichenwurzeln und Eichenholze; als Käfer saugt er lieber mit seiner Zunge Säfte, die aus verwundeten oder behauenen Bäumen herausfließen, und in der Gefangenschaft (wo man ihn auch lange mit Wein- und Eichenblättern erhalten kann) Zuckerwasser. Das Männlein hat schöne, hirschartige Geweihe, mit denen es tüchtig kneipen kann. Diese Geweihe sind seine Kinnladen (**mandibulae**).

9) Der Todtengräber (**Necrophorus Vespillo**), ist ein besonders merkwürdiger, etwas länglicher, auf seinen Flügeldecken orangefarb und schwarz gezeichneter Käfer mit einer ebenfalls orangefarbenen Keule an den Fühlhörnern. Man kann ihn bald zu sehen bekommen, wenn man im Frühling oder Sommer eine todte Maus oder einen todten Maulwurf ins Freie hinlegt.

Es dauert nicht lange, so kommen dann etwa 3 oder 5 Todtengräber, untersuchen das Erdreich, wo das todte Thier liegt, und im Fall dieses nicht gut zu durchgraben ist, tragen sie wohl auch das Thier, einige Schritte weit, langsam kriechend, auf ihren Rücken an einen bequemeren Ort weg, graben es dann gar schön und sauber ein, so daß man gar den Ort nicht bemerkt, wo dies geschehen ist. Nach vollendeter Arbeit kommen sie aus der Erde herauf und ruhen aus, dann geht das Weiblein wieder hinunter und legt seine Eier hinein ins todte Fleisch. Aus den Eiern werden bunte Engerlinge, diese aber schon nach 6 Wochen zu Käfern. So ist im Kleinen wie im Großen in der Natur auch für Reinlichkeit, besonders für das Hinwegschaffen faulender Thiere,

Digitized by Google

gesorgt, und wie in Aegypten Hunde und Geier die todten Thiere auffressen, so thun dies wenigstens im Kleinen bei uns die fleißigen Todtengräberkäfer.

b) Mit faden- oder borstenförmigen Fühlhörnern und mit 6 Tastern am Munde.

10) Der Gold-Laufkäfer (**Carabus auratus**), hat unter den schönen goldgrünen Flügeldecken, die seinen eirunden Körper bedecken, gar keine Flügel, kann daher blos auf der Erde, auf Feldern und Wiesen herumlaufen, wo er sich dadurch sehr nützlich macht, daß er eine Menge schädlicher Gewürme und Insekten mit seinen scharfen Freßzangen anfällt und umbringt. Unter andern überfällt er die Maikäferweibchen gerade dann, wenn sie sich auf der Erde niedersetzen, um ihre vielen Eier, aus denen die schädlichen Engerlinge kommen, hineinzulegen, und frißt sie oder zerstückt sie. Denn er ist ein wahrer Tiger unter seines Gleichen.

Die Familie der Laufkäfer ist außerordentlich zahlreich an Gattungen und Arten, die sich über die verschiedensten Gegenden der Erde verbreitet finden. Viele davon sind an ihren Flügeldecken sehr schön gefärbt und gezeichnet, haben daran gitterförmige Leisten und körnige Vorragungen.

11) Der Schönleib- oder Spürkäfer (**Calosoma Sycophantha**), dessen Leib, mit den schönen grünen, metallisch glänzenden Flügeldecken einem Wappenschilde gleicht, spürt auf Gesträuchen und Hecken nach schädlichen Insekten, besonders Raupen, herum, die er umbringt. Auch als Larve stellt er schädlichen Raupen nach. Er ist aber nicht sehr häufig. Dagegen findet sich:

12) der Sandläufer (**Cicindela**) fast überall in sandigen Gegenden, läuft jetzt schnell am Boden und fliegt dann noch schneller weiter. Die Larve der Sandläufer lebt im Sandboden und fängt sich zum Theil, so wie der Ameisenlöwe, in künstlichen Trichtergruben Insekten. Der vollendete Käfer, dessen Flügeldecken bei dem gemeinen Sandläufer (**C. campestris**) grünlich und weißlich punktirt, dabei wie mit Goldfäden durchwebt, bei andern Arten grün und weiß getupft sind, jagt auch, wie ein gieriges Raubthier

Digitized by Google

nach kleinem Gewürm und Insekten umher. Er ist etwa so lang als ein Mannsfingernagel.

13) Die Wasserkäfer, nämlich der große einfarbig braunschwarze, glatte, mit keulenförmigen (am Ende rundkolbigen) Fühlhörnern (**Hydrophilus**), und der mit gelbem Rande, gefurchte, mit borstenförmigen Fühlhörnern (**Dyticus**) sind als Larve den Fischteichen schädlich, doch nähren sie sich meist nur von den Larven der andern Wasserinsekten.

14) Der Springkäfer (**Elater**), hat Gelenke an seinem Halse, durch die er, wenn man ihn auf den Rücken legt, schnell in die Höhe springen und so wieder auf die Füße kommen kann. Von dem schädlichen Drathwurm, der die Larve des Saat-Springkäfers: **E. segetis**, ist, s. m. S. 295.

15) Das Johanniswürmchen (**Lampyris noctiluca**), hat ein halbrundes, den Kopf bedeckendes Halsschild, und ein weiches, faltiges, bei Nacht leuchtendes Ende des Hinterleibes. Nur das um Johannis des Abends so schön leuchtende Männchen kann herumfliegen, das Weiblein aber, so wie die Larve, die man noch im Herbst auf dem Grasboden leuchten sieht, sind ungeflügelt.

B) Käfer mit 5 Gliederstücken am untersten Theil des ersten, mit 4 am untersten Theil des 2ten und 3ten Fußpaares.

16) Der Mehlkäfer (**Tenebrio Molitor**), länglich und von dunkelbrauner Farbe, ist als Larve unter dem Namen Mehlwurm allgemein bekannt, und wird als Larve, so wie als Käfer, auch in faulem Holz gefunden.

17) Der Sattelkäfer (**Akis reflexa**), schwarz, mit sattelförmig eingetieftem Rücken und Brustschild, lebt z. B. in Rom in großer Menge in altem, verfallenem Gemäuer und wird daselbst von den Kindern, die ihm an manchen Festtagen kleine Stückchen von brennendem Wachsstock auf den Rücken kleben, zu einer beweglichen und wandelnden Illumination benutzt. Man nennt ihn dort Pagarozzo.

18) Der Pflasterkäfer, die spanische Fliege

(**Lytta vesicatoria**), schön grün und metallisch glänzend, mit langem Körper und halb so langen fadenförmigen Fühlhörnern, findet sich als Larve in der Erde; der Käfer, welcher eine große Schärfe bei sich hat und zur Bereitung des spanischen Fliegenpflasters gebraucht wird, findet sich mitten im Sommer auf jungen Edeleschen.

19) Der Maiwurm, Oelkäfer (**Meloë proscarabaëus**), muß wohl Jedem, der ihn zum ersten Male sieht, sehr auffallen. Er ist schwarzblau und glänzt metallisch, besonders das Weibchen hat einen großen, dicken Hinterleib, die Flügeldecken sind kurz, ganz weich, mit kleinen Höckerchen besetzt, eigentliche Flügel fehlen ganz, die Fühlhörner sind aus runden Gliedern zusammengesetzt, (rosenkranzförmig). Wenn man das weiche Thier anfaßt, giebt es, besonders aus den Kniegelenken der Beine, einen ölichten, scharfen Saft von sich.

Sonst hat man den Maiwurm innerlich, als Heilmittel sogar gegen den tollen Hundsbiß empfohlen und gebraucht. Wenn der Maiwurm noch eine kleine Larve (Engerling) ist, saugt er sich an dem Leibe mancher großen Fliegen fest und macht so in seiner frühesten Jugend große Reisen in der Luft über Berg und Thal hinüber, während er in seinen alten Tagen flügellos am Boden herumkriechen muß.

C) Käfer mit 4 Gliederstücken am untersten Theile der Füße.

20) Der Fichtenkäfer (**Bostrichus Typographus**), mit bräunlichen, am Rande 6 bis 7mal gezähnelten Flügeldecken und keulenförmigen, dichten Fühlhörnern, ist zwar kaum so groß wie ein Weizenkörnlein, thut aber als Larve, wo er oft zu vielen Tausenden unter der Rinde, im Splint der Bäume haust, vielen Schaden. Man haut dann lieber im Frühling einige gesunde Stämme um, in welche abgehauene Bäume die Käfermütterchen lieber als in die frischen ihre Eier legen, wodurch man hernach die ganze Brut fängt.

21) Der Rüsselkäfer (**Curculio**), hat vorne einen langen Rüssel. Dahin gehört auch der Juwelenkäfer (**C. imperialis**) aus Brasilien, und bei uns der

Digitized by Google

schädliche sogenannte schwarze oder rothe Kornwurm (**Calandra granaria**).

22) Der Langhorn- oder Widderkäfer (**Lamia aedilis**), den man im Sommer in Wäldern, auf Holzstößen und an Bauholz findet, ist grau, hat ein an den Seiten höckriges Halsschild und die Fühlhörner sind wohl 3mal so lang als der ganze übrige Käfer. Wenn man ihn in die Hand faßt, giebt er durch Anreiben des Brustschildes an die Flügeldecken einen pfeifenden Laut von sich.

23) Der große Holzkäfer (**Prionus coriaceus**), ist dunkel kastanienbraun, hat 3 Zähne am Rande des Halsschildes und sägenartig gezackte Fühlhörner. Er findet sich in Laubwäldern.

24) Der Lilienkäfer, das Rothkäppchen (**Lema merdigera**), ist der kleine scharlachrothe Käfer mit schwarzem Kopfe, der zwischen den Blättern der Lilien, Maiblümchen und Schwertlilien lebt und wenn man ihn in die Hand nimmt, ein lautes Piepen hören läßt. Die Larve, die auch die Lilienblätter benagt, deckt sich beständig mit ihrem Kothe zu, weßhalb der Käfer seinen lateinischen Beinamen hat.

Zwei andere Käferlein, welche auf dem Spargel leben, ein gelber mit einem Kreuz und 4 dunklen Flecken auf dem Rücken (**Lema asparagi**) und ein rother mit 12 schwarzen Tupfen (**L. duodecim punctata**) gehören auch zu diesem Geschlecht. Die Larve der letzteren Art, so wie der Käfer selber, fressen die zarten Blättlein der Spargelpflanzen ab.

D) Käfer mit 3 Gliederstücken am untersten Theil der Füße.

25) Der Schildkäfer (**Cassida viridis**) hat eine scheibenförmige Gestalt durch eine Ausbreitung des Hals- und der Deck-Schilde weit über den eigentlichen Körper-Umfang. Wenn er sich knapp an einem Zweig oder einen Stengel anlegt, könnte man ihn für einen Auswuchs desselben halten.

26) Der Erdfloh (**Haltica oleracea**) kann wie der gewöhnliche Floh mittelst seiner Hinterbeine sich sehr weit fortschnellen. Er thut an jungen Gemüse-Pflanzen sehr vielen Schaden.

27) Das Sonnenkäferchen (**Coccinella sep-**

Digitized by Google

tempunctata), das halb rundlich ist und auf seinen rothen Flügeldecken 7 schwarze Pünktlein hat, ist ein sehr bekannter und dabei auch sehr nützlicher Käfer, indem er als Larve, welche schwarze und orangegelbe Dornen an ihrem Körper hat, eine gar große Menge schädlicher Blattläuse umbringt. Die Puppe, die nach 14 Tagen auskriecht, sieht orangegelb aus, und hängt sich an Blättern oder Zweigen an.

II. Man theilt die Insekten ferner in:

Geradflügler (**Orthoptera**), welche ebenfalls wie die Käfer 2 Paare von Flügeln haben, deren vorderes Paar meist lederhäutig ist, das hintere Paar aber während der Ruhe sich nicht wie bei den Käfern der Queere, sondern der Länge nach zusammenlegt. Ueberdieß erleiden die Geradflügler keine vollkommene Verwandlung, sondern das junge, noch unausgewachsene Thier sieht schon ganz so aus wie das alte, nur daß es noch keine Flügel hat, welche ihm nach und nach wachsen. Durch die zangenartigen Freßwerkzeuge, so wie durch die freilich weicheren Flügeldecken nähern sie sich übrigens sehr den Käfern. Hieher gehören:

1) Das Ohrwürmchen (**Forficula auricularia**), mit den beiden Zangenspitzen am Schwanze, welches keine eigentliche Verwandlung durchgeht. Es lebt meist unter den Baumrinden und in altem Holzwerk und das Weibchen bewacht und bedeckt, wie brütend, die Eier sowie die noch zarten Jungen.

2) Die Schabe (**Blatta orientalis**), sieht braun aus, ist ziemlich platt gedrückt und eirund länglich, hat über dem Schwanz zwei Hörnlein. Sie thut außerordentlichen Schaden in manchen Gegenden und auf Schiffen, die eine Art (**Bl. lapponica**), die sich auch bei uns in Nadelwäldern findet, zehrt den armen Lappländern oft ihren ganzen Wintervorrath auf. Igel und Enten fressen solche häßlichen Insekten gerne; oft aber muß man diese auch durch stinkende, giftige Dämpfe ausrotten.

3) Das wandelnde Blatt, betende Weinhandel (**Mantis religiosa**), giebt es nur in den wärmeren Gegenden von Deutschland, außer diesem

Digitized by Google

aber noch in vielen wärmeren Ländern von Europa, an Waldrändern u. s. w. Das Thier sieht wie eine grüne Heuschrecke aus, trägt aber den Kopf, mit den ungeheueren großen Augen und die Brust aufrecht, und hat an den Vorderfüßen, die es meistens, als wenn es betete, zusammenfaltet, scharfe, wie Sägezähne hervorstehende Haken.

Dieses ist, obgleich es sich so fromm stellt, ein recht mörderisches Thier: das Weibchen zerreißt und frißt sein eignes Männchen, und die Jungen fressen am allerliebsten sich selber untereinander auf, man mag ihnen an andern Nahrungsmitteln hineingeben, was man will. Die Augen leuchten tückisch, wie glühende Kohlen.

4) Die Säbelheuschrecke (**Locusta viridissima**), sieht grün aus, und das Weibchen hat hinten einen säbelartigen Legestachel, womit es in den Boden bohrt, und seine Eier da hineinlegt. Dieß Thier kann ziemlich beißen, so daß man von der einen Art mit braungefleckten Flügeln (**L. verrucivora**) die Warzen an den Händen abbeißen läßt.

2) Die Werre oder Maulwurfsgrylle (**Gryllotalpa vulgaris**), hat ausgezackte Händchen an den Vorderfüßen, womit sie, wie mit einer Schaufel, Löcher in die Erde gräbt. Sie thut viel Schaden, man giebt sich deßhalb Mühe, sie auszutilgen.

6) Die Hausgrylle, das Heimchen (**Acheta domestica**), welche von fahlgelber Farbe und braun gefleckt ist, und an deren rundlichem Kopfe sehr lange Fühlhörner stehen, unterscheidet sich dadurch von der eben erwähnten Werre, daß diese gar keine Legeröhre am Hinterleibe und sehr kurze Flügeldecken hat, während die Hausgrylle mit einer Legeröhre versehen ist und längere, pergamentartige Vorderflügel (Flügeldecken) besitzt. Bei der eigentlichen Hausgrylle endigen die hinteren Flügel in eine stachelähnliche Borste, die an beiden Seiten unter den Flügeldecken hervorragt; die Feldgrylle ist von schwärzlicherer Farbe und hat keine solchen Borstenenden an den Hinterflügeln. Die letztere hält sich in selbstgegrabenen Löchern an sonnigen Feld- und Wiesenrändern auf; die Hausgrylle wohnt in und unter dem Gemäuer und Fuß-

Digitized by Google

boden mancher Küchen und Wohngebäude und läßt da öfters ihren zirpenden Laut hören, der vorzüglich durch das Aneinanderstreifen der Flügeldecken zu entstehen scheint.

7) Die Wanderheuschrecke (**Acridium migratorium**), hat, wie unsere Heuschrecken, lange Springhinterfüße, unterscheidet sich aber durch eine kiel- oder kammförmige Hervorragung auf der Brust. Sie ist grünlich oder graulichbraun, hat dunkle Flecken, die Flügeldecken sind auch grünlich oder braun mit schwarzen Flecken; sie wird etwa dritthalb Zoll lang.

Die Heuschrecken fressen in manchen heißen Ländern gar oft jedes grüne Blatt und Gras so ganz ab, daß man in ungemein weiten Strecken nichts anders sieht, als den dürren Boden. Denn sie kommen in solchen ungeheuren Schaaren, daß, als sie in den Jahren 1747 und 1748 auch in einem großen Theil von Europa, sogar in Deutschland sich verbreitet hatten, ein Schwarm manchmal 4 Stunden lang dauerte, ehe er vorbeizog und dabei mehrere 100 Klaftern breit war, so daß es in den Gegenden, über die ein solcher Zug gieng, so finster wurde, wie in der spätesten Dämmerung. Wo sie dann niederfielen, deckten sie einen stundenlangen und breiten Wiesen- oder Feldgrund Queerhände hoch, und nach wenig Stunden war nichts Grünes mehr zu sehen. Zum Glück war es diesen fremden, zu uns aus Asien eingewanderten Gästen hier zu Lande zu kalt, und sie starben, da der Winter ein wenig strenge wurde, von selber, was sehr gut war, da die Heerden Schweine, die man auf sie und ihre Eier trieb, zwar manche Million fraßen und zertraten, aber doch nicht darüber Herrn werden konnten. Desto schlimmer ergehts aber den heißen Ländern, die übrigens dafür auch desto fruchtbarer sind. In manchen Ländern ißt man die Heuschrecken. Die Schnarrheuschrecke (**A. stridulum**) mit rothen, schwarzgerandeten Flügeln, findet sich bei uns gegen den Herbst häufig an Waldrändern.

III. Die Netzflügler (**Neuroptera**), haben 4 zarte netzförmige oder gegitterte Flügel, die in mancherlei Farben schillern. Es gehören dahin:

1) Die Wasserjungfern (**Libellulae**), mit einem degenförmig breiten Hinterleib und einem kuglichen Kopf, dessen Aeuglein auf einer blasigen Erhabenheit stehen. Die Larven leben im Wasser, haben zwei klappenartige Scheeren und 5 Blattanhänge an ihrem kurzen, breiten Leibe. Dieses Geschlecht ent-

Digitized by Google

hält schon größere Arten, jenes aber, welches die meist blauen, zarten Arten, mit fast fadenförmigem Hinterleibe in sich fasset, heißt **Agrion**, z. B. die gemeinste Art **A. puella**.

2) Das Haft oder Uferaas (**Ephemera albipennis**), mit 3gliedrigen, kurzen Fühlhörnern und einem in 2 oder 3 Borsten endigenden Hinterleib, entsteht aus einer Larve, welche mehrere Jahre im Schlamm oder Wasser wohnt, dann zu Millionen, besonders gegen Abend, als geflügeltes Insekt hervorgeht, dessen Schaaren sich begatten, und nach wenigen Stunden sterben. In Krain sind diese Thiere so häufig, daß man die Felder damit düngt.

3) Die Frühlingsfliegen (**Phryganeae**, z. B. **Phryganea grandis** und **rhombica**), bauen sich als Larven kleine Körbchen, oder Röhrchen, aus Stücken Schilf, Gras oder Sand, in denen sie drinn stecken, so daß nur der Kopf oben heraussieht, und so im Wasser herum schwimmen. Mancher wird schon diese schiffenden Würmchen in ihren Fahrzeugen haben herum fahren sehen, ohne zu wissen, daß daraus ein bräunliches oder schwärzliches 4flügliches Insekt mit langen, borstigen Fühlhörnern und langen Beinen wird, welches man auch oft am Wasser herumflattern sieht.

4) Die Florfliege (**Hemerobius Perla**), sieht wohl schön grün und zart aus, hat aber, wenn man sie auf die Hand setzt, einen widerwärtigen Geruch. Die Eier sitzen auf eignen Stielchen, die Larve (der sogenannte Blattlauslöwe) lebt von Blattläusen und wird dadurch sehr nützlich.

5) Der Ameisenlöwe, oder die Ameisenjungfer (**Myrmeleon formicarius**), hat wohl auch schon mancher als Larve gesehen. Man bemerkt nämlich an Waldrändern und sonst in recht feinsandigem Boden, kleine trichterförmige Gruben. Wirft man da eine Ameise hinein, so merkt man, daß aus der Mitte der Grube kleine Strahlen von Sand auf diese geschleudert werden, so daß die Ameise nicht weiter kann, sondern rückwärts, in die Mitte der Grube hineinfällt. Da wird sie sogleich von zwei rüstigen scharfen Zangen

Digitized by Google

angepackt, die einem kleinen, etwa erbsengroßen, birnförmig rundem Thierchen zugehören, das die Ameise aussaugt, und dann die leere Haut von sich stößt. Das ist eben der kleine Ameisenlöwe, aus welchem, wenn er sich verpuppt hat, ein Insekt, das der Wasserjungfer gleicht, und welches schwarz geäderte in eine weiße Spitze endigende Flügel hat, hervorkommt.

6) Die Scorpionfliege (**Panorpa communis**), zeichnet sich durch einen Scorpionscheeren-ähnlichen Ansatz am Schwanz des **Männchens**, dagegen:

7) Die Langhalsjungfer (**Raphidia ophiopsis**), durch einen langen Hals am schlangenartig gebildeten Kopfe aus. Beide giebt es bei uns.

8) Die weiße Ameise, oder der Termite (**Termes fatale**), lebt in ihrem Vaterlande: Indien und Nord-Afrika und in den heißeren Ländern von Amerika in so großen Gesellschaften beisammen, wie die Ameisen, und heißt mit Recht auch der Verwüster, da besonders die Larve Alles, was ihrem Bisse nachgiebt: Hausgeräthschaften, Kleider, Wäsche, Bücher und dergleichen zerbeißt und zerstört und selbst Häuser und Schiffe durchbohrt. (M. v. oben S. 295).

Die Termitengebäude sind in ihrer Art das größeste in allen seinen einzelnen Theilen wundervoll ausgeführteste Kunstwerk, das von gesellig lebenden Thieren hervorgebracht wird. Sie haben die Höhe eines ansehnlichen Backofens oder einer Indianerwohnung von 8—12 Fuß und darüber; das Thierchen aber, das diese Gebäude aufführt ist nur $\frac{1}{4}$ Zoll groß. Sollten die Menschen ein Gebäude aufführen, das an Höhe zu ihrer mittleren Größe (von 5 Fuß) in demselben Verhältniß stünde wie ein Termitenhaufen zur Länge des bauenden Insectes, dann müßte dieses die fast siebenfache Höhe eines unsrer höchsten Thürme von Europa oder die mehr als 6fache Höhe der größesten ägyptischen Pyramide haben (2880 Fuß). Und der äußere über den Boden hervorragende Bau mit seiner verhältnißmäßig ungeheuren Größe ist nicht das Merkwürdigste an diesem thierischen Kunstwerk, ungleich interessanter ist noch das Innere mit seinen Thürmchen, domartigen Gewölben und Bogenbrücken, an denen die pflegmütterlichen Larven hinansteigen zu den Hunderttausenden der Brutzellen, die in den dicken Wänden des Baues und in den thurmartigen Pfeilern, welche ihn stützen, angelegt sind. Eben so beachtenswerth sind die tiefen unterirdischen Höhlen, welche den Durchmesser eines großen Kanonenlaufes haben. Aus diesen

Digitized by Google

Höhlengängen bringen die fleißigen Arbeiter oder Larven das thonige Erdreich in kleinen Klümpchen herauf, die sie zuerst in ihrem Munde kneten, und dann zu einer Masse verbinden, die an der Luft und Sonne so hart und fest wird wie Stein. Auch dienen jene unterirdischen Höhlengänge den Termiten als verborgene Wege nach den abgestorbenen Baumstämmen oder anderen Gegenständen hin, die ihnen und ihrer Brut Speise und Trank reichen.

Der bei weitem größere Theil der Bevölkerung eines Termitenbaues besteht aus den Arbeitern oder Larven, deren Zahl Millionen betragen mag. Diese werden nicht wie bei den Käfern oder Bienen zu unbeweglichen Puppen, sondern zu solchen an denen allmählig die Flügel hervorkeimen und sich entwicklen. Die Larven haben einen dicken Kopf mit großen Kiefern, lange Fühlhörner vor denen die überaus kleinen, kaum bemerkbaren Äuglein stehen und einen länglich-eirunden Hinterleib. Unter ihnen sieht man auch, wiewohl in viel geringerer Menge sogenannte Soldaten welche nicht beim Bauen und Eintragen beschäftigt, sondern nur zur Vertheidigung des Baues da sind. Diese sind reichlich noch einmal so lang als die Larven und mehr denn 15mal so schwer denn diese, haben mächtige harte Kiefer mit denen sie furchtbar zubeißen können. Kurz vor dem Eintritt der Regenzeit bekommt ein Theil der Larven Flügel und verläßt in Schwärmen von Hunderttausenden den Bau. Diese geflügelten Männchen und Weibchen haben große Augen, bräunliche Flügel, sind mehr denn 3mal so lang als die Larven, fast 2mal als die Soldaten, haben aber ihre Vertheidigungswaffen verloren, so daß sie, wenn sie wenige Stunden das Vergnügen des Fluges genossen haben, und nun in ganzen Lagen den Boden bedecken, nicht nur von Vögeln, Eidechsen, sondern selbst von kleinen Ameisen überfallen werden. Auch die Hottentotten sammeln sie und machen eine Art von Gebäck daraus. Von den unzählbaren Schaaren welche ausfliegen, werden nur wenige von den Larven hineingezogen in ihre Baue. In jeden von diesen nur 2, ein Weibchen sammt einem Männchen, welche in der Mitte des Baues förmlich in ein kleines Gewölbe eingemauert werden. Das Weibchen, welches länger als ein Jahr lebt, und dessen Hinterleib wegen der vielen Eier, die er enthält, zu einer ungeheuren Größe anschwillt, soll, wenn es seine vollkommene Reife erlangt hat, in einem Tage 80,000 Eier (ohngefähr in jeder Secunde eines) legen können. Es giebt mehrere Termitenarten, welche minder bedeutende Baue anlegen. Zwei davon finden sich schon in den wärmern Ländern von Europa.

IV. Die bienen- und wespenartigen Insekten (Piezata), haben vier häutige Flügel, mit einzelnen starken Adern, meist 2 große, aus vielen

Digitized by Google

in 6seitigen Flächen endigenden Stücken zusammengesetzte Augen zu beiden Seiten des Kopfes und noch 3 kleine, einfache Augen in der Mitte der Stirne, die zum Sehen in die Ferne zu taugen scheinen; starke Freßwerkzeuge. Die Weibchen, so wie die sogenannten Geschlechtslosen, welche aber nur unvollkommene Weibchen sind, haben einen Stachel, womit sie verletzen, und dabei zugleich durch einen giftigen Saft, der mit in die gestochene Wunde fließt, Schmerz verursachen können. Die Larven sind zum Theil wie Maden, ohne Füße, manche aber auch wie die Raupen, wohl mit 20 Füßen versehen. Dahin gehören:

1) Die Gallwespe (**Cynips**). Das Weibchen bohrt mit seinem Stachel im Herbste in Pflanzen, und legt da seine Eier hinein. Die gestochenen Theile der Pflanzen schwellen darauf, durch den Reiz des scharfen Saftes, der mit hinein floß, und durch den Lebensreiz, den die Eierchen machen, auf, und es entstehen die moosartigen Schlafäpfel an den Rosen, oder die Galläpfel an den Eichen, und die eine Art (**C. Psenes**), die vorzüglich die wilden Feigen ansticht, nutzt dadurch dem menschlichen Haushalt noch ganz besonders, denn man hängt die gestochenen wilden Feigen zwischen den zahmen auf; die ausfliegenden Wespen stechen dann auch diese, und nun giebt ein Baum, der vorher vielleicht nur 25 Pfund Feigen geliefert hätte, wohl 100 Pfund.

2) Die Goldwespe (**Chrysis ignita**), die am Hinterleib schön metallisch glänzend und roth, nach vorne grünlich aussieht, läßt den Larven der Gallwespen ihr sonderbares Häuschen nicht in Ruhe bewohnen, sondern, als ob sie die beschädigten Pflanzen rächen wollte, sticht sie wieder hinein in die Gallen, legt ihre Eier auch hinein, und ihre Larven fressen nun die der Gallwespen auf.

3) Die Arten der Schlupfwespe (**Ichneumon**), deren es viele giebt, treiben einen ähnlichen Vertilgungskrieg gegen andere Insekten, freilich viel mehr ins Große. Mit dem Stachel, der sich an ihrem langgestreckten, meist an einem Stiele stehenden Hinterleib

Digitized by Google

befindet, bohren sie in eine Menge schädlicher Raupen und anderer Insekten hinein und sind dadurch im Herbst, wo besonders die Kohlraupen-Schlupfwespe (**I. glomeratus**), eine unzählige Menge Kohlraupen anbohrt, so daß unter 20 kaum eine gesund bleibt, eine große Wohlthat für unsre Felder und Gärten. Die Raupen, die doch manchmal **20, 30,** ja **100** solche kleine Lärvchen in sich tragen, fressen dabei noch immer fort, puppen sich manchmal sogar ein, aber es kommt dann aus diesen Puppen kein Schmetterling, sondern eine Schaar von Schlupfwespchen heraus, die, weil sie sich sehr schnell vermehren, oftmals in milden Herbsten den Vertilgungskrieg, den ihre Eltern angefangen haben, gleich weiter, gegen die seitdem wieder herangewachsenen Kohlraupen, fortsetzen.

4) Die Blattwespe oder Schmetterlingswespe (**Tenthredo**), hat Larven, welche glatten, kleinen Raupen gleichen und auf und von den Blättern, z. B. der Rosen und Weiden, leben, auch beim Verpuppen ein Gespinnst um sich machen. Die Larve der einen Art (**T.** oder **Lophyrus Pini**), welche sich in großen Gesellschaften in gemeinschaftlichen Nestchen zusammenhält, thut auch an Fichten und Föhren grosse Schaden, deren Nadeln sie abfrißt. An dem geflügelten, meist grünlichem Insekt findet sich ein 4eckiger dicht aufsitzender Kopf, und ein weicher Hinterleib.

5) Die Arten der Afterwespe (**Sphex**), haben zwischen Kopf und Brust eine Art von Hals und einen gestielten Hinterleib.

Diese graben in die Erde oder in mürbes Holz ein Loch, legen ein Ei hinein, und tragen dann eine Insekten-Larve, oder Spinne oder ein geflügeltes Insekt hinzu, das sie da drinnen bei ihrem Eie meist lebendig begraben, indem sie das Loch zustopfen. Das auskriechende Lärvchen macht sich bald daran, frißt und saugt sich an der eingetragenen Beute groß und stark, bis es sich einpuppen kann. Die eine Art, die Töpferwespe (**S. Figulus**), die ihre Löcher in Holz macht, mauert und tüncht diese Höhlen mit Thon aus, so daß sie an jedem Loch 2 Tage zu bauen hat. Eine andere, die Sandwespe (**S. sabulosa**), soll das Loch nach einigen Tagen wieder öffnen, und ihrer Larve eine frische Raupe hineinlegen.

Digitized by Google

6) Die Mauerwespe (**Eumenes muraria**), deren schwarzer, kurzgestielter Hinterleib 4 gelbe Streifen, die Brust 2 rosenrothe Flecken hat, macht zwischen Mauersteinen ein mehrere Zoll tiefes Loch, klebt den ausgegrabenen Sand außen wie einen Schachtkranz, rings herum fest, legt dann in den Grund der Röhre ein Ei und fügt auf dieses wohl gegen 12 kleine Raupen noch lebendig so hinauf, daß sie dieselben, wie Tabaksrollen, zusammenringelt und eine auf die andere fest packt. Dann schließt sie das Loch mit dem außen aufgehäuften Sande fest zu. Die Larve hat an den Vorräthen, mit welchen die mütterliche Liebe sie versorgte, zu leben, bis sie sich einpuppt.

7) Die eigentliche Wespe (**Vespa vulgaris**), mit ihrem gelben und schwarzen, glatten Leibe und mit den während der Ruhe der Länge nach gefalteten Flügeln ist allbekannt.

In jedem Neste sind Weibchen, Männchen und sogenannte Geschlechtslose. Ein Weibchen wiegt fast 3mal so viel als ein Männchen, dieses noch immer 2mal so viel als eine Geschlechtslose. Die Wespe baut ein Haus, das einer kleinen Stadt von Löschpapier, mit vielen Ringmauern und mit 2 Thoren, eins zum Ein-, das andere zum Ausgehen gleicht. Besonders ist dies bei denen der Fall, die unter der Erde, in Löcher bauen. In einem recht großen Neste der Art kann es wohl 16000 Zellen geben, und da diese 3mal Brut enthalten, könnte ein einziges solches Nest in einem Sommer gegen 48000 Wespen liefern. Diese sterben aber fast alle gegen den Winter hin, und es bleiben nur einige trächtige Weibchen am Leben, nachdem die Geschlechtslosen oder unfruchtbaren Weibchen, die vorher meistens die jungen Lärvchen ernährt hatten, indem sie dieselben, wie junge Vögel ätzten, kurz vorher, ehe sie selber sterben müssen, alle noch lebenden Larven, die nun doch vor Hunger umkommen würden, aus den Zellen herausgerissen und hinaus ins Freie ans Sonnenlicht getragen haben. Man könnte glauben, sie thäten das aus einer Art von Mitleiden gegen die armen Würmchen. Aber man bemerkt gar oft, daß sich beim Thiere, wenn es krank wird, oder wenn es mit ihm zum Sterben geht, das, was vorher Liebe war, ordentlich in eine Art von Haß umwandelt, der aber in seinen Folgen doch auch wieder zur Liebe wird, denn es ist ja eigentlich nicht das Thier selber welches liebt und Mitleid mit seines Gleichen trägt, sondern eine durch dasselbe wirkende, alliebende und allwaltende göttliche Vorsicht. — Die noch am Leben bleibenden Weibchen

Digitized by Google

verstecken sich unter Steine, kommen im Frühling herausgekrochen, und jede einzelne legt dann ein Nest für sich an, welches anfangs ziemlich klein ist, bis ihre Kinder mitbauen und Eier legen helfen. Die neue Generation der unfruchtbaren Weibchen kriecht im Frühling zuerst aus, und diese hilft sogleich ihre jüngern Geschwister mit füttern, und der Mutter mit bauen. Im August kommen dann unter den später gebornen Jungen auch etliche hundert Männchen und Weibchen zum Vorschein. Die Männchen, welche keinen Stachel haben, und deßhalb nicht stechen können, sind bei den Wespen nicht müssig, sondern besorgen die Reinigung des Baues, aus dem sie alles Todte und Abgängige hinaustragen. Außer den großen, im August flügge werdenden Weibchen, von denen manche, wie schon erwähnt, den Winter überleben und im Frühjahr die Stammütter eines neuen Baues werden, giebt es auch kleine Weibchen, die nur so groß sind, als die sogenannten Geschlechtslosen und blos solche Eier legen sollen, aus denen Männchen kommen.

Die Wespen fressen nicht allein Süßigkeiten und Obst, sondern auch Fleisch, und reißen z. B. den Bienen oder Fliegen den Leib ab, und tragen ihn heim oder fressen ihn gleich.

9) Die Biene (**Apis mellifica**), hat einen pyramidalen Hinterleib, die Brust ist grau, der Bauch bräunlich gefärbt, das erste Fußglied an den Hinterbeinen ist länglich viereckig. Sie ist sammetartig behaart und zart in die Queere gestreift.

Die Biene, die so manches Pfund Honig und Wachs für den Menschen sammelt, baut sich draußen im Freien ihre Wohnung in hohle Bäume, bei den Menschen aber in die für sie angelegten Stöcke und Körbe. In einem vollkommnen Bienenschwarme zählt man gegen 20000 Arbeitsbienen, 1400 bis 1600 Drohnen oder Männlein, und nur eine eigentliche Bienenmutter, welche Weisel heißt. Die Arbeitsbienen oder unvollkommneren Weibchen erziehen auch im Nothfall aus einer Arbeitsbienenlarve, dadurch, daß sie die Brutzelle vergrößern, und Weiselfutter hineinlegen, eine Königin, die sonst ganz der gewöhnlichen gleicht, nur daß sie stumm ist. — Der Weisel ist wie eine gemeinschaftliche Seele, die alles zusammenhält, und wenn der stirbt, so zerstreuen sich alle. Die Arbeitsbienen leben den ganzen Sommer hindurch immer nur wie im Fluge, und gleichsam beiläufig der Gegenwart, mehr aber und aus allen Kräften der Zukunft, für die sie einsammeln in ihre kleinen Scheuren, und dabei ein ganzes künftiges Geschlecht ernähren so wie groß ziehen. Und es wäre wohl gut, wenn der Mensch von ihnen lernte, so treulich in Allem auf das Künftige zu sehen. Die Arbeitsbienen und die Königin haben einen Stachel, mit dem sie empfindlich ste-

Digitized by Google

chen, und man weiß einen Fall, daß ein einziger Bienenstich, der die Gegend gleich unter dem Auge getroffen hatte, eine vorher gesunde Frau eben so plötzlich tödtete, wie der Biß einer giftigen Schlange; doch hilft zum Glück gegen einzelne Bienenstiche meist schon aufgelegte, frische Erde gar leicht und bald.

Im wärmeren Amerika giebt es auch Bienen welche keinen Stachel haben. Sie gehören zur Gattung **Melipona**. Der Bau von der einen dieser Arten enthält ein dunkelfarbiges Wachs und einen angenehm, obwohl etwas säuerlich schmeckenden Honig. Er ist meist in einem ausgehölten Baumstamm angelegt, hat aber nach außen einen trichterförmigen aus Lehmen und Wachs gebildeten Anbau.

9) Die Ameise (**Formica**), deren Arten, z. B. die große ungestachelte rothe Waldameise (**F. rufa**), die kleine schwarze (**F. nigra**), so wie die noch kleinere gelbe Ameise (**F. flava**) zwischen Brust und Hinterleib einen knotigen oder schuppigen Stiel haben, gehört auch hieher; denn gegen Ende des Sommers bekommen Männchen und Weibchen Flügel, (die ihnen freilich gar bald abfallen) und fliegen dann in ganzen Schwärmen auf und nieder.

Die Eier, welche die trächtigen Weiblein in den Haufen hinein legen, sind nur so groß wie ein Sandkörnlein, denn was man gewöhnlich Ameiseneier nennt, sind die Puppen. Die Weiblein sterben nach dem Eierlegen im September, und nun nehmen sich die Arbeitsameisen der verwaisten Brut sehr sorgfältig an, tragen sie während des Winters tief unter die Erde, ernähren sie, und sorgen dann auch im Frühling und Sommer gar sehr für die Puppen. Ueberhaupt zeigen sich an den Ameisen recht merkwürdige Triebe, mittelst welchen sie sich gleichsam ihre eigene Milchkühe (nach Seite 315) halten, gleichsam Sclaven machen, die für sie arbeiten müssen, Krieg mit einander führen u. a. — In Südamerika giebt es eine Art wandernder Ameisen, die sogenannten Besuchsameisen, (**F. Cephalotes**), die alle 3 bis 4 Jahre einmal kommen, und die Menschen durch ihre heftig schmerzende Bisse aus ihren Häusern vertreiben. Man läßt sie aber doch gerne hinein, und öffnet ihnen Alles, weil sie das schädliche Ungeziefer, welches in jenen Ländern sich so leicht einnistet, selbst Schlangen vernichten. Freilich thun sie auch an den Pflanzungen großen Schaden indem sie alle grüne Blätter an den Bäumen abbeißen und stückweise auf den Boden werfen, wo sie von ihren Gefährten aufgesammlet und zum Austapezieren ihrer unterirdischen Gänge verwendet werden. Bei dieser Art sind die Weibchen sowie die Arbeiterinnen mit einem Stachel versehen, und dasselbe gilt von der kleinen

Digitized by Google

rothen Ameise (F. oder Myrmica rubra). Uebrigens ist es nicht dieser Stachel, sondern es ist der ätzende Saft, der beim Biß in die Wunde dringt, welcher bei vielen Arten der Ameisen, namentlich des heißeren Amerikas, so heftige, zuweilen fast die Besinnung raubende Schmerzen erregt. Dennoch wenden sie die Indianer in Guiana gegen starke rheumatische Uebel an. — Furchtbare Verheerungen richtet auch an den Zuckerplantagen die Verwüsterameise (Formica oder Myrmica omnivora) an, zunächst dadurch, daß sie unter den Wurzelstock des Zuckerrohres ihren Nesterbau anlegt und die zarten Zasern entblößt und losreißt. Zündet man ein Kohlenfeuer am Boden an, dann stürzen sich Hunderttausende hinein in die Gluth, bis diese verlöscht. Uebrigens fressen diese Verwüsterameisen nur thierische Körper, namentlich Aas, doch fallen sie auch lebende Thiere, junge Kinder in der Wiege, sowie hülflose Kranke an.

V. Die Halbdeckflügler (Hemiptera), haben meist Flügeldecken wie die beiden ersten Insektenordnungen, aber statt der Freßzangen eine gegliederte Schnabelröhre, zum Saugen der thierischen und Pflanzensäfte. Sie erleiden keine vollkommene Verwandlung, sondern das junge noch ungeflügelte Thier bekommt allmählig Flügel und wächst so zur Gleichheit der Alten heran. Uebrigens giebt es in dieser Ordnung Gattungen, bei denen die Weibchen, andre, bei denen beide Geschlechter fast immer flügellos sind, so z. B.

1) Die Bettwanze (Acanthia lectularia), mit kurzen, 2 gliederigen, in einer Borste endigenden Fühlhörnern, soll aus Amerika erst zu uns nach Europa gebracht worden seyn. Sie ist jetzt leider überall bekannt, den Menschen wie den Thieren (z. B. jungen Vögeln). Eisenvitriol, frische Rindsgalle und Scheidewasser, von jedem gleich viel zusammengemischt, und in die Fugen gestrichen, vertilgt sie zum Theil; eben so ein starker Zugwind, den man lange fortgesetzt durch die Zimmer streichen läßt.

2) die Beerenwanze (Cimex baccarum), mit 5 gliedrigen, auf einem besondern Höcker sitzenden Fühlhörnern, findet sich oft auf Beeren und Gartenfrüchten und ist durch ihren üblen Geruch so wie durch den häßlichen Geschmack, den sie den Früchten mittheilt, auf welchen sie saß, bekannt genug. Das

Digitized by Google

Weibchen nimmt sich seiner Jungen an, führt sie, wie eine Henne die ihrigen.

Eine noch andere Art von Wanzen, die Masken- oder Radwanze (Reduvius personatus) mit bogenförmigem Rüssel, welche ihren Namen daher hat, weil sie als Larve im Kehricht lebt, und sich immer mit diesem bedeckt (maskirt), ist dadurch nützlich, daß sie begierig Bettwanzen aufsucht und diese frißt. — Die westindische Radwanze (R. serratus) kann, wenn man sie auf die Hand nimmt, kleine elektrische Schläge austheilen.

3) Der Laternenträger (Fulgora laternaria), der eine Zierde jeder schönen Insektensammlung ist, kommt aus Brasilien.

4) Die Blattlaus (Aphis), die man besonders, an Theeholunderſträuchen (A. Sambuci) und Rosen (A. Rosae) zu sehen bekommen kann, ist ein weiches, dickes, meist grau aussehendes kleines Thier, welches am Hinterleib 2 kurze Röhrchen oder Warzen hat, aus denen Honigthau hervorträufelt.

Im Frühling sieht man lauter Weibchen und so auch den ganzen Sommer hindurch. Alle 10 Tage gebären die Weibchen lebendige Junge, sterben dann, und nach zehn Tagen gebären ihre Töchter wieder lebendige Töchter. Erst im Herbst, in der 9ten oder 10ten Ausgeburt, kommen Männchen mit vor, und die Weiblein von diesen legen nun Eier, die sich den Winter durch erhalten, und aus denen dann im Frühling neue Blattläuse kommen. Es scheint zwar den Menschen eine schädliche Thierart; die Ameisen würden aber ganz anders darüber urtheilen. Denn diesen dienen die Blattläuse als Milchkühe, mit deren süßen Säften sie sich und ihre Jungen ernähren.

5) Die Schildlaus oder Coschenille (Coccus), hat Füße, an denen sich nur ein Gliedergelenk findet. Bei dieser Thierart ist dem geflügelten Männchen ein Weibchen zugesellt, das ihm gar nicht ähnlich sieht und ungeflügelt ist, was es aber deswegen doch lieb hat.

Einige Arten (z. B. C. polonicus) findet man an der Wurzel mancher Grasarten und anderer im Sandboden stehenden Kräuter, und vor Zeiten, wo die rothe Farbe, die man daraus machte, noch sehr theuer und rar war, mußten in manchen Gegenden die Unterthanen einen Theil ihrer Abgaben in solchen Purpurwürmchen entrichten. Man hat diese aber jetzt häufiger und deßhalb wohlfeiler von der einen, in den heißen Ländern von Amerika, vornehmlich in Mexico auf

Digitized by Google

der Opuntie lebenden Art, welche der eigentliche Cochenill- oder Scharlachwurm (C. Cacti) heißt.

VI. Die Schmetterlinge (**Lepidoptera**) sind eigentlich diejenigen Insekten, an denen man das, was oben von der Verwandlung gesagt wurde, am vollkommensten sehen kann. Man theilt sie:

A. in Tagvögel (**Papiliones**), bei denen eine meist dornige Raupe, eine nackte (in kein Gespinnst gehüllte) etwas eckige Puppe und ein am Tage umherfliegender Schmetterling sich findet, der beim Sitzen seine 4 Flügel zusammengelegt, in die Höhe richtet. Unter diesem Geschlecht giebt es, besonders in heißen Ländern, gar große, schönfarbige Arten, welche als sogenannte Riesenfalter oder auch Ritter (Heliconier) eine Zierde unserer Sammlungen bilden. So der metallisch glänzende lasurblaue, ins Grüne und Purpurrothe schillernde Menelaus aus den heißeren Gegenden von Amerika, der dunkelfarbige, roth gefleckte Hector, der Achilles, über dessen dunkle Oberflügel ein breites, blaues Band läuft, der prächtig grün, blau und weiß und dabei goldartig schillernde Leilus, der schön gezeichnete Aeneas u. s. w. Zu den vaterländischen Tagvögeln gehören unter andern

1) der rothe Augenspiegel (**Parnassius Apollo**) dessen Raupe in bergigen Gegenden von dem dickfleischigen Laube des weißen Mauerpfeffers (**Sedum album**) lebt, und dessen Puppe mit einem groben Gespinnst umkleidet ist. Der Schmetterling hat auf gelblich weißem Grunde, an den Hinterflügeln oben 4, unten 6 rothe Aeuglein.

2) Der Schwalbenschwanz (**Papilio oder Zelima Machaon**), ist gelb, mit schwarzen, gebogenen Strichen und Flecken und mit gelben Halbmondflecken am schwarzen Rande der Flügel. Die Raupe lebt auf den Blättern vom Fenchel, gelben Rüben u. a., ist grün und ganz unbehaart und kann, wenn sie beunruhigt wird, aus dem Halse ein fleischiges gablichtes Horn hervorstrecken, wobei ein unangenehmer Geruch entsteht; die Puppe hat ein seidnes Queerband.

Digitized by Google

3) Der Trauermantel (**Vanessa Antiopa**), ist schwarz mit gelbem Rande. Seine Raupe, die auf Weiden und Pappeln gesellig lebt, ist auch schwarz, dabei weiß getüpfelt und mit ziegelrothen Flecken auf dem Rücken, wollig, mit 6 Reihen ästiger Dornen, gespaltenem Kopf; die eckige, goldglänzende Puppe hängt sich nur am Schwanze auf.

Zu dieser Gattung gehört auch das Pfauenauge (V. Jo) und der Admiralfalter (V. Atalanta) mit rothen Binden auf den schwarzen Oberflügeln. Die Raupen von beiden Arten leben auf Nesseln.

4) Der Perlmutterfalter (**Argynnis**), davon es viele Arten giebt, unterscheidet sich durch die silberfarbenen, perlmutterartig glänzenden Flecken an der untern Seite des hintern Flügelpaares. Die Raupen leben auf Veilchenarten.

5) Der Schillerfalter (**Nymphalis Iris**) schillert oben schön ins Lasurblaue und hat weiße Binden. Die Raupe lebt von der Saalweide.

6) Der Bläulingfalter (**Poliommatus**), davon es auch mehrere Arten giebt, z. B. der gemeine und schöne Argusfalter (**P. Argus**), so wie der Icarusfalter (**P. Icarus**), ist oben blau und hat unten sehr viele Augenpunkte.

7) Der Heckenweißling (**Pieris Crataegi**), ist der so häufig herumfliegende Schmetterling mit weißlichen Flügeln, auf denen schwärzliche Adern sind, dessen Raupe an vielerlei Obstbäumen die Blätter abfrißt.

Der Kohlweißling (P. Brassicae), dessen Raupe die Kohlblätter abfrißt, hat gelbliche Unterflügel und an den Vorderflügelchen 2 schwärzliche Flecken und schwärzliche Spitzen.

B. Dämmerungsfalter (**Sphinges**), haben spindelförmige Fühlhörner, am Unterflügelrand einen borstigen Anhang, der in einen hakenartigen des Oberflügels paßt, und so dazu dient, die Flügel horizontal ausgebreitet zu halten; sie fliegen meist nur in der Dämmerungszeit umher. Die Raupe ist 16füßig, die Puppe rundlich. Dahin gehört:

1) Der Schwärmer (**Sphinx**), mit flach stehenden Flügeln und spitzig zulaufendem, nicht behaartem Hinterleib, hat eine meist sehr buntfarbige, nackte

Digitized by Google

Raupe, mit herzförmigem Kopfe, den sie in der Ruhe in die Höhe richten kann, und mit einem rückwärts gekrümmten Horn am Hinterleibe. Dahin gehören:

a) Der Wolfsmilchvogel (Sph. Euphorbiae), dessen grün und schwarze Raupe auf dem Wolfsmilchkraute lebt. Der Schmetterling hat bräunlich gelbe Flügel, mit schönen, grünen Binden.

b) Der Todtenkopf (Sph. Atropos), der auf dem Rücken die gelblich weiße Zeichnung eines Todtenkopfs zeigt, ist ein großer, von den Sammlern sehr geschätzter Schwärmer, der auch wohl in Bienenstöcken dem Honig nachgeht, und daselbst Schaden stiftet. Wenn er geplagt wird, giebt er einen ganz besondern kläglichen Ton von sich. Die schöne, gelb und blau gestreifte Raupe lebt auf Kartoffelkräuterich, Hanf und Jasmin.

2) Das Abendpfauenauge, der Weidenschwärmer (Smerinthus ocellatus) hat eckige, bräunlich gewölkte Vorderflügel. An dem hintern Flügelpaare steht auf rosigrothem Grunde ein dunkelbläuliches Auge mit schwarzem Rande und Mittelpunkte. Die grünlichblaue, weißgestreifte nackte Raupe lebt auf Pappeln, Weiden und Aepfelbäumen. Sie hat hinten ein Horn stehen.

3) Der Glasschwärmer (Sesia), hat öfters eben so glasartig durchsichtige Flügel und fast eben ein solches Aussehen als die Wespen, unterscheidet sich aber vorzüglich durch den Haarbüschel am Hinterleib. Die Raupe lebt bei vielen Arten im Mark oder jungen Holz der Kräuter und Bäume oder an ihren Wurzeln, und macht ein Puppengespinnst aus Holzspänen. Z. B. S. apiformis, der Wespenglasspinner, dessen Raupe in Pappeln lebt.

4) Der Kolbenschwärmer (Zygaena) unterscheidet sich durch widderhornförmige, ungezähnte Fühlhörner und durch eine schiefe (dachförmige) Stellung der Flügel. Die Raupe ist haarig, reihenweis schwarz punktirt, frißt Blätter und spinnt sich ein papyrartiges, spindelförmiges Gewebe an Pflanzenstengeln. Z. B. Z. Filipendulae, das grünlich blaue, roth punktirte Distelfinkchen oder die Zirkelmotte.

5) Der Hopfenschwärmer (Hepialus Humuli), thut als gelbliche, schwarz punktirte Raupe vielen

Digitized by Google

Schaden, indem er, meist in der Erde verborgen, die Wurzel des Hopfens abnagt und durchfrißt, und so zuweilen ganze Pflanzungen zu Grunde richtet. Der Schmetterling hat rund-gliedrige (rosenkranzförmige) Fühlhörner, das Männchen ist silberfarbig, das Weibchen gelb, mit orangefarbigen Streifen.

C) Die Nachtvögel (Phalaenae), entstehen meist aus behaarten Raupen, die sich in einem, von ihnen selbst zubereiteten, seidenartigen Gespinnste verpuppen; die Schmetterlinge fliegen meistens bei Nacht herum.

Wenn man ein nach allen Seiten hin fest zugeschlossenes Gespinnst von einem Nachtvogel hat, und glaubt, man wolle dem künftigen Schmetterling, dessen Puppe doch ganz frei darinnen liegt, die Arbeit des Auskriechens dadurch erleichtern, daß man ins Gespinnst ein Loch schneidet, so kommt meistens ein Krüppel heraus. Gerade die Arbeit des Durchbeißens durch die feste äußere Hülle, scheint dem neugebornen Schmetterlinge zu seiner Ausbildung nöthig. Eben so wie man auch den Kindern beim Lernen nicht alle Anstrengung ersparen muß, wenn nicht ein geistiger Krüppel herauskommen soll.

Zu den Nachtvögeln gehören:

1) Der Spinner (Bombyx), mit kammförmigen oder gezähnelten Fühlhörnern, kurzer Saugröhre und meist behaarten 16füßigen, höckrigen Raupen, die ein sehr vollkommnes Gespinnst machen.

a) Das Nachtpfauenauge (B. Pavonia), zeigt auf den Flügeln in graulich bräunlichem Grunde ein großes Auge. Die Raupe macht bei dieser Art ihrem künftigen Schmetterling, der etwas plump aussieht, das Auskriechen selber etwas leichter, als sonst bei dieser Familie gewöhnlich ist. Sie baut sich nämlich ein Gespinnste, welches eben so künstlich, nur aber auf umgekehrte Weise so gebaut ist, wie die Fischreußen, so daß der Schmetterling beim Auskriechen zwar gut hinaus, kein schädliches Insekt aber hinein kann.

b) Der Seidenspinner (B. Mori), mit schmutzig weißen ausgezackten Flügeln, ist der nämliche, davon die Raupe, ehe sie sich einpuppt, das kunstvoll feine Gespinnst macht, dessen fast 500 Ellen lange Fäden, nachdem man das Gespinnst in heißes Wasser geworfen hat, abgewunden, und dann zu unserer gewöhnlichen Seide verarbeitet werden. Die Raupe frißt Maulbeerblätter und lebt so 6—7 Wochen. Der Schmetterling schlüpft 3 Wochen nach dem Einpuppen aus und das Weibchen legt gegen 500 Eier, die im Frühling gerade dann auskriechen, wenn schon draußen ihre Speise

Digitized by Google

bereitet ist, an den jungen Maulbeerblättern, die ganz zu derselben Zeit ausschlagen. Man hat die Seidenwürmer vor fast 1300 Jahren aus Asien zu uns nach Europa verpflanzt, und späterhin von da sogar nach Amerika. Darum ist die Seide, die sonst so außerordentlich rar war, so daß nur die reichsten Leute welche trugen, bei denen sich auch oft ein seidenes Gewand vom Großvater bis auf den Enkel vererbte, jetzt so gemein geworden.

c) Die Prozessionsraupe (**B. processionea**), deren steifborstiges, leichtabgehendes Haar an der Haut des Menschen heftiges Jucken und Entzündung erregt, zieht in langen Reihen regelmäßig, wie marschirende Soldaten, auf die Eichenblätter, von denen sie lebt, nach Nahrung aus. Der Schmetterling ist graubraun, das Männchen hat 3, das Weibchen 1 dunklen Streifen auf den Flügeln.

d) Die Nonne (**B. Monacha**), thut als Raupe in Fichtenwäldern ungemeinen Schaden, und obgleich sich in dem bei Nacht angezündeten Feuer im Walde viele Tausend solcher Schmetterlinge verbrennen, so hilft das doch öfters Alles nicht genug gegen diese Landplage. Zum Glück wird sie selten so gar heftig, und die kleinen, fleißigen, von Insekten lebenden Waldvögel, lesen im Frühling und Spätwinter gar manches Tausend ihrer Eier ab. Die Raupe ist grau, mit blauen und rothen Warzen, der Schmetterling hat weißliche Flügel, mit schwarzen Zikzakstreifen.

2) Die Weidenraupe (**Cossus ligniperda**), ist eine am Rücken dunkelröthlichbraune, am Bauche fleischfarbene, gar starke Raupe, die sich durch Holz, z. B. hölzerne Schachteln, durchbeißt, und welche vormals (von den Alten) gebraten und gegessen wurde. Auch die Puppe kann noch kriechen, und bohrt sich aus ihrem Hinterhalte heraus. Der grauliche Schmetterling hat auf der Brust eine schwarze Binde und einen weiß geringelten Hinterleib.

3) Die Arten des Eulchens (**Noctua**), entstehen aus nackten oder nur wenig behaarten, 16füßigen Raupen, der Schmetterling hat einen länglich kegelförmigen Leib und buschiges Bruststück und fliegt zum Theil auch bei Tag umher. Die Raupen einiger Arten z. B. des Ritterspornеulchens (**N. Delphinii**), fressen außer Blätter auch andere Raupen, sogar ihrer eigenen Art. Einer der schönsten deutschen Nachtfalter welcher unter die Sippschaft der Eulchen gehört, ist das blaue Ordensband (**N. oder Catocala Fraxini**), wovon die Raupe auf Eschen lebt,

Digitized by Google

der Schmetterling aber durch seine schwarzen, mit blauer Queerbinde durchzogenen Unterflügel sich auszeichnet. Auch gehört zu diesem Geschlecht der Riese unter den Nachtfaltern: die Agrippina (**Noctua** oder **Erebus Agrippina**) von welcher es in Guiana Exemplare giebt, welche mit ausgebreiteten Flügeln 10 Zoll messen.

4) Spanner (**Phalaena**) nennt man die Gattung von Nachtfaltern, deren Raupen zwar auch vornen jene gewöhnlichen 6paarigen Füße und am letzten Ringe jenes Paar von häutigen Füßen haben, welche man bei andern Raupen findet, statt der vier Paare der mittleren Bauchfüße aber nur eines, oder in seltenen Fällen 2, die noch dazu ganz nahe an den Hinterfüßen stehen, so daß daher die ganze Bauchgegend ohne Füße zu seyn scheint. Wenn sich deshalb eine solche Spannraupe fortbewegen will, setzt sie sich erst mit den Vorderfüßen fest, krümmt hierauf den Leib in einen Bogen, zieht die Hinterfüße an die vorderen heran, streckt sich dann mit dem Vorderleib wieder aus, und macht so von neuem einen großen Bogenschritt. Die Puppe liegt nur in einem dünnen Gespinnst; der Schmetterling hat einen langen Rüssel, meist borstenförmige Fühlhörner, schmälere Unterflügel. Z. B. der Fliederspanner (**Ph. syringaria**), dessen Raupe auf dem türkischen Hollunder lebt, mit eckigen, wie Bandjaspis gezeichneten Flügeln.

5) Der Zünsler oder Wickler (**Pyralis**) hat seinen letzteren Namen von der Gewohnheit seiner Raupen, die sich in Blätter oder Blüthen einwickeln, indem sie die Ränder derselben durch einige Seidenfäden zusammenhalten und dann ihr grünes Haus von innen verzehren. Andere Arten bohren sich in die Früchte ein. Der Schmetterling zeichnet sich durch seine hinten abgestutzten, dreieckigen Flügel aus. Z. B. der Eichenwickler (**P. quercana**) mit grünen Oberflügeln, über welche 2 weiße Queerstreifen hinweglaufen, und mit weißen Unterflügeln.

6) Die Federmotte (**Pterophorus**), ist durch ihre zierlich, in federartige Abschnitte zerspaltenen Flügel kenntlich. Z. B. das Geistchen (**Pt. penta-**

Digitized by Google

dactylus) mit schneeweißen Flügeln, davon die oberen in 2, die unteren in 3 federartige Abschnitte zertheilt sind. Die Raupe findet sich häufig auf Schlehen und Zwetschgen.

7) Die Kleidermotte (**Tinea sarcitella**), thut an wollenen Kleidern, die Pelzmotte (**T. pellionella**) am Pelzwerke, die Getreidemotte (**T. granella**) als weißer Kornwurm am Getreide großen Schaden. Alle Mottenarten zeichnen sich durch ihre langen, schmalen, um den Leib herumgerollten, unten gefalteten Flügel und durch einen buschigen Kopf aus. Ihre Räupchen stecken in einem Gehäuse, welches sie sich aus kleinen Wollen- oder andern Fasern und Körnchen bereitet haben.

VII. Die Fliegen oder Zweiflügler (**Diptera**), haben zwei Flügel und noch 2 Flügelstümmelchen, welche hinter den Flügeln unter kleinen Schüppchen liegen. Die Larve ist eine Made, die Puppe ein braunes Tönnchen.

1) Die Breme (**Oestrus**), legt ihre Eier an den Ausgang des Mastdarms, oder an Nasen- und Mundöffnungen großer Thiere. Die Maden kriechen dann hinein in den Leib, und erregen da (bei Pferden, Rennthieren, Schafen) öfters große Schmerzen und Beschwerden, bis sie endlich zu ihrer Verpuppung in der Erde reif, das geplagte Thier, welches manchmal dabei umkommen muß, wieder verlassen. Die Breme sieht fast wie eine Biene aus, ist dick behaart und hat (weil sie als geflügeltes Insekt nichts mehr genießt) weder Rüssel noch andere Freßwerkzeuge, sondern nur 3 Warzen am Munde. Je nach ihrem Vorkommen an und in verschiedenen Thieren nennt man die Arten Schaf-, Ochsen-, Rennthierbreme (**O. ovi, bovis, tarandi**), aus den im Darmkanal der Pferde lebenden Arten (**O. equi** und **haemorrhoidalis**) machen neuere Naturforscher die Untergattung **Gastrus**.

2) Die Viehbremse (**Tabanus**, z. B. **bovinus**) hat einen starken Rüssel, damit saugt sie dem Vieh, und, wo sie dazu kann, auch Menschen, das Blut aus, und ist daher im Sommer eine große Plage. Jedoch

Digitized by Google

gilt dieß blos vom Weibchen, das Männchen saugt nie Blut, sondern begnügt sich mit den Säften der Blumen, auf denen man es im Sommer findet. Die weiße Made lebt in der Erde, von Pflanzenwurzeln.

3) Die Stechfliege (**Stomoxys calcitrans**), sieht fast aus wie eine Stubenfliege; an ihren schmerzlichen Stichen, die sie Menschen und Thieren mittelst eines Bohrstachels, den sie am Munde hat, giebt, merkt man aber bald, daß es eine andere Art ist.

4) Die eigentliche Fliege (**Musca**) und zwar die Stubenfliege (**M. domestica**), hat an der Außenseite ihres Rüssels Taster stehen, womit sie bei ihrem lästigen Belecken der Haut diese zugleich betastet. Dieses Thier ist fast überall, wo es Menschen giebt, eine Plage derselben. Das Weibchen legt etwa 80 Eier in Ställe oder Misthaufen. Die Fleischfliege (**M. carnaria**), setzt gleich lebendige Maden aufs Fleisch, welches dann schneller fault und sich auflößt.

5) Die Sandfliege (**Simulia pertinax**) eine kleine, schwärzliche Fliege, ist eine große, fast unausstehliche Plage für die Bewohner der heißeren Länder von Amerika. Mit Blitzesschnelle wirft sie sich auf die unbekleideten Stellen der Haut und in demselben Augenblick empfindet man auch den Schmerz von ihrem bohrenden, blutdürstigen Saugrüssel. Schlägt man nach ihr, so ist sie alsbald verschwunden, kommt aber sogleich wieder und sticht von neuem und jeder Stich hinterläßt einen dunklen mit Blut unterlaufenen Fleck, der noch einige Zeit hindurch fortjuckt und fortschmerzt. Dabei machen die Sandfliegen nicht einzeln, sondern in ganzen Schwärmen ihre Anfälle und nur bei Nacht lassen sie den Menschen ungeplagt, ziehen sich ins Gebüsche zurück. Es giebt im heißen Amerika mehrere Arten dieser plagenden Insekten, aber auch in Europa kommen Simulien- oder Kriebelmücken vor, davon manche Arten, so klein, daß man sie kaum mit bloßen Augen unterscheiden kann, den Viehherden furchtbar werden können, indem sie den Thieren in alle Oeffnungen des Leibes dringen und Entzündungen erregen.

Digitized by Google

6) Die Stechmücke, Singmücke (**Culex pipiens**), ist in allen, vornehmlich aber in etwas sumpfigen Gegenden als ein gar lästiges Insekt bekannt, das sich Menschen und Thieren mit singendem Laute nähert, dann seinen langen, mit 5 ein- und ausschiebbaren Saugborsten versehenen Rüssel in die Haut setzt, und nun das Blut aussaugt, wobei die Mücke zugleich einen giftigen Saft in die Wunde fließen läßt, welcher Geschwulst erregt. Doch thun dieß alles nur die Weibchen, die Männchen stechen niemals, sondern halten ganz friedlich in der Luft ihre Tänze. So klein diese Thierlein sind, so schön und elegant erscheint ihre Gestalt, besonders die buschigen Fühlhörner des Männchens unter Vergrößerungsgläsern. Das Weibchen legt ihre etlichen hundert Eier aufs Wasser, in welchem die Larven, so wie die beweglichen Puppen leben, und hier zur Reinigung des Wassers (nach S. 285) wohlthätig wirken.

In heißen Ländern, namentlich von Amerika, giebt es mehrere Arten von Stechmücken z. B. **Culex molestus, trifurcatus** und **pulicaris**, die unter dem Namen die Mosquitos nur zu bekannt und wegen ihrer schmerzhaften Bohrstiche gefürchtet sind. Während die Sandfliegen den Menschen doch wenigstens bei Nacht Ruhe lassen, auch nicht so allgemein verbreitet sind, setzen die Mosquitos auch im Dunklen ihr blutdürstiges Geschäft fort.

7) Die Wiesenschnake (**Tipula oleracea**), ist viel größer als die Stechmücke, und hat gleich dieser, sehr lange Beine. Die Larve lebt unter der Erde und frißt vorzüglich die abgestorbenen Pflanzenwurzeln (nach S. 284). Die Larve der Heerwurmschnake (**T. mirabilis**) hält sich unter und auf dem Moos zu vielen Tausenden zusammen, welche eine Art von Schlangengestalt bilden und auch so in reihenweisen Massen ziehen. — Die Larven vieler andrer Schnakenarten leben im Wasser.

VIII. Die ungeflügelten Insekten (**Aptera**), fassen, wenn man blos den Mangel der Flügel berücksichtigt, gar verschiedene Thierarten in sich, z. B.

1) Die Laus (**Pediculus**), mit zangenartigen

Digitized by Google

Klauenenden, ein Schmarotzer-Insekt, wovon fast jede Säugethier- und Vögelart auch ihre besondere Art ernährt.

2) Der Floh (**Pulex irritans**), hat stachliche Springfüße, und 12 in 2 Theile getheilte Ringe am Leibe. Er erleidet eine Verwandlung, ist erst an feuchten Orten eine Made, verpuppt sich hierauf, und wird dann zum Floh. Er soll zuweilen mehrere Jahre alt werden können. Ein gutes Mittel gegen die Flöhe soll Wermuthssaamen seyn, den man ins Zimmer streut. — Viel schlimmer als unser gemeiner Floh ist der südamerikanische Sandfloh (**P. penetrans**), der bei dem Menschen seine Eier zwischen Nägel und Fleisch der Fußzehen legt, welche dann gefährlich sich entzünden, oder wohl gar brandig werden, wenn man nicht durch Herausgraben zu Hülfe kommt.

3) Der Scolopender (**Scolopendra**), hat sehr viele Füße. Die eine Art davon, der leuchtende Vielfuß (**Sc. electrica**) genannt, die man manchmal im Dunklen leuchten sieht, hält sich oft auf Blumen auf, und ist dann schon zuweilen Denen, die an Blumen rochen, mit in die Nase und von da in die Stirnhöhlen gekommen, wo sie ein langwieriges heftiges Kopfweh erregt hat.

IX. Die Spinnenartigen Thiere (**Araneacea**) haben 8 Beine, keine Flügel und keine Fühlhörner, ihr Kopf ist mit dem Brustschild verwachsen, in vielen ist ein deutliches Gefäßsystem entdeckt worden. Dahin gehören:

1) Die Zecke oder der Holzbock (**Ixodes Ricinus**) braun, mit lederartigem röthlichen, flachen Unterleib, lebt in Wäldern, saugt sich aber mit dem starken Saugrüssel oft so tief in Haut und Fleisch der Hunde, des Rindviehs, auch der Menschen (besonders am Nacken) ein, daß man sie ordentlich herausgraben muß. Dabei schwillt das Thier, das anfangs so groß wie ein Hanfkorn ist, zur Größe einer Erbse an.

In wärmeren Ländern giebt es eine Menge Arten dieses wehethuenden Geschlechts, die in Wäldern und Gebüschen le-

Digitized by Google

ben und sich an Menschen und Thieren anſaugen. Namentlich ſo die amerikaniſche Zecke (J. americanus).

2) Die Milbe (Acarus), welche einen blaſenartigen Wulſt an den Fußenden hat und wie eine kleine Laus ausſieht, lebt in alten Käſerinden (A. Siro), wo man ſie kaum mit bloſen Augen erkennen kann, auch auf gedörrtem Obſt und im Mehl (A. farinae), ſo wie auf kleinen Thieren, z. B. Käfern (A. oder Gamasus coleopteratorum).

Außer dieſen gewöhnlichen Arten giebt es auch einige ſehr furchtbare, z. B die Art, welche die gräßliche ſogenannte Läuſekrankheit bei Menſchen erregt, bei welcher dieſe von den unter der Haut und zwiſchen den Muskeln lebenden Milbenſchaaren lebendig gefreſſen werden, wie dieß in älteren Zeiten dem Tyrannen Pheretima, dem Antiochus Epiphanes, den beiden Herodes, und andern geſchehen iſt. — In Südamerika giebt es auch eine Milbenart, die rothe Coyamilbe, deren Zerdrücken auf der Haut zuweilen lebensgefährliche Entzündungen erregen ſoll.

3) Das Geſchlecht der Spinne (Aranea), umfaßt viele Arten, die ſich theils künſtliche Gewebe, zur Wohnung und zum Fangnetz, theils nur zur Hülle ihrer Eier ſpinnen. Zu dieſem Geſchäft dienen die ſiebartig durchlöcherten Spinnwarzen an ihrem Leibe. Manche Spinnen ſind gute Wetterpropheten; alle leben vom Raube kleinerer Thiere und ſind zum Theil ſo raubſüchtig, daß ſie einander ſelber auffreſſen (ſogar das Weibchen das Männchen).

Man unterſcheidet die verſchiedenen Arten an der Stellung ihrer 6 oder 8 an der Stirne befindlichen Augen gegen einander. Die Kreuzſpinne (A. Diadema), die ſonſt mit Unrecht für gar ſo giftig gehalten wurde, und die Fenſterſpinne (A. domestica) verkündigen durch die Stellung ihres Rückens nach dem Freien hin oder nach innen hinein, heitres Wetter oder Regen. Manche Spinnen, z. B. die eßbare in Neu-Caledonien (A. edulis), werden von den Menſchen geröſtet und gegeſſen. Die 13 tropfige Spinne (A. 13 guttata) auf der Inſel Elba ſoll ſo giftig ſeyn, daß ihr Biß zuweilen Menſchen und Thiere tödtet, aber auch ſehr nützlich, indem ſie die Scorpionen umbringt.

4) Der Scorpion (Scorpio, z. B. europaeus), kann mit dem letzten, krumm gebogenen, ſpitzigen Glied ſeines Schwanzes ſtechen und durch den giftigen Saft, den er zugleich aus einer Oeffnung unterm Stachel

Digitized by Google

in die Wunde fließen läßt, auch gefährlich werden. Besonders ist dieß bei den größeren Arten der Fall. Sie fressen Insekten und gebären lebendige Junge.

5) Der Bücherscorpion (**Obisium cancroides**), ein kleines dunkelbraunes oder schwärzliches Thierlein, das mit seinen langen, armförmig vorstehenden Scheeren und im übrigen Körperbau ganz einem Scorpion gleicht, nur daß es keinen Schwanz hat, findet sich oft bei uns unter alten Papieren und an andern Orten, wo es Milben, Papierläuse und dergleichen kleine, schädliche Insekten aufsucht und frißt, und hierdurch nützlich wird. Das Weibchen trägt die Eier in einem zusammengesponnenen Klumpen unten an seinem Leibe mit sich.

X. Die Krustenthiere (**Crustacea**), sind ungeflügelte Gliederthiere, welche durch Kiemen athmen, und welche ein deutliches Gefäßsystem haben. Wir führen davon nur die nachfolgenden an:

A. Eigentliche Krustenthiere.

1) Der Krebs (**Cancer**) unterscheidet sich durch seine beweglichen, auf Stielen sitzenden Augen, einen Kopf, der mit dem Brustschilde zu einem Stück verwachsen ist, und durch pyramidale, blättrige Kiemen, welche an der Wurzel der Füße und Scheeren sitzen. Von dieser Thierfamilie giebt es, besonders im Meere, gar viele Geschlechter und Arten. Eine der größten ist der Hummer (**Astacus marinus**), der auch in der Nordsee lebt und manchmal über eine halbe Elle lang ist. Unser gemeiner Krebs (**Ast. fluviatilis**) kann auch gegen 20 Jahre alt, und dann sehr groß werden. Die abgerissenen Scheeren erzeugen sich wieder.

Eine Art von Krebsen, die Wanderkrabbe (**Cancer** oder **Ocypoda ruricola**), lebt in Westindien und Südamerika in Erdlöchern, aus denen sie nur bei Nacht hervorgeht. Sie ist von dunkelrother Farbe und hat einen kurzen Schwanz, den sie, wenn sie still sitzt, klappenartig nach unten herumbeugt. Wenn die Zeit des Eierlegens kommt, dann zieht die Wanderkrabbe in ganz ungeheuren Schaaren und immer in einer schnurgeraden Richtung, so daß sie lieber über die Häuser wegklettert als sie umgeht, nach dem Meere, um dort ihre Eier in den Sand zu legen. Die Negersclaven

Digitized by Google

lassen sich um diese Zeit die Krebse gar gut schmecken und nähren sich, so lange der Zug dauert, in manchen Gegenden von Amerika fast ganz davon. Der Bernhardskrebs (Pagurus Bernhardus), wird am Meeresufer öfters in leeren Seeschneckenhäusern gefunden, in deren Windungen er sich mit seinem zarten, sehr dünnschaaligen Schwänzchen festhält, während er mit dem fremden Haus an dem Rücken, munter umherkriecht.

2) Der Kellereſel, die Keller-Assel (Oniscus Asellus), hat 4 Fühlhörner und 4 Anhänge an den Seiten des Schwanzes, sieht übrigens grau aus und ist länglich rund. Die gemeinste Art lebt an feuchtem Gemäuer und wurde sonst als Arzneimittel gebraucht.

Viele Geschlechter der asseluartigen Thiere leben im Meere, zum Theil als plagende Schmarotzer, an und in anderen Seethieren.

B. Ranken- oder Lockenfüßler, (Cirripedia). Diese merkwürdige Thierordnung steht ihrem ganzen Wesen nach in der Mitte zwischen den gegliederten Thieren und den Schaalenthieren, zu welchen man sie noch jetzt öfters unter dem Namen der vielschaaligen Muscheln (Multivalves) hinstellt, und bei denen man ihre Gehäuse auch in den meisten Sammlungen aufgestellt findet. Die Lockenfüßler haben keinen Kopf, aber am Munde eine hornige Oberlippe und an jeder Seite derselben eine Art gegliederter Fühlfäden, zwei Paar gezähnelte Kinnladen und eine häutige Unterlippe, so wie längs des ungegliederten Leibes 10 bis 12 Paar (lockenartig) gewimperte Arme. Ihre Kalkschaale besteht aus mehreren Schaalenstücken, die bei manchen fest mit einander verwachsen sind. Mit der Schaale oder mit einem häutigen Stiele sind sie an Felsen oder andern Gegenständen festgewachsen. Dahin gehört:

1) Die Meereichel, oder Seetulpe (Balanus Tintinnabulum), die 6 oben spitzig zulaufende, der Länge nach gestreifte, oft röthlich aussehende Schaalenstücke, wie Tulpenblätter hat, welche auf eine Unterschaale, die fein der Quere nach gestreift ist, angewachsen sind. Oben ist die Oeffnung, aus welcher das Thier hervorragt, unten ist die Schaale an Fel-

Digitized by Google

sen, oft auch an Schiffen festgewachsen. Die schönsten kommen aus Ostindien.

Die Kroneneichel oder Wallfischeichel (**Coronula balaenaris**) ist auf ähnliche Weise wie die Seetulpe aus Schaalenstücken zusammengesetzt, hat aber inwendig, wie ein Mohnkopf, lauter kleine, fächerartige Abtheilungen, in welche man von unten her hineinsehen kann. Sonst gleicht die Schaale einer kleinen weißen Krone. Die Wallfischeichel sitzt im Speck der Wallfische.

2) Die Entenmuschel (**Lepas anatifera**), hat nach unten einen lederartigen Stiel, womit sie, oft in großer Gesellschaft, am Boden, oder an Schiffen festsitzt; zwei größere, breitere und ein kleineres, schmäleres Schaalenstück.

§. 50. Die dritte Hauptabtheilung des Thierreiches umfasset die Klassen der Molusken, oder der Weich- und Schaalenthiere (**Mollusca**), die sich vorherrschend durch ihre weiche, nervenreiche, Schleim aussondernde Haut und ihre Schaalenbedeckung auszeichnen. Diese sind unter allen Klassen der Thiere, welche kein Rückgrat haben, die vollkommensten, denn man findet in ihnen ein ordentliches Herz, Blutgefäße, ein Nervensyßem, das zum Theil schon dem der vollkommneren Thiere etwas ähnlicher ist, und bei einigen auch Sinnesorgane, z. B. Augen, welche fast denen der Fische gleichen. Und doch giebt es zugleich auch in dieser Klasse eine ganze Abtheilung (die zweischaaligen Muscheln), die gar keinen eigentlichen Kopf, mithin noch weniger Augen, Ohren u. s. w. hat, dabei aber dennoch ein Gefühl für das Tageslicht und für die Annäherung von fremden Gegenständen besitzt. Manche sind von doppeltem Geschlecht, andre z. B. eben die zweischaaligen, sind blos weiblich, so daß jedes einzelne Thier für sich allein seine Eier legt. Die meisten leben freilich im Meere, nur wenige in unsern Flüssen und Teichen.

Man kann die Molusken entweder nach der Gestalt und Zusammensetzung der Schaalengehäuse — welche ja das einzige sind, was wir hier zu Lande von den meisten zu sehen bekommen — eintheilen, oder, was freilich besser ist, sie nach der Beschaffenheit der

Digitized by Google

inwohnenden Thiere anordnen. Wir thun hier beides. Und so umfaßt die erste Abtheilung:

A. Muscheln (Conchae) meist mit zwei Schaalen versehen, das Thier ohne Kopf, ohne Augen, und Fühlhörner, nur eine Mundöffnung an dem einen, eine Afteröffnung am anderen Ende. Inwendig, unter den Lippen, liegen 2 Kiemen, im Bauche eine große Leber, nach dem Rücken zu ein Herz mit einer Kammer und 2 Ohren. Die hintere Oeffnung dient zum Athmen und verlängert sich bei manchen in 2 Röhren, durch welche Wasser eingezogen und ausgestoßen wird. Der vordere, fleischige Theil des Bauches verlängert sich bei vielen wie ein gebogener (knieender) Fuß, womit die Thiere fortkriechen, auch sich einbohren können.

Die Lochmuschel (Terebratula), hat am Wirbel der einen, zarten, weißen Schaale ein Loch, durch welches sie zwei armartige Glieder hervorstreckt, womit sie sich festhält. Man nennt deßhalb diese Thiere auch Armfüßler und trennt sie als solche von der Ordnung der eigentlichen Muscheln, an deren Spitze wir hier stellen wollen:

1) Die Riesenmuschel (Tridacna gigas), mit Rinnentiefen und mit dachziegelförmigen Schuppen an der Schaale, wird manchmal so ungeheuer groß, daß die beiden Schaalen wohl 6 Centner wiegen, und man jede solche Schaale zu Waschbecken, zu Waschgefäßen, auch kleinen Trögen u. a. gebrauchen kann, und daß das Fleisch der Muschel, welches gegen und über 30 Pfund wiegt und gut zu essen, nur etwas schwer zu verdauen ist, ein Mittagsessen für mehr als 40 Mann hergiebt.

Wenn die Muschel so groß ist, dann hat sie auch eine solche ungeheure Kraft, daß sie, wenn sie ihre geöffneten Schaalen schnell zusammenschließt, einem Menschen, welcher eben mit einem Messer ihre Sennen abschneiden und dann das Fleisch herauslösen will, die Hand und den Arm abquetschen, auch ein mehr als armdickes Stück Holz durchbrechen kann.

2) Die Auster (Ostrea edulis), deren Thier auch bei uns von reichen Leuten roh gegessen wird, klebt mit der einen Schaale an den Felsen fest, und kann nur die andre (die obere) aufthun und bewegen.

Digitized by Google

Man findet sie an den Küsten des Mittelmeeres, der Nordsee u. s. w. Oben, wo die Schaalen zusammengewachsen sind, findet sich ein 3eckiges Grübchen, das mit einem schwärzlichen Knorpel ausgefüllt ist.

3) Die Kammmuschel, Pilgermuschel (**Pecten maximus und jacobaeus**), lebt auch in unsern benachbarten Meeren und hat ein eßbares Fleisch. Die Oberschaale ist bauchig gewölbt, die Unterschaale platt, über beide laufen stark hervorragende, gestreifte Rippen hin. Oben am Schloß, darin, wie bei den Austern, ein dreieckiges Grübchen ist, finden sich zwei flügelartige Seiten-Ansätze. Das Thier kann sich durch schnelles Oeffnen und Schließen der Schaalen im Meere fortschnellen.

4) Die Lazarusklappe (**Spondylus Gaederopus**), hat neben dem dreieckigen Grübchen im Schloß noch zwei starke Zähne und Stacheln auf den meist röthlichen Schaalen.

5) Die Perlenmuttermuschel (**Avicula margaritifera**), von welcher die eigentlichen ächten orientalischen Perlen kommen, findet sich zwar nur in wärmeren Meeren, vor allem im persischen Meerbusen und bei Ceylon, man kann aber ihre nach unten runden, nach oben liniengeraden und nach einer Seite hin mit einer schnabelartigen Kante versehenen Muschelschaalen, wovon eine oft mehrere Pfunde wiegt, und die man als Perlmutter verarbeitet, fast in jeder Apotheke zu sehen bekommen.

Die Perlen bilden sich in den Hautfalten (im sogenannten Mantel) des Thieres, welches die Muschel bewohnt, auf deren inwendiger Fläche auch zuweilen perlenartige Auswüchse, nicht aber eigentliche Perlen gefunden werden. Nächst den Edelsteinen von erstem Range sind die Perlen die kostbarste Waare, welche der Mensch in Handel und Verkehr bringt. Denn obgleich eine Perle, welche nur einen halben Gran wiegt, blos einen guten Groschen kostet, kommt dagegen schon eine solche, welche $3\frac{1}{2}$ Gran oder ein Karat wiegt, wenigstens auf 3 Thaler Preußisch zu stehen, eine von 3 Karat Gewicht wird mit 3 mal 3 oder mit 27 Thalern, eine, die zwischen 5 und 6 Karat wiegt, mit 100 Thalern bezahlt, und wenn das Gewicht über 10 Karat steigt, dann bezahlen die Liebhaber verhältnißmäßig noch viel mehr, denn eine 12 karatige Perle, wenn sie schön milchweiß und ganz kugelrund

Digitized by Google

ist, wird öfters um 1000 Thaler feilgeboten und verkauft, ja es hat Perlen gegeben, deren Werth auf anderthalb Millionen Thaler geschätzt wurde. Die reichhaltigsten Perlenmuscheln werden aus einer Tiefe des Meeres von 40 bis 60 Fuß heraufgeholt. Daher haben die Perlenfischer, welche meist eben so wie die Bergleute, die das Gold und das Silber aus der Tiefe der Erde holen, sehr arm sind, allerdings einen sehr schweren Broderwerb. Denn wenn sie keine Taucherglocke besitzen, müssen sie so lange unter dem Wasser bleiben (man sagt, daß einzelne Taucher es 8 bis 10 Minuten aushalten könnten) und dabei einen so schweren Druck des Wassers auf ihrem Körper aushalten, daß ihnen öfters, wenn man sie wieder heraufzieht, das Blut aus Nase und Mund hervorströmt. Daher werden diese armen Leute auch nur selten alt und viele von ihnen werden überdieß von Haifischen verschlungen oder tödtlich verletzt. Aber was thut der Mensch nicht um des lieben Brodes willen, und was giebt er alles für ein Bischen Schmuck hin, so lange er nicht den Schmuck kennt, der nicht äußerlich, mit Haarflechten u. s. w., sondern inwendig und kostbarer ist, als aller Schmuck und alle Zierde der Erde.

6) Die Noahs-Arche (**Arca Noae**), sieht wie ein Schiff aus, das nach unten, am Kiel, scharf zuläuft, nach oben ein breites Verdeck hat, welches gitterartig gestreift ist. Da, wo beide Schaalen aneinander schließen, finden sich lauter sägenartige Zähnchen. Diese Muschel lebt im Mittelmeer und im Ostindischen Meer; ihr Fleisch ist eßbar.

7) Die Steckmuschel (**Pinna**), unten spitz, oben breit, dabei, wie an der edlen (**P. nobilis**), mit Schuppen wie Hohlziegel bedeckt, findet sich im Mittelmeer, steckt mit dem spitzigen Ende im Sand, oben hängt der seidenartige Haarbüschel heraus, aus dem man in Italien Handschuhe u. s. w. macht. Das Fleisch ist eßbar.

8) Die Miesmuschel, der Blaubart (**Mytilus edulis**) endet nach vorn, wo beide Schaalen schließen, ganz spitz, nach hinten breiter. Unter dem schwarzen Ueberzug der Schaale ist ein schöner blauer Grund. Das Thier, welches auch (wie 7) einen seidenartigen Haarbüschel hat, wird gegessen, doch erregt der Genuß im Uebermaas Fieber und eine besondere Geschwulst des Kopfes. Die Miesmuschel lebt in allen Meeren.

Digitized by Google

9) Die Teichmuschel (**Anodonta cygnea**), die sich in unsern Teichen und Sümpfen findet, unterscheidet sich dadurch von der Klaffmuschel, daß ihre (grünlichen) Schaalen viel dünner sind, und keinen Schloßzahn haben.

10) Die Klaffmuschel (**Mya**), mit einem starken, gekerbten Zahn am Schloß der Schaalen, z. B. die Malermuschel, in die man die Farben hineinthut (**M. pictorum**), findet sich fast durch ganz Deutschland in Bächen und Flüssen; die europäische Perlenmuschel, (**M. margaritifera**), in deren Schaalen sich die schönen Flußperlen erzeugen, welche öfters eben so geschätzt sind als die etwa gleich großen oder gleich schweren orientalischen Perlen, findet sich seltener.

Mehrere Arten von Süßwassermuscheln, die den Familien der Teich- und Klaffmuscheln verwandt sind, dienen in manchen armen, uncultivirten Ländern selbst den Menschen zur Nahrung. So namentlich den wilden Australländern am Alexandrina-See und an andern dortigen Landgewässern.

11) Die Herzmuschel (**Cardium, z. B. edule**), heißt so, weil die beiden gleichen Schaalen, wenn sie zusammenschließen, fast die Gestalt eines Herzens bilden. Im Schloß findet sich an jeder Schaale ein doppelter Zahn und zu beiden Seiten desselben stehen zwei vorspringende Leisten. Das Thier hat einen knieförmig gebogenen Fuß und zwei Spitzröhren, und ist eßbar. Herzmuscheln giebt es in allen Meeren.

12) Die Dreieckmuschel (**Donax**), ist keilförmig gestaltet. Lebt im Meere.

13) Die Kreismuschel (**Cyclas cornea**), die man in unsern Wassergräben, im Schlamm findet, ist rund, hornfarbig grau oder grünlich und hat fast einen ähnlichen Bau der Schloßzähne, als die Herzmuschel. Sie ist klein.

14) Die Tellmuschel (**Tellina**), mit schönen rosenroth und weiß, oder gelb und weiß gefärbten, glatten Schaalen, hat drei Zähne, wovon 2 nahe aneinander stehen, und in der rechten Schaale eine Leiste.

15) Die Venusmuschel (**Venus**), hat unter

Digitized by Google

dem Wirbel des Schlosses mehrere nahe zusammengestellte Zähne und Zahnblättchen.

16) Die Messerscheidenmuschel (**Solen**), deren lange Schaalen den Messerscheiden gleichen, läßt nach vorn und nach hinten eine weite Oeffnung. Die Zähne stehen nahe nach dem einen Ende hin.

17) Die Dattelbohrmuschel (**Pholas**), hat außer den zwei großen, nach der einen Seite hin weit von einander klaffenden, weißen, gerippten Schaalen noch etliche kleinere Schaalenstücke und ist daher sonst unter die vielschaaligen Muscheln gerechnet worden. Sie bohrt sich Gänge in den Kalkfelsen oder in Corallenriffe. Das Fleisch, das bei Nacht ein wenig leuchtet, ist sehr wohlschmeckend.

18) Die Gießkanne (**Arytaene Aspergillum**) mit einer zarten, weißlichen Kalkröhre, die nach oben offen, nach unten durch ein großes, rundliches, in seiner Mitte siebförmig durchbohrtes, von einem breiten Rande umsäumtes Ende geschlossen ist, wird als eine seltene Zierde unsrer Sammlungen geschätzt, in denen man sie früher zu den Wurmröhren (**Serpula**) hinstellte. Das Thier steckt mit dem unteren, scheibenförmigen Ende, an dessen vorstehendem Rande kleine Röhrchen bemerkbar sind, im Sande, durch die obere Oeffnung dringt ihm das Seewasser und die Nahrung zu. Findet sich am Meeresufer bei Suez am rothen Meer und an verschiedenen Küstengegenden des indischen Oceans.

19) Der Schiffsbohrwurm (**Teredo navalis**), der in Holland an den Dämmen öfters schon so großen Schaden gethan hat, soll ursprünglich durch Schiffe aus dem Indischen Meere nach Europa gebracht worden seyn. Der Athmungsröhre gegenüber stehen zwei kleine rhomboidale Schaalen und noch zwei finden sich an der Wurzel der beiden Enden, in welche sich die Athmungsröhre theilt. Ueberdies ist das Thier von einer dünnen, kalkigen Röhrenschaale umgeben, welche aus seinem Körper ausschwitzt.

Sehr nahe verwandt mit den Thieren, welche in den Muscheln leben, ist seinem Baue nach das Thier der

Digitized by Google

20) Seescheide (Ascidia oder Tethyon), z. B. der moosigen Seescheide (A. rustica). Die Hülle ist nur knorplicht und hat blos zwei Oeffnungen für die beiden Röhren, davon die eine zum Aufnehmen des Wassers, die andere als After dient. Die Seescheiden sitzen beständig am Meeresgrund an den Gesteinen fest und sehen öfters selber einem bemoosten Steine gleich. Das Fleisch wird von mehreren Arten gegessen.

B. Schnecken (Cochleae) zum Theil auch einschaalige Mollusken genannt, haben die Eingeweide, besonders die große, in mehrere Lappen zertheilte Leber, welche den Darm umgiebt, in einem Schneckenhaus verborgen; eine Art von vorstreckbarem Kopf, daran 2, 4, ja bei einigen gar 6 Fühler sind, die sich nach innen hereinstülpen lassen, und an deren einem Paare die Augen stehen. Im Munde finden sich knorpliche Kiefer, und bei manchen Gattungen, z. B. gleich bei den ersten 6, eine mit kleinen Häkchen besetzte Zunge, womit das Thier in harte Schaalen Löcher hineinfeilen kann, überdieß ein vorstreckbarer Rüssel. Diese Familie von Schnecken, so wie die meisten im Meere lebenden, gehören in ihrer Art zu den Raubthieren, indem sie andere Mollusken anbohren und aussaugen. Manche Schnecken, wie z. B. die ersten 9 Arten, haben Männchen und Weibchen unter sich, andere sind (sogenannt) Doppelgeschlechtige. Die im Meere lebenden athmen durch Kiemen, die auf dem Lande und im süßen Wasser wohnenden, namentlich die unter 17, 18, 19, 20 so wie 24 erwähnten Geschlechter, athmen Luft in einer Art von Brusthöhle, durch die Oeffnung an der Seite des Halses. Sie legen ihre Eier meistens in Klumpen von besonderer Gestalt.

1) Die Kegelschnecke (Conus), ist oben nach der Windung hinauf ganz oder fast ganz flach und platt, nach unten, wo sonst andere Schnecken breit sind, spitzig. Die Mündung ist ganz lang und schmal. Es giebt viele Arten davon, die in warmen Meeren leben. Es wohnt eine Schnecke mit spitzigen Fühlhörnern darinnen. Man kann sie nicht essen.

2) Die Porzellane (Cypraea), ist fast eirund

Digitized by Google

und hat eine schmale, längliche Mündung mit Zähnen. Eine Art davon, welche gelblich-weiß aussieht, und oben am Rücken einen kleinen Höcker hat (**C. Moneta**), ist unter dem Namen Otternköpflein bekannt und wird oft als Zierrath an Gürteln, Sätteln, Messerriemen u. s. w. gefunden.

Diese Art wird in manchen Gegenden von Ostindien als Geld gebraucht und heißt daselbst Kauri. Da kann man dann für wenig Geld die ganze Tasche voll Geld bekommen. Denn wenn man etwa einen Gulden nach unserm Gelde in Kauri's umwechselt, bekommt man 3000 Stück dafür, und es kann dort einer ein Kauri's-Millionär seyn, der doch für alle sein Geld noch nicht einmal in einem unsrer Marktflecken ein Haus bezahlen könnte; denn eine Million Kauri's macht erst 200 Gulden. Und doch bekommt man dort zu Lande für einen Kauri schon eine gute, lieblich schmeckende Frucht. Eine andere, große Art, auf weißem Grunde schön braun und gelb getiegert (**C. Tigris**), sieht man manchmal zu Schnupftabaksdosen verarbeitet. Fast alle Arten von Porzellanen kommen aus wärmeren Meeren. Die Schnecke ist ungesund zum essen.

3) Die Bischofsmütze (**Mitra episcopalis**), ist eine nach oben spitzig zulaufende Schneckenschaale, die auf weißem Grunde orangefarbene (gelblichrothe) Flecken zeigt. Die Schnecke, welche darinnen lebt, hat ein giftiges Fleisch, auch sollen die Wunden, welche sie mit ihrer Bohrzunge hervorbringt, sehr schmerzhaft und selbst gefährlich sein. Sie lebt im Ostindischen Meere.

4) Die Kronenwalze (**Voluta aethiopica**), ist eine sehr große, röthlich braun an ihrer Schaale gefärbte, eßbare Schnecke, deren reinliche glatte Schaale man in Ostindien auch zu Gefäßen, z. B. zum Einsalzen und Aufbewahren des Fleisches gebraucht. Oben an den Windungen der Schaale finden sich gerade aufwärts stehende Hohlspitzen (Dornen), während bei der noch größeren und ansehnlicheren (**V. nautica**), diese Hohlspitzen fast horizontal einwärts gerichtet sind.

Zu dem Geschlechte der Walzenschnecken, die sich vorzüglich durch die großen, leistenartigen Falten unterscheiden, welche in schräger Richtung an der Spindel des Gehäuses hinanlaufen, gehören sehr ausgezeichnete Arten. Das Thier, welches in ihnen wohnt, hat kurze, dreieckige Fühlfäden, an deren Wurzel die Augen sitzen und einen dicken, mit Wider-

Digitized by Google

häkchen versehenen Rüssel. Von den Arten dieses Geschlechtes führen wir nur noch an

a) Die Notenschnecke (V. musica), die sich durch die zarten Streifen auszeichnet, welche gleich Notenlinien queer über die Schaale laufen und zwischen denen sich auch dunkle Punkte, ähnlich den Notenzeichen finden. Der Lippenrand der Schaale ist regelmäßig schwarz gefleckt, die Gewinde sind knotig. Diese Art kommt aus Amerika.

b) Die Fledermausschnecke (V. vespertilio) ist eine der gemeinsten Walzenschnecken, die man sich sehr leichten Kaufes verschaffen kann, obgleich sie aus Ostindien zu uns gebracht wird, wo man das Fleisch des Thieres ißt. Die Schaale zeigt auf lichte graulich gelbem Grunde dunkelrothbraune Flecken und Streifen, welche zickzackartig hin und her gebogen sind. Am Rande der unteren Gewinde stehen kurze Zacken.

5) Die Olivenschnecke (Oliva), unterscheidet sich durch ihre dicke, eiförmig-cylindrische Schaale, aus deren nur wenig von einander absetzenden Windungen in der Mitte ein kleiner, spitziger Wirbel hervorragt. An der Spindel zeigen sich wulstartige, undeutliche Falten.

6) Die Flügelschnecke (Strombus), zeichnet sich im ausgewachsenen Zustand durch ihre flügelartig abstehende äußere Lippe aus, die von der Spindel durch eine Einbuchtung (einen Ausschnitt) abgesondert ist. Das Thier, welches in dem Schaalengehäuse dieser Schneckenarten lebt, ist von sonderbarer Gestalt. Die Augen stehen auf dicken Stielen, wie die Gläser eines Telescopes und sind von schöner grüner Farbe; an der Zunge findet sich nach unten eine mit Widerhaken bewaffnete Leiste, der Fuß läuft in ein schmales, fingerförmiges, bei manchen Arten sehr bewegliches Ende aus, an welches der schmale, zuweilen zackige Deckel angewachsen ist. Als Arten gehören hieher unter andern:

a) Der Riesenflügler, das Riesenohr (Str. gigas). Dieses ist jene, zuweilen einen Fuß lange, an ihren untern Windungen mit großen Zacken besetzte, außen runzlich queergefurchte, schmutzig gelbliche, inwendig aber prächtig rosenrothe Schnecke, welche von den Antillen, wo sie häufig ist, zu uns gebracht wird. Sie gehört unter die größesten Schnecken des Meeres.

b) Das Dianenohr (Str. auris Dianae), hat an der flügelartig abstehenden Außenlippe einen fingerartigen Zak-

ken, welcher länger ist als das kegelartig spitz zulaufende Gewinde, an dessen unteren Umgängen knotige Höcker stehen. An der dem Gewinde gegenüber gelegenen (vorderen) Seite der Schaale findet sich ein röhrenförmiger, nach oben gebogener Kanal. Der innere Theil der Mündung ist von dunkelpurpurrother Farbe. Das Thier, welches in dieser Schaale lebt, vermag durch das fingerförmig dünne, mit dem Schließdeckel bewaffnete Ende seines Fußes so schnell und kräftig um sich zu schlagen, und weiß sich in andern Fällen seines widerhakig stachlichen Zungenbandes so geschickt zu bedienen, daß es hierdurch, wenn man es mit andern Schnecken in eine Schüssel voll Wasser setzt, diese Alle hinauswirft oder hinaustreibt.

Als Unterordnungen schließen sich an das Geschlecht der Flügelschnecken an: die Gattung des Bootshaken (**Pterocera**), an dessen Arten die flügelartige Außenlippe mit fingerförmigen oder hakenartig gebogenen Fortsätzen versehen ist, so wie die Gattung der Schnabelschnecken (**Rostellaria**), an welchen, den Windungen gegenüber (am vorderen Ende der Schaale) ein schnabelartiger Fortsatz gefunden wird. Dahin gehört der kleine Pelecansfuß (**R. pes Pelecani**) aus dem Mittelmeer, mit gefingertem Lippenrand und die wunderschöne Sternspindel (**R. fusus oder curvirostra**) aus dem rothen Meere, mit einem langen, spitzig zulaufenden Gewinde, zahnartig ausgekerbtem Flügelrand und rinnenförmigem Schnabel. Die Außenfläche dieser zierlich gebauten Schnecke ist hellbraun, die Mündung schneeweiß gefärbt und porzellanartig glänzend.

7) Die Stachelschnecke oder Purpurschnecke (**Murex**), ist an ihrer Schaale mit einer Menge Bukkeln und Stacheln besetzt, und nicht sehr buntfarbig, sondern meistens bräunlich und graulich weiß. Nach vornen findet sich ein fast röhrenförmig geschlossener Kanal.

Man hat überhaupt die Bemerkung gemacht, daß gerade die Seeschnecken, die am schönsten bunt gemalt und glatt sind, und durch ihr äußeres Ansehen am meisten an sich locken, ein schädliches und giftiges Fleisch in sich führen, die aber, welche knorzig und höckrig und von Farbe am unscheinbarsten sind, enthalten ein wohlschmeckendes nnd gesundes Fleisch. Da will uns denn die Natur auch, wie sie gar oft thut, lehren: daß auf den äußern Schein nicht so gar viel zu halten sey.

Der ehrliche Hund eines Hirten, sagt man, hat in der stachlichen Purpurschnecke (**Murex brandaris**), die in großer Menge an den Küstengegenden des adriatischen und Mittelmeeres vorkommt, den Purpur entdeckt, der bei den alten Völkern eine so gar hochgeachtete Farbe war. Der Hund

Digitized by Google

hatte eine solche Schnecke zerbissen, und war auf einmal an der Schnautze schön roth gefärbt. Der Hirt dachte, es wäre Blut, wischte es mit Wolle ab, und die Wolle wurde so dauerhaft purpurroth gefärbt und jeden Tag immer schöner, daß der Hirt ganz aufmerksam ward, und so die Entdeckung des Purpurs in der Stachelschnecke machte. Dieser färbende Saft findet sich fast bei allen Schneckenarten, in einem kleinen Beutelchen am Halse, nur hat er bei der einen eine schönere Farbe, als bei der andern, sieht öfters anfangs, wenn er herausfließt, grünlich aus, und wird dann erst roth. Da auch in jeder Purpurschnecke nur etliche Tröpflein sind, gehörte eine ungeheure Menge dazu, um ein Kleid damit zu färben, und eine solche Purpurfarbe war höchst theuer. Die Leute bezahlen das aber doch gern, denn Viele haben die rothe Farbe ganz besonders lieb, obgleich man bemerkt hat, daß sie für Menschen und Thiere etwas Feindliches und Erschreckendes hat, und z. B. ein Regiment roth gekleideter Soldaten auf Indianer einen viel furchtbareren Eindruck mache, als ein Regiment blau oder grüngekleideter. Aber manche Menschen, und besonders die schwächsten, wollen gar gern ein Ansehen über Andre haben und gefürchtet seyn.

8) Das Tritonshorn, Kinkhorn, (**Tritonium tuba**), hat eine glatte, braun gefleckte Schaale, über welche rundliche und zum Theil knotige Reifen der Queere und andre hervorspringende Leisten der Länge nach hinlaufen; die Mündung ist gezähnt. Man kann sich dieser Schaale, wenn man die Spitze abbricht und da stark hineinbläst, als einer sehr laut tönenden Trompete bedienen. Das Kinkhorn wird mehr als Fußes lang. Das Fleisch ist eßbar.

9) Die Helmschnecke (**Cassis**), hat eine ähnlich gestaltete, schmale, gezähnelte Mündung als die Porzellanschnecke, ist aber nach hinten (wo die Windungen sind) breit abgestutzt, und nach vorn zeigt sich an ihr eine wie ein Eberzahn heraufstehende Röhre.

10) Die Harfe (**Harpa**), hat eine weitbauchige Schaale, über welche roth und weißlich gefleckte Rippen herablaufen. Die Mündung ist sehr weit und ungezähnt. Oben um den Saum der Windungen sitzen Kronenzacken. Sie findet sich in den Meeren beider Indien.

11) Die Faßschnecke (**Dolium**), besitzt eine dünne weitbauchige Schaale mit rundlichen Reifen und einen aus- und einwärts gebogenen Saum der äußern

Digitized by Google

Mündung. Sie wird ziemlich groß. Das Fleisch ist eßbar.

12) Die Kräuselschnecke (**Trochus**), ist unten nach der untersten Windung zu, an der die ziemlich 4eckige Mündung steht, sehr breit, nach oben spitzig. So besonders bei der Telescop-Kräuselschnecke (**Tr. telescopium**). Weniger nach oben zugespitzt ist die schöne Pharaos-Krauselschnecke (**Tr. Pharaonis**), welche mit buntfarbigen Knöpfchen, wie Perlenschnüre, überzogen ist.

13) Die Mondschnecke (**Turbo**), zeigt eine runde Mündung an ihrer Schaale, welche der Schaale unsrer gemeinen Landschnecken etwas ähnlich gebildet, nur viel dicker als diese und mit einem festen Schließdeckel, (dergleichen auch die vorhergehende Art hat) versehen ist. Dieser Schließdeckel ist der sogenannte Meernabel. Eine Art von Mondschnecken, die an unsern Küsten lebt (**Tr. littoreus**), kündigt durch ihr weiteres Hinaufkriechen an den Felsen Sturm an, und umgekehrt.

14) Die gemeine Wendeltreppe (**Scalaria Clathrus**), hat eine weiße Schaale, mit vielen Windungen, welche wie rundliche Röhren eine von der andern abgesetzt sind, und über welche der Länge nach viele hervorspringende Leisten hinablaufen. Die Mündung ist ganz rund. Diese Art ist häufig im Mittelmeer und daher leicht zu haben. Schwerer dagegen und nur um hohen Preis die ächte ostindische Wendeltreppe (**Scalaria vera**), deren Windungen viel stärker von einander absetzen, als die der gemeinen.

15) Die Schwimmschnecke (**Nerita**), hat auch einige wenige, kaum merklich von einander absetzende Windungen und eine halbmondförmige Mündung. Es giebt darunter sehr schöne buntfarbige Arten, z. B. die Flußschwimmschnecke (**N. fluviatilis**), die sich schon in manchen südeuropäischen Flüssen findet.

16) Das Püppchen, Bienenkörbchen (**Pupa uva**), hat eine nach oben zugerundete, längliche, breitgereifte Schaale mit runder Mündung.

Digitized by Google

17) Die Schnirkelschnecke (**Helix**), enthält die bei uns bekanntesten Arten, z. B.

a) Die Weinbergsschnecke (**Hel. pomatia**), mit gelblich grauer oder graulich weißer Schaale, so groß und größer, als eine Wallnuß. Findet sich in unsern Gärten und Weinbergen und wird gegessen.

b) Die Busch- und Gartenschnecke (**H. nemoralis**), ist jene allbekannte, die meist auf gelbem Grunde bräunliche Bänder hat, welche schön regelmäßig an der ganzen Schaale herumlaufen. Manchmal ist sie auch ganz gelb ohne Streifen.

18) Die Vielfraßschnecke (**Bulimus decollatus**), trägt eine keglich thurmförmige Schaale, deren Spitze oben wie abgebrochen erscheint. Lebt schon hie und da im südlichen Deutschland.

19) Die Sumpf- und Teichschnecke (**Limnaea stagnalis**), hat eine dünne, leicht zerbrechliche, oben sehr spitzige, unten weit und breit geöffnete Schaale. Die Schnecke mit ihren breiten, zackigen Fühlhörnchen sieht schwärzlich aus. Sie findet sich in unsren stehenden Wassern und frißt Wasserpflanzen.

20) Das Posthörnchen (**Planorbis Vortex**), ist eine runde Röhre, die so um sich selber aufgewickelt ist, wie ein Posthorn. Die Schaale sieht bräunlich aus, die Fühlhörnchen der Schnecke sind mit Borsten, und die Augen stehen unten an ihrer Wurzel. Bringt man an eine solche Schnecke Salz oder Essig, so läßt sie einen röthlichen Saft fließen. Sie findet sich auch häufig bei uns.

21) Das Seeohr (**Haliotis**), ist fast so gebildet wie ein Ohr, und außen meist höckerig, innen perlmutterartig glänzend; nach dem einen Ende hin hat es offene Löcher, wodurch das Thier seine Athemhol-Werkzeuge streckt. Findet sich meist im indischen Meere.

22) Die Napfschnecke (**Patella**), ist wie ein Schälchen oder Näpfchen gebaut. Findet sich an der Meeresküste, und man ißt die Schnecke. Die Gattung der Spaltschnecke (**Fissurella**) gleicht, was die Schaale betrifft, sehr der Napfschnecke, nur hat sie oben am Gipfel der Schaale eine Oeffnung.

23) Die Käferschnecken (**Chiton**), sehen fast

Digitized by Google

wie die Kellerschäfchen oder Asseln aus, können sich auch wie diese zusammenrollen. Sie haben meist 8, verschieden gefärbte, gestreifte und punktirte Rückenschaalen, einen Kopf, der gleichsam verschleiert ist, aber keine Augen noch Fühlfäden. Sie kleben mit ihrem Bauche sehr fest an den Felsen, an welchen sie langsam herumkriechen. Sie haben eine stachliche Zunge. Schon im Mittelmeer, noch mehr in den heißeren Meeren, giebt es verschiedene Arten von Käfermuscheln.

Nackte Schnecken. (Ohne äußerlich sichtbare Schaale.)

24) Die Erdschnecken (**Limax**), sind für unsere Felder und Kohlgärten, besonders in manchen Jahren, gar schädliche Thiere. Die eine Art (**L. sylvaticus**) sieht roth aus mit gelbem Munde, und ist länger und stärker als ein Mannsfinger; eine andere (**L. niger**) sieht schwarz, eine dritte, ganz besonders schädliche, röthlich grau aus (**L. agrestis**). Oben in der Brust findet sich ins Fleisch eingewachsen noch ein ganz kleines Kalkschälchen, außen sieht man keines. Das Loch vorne an der rechten Seite dient zum Athmen. Im Munde steht ein gezähnter, knorplicher Kiefer. Auch im Meere giebt es nackte Schnecken, an denen äußerlich keine Schaale sichtbar ist, z. B.

25) Den Seehasen (**Aplysia depilans**), mit Fühlhörnern, welche hohl sind und deshalb mit Haasenohren verglichen werden. Diese Schnecke, welche fast Fußes lang wird, hat einen ekelhaften Geruch.

C. Die Flügelfüßler (**Alipedia**), haben keinen eigentlichen Kopf, sondern an ihrem Leibe flossenartige Flügelein, mit denen sie sich im Wasser auf und nieder bewegen. In diese kleine Abtheilung von Seethieren gehört das nordische Wallfischaas (**Clio borealis**), das zu Millionen in den nordischen Meeren auf und nieder schwebt, und, so klein es ist, dennoch eine Hauptnahrung des großen Wallfisches ausmacht.

Endlich gehören nun auch noch unter diese Thierklasse:

D. Die Kopffüßler oder Tintenfische (**Cephalopoda**), welche (meist 8) Arme vorn beim Kopfe

Digitized by Google

haben, Arme, an denen viele Saugnäpfe stehen, durch die sich das häßliche Thier festsetzen und ansaugen kann. Es finden sich am Kopf ein Paar sehr vollkommen gebildete Augen, und am Munde meistens eine Art von hornigem Schnabel. Sie sind getrennten Geschlechts.

1) Das Schiffsboot (**Nautilus Pompilus**), lebt in einer schönen, inwendig aus vielen Kammern, durch die ein zum Theil festes, zum Theil häutiges Röhrchen geht, bestehenden Schneckenschaale und schwimmt in den ostindischen Meeren herum.

2) Die eigentlichen Tintenfische (**Sepia officinalis**), aus deren Tintenbeutel die unter dem Namen Sepie benutzte schwarze Farbe, aus deren Rükken der dünne, fast bimssteinartige, leichte Knochen kommt, den man auch zum Poliren gebraucht, ist eins der häßlichsten Thiere in der Welt, welches hinten wie eine Spinne oder Schaaflaus, in einen dicken, sackartigen Leib, vorn in den sonderbaren, mit den höckrigen Saugfüßen besetzten Kopftheil endigt, an dem man die Augen, wie an einer zornigen Katze funkeln sieht.

Zu der Familie des Tintenfisches gehören auch der Kalmar (**Loligo vulgaris**) mit 10 Fangarmen oder Füßen, und der Achtfuß (**Octopus**). Diese Thiere erreichen selbst an unsren Küstengegenden zuweilen eine solche Größe und Stärke, daß sie badende und schwimmende Menschen, indem sie dieselben mit ihren Fangarmen umschlingen, in Todesgefahr versetzen oder ganz unter das Wasser hinabziehen und ertränken können. Und die Seefahrer erzählen uns von Wahrnehmungen, welche sie auf ihren Reisen gemacht haben, die auf eine noch viel riesenhaftere Größe solcher auf dem tiefen Grunde des Meeres lebenden Thiere schließen lassen; Wahrnehmungen, bei denen zwar kein Professor der Naturgeschichte, weder aus München noch aus Paris zugegen war, wohl aber andere Menschen, welche eben so gesunde Augen hatten als ein Professor. Der Mensch, wenn er solche Wunder des Meeres sieht, thut da einen Blick in eine ihm in doppeltem Sinne unergründliche Tiefe: in die des Oceans der Fluthen und der Allmacht.

§. 51. Die vierte Hauptabtheilung des Thierreichs umfaßt jene vollkommneren Thiere, welche unter dem Namen der Wirbelthiere (**Vertebrata**)

begriffen wird, weil ihr Hirn und Rückenmark in einer Höhle eingeschlossen sind, die vom Schädel und der aus vielen Wirbeln zusammengesetzten Rückgratssäule gebildet ist. Diese Ordnung zerfällt in 4 Klassen, deren erste, von unten herauf, die Fische sind.

Die Fische haben ein vollkommenes Rückgrat, sie sind deshalb Wirbelthiere, welche jedoch nicht durch Lungen, sondern durch Kiemen athmen, und ein zwar rothes, dabei aber kaltes Blut haben. Die Kiemen liegen auf beiden Seiten hinter dem Kopfe und werden deshalb im gemeinen Leben fälschlich als Fischohren bezeichnet. Jede Kieme hat in der Regel 4 rothfarbige, aus einer doppelten Reihe von lanzettförmigen Blättchen zusammengesetzte Platten, welche an beweglichen Knochen oder Knorpelbögen befestigt sind. Ueber diesen Kiemenplatten liegt der Kiemendeckel, der sich öffnen und schließen läßt, so wie die Kiemenhaut. Beim Athmen läßt der Fisch, indem er den Mund öffnet und die Kiemendeckel zuschließt, das Wasser durch den Mund über die Kiemenplatten streichen und indem er hierauf den Mund schließt und die Kiemendeckel aufthut, läßt er es zu diesen wieder hinaus. Bei dieser Gelegenheit verbindet sich die Lebensluft der immer im Wasser aufgelösten athmosphärischen Luft mit dem Blute der feinen, auf dem Kiemenblättchen ausgebreiteten, Blutgefäße und reinigt dasselbe (nach S. 277) von seiner Kohle. Die Fische haben, weil nach S. 278 das Blut aus den Kiemen nicht noch einmal zu dem Herzen zurückkehrt, sondern sogleich in die Schlagaderstämme sich sammelt, nur ein einfaches Herz; sie haben vollkommne Augen zum Sehen, und inwendig verborgen die Werkzeuge zum Hören und Riechen. Denn beides können sie recht gut, und man lockt zahm gemachte Fische, z. B. Goldkarpfen, durch den Klang eines Glöckchens herbei, so wie die Fische des Meeres und der Flüsse durch den Geruch eines Köders ins Netz. Die Fische schlafen nicht regelmäßig jeden Tag, sondern sind großentheils bei Nacht in eben so munterer Bewegung als am Tage, dagegen halten viele von ihnen eine Art von Winterschlaf. Sie

Digitized by Google

leben fast alle von größeren und kleineren Thierchen, und manche locken z. B. die kleineren Fische durch ihre wurmförmigen Bartfasern herbei, die sie aus dem Sande oder sonstigem Schlupfwinkel, in dem sie sich versteckt halten, heraushängen lassen; einige, welche Insekten fressen, spritzen, wenn sie z. B. Fliegen an einem Steine sitzen sehen, einen Strahl Wasser darauf, und fangen sie so; noch andere haben die Eigenschaft, den Thieren und selbst den Menschen, auch aus ziemlicher Entfernung, einen so heftigen elektrischen Schlag (Zuckblitz) zu versetzen, daß diese ganz betäubt und gelähmt werden.

Mit Ausnahme der Lungen, von denen man doch auch bei einigen wenigen ausländischen Fischarten Spuren oder unvollkommene Anfänge entdeckt hat, findet man im Innren des Fischkörpers alle die wichtigeren Eingeweide und Theile, die bei den vollkommneren Wirbelthieren gefunden werden: Magen und Darmkanal, eine Leber, zur Gallenabsonderung bestimmt, Milz, Nieren u. s. w. Außer diesen allgemein vorkommenden Organen haben aber die Fische öfters noch ein besonderes, dies ist die im Bauche unterhalb des Rückgrates liegende, mit Luft erfüllte Schwimmblase, die sich, wenn sich der Fisch schwerer machen und im Wasser hinabsenken will, zusammenpressen und im entgegengesetzten Fall wieder ausdehnen läßt. An den Kinnladen, am Gaumen, wie selbst an der Zunge vieler Arten von Fischen stehen Zähne; die äußre Haut ist bei den meisten mit Schuppen bedeckt.

Obgleich es, besonders unter den Meerfischen, einige immerfort verdächtige und einige von Zeit zu Zeit giftige Arten giebt, auch mitunter solche, deren Fleisch schleimig und häßlich schmeckt, so sind doch die meisten eine sehr gute, gesunde Speise für Millionen von Menschen; denn zum Glück für die vielen Menschen und Völker, die fast blos von Fischen leben, sind diese so fruchtbar, daß man z. B. in einem einzigen Karpfenweibchen 200,000, in dem Kabeljau mehrere Millionen Eier zählt. Das Männchen der Fische heißt der Milchner, das Weibchen der Rogner. Das Weib-

Digitized by Google

chen legt seine Eierchen z. B. in den Sand, und der Milchner bringt dann bei den meisten seinen Milchsaft darauf, wodurch die Eierchen belebt werden. Besonders in der Zeit, wo die Fische laichen wollen, machen manche von ihnen gar weite Reisen, bis zu solchen Stellen des Wassers hin, die ihren Jungen zum ersten Aufenthalt am zuträglichsten sind. Denn das fühlt jedes Thier, was für ein Element und Nahrung seinen noch künftigen Jungen am zuträglichsten sey, und das geflügelte Insekt, das doch selber an der Luft lebte, und von Pflanzensäften sich nährte, legt seine Eier ins Wasser oder in modernde Erde; der Lachs, der sich im Meere so wohl befindet, trägt seine Eier oft mehrere 100 Stunden weit in den Flüssen hinauf, bis nahe an ihre süßen Quellen. So fühlt auch jedes Thier deutlich, was ihm selber für die Zukunft am besten ist, und das junge Lachschen, das doch im reinen Gebirgswasser geboren und erzogen ist, fühlt, daß es ins Meer hinunter soll, und muß diesem Zuge folgen: auch der Mensch wird zuweilen von Jugend an durch einen solchen innren, ihm selber unbegreiflichen Trieb geführt, wohin Gott ihn haben will.

Jene Theile, welche am Körper des Fisches am ersten und leichtesten ins Auge fallen, sind zugleich für seine thierische Bewegung die wichtigsten: es sind dies die Flossen. So bemerkt man z. B. am Karpfen oder am Hecht zu beiden Seiten des Körpers 2 Paare von Flossen, ein vorderes und ein hinteres, davon das erstere (das Brustflossenpaar) die Stelle der Vorderfüße, das andere (das Bauchflossenpaar) die Stelle der Hinterfüße der vollkommneren Thierklassen vertritt; denn mittelst dieser Flossen schreitet (schwimmt) der Fisch eben so in seinem flüssigen Elemente fort, als das vierfüßige Thier mittelst seiner vier Füße dies auf dem Lande thut. Schon die Luft, wenn sie in starker, stürmender Bewegung ist, fordert den Körper des vierfüßigen Landthieres, wenn derselbe nicht umgeworfen werden soll, zu einem kräftigen Widerstand auf; der Fisch, in seinem gegen 800fach dichteren Elemente, würde sich gegen die oft sehr starken

Digitized by Google

Bewegungen des Gewässers nicht aufrecht halten können, wenn ihm nicht außer den wagerecht stehenden Brust- und Bauchflossen auch noch mehrere senkrecht stehende verliehen wären, nämlich die Rückenflosse, so wie die hinter dem After stehende Afterflosse und die Schwanzflosse, die ihm zugleich als Steuerruder dient. Wegen der großen Wichtigkeit und zugleich wegen der leichten Augenfälligkeit der Flossen hat man, wie wir nachher erwähnen wollen, nach dem Vorhandenseyn, nach der Anordnung und Beschaffenheit derselben die Fische in verschiedene Abtheilungen gesondert. Noch näher jedoch als die Berücksichtigung dieser äußern Bewegungsorgane muß uns bei der systematischen Anordnung der Klasse der Fische die Beachtung jener Grundzüge ihrer Körperbildung, durch welche sie zunächst von den angränzenden Formen der wirbellosen Thiere sich unterscheiden, nämlich des Baues und der Beschaffenheit des Skeletes, liegen. Denn nicht alle Fische haben, so wie der Hecht und der Karpfen, ein festes, knochenartiges Skelet (Schädel, Rückgrat, Rippen und andre Gräten), sondern bei manchen Familien der Fische, unter welche sehr große Thiere gehören, ist das Skelet von weicher Beschaffenheit und bleibt auch so während des ganzen Lebens, oder nimmt doch erst im Alter eine knochen- (gräten-) artige Festigkeit an. Hiernach theilt man denn die Fische:

§. 52. A. In eigentliche Knorpelfische (**Chondracanthi**), d. h. in solche, deren Skelet auch im Alter nur von knorplicher Beschaffenheit, der Schädel ohne Verbindungsfugen seiner einzelnen Theile (ohne Nähte) wie aus einem Stück gebildet ist, und deren Kiemenapparat von der bei den Fischen gewöhnlichsten Norm mancherlei Abweichungen zeigt. Zu diesen eigentlichen Knorpelfischen zählt man:

1) Den Blindfisch oder Inger (**Gastrobranchus coecus** oder **Myxine glutinosa**). Bei dem ersten Anblick dieses Thieres möchte man dasselbe unbedenklich, so wie die Naturforscher in früherer Zeit thaten, zu den Würmern stellen. Denn sein Körper ist bei

Digitized by Google

einer Länge von 8 bis 10 Zoll so dünn als ein Kinderfinger, ist wurmartig geringelt, endigt nach hinten in einen platten Schwanz, nach vorn in eine runde Saugmündung daran weder die Gestalt eines Kopfes noch eine Spur von Augen zu finden ist, sondern nur 4 Paare von Fühlfäden oder Bartfasern stehen. Wenn man jedoch die knorpelartige, außen ins Blauliche schillernde Hautdecke durchschneidet und den innern Bau des Thieres betrachtet, dann erkennt man allerdings daß es zu den Fischen gehört, denn es hat wie diese ein einfaches Herz mit Kiemengefäßen, eine Leber und Gallenblase, ein nicht in Knoten gesondertes, sondern einfaches, einem starken Nerven gleichendes Rückmark, ein Gehirn von der Größe einer kleinen Erbse. Die Kiemen sind Blasen, deren Ausgänge in eine gemeinsame Röhre vereint, unten am Halse, in 2 Kiemenlöchern münden. An beiden Seiten des Körpers bemerkt man auch kleine, feine Oeffnungen, aus denen ein zäher Schleim in so großer Menge ausgesondert wird, daß wenn man einen Inger in eine ganze Badwanne voll Seewasser wirft, dieses nach wenig Stunden eine klebriche, gallertartige Beschaffenheit annimmt. Im Innern des Mundes finden sich an jeder Seite 2 Reihen spitzer Zähne, welche dem ekelhaften, in lehmigem Meeresboden wohnenden Thiere dazu dienen, sich, wenn es sich mit dem Munde angesaugt hat, in den Körper der nutzbaren Fische hineinzubohren, welche es dann ganz ausfrißt, so daß nichts davon überbleibt als die Schuppenhaut und die Gräten. Der Inger findet sich, zum großen Leidwesen der dortigen Fischer an den Küsten von Norwegen, Jütland und den benachbarten Inseln.

2) Das Neunauge oder Rundmaul (**Petromyzon**) nähert sich dem Blindfisch durch seinen wie ein Saugnapf gestalteten Mund, welcher aus den zu Ringen verwachsnen Kinnladen gebildet wird. Auch das Neunauge hat ein höchst unpollkommenes Skelet, bestehend aus einer häutigen, von zarten knorplichen Ringen umgebenen Rückenmarkröhre, knorplichem Schädel, Kinnladen und einem Knorpel, der als Stellvertreter

Digitized by Google

des Zungenbeins die stempelartig gestaltete Zunge stützt. Selbst die Zähne sind nur knorplich. An jeder Seite des Körpers hinter dem Kopfe zeigen sich 7 rundliche Kiemenöffnungen, die zu kleinen, beutelartigen Höhlungen führen. Die Neunaugen nähren sich von kleinen Wasserthieren und Fischeiern, auch vom Fleisch todter Thiere. Dahin gehört:

a) Die Lamprete (P. marinus) mit mehreren Reihen von Zähnen im Munde. Sie lebt im Meere, kommt aber im Frühjahr in die Flüsse, ist sehr wohlschmeckend.

b) Die Pricke (P. fluviatilis), hat nur eine Reihe von Zähnen. Sie findet sich in Flüssen, besonders in Norddeutschland und wird im Winter gefangen, weil sie nur in dieser Jahreszeit schmackhaft ist. Man versendet sie, einmarinirt, in Fäßchen, durch ganz Deutschland.

c) Das Bachneunauge (P. Planeri), und

d) Die Uhle oder der Kiefernwurm sind kleine Arten, die in unsern Bächen (die erstere in kiesigen, die andre mehr in schlammigen) leben und welche, ihrer wurmförmigen Gestalt wegen, nur selten gegessen, wohl aber als Köder, am Angelhaken, gebraucht werden.

Während die Rundmäuler durch die Unvollkommenheit ihres Baues an die wirbellosen Thiere und zwar an die Ordnung der Weichthiere angränzen, giebt es andre Fische mit einem selbst im Alter knorplichen Skelet, welche sich durch ihren Bau schon sehr einer über den Fischen stehenden, höheren Thierklasse, nämlich jener der Amphibien nähern. Dies ist das Riesengeschlecht unter den Fischen, zu welchem vor Allem gehören:

3) Die Arten des Haifisches (Squalus), haben einen rundlichen Körper, an dessen Seiten die Kiemen-Spalten (5 bis 7 an jeder Seite) stehen; bei manchen finden sich 2 Spritzlöcher zum Ausspritzen des Wassers hinter den Augen. Die Haut der meisten Arten giebt den sogenannten Chagrin. Einige gebähren lebendige Junge, andere geben flache, länglich viereckige Eier, mit horniger Schaale und 4 langen Schnuren an den Ecken von sich.

Der Haifisch ist ein sehr gefräßiger, auch dem Menschen oft gefährlicher Fisch. Denn die größeren Haifische sind im Meere immer hinter und neben den Schiffen her, weil sie riechen, daß da gar viele lebendige Wesen drinnen sind, die

Digitized by Google

sie gerne fressen möchten. Fällt nun einmal ein Matrose von ohngefähr vom Schiff herunter ins Wasser, oder hat etwas im Wasser zu verrichten, so ist oft gleich so ein Haifisch bei der Hand, der ihm ein Bein oder einen Arm abbeißt, auch wohl ihn ganz verschlingt. Man weiß Fälle, daß ein solcher Mensch, zwar von den ungeheuer vielen, 3eckig spitzigen Zähnen, welche inwendig im Rachen wie Blätterreihen einer Artischoke über einander liegen, schlimm verwundet, aber doch am Leben erhalten worden ist, wenn man eine Kanonenkugel noch gerade zur rechten Zeit auf den Fisch abfeuerte. Ein solcher geretteter Matrose zog einmal mit dem nämlichen ausgestopften Haifisch, (den er für Geld zur Schau trug) herum, der ihn schon im Rachen gehabt hatte. Solche die Schiffe begleitenden Haifische, verschlingen übrigens Alles, was man hinauswirft, z. B. ein ganzes, todtes Pferd auf einmal, auch Fässer, todte Menschen, die im Schiff starben, und die man auf ein Brett gebunden ins Meer wirft, mit sammt dem Brett. Oefters fangen die Matrosen den Haifisch so, daß sie ein Stück Fleisch, oder ein todtes Thier an einem Anker befestigen. Der Fisch verschlingt dieses mit sammt dem Anker, wird dann ans Schiff gezogen und getödtet, und sein Thran benützt, auch wohl gar in Zeiten der Noth sein zähes, schlecht schmeckendes Fleisch.

a) Der ächte Haifisch (Squ. Carcharias), der auch Menschenfresser heißt, grau, mit 6 Reihen 3eckiger an den Rändern sägenartig ausgezackter Zähne, welche etwas beweglich (aufrichtbar) sind. Er wird zuweilen bis 100 Centner schwer. Und doch fürchtet sich dieses ungeheuer große Thier so sehr vo einem noch viel größeren und furchtbareren fleischfressenden Wallfisch (man sehe unten die Gesch. der Wallf.), daß es vor Furcht oft ans Land treibt und strandet, wenn es einen kommen sieht. Dagegen ist er selbst die Furcht und das Schrecken der Bewohner des Meeres, so wie der auf ihn schiffenden Menschen, denen er so nachstrebt, daß er öfters sogleich aus der Tiefe herauf kommt, wenn er Menschen reden hört. Das Meer, das vor Alters einmal die Erdoberfläche bedeckt hat, muß sehr große Thiere dieser Art enthalten haben. Denn man findet versteinerte Zähne, welche 70 Fuß langen Haifischen müssen angehört haben.

b) Der Hammerfisch (Zygaena), hat einen breiten, walzenförmigen, wie ein Querbalken ansitzenden Kopf, an dessen beiden Seiten die Augen stehen. Er wird manchmal auch bis 500 Pfund schwer.

c) Der Sägefisch (Pristis), unterscheidet sich durch eine sägenartig gezähnte, breit verlängerte Schnauze.

4) Der Roche (Raja), hat einen breiten, scheibenartig platten Körper, an dessen Seiten die weit-

Digitized by Google

spannenden Brustflossen wie Flügel sitzen und welcher nach hinten in einen dünnen Schwanz sich verlängert; der Mund liegt queer an der untren Seite des in eine spitzige Schnautze auslaufenden Kopfes, an dessen oberer Seite die Augen und hinter jedem ein Spritzloch stehen. Die Kiemenspalten finden sich unter dem Halse. Die Eier der Rochen unter dem Namen der Seemäuse bekannt, sind viereckig, haben eine braune, lederartige Schaale die an den Ecken in 4 spitze Zipfel ausläuft. Zu diesem Geschlecht gehören viele Arten, welche in allen Meeren verbreitet sind, eine rauhe, meist auch noch mit Dornen (namentlich am Schwanz) besetzte Haut und zum Theil überdies am Schwanz einen oder mehrere lange, spitze, gezähnelte Stacheln haben, mit welchem sie gefährlich verwunden können. Wir nennen hier nur einige.

a) Der Glattroche (R. batis) hat nur am Schwanz eine Reihe von Dornen, der übrige Körper ist von einer chagrinartigen Haut bedeckt, unter welcher das zarte, wohlschmeckende weiße Fleisch liegt, das frisch und getrocknet zur Nahrung dient. Aus der Leber wird ein feiner Thran gesotten. Die Glattrochen sind wie alle eigentliche Roggen mehr breit als lang, es giebt zuweilen welche von 1 bis 2 Centner Gewicht.

b) Von dem Nagelrochen (R. clavata), welcher mit gekrümmten Stacheln, ähnlich denen der Rosenstöcke, besetzt ist, benutzt man vorzugsweise die Leber; das Fleisch ist zähe. Auch dieser wird zuweilen Centnerschwer.

c) Die Stechroche (R. pastinaca) hat am Schwanz einen langen, spitzen Stachel, welcher alljährlich durch einen neuen ersetzt wird. Mit dieser gefährlichen Waffe, die selbst zu Pfeilspitzen benutzt wird, sind auch der Adlerroche, R. aquila, und der gehörnte Roche, R. cornuta, versehen. Namentlich der letztere erreicht zuweilen eine so riesenhafte Größe, daß er mit seinen ausgespannten Flügelflossen gegen 2 Klaftern Breite einnimmt, und, wenn er sich wie eine dunkle Wolke auf die armen Perlenfischer herabsenkt, diese durch die Verletzungen seines Stachels oft in Todesgefahr bringt.

Eine freilich nur kleine, aber für den Menschen ungleich furchtbarere Art der Stechrochen (R. hystri) lebt in den Flüssen des heißeren Amerikas, namentlich von Guiana. Dieses grauenhafte Thier vergräbt sich bis an die Augen in den sandigen Schlamm und haut mit seinen Stacheln Menschen und Thiere, die sich ihm nähern. Der Schmerz, den ein solcher Hieb verursacht, ist so gräßlich, daß selbst der stärkste Mann darüber wie von

Digitized by Google

Sinnen geräth, und daß er oft den Tod durch Convulsionen nach sich zieht.

Als ein Anhang zum Rochengeschlecht läßt sich der Zitterroche (R. Torpedo oder Torpedo Narke) anführen, dessen scheibenförmiger ganz glatter Körper von fast rundem Umriß ist und welcher einen fleischigen Schwanz hat. Dieser kann, wenn man ihn anfaßt, sehr starke elektrische Schläge austheilen, wozu ihm die Kraft aus einer Vorrichtung seines Leibes kommt, die aus vielen hundert kleinen, sechsseitig pyramidenförmigen Zellen besteht, welche mit einer gallertartigen Flüssigkeit erfüllt, unmittelbar unter der Haut neben und hinter den Kiemen liegen.

5) Der Stör (Acipenser Sturio), der meist im Meere lebt, geht in der Laichzeit den Lachsen (die er frißt) weit nach in unsre Flüsse herauf (in die Donau, Elbe, Rhein), und man hat schon welche von 9 Ellen, und von der Dicke eines Mannsleibes gefangen (an der Norwegischen Küste 10 Centner schwere, wo allein aus dem Kopfe eine Tonne Thran gesotten wurde). Der Körper ist 5eckig und mit 5 Reihen von großen pyramidalen Hornschildern besetzt; die Kiemenspalte ist einfach, der Kiemendeckel klein, die Kiemenhaut ohne Strahlen; im Innren des Leibes findet sich eine (bei den meisten Knorpelfischen fehlende) Schwimmblase.

Es ist ein zwar sehr starker Fisch, der einem Menschen mit einem Schlage das Bein zerschmettern kann; aber dabei harmlos und ruhig, läßt sich auch leicht fangen. Sein Fang beschäftigt viel tausend Menschen, und man genießt nicht blos sein sehr wohlschmeckendes Fleisch, sondern bereitet aus dem Roggen den Caviar (eingesalzene Fischeier). Es gehört zu diesem Geschlechte auch:

a) der Hausen (St. Huso), der oft noch größer wird und schwerer (bis zu 12 Centnern), als der Stör. Sein Fleisch und sein Roggen werden genossen, und seine Schwimmblase giebt die sogenannte Hausenblase und den Mundleim. Er findet sich besonders im caspischen Meere, und den diesem zuströmenden Flüssen, zugleich aber auch im schwarzen Meer und in der Donau.

b) Der Sterlet (St. Ruthenus), ist nur drei Fuß lang und im caspischen Meere zu Hause.

B. Uneigentliche Knorpelfische, mit unvollkommen entwickelten (verwachsenen) Theilen der Kinnladen (Plectognathi). Bei den hieher gehörigen Geschlechtern nimmt das Skelet meist im Alter

Digitized by Google

eine knochenartige Festigkeit an und zeigt unvollkommene Anfänge der Rippen. Wir nennen nur folgende Arten:

6) Der Kofferfisch (**Ostracion**), ist ein sonderbar eckiger, abentheuerlich, mit einzelnen großen Stacheln gezierter, und wenn diese am Kopfe stehen, fast einem kleinen Stiere gleichender Fisch.

7) Der Stachelbauch (**Diodon**), ist ein kugelrunder, aufgetriebener, ganz mit Stacheln besetzter Fisch, dessen Kinnladen von einer elfenbeinartigen Substanz überkleidet sind. Beide sind nicht eßbar (schleimig, besonders der Stachelbauch, der für giftig gehalten wird), und nur zu Thran zu benutzen. Sie finden sich fast nur in den heißeren Zonen.

Ein gar sonderbares Thier ist der Mondfisch oder Mühlsteinfisch (**Diodon** oder **Cephalus Mola**), der hinten wie abgeschnitten und gleich wie mit einem Bande eingesäumt aussieht, mehrere Centner schwer wird und bei Nacht leuchtet. Er findet sich im Mittelmeer.

Als einen Anhang an die unvollkommenen Knorpelfische kann man betrachten:

8) Die Meernadel (**Syngnathus**), ist ein wurmförmiges, langes, eckiges Fischchen, mit einer verlängerten Röhrenschnauze und mit buschförmigen Kiemen. Dahin gehört das Seepferdchen (**S. Hippocampus**), welches im Tode sich wie ein **S** krümmt. Ferner reiht sich an diese Abtheilung vermöge der knorpelartigen Beschaffenheit seines Skeletes:

9) Der Seeteufel oder Froschfisch (**Lophius piscatorius**), der mit seinem immer offnen, zahnreichen, breiten Rachen, plattem Kopf, nach oben stehenden Augen und vielen Bartfasern ein häßliches Aussehen hat, lauert hinter Seesträuchern den kleinen Fischen auf, die seine Bartfasern für Würmer halten, und darnach schnappen. Er findet sich schon in der Nordsee und im Mittelmeer, lebt einzeln, wird selten gegessen, sondern nur allenfalls zu Thran benutzt, und wird manchmal wohl 3 Ellen lang, von welcher Länge der ungeheure Kopf fast die Hälfte ausmacht.

An die Familie der Froschfische reihen sich auch die seltsam gestalteten Fledermausfische (**Lophius** oder **Malthe**

Digitized by Google

vespertilis) und Krötenfische (L. oder Chironectes histrio) aus wärmeren Küstengegenden an. Die ersteren haben armförmige Brustflossen, und ihr glatter Körper läuft nach vorn, ein Dreieck bildend, spitzig zu, endigt nach hinten in einem dünnen Schwanz.

Ein nur unvollkommen festes, fast knorpelartiges Skelet hat auch:

10) Der Seeboll oder Lump (Cyclopterus Lumpus), bei welchem die Bauchflossen, die unter den Brustflossen sitzen, so verwachsen sind, daß sie eine napfförmige Scheibe bilden, mit welcher sich der Lump gleich einer Schnecke an Steine und andere Gegenstände anhält und fest saugt, lebt in der Ost- und Nordsee. Er hat auf seiner schleimigen Hautfläche mehrere Knochenvorsprünge, wodurch der Körper fast eckig wird. Man findet ihn zuweilen etliche Fuß lang. Er wird gegessen, obgleich das Fleisch etwas weichlich ist.

§. 53. Die Knochenfische oder Grätenfische (Ostacanthi seu Pisces ossei), haben deutliche Rippen, dabei meist dachziegelförmig übereinander liegende Schuppen, eine an beiden Seiten längs des Körpers herunterlaufende Linie (Furche) und die meisten von ihnen besitzen eine Schwimmblase. Man findet unter ihnen mehr Weibchen als Männchen. Man theilt sie nach dem Verhältniß der Flossen in mehrere Ordnungen.

. Kahlbäuche (Apodes), denen die Bauchflossen, welche eigentlich die Hinterfüße der Fische sind, ganz fehlen. Je nachdem sich in der Rückenflosse vorherrschend nur weiche, gegliederte, ästige Strahlen, oder ungegliederte, harte, einfache Strahlen finden, theilt man diese Ordnung, so wie alle die folgenden, in Weichflosser (Malacopterygii) und Stachelflosser (Acanthopterygii).

a) Kahlbäuche mit weichen Flossen (Apodes malacopterygii).

1) Der Zitteraal (Gymnotus electricus), ein großer, aalartiger Fisch aus Südamerika, welchem außer den Bauchflossen auch die Rückenflosse fehlt, und welcher starke elektrische Schläge ertheilen kann, so daß er die

Digitized by Google

ins Wasser hineingetriebenen Pferde, so wie die Menschen, die ihn greifen wollen, oft sehr gefährlich lähmt.

2) Der Aal (**Muraena Anguilla**), mit nacktem, schlangenartigem, schleimig anzufühlenden Körper, an dem die Bauchflossen fehlen, kriecht aus dem Meer und den Flüssen heraus ins Freie (in die Erbsenfelder, deren Früchte er frißt), und wird häufig an den Meeresküsten, auch an todtem Fleisch, das man ins Wasser legte, gefangen. Er hält, im Schlamme versteckt, zu Hunderten einen gesellschaftlichen Winterschlaf.

An der Ost- und Nordsee ist er häufig und war es in älterer Zeit noch mehr, daher damals die Dienstmädchen an manchen Orten, ehe sie bei einer Herrschaft in Dienste giengen, sichs zur Bedingung machten, daß man ihnen nicht öfter als 3mal in der Woche Aal zu essen gäbe. So kann der Mensch auch das Beste zum Ueberdruß bekommen, wenn ers gar zu reichlich und ununterbrochen hat.

b) Kahlbäuche mit Stachelflossen (**Apodes acanthopterygii**) sind folgende:

3) Der Seewolf, Meerwolf (**Anarrhichas Lupus**), verräth seine Raubsucht und Gefräßigkeit schon durch den großen, weiten, mit starken Zähnen besetzten Rachen, der am stumpfen, großen Kopfe sitzt. Die Vorderzähne sind von kegelförmigem Bau, die Backzähne rundlich. Das Thier zermalmt damit Muscheln und Seekrebse, die ihm, fast noch mehr als die Fische, zur Nahrung dienen. Die glatte Haut ist schwarzgrün, die Brust- Seiten- und Schwanzflossen sind weißgrau. Der Seewolf erreicht zuweilen mehr als Mannslänge und sein Fleisch ist wohlschmeckend. Er wohnt in der Ost- und Nordsee.

4) Der Schwertfisch, Kaiserfisch (**Xiphias gladius**), unterscheidet sich schon durch die in einen schwertförmigen Fortsatz verlängerte Oberkinnlade und den Mund, der statt der Zähne nur 12 harte Erhöhungen am Gaumen hat. Er lebt meist nur von Seegewächsen, die er mit seinem Schwert sich abhaut, weniger von Fischen. Er wird zuweilen bis 10 Ellen lang, sein Fleisch wird als sehr wohlschmeckend geschätzt, die eingesalzenen Flossen geben ein Gericht, das man Cadlo nennt.

Digitized by Google

B. Halsflosser oder Kehlflosser (Jugulares), bei denen die Bauchflossen, statt hinter den Brustflossen vor diesen, an der Kehle sitzen. Auch diese Ordnung theilt sich in Weich- und in Hartflosser.

a) Kehlflosser mit weichen Rückenflossenstrahlen (Jugulares malacopterygii).

5) Der Nutzfisch, Stockfisch (Gadus), der wegen seines zarten, weichen Fleisches auch Weichfisch heißt, hat schmale, spitz zulaufende Kehlflossen, der ziemlich langgestreckte, meist rundliche Körper ist mit kleinen, leicht abfallenden Schuppen bedeckt, der glatte Kopf läuft keilförmig zu; die weichen Rückenflossen, 2 oder 3 an der Zahl, sind mit der gemeinsamen Haut des Körpers überzogen. Zu diesem Geschlecht gehören viele, für den Menschen ganz besonders wichtige und nützliche Arten:

a) Der kleine oder gemeine Stockfisch (G. Merluccius), der wegen seiner dem Hechte ähnlichen Gestalt auch Seehecht heißt, hat 2 Rückenflossen, keine Bartfäden und die untere Kinnlade ist länger als die obere. Er sieht grau aus und wird nur etwa 2 bis 3 Fuß lang. Man fängt ihn im Mittelmeere und in der Nordsee, und dörrt ihn häufig zu Stockfisch.

b) Der Leng (G. Molva), der bis 3 Ellen lang wird, hat Bartfäden, einen längeren Ober- als Unter-Kiefer und 2 Rückenflossen. Man fängt und benutzt ihn (vorzüglich in Norwegen) wie den Stockfisch.

c) Der Kabeljau, große Stockfisch (G. Morrhua), der drei Rückenflossen, Bartfasern am Munde und einen stachlichten, ersten Strahl der Afterflosse hat, wird 3 bis 4 Fuß lang und 70 bis 80 Pfund schwer. Man fängt ihn in den nördlichen Meeren zwischen Europa und Nordamerika alljährlich in ungemeiner Menge, ohne daß deßhalb seine Schaaren sich merklich verminderten. Denn ein fruchtbares Weibchen enthält gegen 9 Millionen Eierchen. Eingesalzen nennt man ihn Laberdan, getrocknet Stockfisch und Klippfisch. Vorzüglich aus seiner Leber wird der Fischleberthran bereitet, welcher neuerdings als ein so wirksames Heilmittel z. B. gegen die Gicht empfohlen worden ist.

d) Der Schellfisch (G. Aeglefinus), oben braun, unten und seitwärts silberfarb, mit einem getheilten Schwanz, und 2 Rückenflossen, lebt häufig in der Nordsee und ist auch ein sehr geschätzter Fisch.

e) Der Dorsch (G. Callarias), mit breiter, gebogener und gefleckter Seitenlinie am Körper, ungetheiltem Schwanze,

Digitized by Google

tiefer Furche auf dem gewölbten Nacken, und mit 3 Rückenflossen, lebt vorzüglich in der Ostsee und ist ein sehr vortrefflicher Fisch. Aus seiner Leber gewinnt man den feinen, weissen Fischleberthran.

f) Der Zwergdorsch (G. minutus), wird kaum ½ Fuß lang, ist oben gelblich braun, hat den After gerade in der Mitte des Körpers stehen. Er kündigt durch seine Ankunft an unsern deutschen Küsten gewöhnlich die nahe Ankunft der Schellfische, Dorsche und Kabeljaue an, wird aber auch selber sehr gern genossen.

g) Die Aalrauve, Rutte, Quappe, Aalputte, auch Trusche (G. Lota), ist, wie der Salamander, gelb und schwarz gezeichnet, und die schleimige Haut hat so kleine Schuppen, daß man sie für ganz glatt hält. Die Rutte hat 2 Rückenflossen und an ihrem weiten Maule Bartfäden. Sie wird zuweilen bis 1½ Fuß lang gefangen, ist aber ein schneller, listiger Fisch. Sie laicht bei uns im Dezember. Das zarte Fleisch, besonders aber die Leber, sind sehr wohlschmeckend. Man findet diesen Fisch in allen unsern süßen Wassern. Er ist sehr gefräßig.

b) Kehlflosser mit hartstachlichen Strahlen in der Rückenflosse (Jugulares acanthopterygii).

6) Der Sternseher (Uranoscopus scaber), hat einen warzigen, platten Kopf, mit schief nach oben laufendem Munde, und ganz nach oben stehenden Augen. Zwei Paare von einziehbaren Stacheln dienen nach oben und unten dem Kopf zur Waffe. Der Leib läuft keilförmig zu. Der Sternseher findet sich vorzüglich im Mittelmeere. Er wird höchstens 10 bis 14 Zoll lang. Man ißt ihn.

7) Der Schleimfisch, die Groppe, Aalmutter (Blennius viviparus), die in unsern Meeren lebt und öfters über eine halbe Elle lang wird, gleicht am Kopf einer Kröte, am Leib einem Aale, hat röhrenförmige Nasenlöcher und 2 Fühlfädchen am Munde. Sie ist röthlich braun, und schwarz gefleckt. Die Jungen werden lebendig geboren, ja man sieht sie schon im Mutterleibe herumschwimmen. Man ißt die Groppe selten, denn das Fleisch ist schlecht. Kocht man sie dennoch, so werden die Gräten grün und leuchten im Dunklen.

C. Brustflosser (Thoracici), bei denen

die Hinter- oder Bauchflossen vorne an der Brust, gerade unter den Vorder- oder Brustflossen stehen.

a) Brustflosser mit weichen Rückenflossenstrahlen (**Thoracici malacopterygii**). Dahin gehören:

8) Die Scholle oder Butte (**Pleuronectes**), davon es in unseren Nachbarmeeren: in der Ost- und Nordsee, so wie im Mittelmeere mehrere Arten giebt, ist ein gar sonderbar gebildeter Fisch, dessen Leib ganz platt gedrückt ist, und der Kopf so verdreht, daß beide Augen schief nach einer Seite stehen.

Dieser Fisch schwimmt immer auf einer Seite, die Augen nach oben gekehrt. Er hat ein gar treffliches, wohlschmekkendes Fleisch und wird deshalb frisch und getrocknet verspeißt. Die eine Art: die Heiligenbutte (Pl. Hippoglossus), die sich vorzüglich in den nördlichen Meeren findet, wird manchmal 4 Centner schwer gefangen. Das Fleisch der alten Thiere trocknet man in Island und ißt es statt des Brodes.

9) Der Schiffshalter (**Echenëis Remora**), schließt sich mit seinen sonderbar gebauten Kopfschildern, die sich wie Fensterjalousien zusammen schieben lassen, und an ihrem hinteren Saume gezähnt sind, an Schiffe, große Fische u. s. w. an.

Man hat diese Eigenschaft des Fisches in einigen Küstengegenden der heißeren Welttheile so benutzt, daß man sich seiner zum Fange großer, schlafender Seeschildkröten bediente, indem man demselben vor dem Schwanze einen metallenen Ring anlegte, daran eine Schnur befestigte, deren Länge bis in die Gegend reichte, wo die Schildkröten sich zeigten. Der Fisch, der ein schlechter, bequemer Schwimmer ist, findet den Ausruhepunkt am Bauchschild der Schildkröte bald auf, setzt sich da fest, und man zieht jetzt vorsichtig den Fänger und seinen Fang heran.

b) Brustflosser mit harten Stachelstrahlen in der (ersten) Rückenflosse (**Thoracici acanthopterygii**).

10) Der Silbergürtelfisch (**Gymnetrus cepedianus**), ist seiner Gestalt nach einer der sonder-

Digitized by Google

barsten, seiner Farbenpracht nach einer der schönsten Fische des Meeres. Bei einer Länge von 4 bis 5 Fuß und einer Höhe von mehr als ½ Fuß ist er so dünn wie ein Damengürtel; seine schuppenlose Haut hat die Farbe und den Glanz eines hellpolirten Silberbleches, auf dessen metallisch strahlendem weißen Grunde nach der oberen Seite des Körpers 3 dunkle Flecken; am Rücken, am Schwanz und an der Brust die rothen Flossen gleich purpurnen Franzen stehen. Wie ein breites Band schlängelt und biegt sich der schöne Fisch und ergötzt, wenn er vom Sonnenschein beleuchtet am Ufer hinschwimmt, wenigstens die Augen, wenn auch nicht den Gaumen der Bewohner der Küstengegenden des Mittelmeeres. Denn er hat nur sehr wenig, und schlechtes Fleisch; seine silberartig glänzende Haut wird hin und wieder als Ueberzug über Wachskügelchen, zur Bereitung von Kinderspiel-Perlen benutzt. Der Silbergürtelfisch hat keine Afterflosse; seine Oberkinnlade ist sehr ausdehnbar.

Zu dieser Familie gehören die Arten des Bandfisches (Cepola) mit bandartig dünnem, langen Leibe.

11) Die Meergrundel, der Kühling (Gobius niger), ein kleiner, wohlschmeckender Fisch, der im Frühling an unsern Seeküsten, in der Nähe der Flußmündungen, häufig gefangen wird, ist auf weißlichem Grunde schwarzbraun und gelb gefleckt. Vor allem aber unterscheidet man ihn durch die in einem trichterförmigen Napf verwachsenen Bauchflossen, mit denen er sich, wie der Seelump nach S. 354 Nr. 10., am Boden festsaugt, wenn er da auf die junge Fischbrut lauert. Zwischen den nahe beisammen und weit hervorstehenden Augen finden sich zwei Oeffnungen von ungleicher Größe.

Schon die Meergrundeln können länger als die meisten Seefische außer dem Wasser am Leben bleiben. Noch mehr aber gilt dies von den Arten der ostindischen Cyclopen-Trichterfische, (Periophthalmus) die zwar nicht nur 1, sondern 2 Augen, diese aber dicht aneinander stehend, haben, daß sie wie nur ein gespaltenes Auge aussehen. Diese schießen zur Zeit der Ebbe öfters weit über den Sand- und Schlammboden hin, helfen sich auf dem feuchten Boden, in ziemlicher Entfernung vom Wasser, munter, wie kleine Eidechsen fort, um

Digitized by Google

da ihrer Beute (kleinen Garnelenkrebsen und Insekten) nachzujagen oder ihren Feinden zu entfliehen. Hiezu sind ihnen ihre Brustflossen behülflich, die fast wie Arme gebaut sind.

12) Der Drachenkopf, Meerscorpion, die Dorn- oder Stachelsau (**Scorpaena**), hat einen großen, durch allerhand Einbuchtungen, Stacheln und fasrige Ansätze wunderlich aufgeputzten Kopf.

13) Der Thunfisch oder die Riesenmakrele (**Scomber Thynnus**), zeichnet sich durch die 8 bis 9 kleinen Läppchen-Flossen hinter den 2 Rückenflossen (davon die erste harte Strahlen hat) und hinter der Afterflosse aus.

Er erreicht und übertrifft nicht selten die Größe eines Mannes und hat dann ein Gewicht von 8 bis 10 Centnern, ja zuweilen soll er bis 15 Fuß lang gefangen worden seyn. Er ist ein Raubfisch, findet sich in der Nordsee, im schwarzen Meere, so wie im Mittelmeere zu gewissen Zeiten in großen Schaaren beisammen, die sich durch ihr lautes Plätschern verrathen, und zuweilen den Schiffen nachfolgen. An der Küste von Sardinien fängt man die Thunfische in langen Netzen mit vielen kammernartigen Abtheilungen. Man ißt den Thun frisch und eingesalzen, wie den Häring, und der Fang ist im Mittelmeere so bedeutend, daß allein Sardinien jährlich (wenigstens früher) gegen 40,000 lieferte. Auch der Bosporus, besonders gegen Konstantinopel hin, ist zu gewissen Jahreszeiten überaus reich an Thunfischen. Zur langen Aufbewahrung und weiten Versendung, besonders in der wärmeren Jahreszeit, ist selbst das gut eingesalzene Thunfischfleisch nicht geeignet. Denn es erleidet gar leicht eine Verderbniß, vermöge welcher sein Genuß Erbrechen, Durchfall, ja sogar Magenentzündung und den Tod nach sich ziehen kann.

Zu diesem Geschlecht gehört auch:

Die eigentliche Makrele (**Scomber Scomber**), hat nur 5 Flossenläppchen. Sie ist zwar viel kleiner, als der Thun, dabei jedoch ein arger Raubfisch, der den Häringen nachgeht, und diese öfters von den Küsten verscheucht, dafür aber selbst in ganzen Schaaren gefangen, und, z. B. in Holland, eben so eingesalzen wird, wie die Häringe. Doch genießt man sie lieber frisch.

14) Der Stichling (**Gasterosteus aculeatus**), ist das kleine Fischchen unsrer Teiche und Flüßchen, das unter dem Namen Stachelbauch bekannt ist und sich durch die Stacheln an den Brust- und Rückenflossen auszeichnet. In manchen Gegenden ist er so sehr häufig, und dabei, wegen seiner Stacheln, so

Digitized by Google

wenig geachtet, daß man die Schweine damit füttert, und ihn zu Thran versiedet.

15) Von fliegenden Fischen hat wohl Mancher gehört und gelesen (m. v. u. Nr. 17 u. 24). Wenige aber von dem merkwürdigen kletternden Fische (**Anabas scansor**), der in Trankebar lebt und mittelst der Stachelfortsätze an seinem Kopf und seinen Flossen zuweilen an Palmbäumen und an andern Bäumen hinanklettern soll, wo er das Wasser aufsucht, das zwischen den Palmblättern sich anhäuft und die Gewürme, welche in dem, meist aus dem Baume selbst ausschwitzendem Gewässer leben. Dieser merkwürdige Fisch kriecht auch oft weit auf dem Sande fort und bleibt zuweilen stundenlang freiwillig außer dem Wasser, ja er kann, durch den Menschen dazu gezwungen, mehrere Tage im Freien ausdauern.

16) Der Kaulkopf (**Cottus Gobio**), der auch Rotzkolbe, Gropp, heißt, und einen sehr dicken Kopf, so wie einen zusammengedrückten Leib mit schleimiger, sehr fein geschuppter Haut hat, findet sich in Quellen und Flüßchen und ist an manchen Orten geachtet, denn sein Fleisch schmeckt zwar etwas weichlich, ist aber gesund. Es wird durchs Sieden roth. Das Weibchen scharrt seine Eier in den Sandgrund und soll dieselben sorgfältig bewachen, bis die Jungen ausgekrochen sind.

17) Der Seehahn (**Trigla**), hat an seinen Brustflossen gleichsam Finger: einzelne, nicht durch eine Haut verbundene, lange Strahlen. Dahin gehört:

a) Der Knurrhahn (**T. Gurnardus**), in der Ost- und Nordsee, der von Schaalthieren lebt, und ein gutes, festes, eßbares Fleisch hat.

b) Der fliegende Seehahn, die Seeschwalbe (**T. volitans**), der sich auch schon im Mittelmeer, mehr aber noch bei Brasilien u. s. w. findet, hat große, schön grün und blau gefärbte, dabei noch mit bunten Augenflecken gezierte Brustflossen. Wenn er von Raubfischen verfolgt wird, fliegt er etliche 100 Schritte weit übers Wasser hin, so schnell fortschießend wie Schwalben. Das Fleisch ist etwas hart, aber doch zur Noth eßbar.

18) Der St. Petersfisch, oder Sonnen-

Digitized by Google

fisch (**Zeus Faber**), ist ein von den Seiten her ganz plattgedrückter bleifarbiger Fisch, der an seinem großen Kopf ein spitziges Maul und an den Rückenflossen lange dünnfasrige Anhängsel hat. Auf jeder Seite des Leibes, fast in der Mitte desselben, steht ein dunkler, runder Fleck. Das Fleisch ist wohlschmeckend.

18) Die Arten des Klippfisches (**Chaetodon**), welche in den wärmeren Meeren leben, unterscheiden sich durch ihren sehr zusammengedrückten Körper, der zum Theil fast eben so hoch ja sogar höher als lang und bei vielen Arten mit dunkelfarbigen, bandartigen Streifen geziert ist. Dahin gehört der Spritzfisch (**Ch. rostratus**) aus Java, der aus seinem kleinen, röhrenförmig verlängerten Mäulchen sehr geschickt Wasserstrahlen auf Insekten spritzt, die an Felsenwänden oder Pfählen in der Nähe des Ufers sitzen und diese so gut zu treffen weiß, daß sie aufs Wasser herunterfallen und ihm zur Beute werden.

Mit den Klippfischen verwandt ist der Lanzettträger (Ch. Chirurgus), der an jeder Seite seines Schwanzes einen Stachel hat, welcher so scharf wie eine Lanzette ist, daß man damit wie mit dieser Ader lassen kann. Diese Art findet sich an den Antillen.

19) Der Flußbarsch (**Perca fluviatilis**), mit einem geschuppten und gezackten Kiemendeckel, und pfriemenförmigen, dichten Backenzähnen, zwischen denen noch viele kleine, borstenförmige stehen, fällt, wenn er in klarem Wasser steht, schon durch seine schöne grüngelbe Goldfarbe, mit 5 bis 7 dunklen Queerstreifen, und durch die violetten und blutrothen Flossen auf. Er wird oft bis 4 Pfund schwer. Sein Fleisch ist weiß und schmackhaft. Er stirbt in Menge, wenn der Blitz ins Wasser schlägt. Er vermehrt sich stark in unsern Flüssen und ist ein Raubfisch. Zu diesem Geschlecht rechnet man auch:

a) Das Amaul oder den Sander (**P. Lucioperca**), mit bräunlichem, blau und röthlich punktirten Rücken und silberfarbenen Seiten. Die Gestalt hat einige Aehnlichkeit mit der eines Hechtes, auch ist der Sander ein Raubfisch.

b) Der Zindel, Zingel (**P. Zingel**) ist gelblich von Farbe mit braunen Streifen. — Die eben erwähnten Barsch-Arten haben zwei Rückenflossen, dagegen hat nur eine:

Digitized by Google

c) Der schwarzpunktirte Kaulbarsch oder Schroll (P. cernua) mit dickem Kopf, an welchem viele Grübchen sind, grünlichem Rücken, gelblichen Seiten, weißlichem Bauche. Dieser ziemlich gemeine Fisch wird meist nur 6 bis 8 Zoll lang, ist aber dennoch, seines trefflichen Fleisches wegen, geschätzt. Ihm ähnlich, nur gelber und mit 2 braunen Strichen an der Seite des Leibes bezeichnet, ist

d) Der Schrätser oder Schnätser (P. Schraetser), der sich in der Donau, Etsch u. s. findet.

Daß auch bei den Fischen dem gar zu schönen, bunten Scheine nicht viel zu trauen sey, zeigt der schöne, prächtig bunte Giftbarsch (P. venenosa), der auf blauem Grunde scharlachroth punktirt ist und an den Flossen gelb gesäumt. Der Genuß seines Fleisches erregt öfters Lähmungen, heftiges Erbrechen und tödtlichen Durchfall. Dieser Fisch lebt indeß nicht bei uns, sondern in den amerikanischen Gewässern.

20) Die Seebarbe, Rothbart (Mullus Surmuletus und barbatus), heißt so wegen der beiden langen Bartfäden, die an der Unterkinnlade stehen. Dieser Fisch hat fast die Gestalt eines Häringes, nur ist er breitrückiger, der Kopf nach vorne abschüssiger gebaut und die großen Schuppen sehr leicht abfällig. Die Farbe ist schön morgenroth, beim Surmuletus goldfarbig gestreift, die Größe selten $\frac{1}{2}$ Fuß. Die alten Römer bezahlten zuweilen für dieses wohlschmeckende Fischlein in Jahreszeiten, wo es noch sehr rar war (wie etwa bei uns die frischen Bohnen im Winter), mehrere hundert Gulden.

21) Der Meerjunker, bandirte Lippfisch, (Labrus Julis), ist ein nicht viel mehr als fingerlanges Fischlein, mit vorschiebbaren, dicken Lippen und kleinem Munde, das an der Seite seines schlankgestreckten Leibes ein orangefarbenes Zickzackband auf blaulichem Grunde hat. Er lebt im Mittelmeere und saugt sich zuweilen den Badenden an ihre Füße an.

Die Familie der Lippfische (Labrus), zu denen der Meerjunker gehört, enthält sehr viele, in den verschiedensten Meeren wohnende, öfters mit bunten Farben gezierte Arten, welche sämmtlich durch ihre doppelten, fleischigen Lippen, welche die Kinnladen ganz bedecken, sich auszeichnen.

D. Bauchflosser (Abdominales), deren Bauchflossen wirklich, wie Hinterfüße, hinter den Brustflossen, am Bauche stehen. Die

Digitized by Google

meisten der hier anzuführenden Geschlechter sind Flußfische, mit weichen Rückenflossen-Strahlen.

a) Bauchflosser mit weichstrahlichen Rükkenflossen (**Abdominales malacopterygii**).

22) Die Schmerle, Bartgrundel (**Cobitis Barbatula**), ist das kleine, bei uns meist nur bis fingerslange Fischlein mit 6 Bartfädchen, welches als ein beliebtes Gericht genossen wird. Die Schmerlen saugen sich gern an den Wurzeln der am Wasser stehenden Erlenbäume an, und erhalten dadurch einen angenehm bitterlichen Geschmack. Die Dorngrundel, Steinschmerle (**C. Taenia**), hat unter dem Auge einen Stachelfortsatz und an den Seiten vier Reihen von braunen Flecken.

Der Wetterfisch, Bißgurre (**C. fossilis**), der oft fußeslang gefunden wird, und der bei uns unter dem Namen Schlammpeizger bekannt ist, kann einen pfeifenden Laut von sich geben. Wenn man ihn in Gefäßen mit Wasser und Sand hält, zeigt er durch sein Unruhigwerden Witterungsveränderungen an. Er hat 10 Bartfasern, der braune Leib ist der Länge nach gelb gestreift, der Bauch orangefarb und schwarz punktirt.

23) Der Wels (**Silurus Glanis**), der auch Schaitfisch und Waller heißt, hat eine ganz glatte, schuppenlose Haut, einen platten, großen Kopf und 6 Bartfäden am Mund, davon das obere Paar sehr lang und gegliedert ist. Er wird zuweilen über einen, ja bis mehrere Centner schwer in unsern großen Flüssen, z. B. in der Donau gefangen, und ist dann so dick, daß ihn ein Mann kaum umklaftern kann, und über 5 Ellen lang. Der Wels lockt kleine Fische durch seine Bartfädchen an, und frißt sie. Das Fleisch ist sehr fett und wohlschmeckend, aber etwas schwer zu verdauen.

An die Familie der Welse schließt sich das Geschlecht des merkwürdigen amerikanischen Höhlenfisches (**Pimelodus Cyclopum**) an, der bei vulkanischen Ausbrüchen aus der verborgenen Tiefe der unterirdischen Seen, in welchen er lebt, zuweilen in so ungeheurer Menge ausgeworfen wird, daß seine verwesenden Massen die Luft weit umher verpesten.

24) Die Meerwachtel (**Exocoetus, z. B. volitans und exiliens**), mit sehr langen Brustflossen,

Digitized by Google

die sich, meist in den wärmern Meeren, in großen Schaaren findet, und eben so groß ist wie ein Häring, auch diesem ähnlich sieht, ist auch ein fliegender Fisch, der schon manchmal armen, ausgehungerten Schiffsleuten zu ihrer Rettung gesendet worden ist, wenn er, vom Flug ermattet, in ganzen Haufen auf die Schiffsverdecke hinstürzte, so daß sie ihn mit Händen greifen konnten. Er hat ein sehr wohlschmeckendes Fleisch.

25) Der Häring (Clupea Harengus), den sein kielförmig scharf zulaufender Bauch und sein gezähnter Mund auszeichnen, kommt zwar nur im Meere vor, ist aber, besonders eingesalzen, in ganz Deutschland und allen Ländern von Europa als wohlschmeckender Fisch so allgemein beliebt, daß ihn wohl Jeder kennt.

Der Häring wird in sehr großer Menge in der Nord- und Ostsee und in den amerikanischen Meeren (zusammen jährlich gewiß zu 1000 Millionen) gefangen. Er lebt den größten Theil des Jahres in der Tiefe des Meeres, kommt aber jährlich 3mal ans Ufer, um zu laichen, wo dann der Zug einen dicht gedrängten, vorne spitzigen, nach hinten breiteren Keil bildet. In Norwegen drängen sich dann oft viele Millionen in einer einzigen Bucht zusammen. Man bemerkt dabei, daß im Frühling die kleinsten, im Sommer die größten, im Herbst die mittelgroßen heraufkommen. Der Häringsfang dauert nun schon manche hundert Jahre, und ist besonders seit 400 Jahren, seitdem durch einen gewissen Beukelen das Einsalzen der Häringe erfunden wurde, außerordentlich bedeutend. Und doch giebt es noch Häringe genug, weil sie sich ganz überaus häufig vermehren (in einem einzigen Weibchen zählte man gegen 70,000 Eier).

Die Sardelle (Cl. Encrasicolus), ist eine kleine, etwa fingerslange Häringsart, die auch im Meer gefangen, und meist gesalzen verspeist wird.

26) Der Stutzkopfhering, (Erythrinus) ist für die Bewohner mancher heißen Länderstriche, besonders von Amerika, ein eben so wichtiger, nutzbarer Fisch, als für die Bewohner der nördlichen und westlichen Küstenländer von Europa der Häring. Er unterscheidet sich von diesem durch seinen nach vorn wie abgestutzten, stumpfschnauzigen Kopf und einen mehr rundlichen Umriß des Körpers. Er hat ein sehr wohlschmeckendes Fleisch, das freilich, wie bei den

Digitized by Google

Häringen, von sehr vielen, dabei aber zarten Gräten durchzogen ist. In manchen Flüssen von Guiana ist namentlich der einfach bandirte Stutzkopfhäring (**E. unitaeniatus**) so überaus häufig, daß eine kleine Zahl von Fischern in wenig Stunden über **1000** Stück fängt, wobei sie sich der Säfte einiger dort wachsenden Pflanzenwurzeln oder Saamen bedienen, welche, wenn man sie ins Wasser streut, so wie die Krähenaugen die Fische betäuben.

27) Auch der Rauhkopfhäring (**Sudis gigas**), der als ein Riese unter den Flußfischen seines Vaterlandes, des wärmeren Amerika, von Mannslänge und darüber gefunden wird, dabei aber dennoch ein zartes Fleisch hat, gehört zu dieser Familie. Er zeichnet sich durch die sehr rauhkörnige Außenfläche seines knochigen Kopfes aus.

28) Ein Fisch von ganz besonders merkwürdiger Bildung ist der sehr seltene Flossenfußfisch oder Bischir (**Polypterus Bichir**), welcher einen schlangenartig verlängerten Körper, einen Kopf, der dem des Hechtes ähnlich ist, und Brustflossen hat, deren Obertheil fußartig gestaltet, nach unten in die Flossenstrahlen ausläuft, so daß das Thier damit eben sowohl kriechend als schwimmend sich bewegen kann. Der Bischir zeichnet sich auf den ersten Blick durch die Reihe von kleinen Flossen aus, die auf seinem Rücken steht. Sein Kopf ist mit rauhen Knochenschildern belegt, sein Körper von den fest mit einander verwachsnen Schuppen wie mit einem Panzerhemd überzogen, das man, selbst wenn der Fisch gekocht ist, nicht mit dem Messer durchschneiden kann, sondern im Ganzen abziehen muß. Dieser Fisch lebt im Nil, tief unten im Schlamm des Bodens, und kommt deshalb nur sehr selten in die Hände der Fischer, obgleich diese sehr nach seinem Fange trachten, weil er wegen seines wohlschmeckenden Fleisches in hohem Preise steht.

29) Die Karpfen (**Cyprinus**), haben vorschiebbare Lippen, und keine Zähnchen im Maule.

Es giebt sehr viele Arten davon, z. B.

a) Den gemeinen Karpfen (**Cypr. Carpio**). Dieser

hat 6 Bartfäden, und war ursprünglich nur im südlicheren Europa zu Hause, von wo er seit dem Jahr 1512 nach England, seit 1560 nach Dänemark versetzt wurde. Doch ist er in nördlichen Gegenden immer kleiner und sparsamer, auch nicht so gut wie in südlicheren, daher aus Preußen jährlich viele Schiffsladungen nach Stockholm und Petersburg gehen, wo man den Karpfen, welcher hier bei uns der gemeinste Fisch ist, fast allen den vielen, herrlichen Seefischen, die man dort so in Menge hat, vorzieht, und ihn für die größte Delikatesse hält. So gefällt fast an jedem Orte das Gute, das ein andrer Ort genießt, besser, als das Gute, was er selber hat, und es wäre gut, wenn die Menschen es auch im Geistigen so mit einander machten, und Jeder das Gute, was der Andere hat, höher hielte, als das Gute, was er selber zu haben meint. Aber da machens die Leute gerade umgekehrt, und Jeder hält da leicht sein Gutes für das Beste. — Der Karpfen frißt modrigen Schlamm, Insekten, Würmer Mist, besonders Schaafsmist und allerhand, für den menschlichen Haushalt unbrauchbare Abgänge aus der Küche, namentlich von Gemüsen, sowie Kürbisse und faulendes Obst. Er ist deshalb bei dieser seiner Genügsamkeit leicht zu unterhalten und zu mästen. Es giebt noch jetzt, besonders in Ungarn, so wie auch bei uns manchmal in kleinen Landseen, ungemein große Karpfen, und man hat schon 4 bis 5 Fuß lange und 70 Pfund schwere gefangen. Solche Thiere waren vielleicht mehrere hundert Jahre alt, denn so alt soll der Karpfen werden können. Die alten Karpfen sind dann auch sehr listig und überaus schwer zu fangen. Am Dniester macht man aus den Eiern der großen Karpfen Caviar. Will man Karpfen in einen Teich setzen, so rechnet man auf einen Rogner 2 bis 3 Milchner. Wenn ein Karpfen 10 Jahre alt ist, kann er 8 Pfund wiegen. Außer diesem erwähnen wir noch von den vielen Karpfenarten:

b) Die Schleie (C. Tinca), findet sich in langsam fließenden oder stehenden, schlammigen Wassern aller Länder. Sie wird bis 8 Pfund schwer. Das Fleisch ist zart und fettig, die flachgeschuppte Haut ist mit dickem Schleim überzogen. Sie hält, so wie die Karpfen, in ganzen Gesellschaften, Winterschlaf im Schlamm, und kann sich in nur einigermaßen feuchtem Schlammboden ziemlich lange am Leben erhalten. Ihre Flossen sind violett, die Seiten oft grünlich oder gelblich gefärbt, an den Mundwinkeln stehen 2 kurze, dünne Bartfasern.

c) Der Blei, Brachsen (C. Brama), der sich in nördlichen Wassern viel häufiger als bei uns findet, kann auch bis 12, ja bis 20 Pfund schwer und 3 Fuß lang werden. Man erkennt ihn an dem breiten, platten Leibe, an dem starkgebogenen, schwarzgrünen Rücken, silberfarbenen Seiten, an der weißen Farbe des Bauches und der Kehle, an der schwärz-

Digitized by Google

lichen der Flossen. Er ist ein scheuer Fisch, den schon das Läuten der Glocken zum Fliehen bringt. Mit ein wenig Brod in Branntwein getaucht im Munde, oder in Schnee gepackt, kann man ihn, wie den gemeinen Karpfen, wohl 20 Meilen weit lebendig versenden.

d) Der Orf (Orfus), mit etwas vorstehendem Oberkiefer, findet sich im südlichen Deutschland öfters in Teichen, und ist schön orangegelb. — Manche andere Arten dieses Geschlechts wollen wir nur nennen und kurz beschreiben: — e) Die Karausche, Gareis (C. Carassius) ist sehr breit und wird nur etwa eine Spanne lang. — f) Die Plötze, Rothfeder (C. erythrophthalmus) hat rothe Flossen und gelblichrothe Augenringe, wird etwa ein Pfund schwer. — g) Das Rothauge (C. rutilus) hat auch rothe Flossen und zugleich rothe Ringe um die Augen. — h) Der Kühling, Frauenfisch, Nerfling (C. Idus) ist sehr länglich und nach unten ganz gerade, wird gegen 8 Pfund schwer. — i) Der Aland, Göse, Gengling (C. Jeses) hat einen dicken, abgestutzten Kopf, blaulich eingefaßte Schuppen und violblaue Flossen. Das Fleisch wird beim Kochen gelblich und ist wohlschmeckend. Er lebt gerne in schnellfließenden Wassern und wird über 6 Pfund schwer. — k) Der Häßling, Hasel, Aitl, oben dunkel olivengrün, am Bauche weiß, hat ein wohlschmeckendes, aber sehr grätenreiches Fleisch. Er lebt meist von schwarzen Blutigeln. — l) Die Lauben, der Weißfisch (C. Leuciscus) mit kleinem Kopf. — m) Die Nase, der Schnäzer, mit vorstehendem Oberkiefer (C. Nasus). — n) Der Seerüßling, die Zärthe (C. Vimba) — o) Die Ellritze (C. Phoxinus) und p) der Bitterling (C amarus) gehören auch hieher, so wie q) der Gründling, Kreßling (C. Gobio). r) Die Barbe (C. Barbus). — s) Der Güster (C. Blicca). Endlich gehört auch noch hieher: — t) Der chinesische Goldkarpfe (C. auratus), der in China und Japan von den allerschönsten Farben vorkommt, und sich durch den grossen Kopf vor andern Karpfen auszeichnet, ist auch in den Springbrunnen und kleinen Teichen unsrer europäischen Lustgärten öfter zu sehen. Am Tage erfreut er das Auge durch seine schöne morgenrothartige oder silberne Farbe, und selbst im Dunkeln wirft er einen Schein, wie glühende Kohlen von sich. Der Bau der Flossen ist an diesem zahmgemachten Fisch so veränderlich wie der Bau und die Farbe unsrer zahmen Hunde, Tauben u. s. w.

30) Der Salm oder Lachs (**Salmo Salar**), zeichnet sich in allen seinen Arten durch seinen (meistens rothen) gefleckten Körper, durch die spitzen langen Zähne und die hintere Rückenflosse aus, welche blos häutig ist, keine Knochenstrahlen hat.

Digitized by Google

a) Der eigentliche Lachs, den man, so lange er jung ist, Salm, dann erst Lachs nennt, hat einen kleinen, keilförmigen Kopf mit etwas vorstehendem Oberkiefer. Er lebt von kleinen Fischen, Würmern, Insekten. Er findet sich im Winter in vielen Meeren der alten und neuen Welt, doch nicht im Mittelmeere. Im Frühling und Sommer geht er in Flüsse, und kommt dann in manchen Ländern von Asien und Amerika in solchen dichten Schaaren, daß viele so nahe ans Ufer gedrängt werden, daß sie selbst die Hunde mit den Zähnen herausziehen. Bei uns ist er zwar so häufig nicht, es werden aber jährlich, besonders im Rheine, in der Elbe u. s. w. welche gefangen, wobei man bemerkt, daß immer dieselben alten Lachse (die man durch Ringe an den Flossen bezeichnet hatte) wieder an denselben Laichplatz zurückkehrten, eben so wie die Schwalben wieder in ihre alten Nester. Dabei ziehen sie in der Laichzeit in 6 Wochen gegen 100 Meilen weit in einem Flusse hinauf, mithin jeden Tag 3 Meilen weit, wobei sie, wenn ihnen ein Wasserrechen oder kleines Wehr im Wege steht, wohl 3 Fuß hoch und noch höher springen, und sich so hinüber schnelzen, daß sie den Schwanz nach dem Maul hin beugen und dann plötzlich fahren lassen. Auf diese Weise versuchen sie es sogar an dem 70 Fuß hohen Rheinfall hinauf zu springen, was ihnen aber freilich nicht gelingt. Rothe Farbe (z. B. rothe Tücher) und auch Flößholz kann sie verscheuchen. In Schottland fängt man oft 80 Pfund schwere. In Deutschland sind die im Rhein und in der Weser die besten. Dahin gehören auch:

b) Die Forelle (S. Fario), (rothgefleckt; mit einem Unterkiefer, der etwas länger ist als der Oberkiefer) hält sich in hellen, frischen Bergwassern auf, laicht im September, und lebt meist von Würmern. Man hat zuweilen bis zu 8 Pfund schwere gefunden.

Von der Gattung der Salme leben auch noch in unsern Seen und Flüssen, besonders in gebirgigten Gegenden:

c) Die Lachsforelle (S. Trutta) mit rothen und schwarzen Punkten, die von einem helleren Kreise umgeben sind. Sie wird oft 8 bis 10 Pfund schwer.

d) Der Huche, Hurchen (S. Hucho) mit braunen und gelben Flecken, auf dem Rumpf und auf den Flossen, (außer den Brustflossen) der oft über 4 Fuß lang und über 40 Pfund schwer wird.

e) Der Salbling oder Schwarzreuter (S. Salvelinus), am Rücken braun, an den Seiten mit orangefarbenen, weiß eingefaßten Flecken, wird auch öfters etliche Pfund schwer.

f) Der Silberlachs, Illanken (S. Schiffermuelleri oder S. Ilanca), ist dem Lachse sehr ähnlich und wird gegen 50 Pfund schwer.

g) Die Aesche, Asch, (S. Thymallus), grau, mit

Digitized by Google

dunklen Längsstrichen, die große hohe Rückenflosse mit mehreren Reihen rother und brauner Punkte bunt gezeichnet, ist ein sehr wohlschmeckender Fisch, der jedoch meist nur ein Gewicht von 1, selten von etlichen Pfunden erreicht.

h) Der Renke, das Blaufellchen (S. Wartmanni), heißt im ersten Jahre Riedling, und zeichnet sich durch seine bläuliche Farbe und den zahnlosen Mund aus. Er ist wegen seiner Menge und seines Wohlgeschmacks gleichsam der Häring unsrer süddeutschen Seen.

i) Der Stint (S. Eperlanus), mit einem ins Grüne und Blaue spielenden, spindelförmigen Körper, der so durchsichtig ist, daß man die Rückenwirbel und im Kopf das Gehirn sehen kann, so wie mehrere andre, ganz vorzüglich zarte und wohlschmeckende Fische dieser Gattung, finden sich in den nördlichsten Seen und andren Landwässern, und manche Arten, die man bei uns als die größte Delikatesse achten würde, sind in Lappland und Grönland so gemein, daß man sie getrocknet fast wie das tägliche Brod verspeist. So ist dafür gesorgt, daß auch jene armen Länder manches recht vorzüglich Wohlschmeckende, in eben solchem Ueberfluß haben, wie Arabien seine Datteln.

31) Der Hecht (Esox Lucius), mit vereinigten Bruststrahlen, langen, vorstehenden, gefurchten Kinnladen voll spitziger Zähne, deren gegen 700 in einem Hechtrachen stehen, mit hornartigen, sehr festsitzenden Schuppen, findet sich (Spanien und Portugal ausgenommen) in allen Süßwassern von Europa, und ist ein greulich gefräßiger Raubfisch.

Unter allen unsern gemeinen Fischen wächst er am schnellsten, denn er kann in 6 Jahren 4 Fuß lang werden. Man hat welche gefangen, so lang und dick wie ein Mann, und man glaubt, daß sie ein mehr als hundertjähriges Alter erreichen können. Solche alte Hechte haben aber hartes Fleisch, während das von jüngeren im Allgemeinen sehr geachtet wird. Eine andere Art ist:

Der Hornfisch (E. Belone), der sich in allen Meeren findet, und im Mittelmeer zu Tausenden gefangen wird. Hat eine sehr lange Schnautze und grüne Gräten.

b) Bauchflosser mit hartstrahliger Rükenflosse (Abdominales acanthopterygii). Hier ist nur zu erwähnen:

32) Die Meeräsche, Multe, Meeralant (Mugil Cephalus), heißt auch Großkopf, wegen ihres großen, dicken Kopfes, der in seinen Kinnladen, dessen untere mit ihrer Schärfe in eine Einbuchtung der obern paßt, keine Zähne hat, sondern blos an der Zunge

und am Gaumen. Große Schuppen bedecken den Kiemendeckel, so wie den übrigen Körper. Die Meeräsche wird bis über 1 Fuß lang und findet sich auch in unsern Meeren.

Als Anhang zu der Beschreibung der Fische mag hier noch die des Sirenenfisches (**Lepidosiren**) folgen, von welchem man noch nicht weiß, ob man ihn zu den Amphibien oder zu den Fischen rechnen soll, denn er hat (was freilich auch beim **Gymnarchus niloticus** der Fall ist) Lungen und Kiemen zugleich. Er ist von aalförmiger Gestalt, hat aber Brust- wie Bauchflossen, seine Rücken-, After- und Schwanzflossen sind mit einander verbunden; die Nasenhöhlen öffnen sich in die Mundhöhle, vorn hinter den Lippen. Das Skelet ist nur von knorplicher Beschaffenheit. Man kennt 2 Arten, davon die eine in Brasilien, die andere in Südafrika lebt.

§. 54. Die Klasse der Amphibien (**Amphibia**) oder Kruper, das heißt der kriechenden Thiere, enthält sehr ungleiche, äußerlich einander sehr unähnliche Arten von Thieren: Schlangen, Eidechsen, Frösche, und Schildkröten, die aber alle (im Vergleich mit den Vögeln und Säugethieren) kaltes Blut und ohne Ausnahme auch Lungen haben, obgleich manche von ihnen wenigstens einen Theil ihres Lebens hindurch (als Quappe) auch durch Kiemen athmen, und deshalb, weil hier ein doppelter Weg des Lebensverkehres mit der Luft stattfindet, den Namen **Amphibia** (zweiseitig Lebende) rechtfertigen. Uebrigens geschieht bei den Amphibien das Athemholen weder so regelmäßig, noch ist es so unentbehrlich zur Fortdauer des Lebens, als bei Vögeln und Säugethieren, indem sie ziemlich lange ohne dasselbe am Leben bleiben können, was ihnen durch den Bau ihres Herzens möglich wird, an welchem sich zwar 2 Vorkammern, dabei aber meistens nur eine eigentliche Herzkammer findet, aus welcher das Blut der Blutadern, ohne erst in die Lungen zu gehen, gleich in die Schlagaderstämme treten kann. Es sind überhaupt Thiere von sehr zähem Leben, die zwar nicht, wie eine alte Sage vom Salamander erzählt, im Feuer,

Digitized by Google

wohl aber sogar in dem warmen Magen von Menschen und andern großen Thieren eine Zeit lang am Leben bleiben, und auch eine Reihe von Jahren in Eisschollen von Gletschern eingefroren seyn können, ohne zu sterben. Bei manchen von ihnen wachsen einzelne abgeschnittene Glieder wieder; alle können sehr lange ohne Nahrung leben, welche nur bei wenig Arten aus dem Pflanzenreiche, bei den meisten aus dem Thierreiche entnommen wird.

Die Amphibien brauchen nicht täglich zu schlafen, die meisten aber halten (meist in Gesellschaften) einen Winterschlaf. Viele können am Lande und im Wasser leben; einige sind nur in der ersten Zeit ihres Lebens im Wasser, andre aber freilich auch (wie die Wasserschildkröten) werden am Lande ausgebrütet, und gehen erst von da ins Wasser. Es sind meistens stumpfsinnige Thiere, die sehr alt werden. Viele legen Eier, andre gebähren lebendige Junge.

Man kann sagen, daß die Klasse der Amphibien an zwei verschiedenen Seiten ihres Umkreises an die Klasse der Fische sich anschließt, oder daß sie gleichsam in zwei verschiedenen Wurzeln und Stämmen aus jener niederern Stufe der thierischen Gestaltungen sich hervorhebt und entwickelt. Der eine dieser Stämme beginnt nach unten mit den Salamandern und Fröschen, deren Vermehrung auf die Weise der Fische geschieht, deren Junge anfänglich eine fischartige Körperform haben und durch Kiemen athmen, deren Geschäft bei den meisten Arten später durch die Lungen übernommen wird. Manche Arten der oben (S. 353 und 354) erwähnten Frosch- und Krötenfische zeigen schon in ihrer äußeren Gestalt Annäherung an die eigentlichen Froscharten.

Der andere Stamm gränzt durch die Schlangen an die Klasse der Fische, unter denen es, wie wir vorhin sahen, manche schlangenförmige Arten giebt, so wie unter den Schlangen wieder sehr unvollkommene, die in Bau und Eigenschaften der niederern Thierklasse nahe stehen.

Jeder der beiden Stämme hat seine eigene Gi-

Digitized by Google

pfelform, der erstere, der mit den Fröschen und Salamandern anhebt, erreicht seinen Gipfel in den Gestaltungen der Schildkröten, der andere, der mit den Schlangen beginnt, hat ihn in der Ordnung der Eidechsen, welche die vollkommensten Amphibien enthält. Wir wollen zuerst den einen, dann den andern Stamm betrachten.

§. 55. Die Nackthäuter, welche auch nach der Mehrzahl der hieher gehörigen Amphibien, Froschartige (Ranaceae) genannt werden, unterscheiden sich durch ihre nackte, schuppenlose Haut, zahnlosen Mund, so wie dadurch, daß sie, wo nicht für immer (wie der Proteus), so doch für ihre erste Lebenszeit außer den Lungen auch Kiemen haben. Es gehören hieher:

A. Geschwänzte Nackthäuter.

1) Der Salamander oder Molch (Salamandra), wovon es mehrere Arten giebt, z. B. eine, die auf dem Trocknen lebt, mit rundem, mehrere, welche im Wasser leben, mit plattem Schwanze, ist gelblichroth und braun gefleckt, und ist in jeder Hinsicht, namentlich auch darin, daß er keine Rippen hat, daß seine Jungen anfangs Quappen sind u. s. w., den Fröschen und Kröten gleich.

Die Landsalamander (S. terrestris), sind dumme, träge Thiere, die nur bei trübem oder nassem Wetter oder in der kühlen Dämmerung aus ihren Schlupfwinkeln in feuchten Erdhöhlen, an Quellen oder Bächen, sich weiter hinaus ins Freie wagen. Man hat ihnen sonst viel nachgesagt, z. B. daß sie im Feuer leben könnten, da sie doch mit dem weißen Saft, den sie aus ihrer Haut von sich geben, nur etwa einige glimmende Köhlchen auslöschen können. Auch hat man ihnen nachgesagt, daß sie ungeheuer giftig wären. In einem kleinen Städtchen des sächsischen Erzgebirges, erzählt man, lebte ein Doctor, der glaubte, er hätte ein Gegengift gegen alle Gifte erfunden. Er probirte das erst an dem Gift, welches er fürs allerstärkste hielt, am Molch, und weil dieser nicht eigentlich giftig ist, sondern nur ein wenig scharfen Saft aus der Haut von sich giebt, der kaum die Haut roth macht, so schadete ihm das nichts, und der Mann machte schon viel Aufhebens von seinem Gegengifte. Jetzt probirte ers an Kreuz-

Digitized by Google

spinnen, die man damals auch noch für sehr giftig hielt, und das Ding that auch gut. Jetzt versuchte ers nun auch ohne Weitres mit einigen hübschen Portionen Arsenik, Sublimat, Bleizucker und andern solchen Zuckerarten, und mußte, trotz seinem Gegengifte, sterben. Außen an dem Begräbniß, auf dem Gottesacker, ist er abgebildet, abgezehrt bis auf Haut und Knochen. — Man muß nicht immer gleich aufs Meer hinausgehen, wenn man auch noch so gut in einer Badewanne auf des Müllers Bach herum geschwommen ist.

2) Der Proteus, Höhlensalamander (Proteus, Hypochthon), ist gleichsam ein Thier aus einer ganz andern Welt, aus der er nur zuweilen durch die Gewalt der Elemente herauf an unsre schöne, von der Sonne und Gestirnen beschienene Erdoberfläche verschlagen wird. Denn eigentlich ist er ein Bewohner der uns ganz unbekannten Unterwelt: lebt in jenen unterirdischen Seen und Wasserbehältnissen, deren Tiefe und eigentlichen Umfang der Mensch nicht kennt und auf welche nie ein Strahl von oberirdischem Lichte fällt. Für das gewöhnliche, obere Tageslicht sind daher die Augen dieses Bergmännleins verschlossen, denn sie liegen, als kleine, dunkle Pünktlein unter der freilich ganz durchsichtigen Haut. Dennoch würde dieser Blindgeborne, wenn er reden könnte, vom Wundern der Allmacht Kunde geben können, von denen nicht blos die vom Tage beschienene Erdoberfläche, sondern auch die Tiefe voll ist. Man fängt den Proteus, der 4 Füße, (die vordern mit 2, die hintern mit 3 Zehen) und Kiemen wie die Fische, zugleich aber auch Lungen in seinem fast durchsichtig zarten Körper hat, in den Wasserbehältnissen der großen Adelsberger Höhle bei Triest und in dem Gruben-Wasser, das die unterirdischen Canäle des Zirknitzer Sees zuweilen ausstoßen. Die auf solche Weise zu uns heraufkommen, sind meist nur eine Spanne lang; in den Oeninger Schiefern hat man aber Ueberreste von einem Thier entdeckt, das zu der Familie der Wassersalamander und des Proteus gehörte und welches fast von menschlicher Größe war. Ein solches aufgefundenes Gerippe wurde auch lange Zeit für das eines Menschen der Vorwelt gehalten.

Digitized by Google

B. Die ungeschwänzten Nackthäuter, denen außer den Rippen auch der Schwanz fehlt. Dahin gehören:

1) Die Kröte (**Rana Bufo**), mit kurzen platten, ungleichen, durch eine kleine Schwimmhaut vereinigten Vorderzehen, dickem, warzigen Körper und Hinterfüßen, die kaum so lang als der Körper sind, kommt in ihren verschiedenen Arten fast in allen Erdgegenden vor; die eine dieser Arten, welche namentlich in den heißesten Ländern von Amerika (auch in Afrika) lebt, die Riesenkröte (**Bufo marinus**), erreicht die Größe eines Tellers; ihre ekelhaften Warzen sind wie große Bohnen.

Und doch scheuen sich dort die Neger so wenig vor ihr, daß sie sie nicht bloß todt machen und essen, sondern auch, wenn sie Kopfweh haben von der heißen Sonne, eine nehmen, und sie an die Stirne halten. Auf der Landenge von Panama in Amerika sind sie so häufig, daß man, wenn es geregnet hat, fast keinen Tritt bei Nachts aus dem Hause thun kann, ohne auf eine zu treten. Unsere einheimischen Kröten, davon die gemeine (B. cinereus) überall, in ganz Europa zu finden ist, sind keineswegs giftig, doch spritzen sie, wenn sie erzürnt oder erschreckt werden, eine Flüssigkeit (Urin) von sich, und zugleich dringt aus den Warzen und Wülsten des Halses ein scharfer, weißer Saft hervor. Auch geben die Kröten im Zorne einen Knoblauchgeruch von sich, der bei der braunen (B. fuscus) in Sümpfen lebenden so scharf ist, daß einem, wenn man das Gesicht in die Nähe des Thieres bringt, die Augen davon übergehen. Die Kröten legen im Frühjahr ihre Eier, die in langen Schnüren vereint sind, im Wasser ab, es gehen Kaulquappen daraus hervor, die aber nach einigen Wochen ihre Fischschwänzchen ablegen, ihre Vorderfüße bekommen und nun in Menge am Land herumkriechen und hüpfen. Die Alten kriechen nur in der Dämmerung und bei Nacht herum, und fressen Insekten und Würmer. In einem Hause hegte man einmal viele Jahre lang eine zahme Kröte, an der die Familie des Hauses ihr Vergnügen hatte. Sie kam Abends aus ihrem Loch hervor, ließ sich auf einen Tisch setzen, und bekam dann Fliegen und anderes Futter. Die Kröten können sehr alt werden. Man findet manchmal noch lebendige in Bäumen und Sand- oder Kalksteinen, die da schon manches Jahr gesteckt haben mögen, bis der Baum zugewachsen, oder die Oeffnung des Steins von außen geschlossen worden ist. Zu den Kröten gehört auch die Unke oder Feuerkröte (B. igneus), bekannt durch ihr „Unk unk"-Geschrei.

Digitized by Google

2) Die Pipa (**Pipa dorsigera**), mit sehr langen, rundlichen, an ihrem Ende 4spaltigen Vorderzehen und mit Hinterfüßen, welche kürzer als der Körper, an den Zehen aber mit Schwimmhäuten versehen sind, ist eine mächtig große brasilianische Kröte, von der das Weibchen die Eier, nachdem sie dieselben gelegt, in den Warzenzellen seines Rückens gleichsam ausbrütet.

3) Der gemeine Frosch, mit Hinterfüßen, die länger als der Körper sind (**Rana esculenta**), ist jedermann, sowohl als Ei (Froschlaich), dann als rundes Quäppchen mit breitem Schwanze und als ausgewachsner Frosch bekannt genug. Man ißt seine Schenkel.

4) Der Laubfrosch (**Hyla arborea**), sieht im Sommer schön grün aus, und hat kleine runde Ballen an den Zehen, womit er sich an Blättern festklebt. Man hält ihn als einen kleinen Wetterpropheten in den Häusern. Er sowohl, als die Kröte, legen ihre Eier ins Wasser (in Teiche, um welche viel grünes Gesträuch herum steht, wo man sie in der Laichzeit schreien hört, mit einem Tone, der den Schlittenschellen gleicht). Aus den Eiern werden auch bei ihnen zuerst geschwänzte Quäppchen, und dann vierbeinige Fröschchen.

§. 56. Die Schildkröten, haben eine feste Schilderschaale über und um den ganzen Leib, und nur vorne kommen aus einer Oeffnung der Kopf, an den Seiten, aus 4 Oeffnungen, die Füße, hinten der Schwanz heraus. Ihre schneidenden Kinnladen sind ohne eigentliche Zähne. Sie haben ein außerordentlich zähes Leben und können sogar mit ausgeschnittenem Gehirn oder geöffneter Brust noch einige Zeit leben.

1) Die Riesenschildkröte (**Chelonia Midas**), ist so groß wie ein mittelmäßiger Tisch (fast mannslang) und hat breite, flossenartige Schwimmtatzen.

Dieß ist ein sehr nutzbares, harmloses Thier, das blos Seetang frißt, seine Eier auf Inseln und Küstengegenden in den Sand scharrt, und dann in großer Menge gefangen wird, indem ihm die Leute den Rückweg nach dem Meere verrennen und es mit starken Hebebäumen auf den Rücken wenden, wo es

Digitized by Google

sich dann nicht sobald wieder aufhelfen kann, sondern leicht getödtet wird. Wenn die Jungen aus den Eiern gekrochen sind, laufen sie spornstreichs nach dem Meere zu, ohne daß ihnen Jemand den Weg zu zeigen braucht. Und es ist nöthig, daß sie eilen, denn die Wasser-Vögel und andere Thiere, die schon manches Ei aufgefressen haben, lauern den jungen Thierlein auf, und nehmen sich davon, so viel sie wollen. Der Ueberrest der ins Meer will, muß da auch noch eine starke Gränzmauthung erleiden, denn dort lauern Raubfische auf ihn. Die Riesenschildkröten schmecken gut und sind eine gesunde Speise.

Eine mit der Riesenschildkröte verwandte Art, die Caretta, kann tüchtig zubeißen, so daß selbst kleine Krokodile die rückwärts, mit dem Schwanz zuerst in eine Höhle hineinkriechen, wo die Caretta sitzt, das empfinden müssen. Aus den schönfarbigen Platten des Rückenschildes dieser Thierart wird das Schildpadd gewonnen, welches zu Kämmen und andern kleinen Kunstsachen verwendet wird.

2) Die Landschildkröte (Testudo), hat kurze, nicht sehr deutlich abgetrennte Zehen, vorn mit 5, hinten mit 4 dicken, kegelförmigen Nägeln. Dahin gehört die gelb und braun geschilderte griechische Schildkröte (T. graeca), die schon bei Triest und in mehreren Gegenden von Italien gefunden wird. Sie legt in ihrem wärmeren Vaterlande gegen Ende des Juni 30 bis 40 Eier, so groß wie Taubeneier, aus denen die Jungen im September auskriechen, hält Winterschlaf und hat ein wohlschmeckendes Fleisch. Sie kann über 60 Jahre alt werden.

3) Die Flußschildkröte (Emys europaea), welche 5 deutliche mit einer Schwimmhaut verbundene Zehen mit langen Klauen und ein grünlich graues Schild mit dunklen Flecken hat, kommt sogar in unsern deutschen Küstengegenden vor und wird manchmal in unsern Lustgärten, an kleinen Teichen, zur Belustigung gehalten. Sie frißt Würmer, auch Fische, ist daher kein guter Nachbar für die Goldkarpfen in unsern Fischteichen.

Die nützlichste und darum wichtigste Art, welche zu diesem Geschlecht gehört, ist die Arrau-Sumpfschildkröte (Emys Arrau). Diese erreicht eine bedeutende Größe und ein Gewicht von 30—40 Pfund. Sie kommt in Schaaren von Hunderttausenden in den Monaten Januar bis März auf die Sandbänke und sandigen Ufer der Orenoccomündungen, gräbt ihre Eier, welche die Größe eines Taubeneies

Digitized by Google

haben, und von sehr fester Schale umgeben sind, hundertweis in den Sand, und kehrt, wenn sie dieses Geschäft bei Nacht verrichtet hat, am Tag wieder zurück ins Wasser. Die Indianer sammeln diese Eier, werfen sie in einen Wassertrog und zerstampfen sie. Unter den Strahlen der Sonne sondert sich das Oel des Dotters und schwimmt oben auf, wird dann abgeschöpft, gesotten und in Krüge gebracht, in denen es versendet wird. Es dient, wie unser Baumöl, als Zusatz zum Salat und als Brennöl.

4) Die Tyrse (**Trionyx aegyptiacus**) mit weichem, breiten Rückenschild und sehr schmalem Bauchschild, 5 durch eine starke Schwimmhaut verbundenen Zehen, davon 3 mit starken Zehen bewaffnet sind, scharf schneidenden Kinnladen und einem kleinen Rüssel, wird einige Schuh lang. Sie lebt im Nil und andern afrikanischen Flüssen, frißt Fische, junge Schildkröten und andere Amphibien, selbst Wasservögel, deren sie durch schnellen Angriff sich bemächtigt. Sie kann stark beißen.

Zu dieser Familie gehört die Beißschildkröte (**Tr. ferox**) in Nordamerika, die auch mehrere Schuh lang und bis 30 Pfund schwer wird. Obgleich sie gegen ihre Angreifer mit scharfen Bissen sich zur Wehre setzt, wird ihr dennoch häufig nachgestellt, weil ihr Fleisch seines Wohlgeschmackes wegen noch höher geschätzt ist, als das der Seeschildkröte.

§. 57. Die Schlangen (**Serpentes**), vereinigen in ihrer Gestalt wie in ihrem Benehmen die widersprechendsten Eigenschaften. An ihrem langgestreckten, mit Schuppen bedeckten Körper finden sich weder Füße noch Flossen, noch andere solche Gliedmassen und doch können viele Arten so schnell wie ein Pfeil fliegt über den Boden hinweg oder an einem Baum hinaufschießen, andere schleudern sich, indem sie sich mit dem Schwanz an einen Zweig aufhängen, über eine ziemlich weite Strecke hinüber, oder sie schnellen sich, nachdem sie vorher spiralförmig sich zusammenringelten, hoch hinan gegen Thiere und Menschen. Von Thieren, welche keine äußerlichen Gliedmassen und Vertheidigungswaffen haben, scheint auf den ersten Blick wenig zu fürchten, und doch giebt es unter den

Digitized by Google

Schlangen die furchtbarsten Thiere der Erde, furchtbarer als der Tiger und Löwe sind, weil sie im Verborgenen lauern und durch ihren Biß den schleunigen Tod bringen, in Stunden und an Orten, wo man an keine Gefahr dachte. Die Schlangen sind so klug als boshaft, kalt wie lüstern, so scheinbar träge als reizbar und zornwüthig; ihre wüthende Rachsucht kennt keine Gränzen; wenn ein Mensch, etwa in Indien, das Unglück hat, durch sein Anstoßen mit dem Fuße den Zorn einer giftigen Schlange zu reizen, und dann, noch ehe ihn ihr Biß traf, in schnellstem Laufe ihr entflieht, bis er sich der Gefahr entronnen glaubt, folgt ihm dennoch, verborgen unter dem Gras oder Gebüsch das furchtbare Thier, und versetzt ihm, wenn er sich dessen nicht mehr versieht, die Todeswunde. Zugleich sind die Schlangen, obgleich viele von ihnen mit den buntesten Farben prangen und wie Juwelen glänzen und gleißen, die ekelhaftesten unter allen Thieren; wahrhaft Verbündete der Fäulniß und Verwesung, denn die Nahrungsmittel, welche wohl nur in Thieren bestehen, und welche von den Schlangen nicht eigentlich gekäut, sondern ganz hinunter gewürgt werden, gehen alsbald in ihrem Körper in eine fäulnißartige Auflösung über, daher auch der Hauch der Schlangen einen Gestank oder widerwärtigen Moschusgeruch verbreitet und bei manchen Arten etwas Betäubendes an sich hat. Jene schnelle, faulige Auflösung der gebissenen Thiere wird namentlich auch durch das Gift bewirkt, das sich bei vielen Schlangen in einer Speicheldrüse absondert, welche unter- und hinterwärts den Augen liegt, und von starken Muskeln bedeckt ist, die beim Zubeißen das Gift aus der Drüse heraus in die Giftzähne pressen. Diese Zähne, welche in der Oberkinnlade stehen, sind meist hakenartig krumm gebogen und gleichen einer mehr oder minder geschlossenen Rinne oder Röhre, in deren Höhlung das Gift herabströmt, und durch eine seitwärts neben der Spitze gelegenen Oeffnung in die Wunde ausfließt. Während der Ruhe des Thieres sind die Giftzähne nach

Digitized by Google

hinten zurückgeschlagen, beim Zubeißen erheben sie sich nach vornen.

Die Schlangen lassen sich, wenn ihre natürliche Bosheit durch Furcht gebändigt ist, zu allerhand Bewegungen abrichten. Die meisten von ihnen legen Eier, manche Arten gebären aber auch ihre Jungen lebendig. Sie gerathen schon durch eine geringe Kälte in Erstarrung, deßhalb halten viele von ihnen eine Art von Winterschlaf, während dessen sie sich in ganzen Schaaren in ihren meist unterirdischen Schlupfwinkeln zusammenhäufen. Die Wärme dagegen vertragen sie vortrefflich, so daß sie selbst in heißen Ländern, die von der Sonne durchhitzten Steine oder Sandflächen aufsuchen, um sich daran zu wärmen. Wir theilen die Schlangen, nach jener Eigenschaft, welche uns Menschen die auffallendste an ihnen ist, in (entschieden) giftige und in ungiftige, und erwähnen, indem wir nur die wichtigsten Gattungen hervorheben, zuerst:

A. Die giftigen Schlangen (**Aspides**). Während die ungiftigen Schlangen in ihrer Oberkinnlade 2 Reihen von Zähnen haben, welche eben so wie die in einfacher Reihe stehenden der Unterkinnlade etwas nach hinten gebogen sind, zeigt sich dagegen bei den giftigen nur eine Reihe von Zähnen (die der Gaumenzähne) in der Oberkinnlade und statt der andren steht an jeder Seite der schon vorhin beschriebene röhrenförmige Giftzahn im Oberkieferbein, welches auf leicht bewegliche Weise am Keilbein des Schädels eingelenkt ist. Ueberhaupt sind bei diesen, wie bei allen Schlangen, die einzelnen Theile der Kiefern so beweglich, und lassen sich so aus einander schieben, daß es hierdurch der Schlange möglich wird, Thiere, welche viel dicker sind als sie selber, ganz in den Rachen hinunter zu würgen.

Von dieser widerwärtigen Thierfamilie leben, besonders in den schönen Palmenländern, wo es so tausendfältige bunte Blumen, herrliche Früchte und kostbare Edelsteine giebt, so viele furchtbar giftige Arten, deren Biß in wenig Minuten tödtet, daß einem schon dieß allein jene schönen Länder gar sehr verbittern kann. Denn, wenn man oft seine Hand nach

Digitized by Google

einer prächtigen Blume oder Frucht ausstreckt, oder sich auf einen smaragdgrünen Rasen niedersetzen will, da schießt eine giftige Schlange heraus, und nimmt alle Freuden sammt dem Leben selber weg. Ja, nicht einmal in seinem eignen Hause ist man davor sicher, und jene Schlangen verbergen sich selbst in den Schlafkammern, fahren plötzlich, wenn man eine Thür öffnet, auf einen herein, verstecken sich selbst unter den Bettstellen. Darum will ich denn doch lieber in meinem Lande bleiben, wo es zwar keine Palmen- und Bananenfrüchte, aber doch auch nicht so viele giftige Schlangen, Scorpionen und Tiger giebt, und es ist doch gut, daß jedes Land seine Freuden, aber auch jedes in demselben Verhältniß seine Plage hat, und daß, wo viel Lust, auch viel Last ist. Freilich ist auch die Furcht vor giftigen Schlangen zu überwinden, und in den Ländern, wo es die vielen giftigen Arten giebt, gewöhnen sich die Menschen am Ende so sehr daran, daß ein Missionär, der auf den Nicobar-Inseln wohnte, mit seinen dicken Lederstiefeln, einem Stocke mit einem Stachel, und einem großen Filzhut bewaffnet, ordentlich auf den Fang der giftigsten Schlangen, (die er für Naturalienliebhaber in Europa sammelte) wie auf eine Lustjagd ausging. Er reizte die Schlange mit dem Stocke zum Zorn, wenn diese dann auf den Stock losfprang, hielt er seinen groben Filzhut wie einen Schild hin, die Schlange biß wüthend hinein, und nun riß er ihr die krummen Giftzähne, die ganz locker in den Kinnladen stehen, und die sich in den Filz verwickelt hatten, heraus, und brachte das Thier um.

Die wichtigsten Gattungen, welche hieher gehören, sind folgende:

1) Die Klapperschlange (**Crotalus horridus**), unterscheidet sich durch häutige, dürre, gliederweise in einander gefügte Klapperstücken am Schwanze.

Diese ist eine der abscheulichsten und furchtbarsten unter allen Schlangen, und es ist ein Glück für uns, daß sie so weit von uns weg in Amerika lebt. Sie wird zuweilen (doch in den bewohnten Gegenden, wo man sie immer mehr ausrottet, seltener) 6 Fuß lang und 18 Zoll im Umfang gefunden. Ihre tückischen Augen funkeln wie glühende Kohlen, die schwarze gespaltene Zunge bewegt sich immer hin und her. Sonst ist die Farbe des Thieres traurig und häßlich grau oder braun, mit unregelmäßigen schwarzen Flecken und Streifen. Jedes Jahr setzt sich am Schwanze ein neues Klapperstück an. Alte Colonisten in Amerika erinnern sich, daß sie sonst welche mit mehr denn 40 Klapperstücken gesehen haben, jetzt findet man sie nur noch etwa mit 12 in der Nähe der Colonien. Sehr oft verräth sich die Nähe dieses furchtbaren Thieres, dessen Biß einen Menschen in wenig Minuten tödten kann, theils durch den abscheulichen Geruch, den eine solche

Digitized by Google

Schlange von sich giebt, theils aber auch durch das Klappern des Schwanzes bei jeder Bewegung. Ist es jedoch nasses Wetter, dann klappert sie nicht, und ist so am gefährlichsten. Zuweilen werden wohl Menschen, die von Klapperschlangen gebissen waren, durch die Anwendung der kräftigsten Mittel wieder geheilt, aber sie behalten dann für immer an den gebissenen Theilen Schmerzen, die von Zeit zu Zeit heftig wieder kommen, auch bleibt ihnen eine Schwäche zurück. Die Klapperschlangen vermehren sich sehr stark, und die Colonisten, die zwar manche, besonders wenn sie im Winter schaarenweise in ihren Löchern erstarrt liegen, umbringen, würden nicht im Stande seyn, sich ihrer großen Anzahl zu erwehren, wenn nicht wahrscheinlich diese Schlangen, wie alle böse Thiere, Alte mit den Jungen im Kriege lebten und wenn nicht die Sumpfvögel und andere Thiere, vorzüglich das zahme Schwein, viele vertilgen hälfen. Denn in einem Weibchen hat man oft über 70 lebendige Junge angetroffen. Nach älteren und neueren Nachrichten soll diese Schlange wirklich eine gleichsam trunken machende (betäubende) Eigenschaft gegen kleine Thiere, von denen sie lebt, ausüben, wodurch diese immer näher zu ihr hingezogen, und so leicht von ihr verschlungen werden, was allerdings auch eine Folge der Todesfurcht und Angst seyn kann. Der Geruch und die Annäherung von frischen Blättern und Zweigen der Eschen soll die Klapperschlange in die Flucht treiben.

Der Klapperschlange an Gestalt und Eigenschaften sehr nahe verwandt und ähnlich, doch statt der eigentlichen Klappern nur mit einem Stachelansatz am Schwanze versehen, ist die südamerikanische Buschotter, von den holländischen Colonisten in Surinam der Buschmeester genannt (**Crotalus mutus** oder **Cophias crotlainus**). Diese erreicht eine Länge von 8 Fuß und dabei die Dicke eines Mannsschenkels. Lebt in Wäldern, kriecht bei Nacht auf das Feuer zu. Ihr Biß tödtet nach wenig Stunden. Zum Glück ist sie träge, wird deshalb oft getödtet und ihr Fleisch von den Indianern und Negern gegessen.

2) Die Grubenotter (**Trigonocephalus atrox**), eine der giftigsten Schlangen der Erde, wird den Bewohnern der heißesten Länder von Amerika eben so furchtbar durch ihr tödtliches Gift als durch die Größe ihres Körpers und durch die Menge, in welcher sie vorkommt. Sie kann eine Länge von mehr als sechs Fuß und die Dicke von mehr als ½ Fuß erreichen, und alljährlich gebiert ein Weibchen wenigstens einmal gegen 50 bis 60 lebendige Junge. Zum Glück ist sie träge, lauert zusammengerollt in Gebüschen liegend auf ihre Beute, und wird oft von

Digitized by Google

dem Jäger erlegt, ehe sie sich zum Sprung gegen ihn entschließt. Doch stirbt an den Bissen dieser Art, so wie der gelben (**Tr. lanceolatus**), die auf den westindischen Inseln vorkommt, alljährlich eine Menge Menschen.

3) Die Brillenschlange (**Naja**), unterscheidet sich dadurch, daß ihre Halsrippen beweglich sind, und daß sich hierdurch der Hals zu einer breiten Scheibe ausdehnen läßt. Bei der in Indien lebenden eigentlichen Brillenschlange (**N. tripudians**) zeigt sich am Nacken eine braune Zeichnung, welche die ohngefähre Gestalt einer Brille hat, daher ihr Name. Das Gift dieser Schlange ist so furchtbar stark, daß ihr Biß gewöhnlich nach wenigen Minuten tödtet, und dennoch richten sie die indischen Gaukler zu künstlichen Tänzen ab, wobei das Thier, auf seinen Schwanz gestützt, mit dem Kopf und Körper aufrecht steht und allen Bewegungen, welche der Gaukler mit seiner Faust macht, folgt. Die heidnischen Bewohner von Indien erweisen diesem furchtbaren Thiere göttliche Ehre, und wagen es nicht, auch wenn es sogar in ihre Hütte kommt, und daselbst Tod und Verderben drohet, dasselbe zu tödten.

Eine andre Art von Brillenschlange, die Haje (**N. Haje**) genannt, welche ihren Hals nicht so weit ausbreiten kann wie die indische, lebt in Aegypten. Auch diese Art ist sehr giftig, wird aber von den dortigen Schlangenfängern häufig zu Tänzen und allerhand Gaukeleien abgerichtet.

4) Die Otter, Viper (**Vipera Berus**), bräunlichgrau, mit einem dunkleren Zickzackband über den Rücken, lebt in Europa. Ihr Biß macht heftige Geschwulst und Entzündung, tödtet auch zuweilen. Aetzendes Laugensalz (Ammoniak-Spiritus) oder eine starke Säure, z. B. Vitriolöl, gleich in die frische Wunde gebracht, hebt die Folgen des Schlangenbisses öfters auf. Zum Glück ist diese Schlange in Deutschland bei weitem nicht so häufig, als die ungiftige Natter.

5) Sogar im Wasser, auf dem Grunde der Flüsse oder am Meeresboden, lebt in manchen heißen Ländern eine höchst giftige Schlange, von welcher badende Menschen oder Fischer oftmals tödtlich verwundet wer-

Digitized by Google

den: die Wasserschlange (**Hydrus Pelamys**), die sich durch den breitgedrückten, platten Schwanz unterscheidet. Ohngeachtet dieser ihrer Furchtbarkeit, wird doch die eine Art: die zweifarbige Wasserschlange (**P. bicolor**) von den Otaheitiern, wenn sie dieselbe in ihren Netzen mit heraufziehen, gegessen.

B. Die ungiftigen Schlangen (**Colubrini**), unterscheiden sich durch den Mangel der Giftzähne. Sie kommen viel häufiger in der Natur vor als die giftigen, und man nimmt gewöhnlich an, daß es gegen 8mal so viel Arten von ungiftigen Schlangen giebt, als von giftigen. Unter jenen ersteren, den ungiftigen, finden sich viele sehr schönfarbige Thiere. Nur die ganz großen, wie die Riesenschlangen, können dem Menschen, so wie größeren Thieren gefährlich werden, die kleineren sind sogar nützlich, weil sie Ratten, Mäuse und andere schädliche Thiere vertilgen.

6) Die Riesenschlangen (**Boa** und **Python**), mit verdicktem, nach vorn abschüssig und platt zulaufendem, deutlich vom Leibe abgesetztem Kopfe, so wie mit langem, dünnen Schwanze und zwei zurückziehbaren Fußstacheln (Klauen) am After, leben nur in den wärmesten Ländern der Erde.

Sowohl in den heißesten Gegenden von Amerika als von Asien und Afrika giebt es Riesenschlangen, welche zuweilen eine Länge von 30 Fuß erreichen. Bei den amerikanischen Arten ist der Kopf blos mit Schuppen bedeckt und die Bauchschilder unter dem Schwanze (hinter dem After) sind ungetheilt. Für diese hat man den Namen **Boa** oder Riesenschlange im engeren Sinne beibehalten. Die bekannteste hieher gehörige Art ist die Kaiserschlange (**Boa constrictor**), die sich ziemlich häufig in Südamerika findet und durch ihr zierlich, mit braunen Flecken gezeichnetes Fell unterscheidet. Sie nährt sich meist von kleineren Säugthieren, bis zur Größe eines Rehes. Eine andere Art von Boa, der Anakondo genannt (**B. Scytale**), welche sich durch eine doppelte Reihe runder, schwarzer Flecken auf dem Rücken auszeichnet, hält sich viel im Wasser auf, weil sie den Fischen nachstellt. Sie soll zuweilen eine Länge von mehr als 30 Fuß erreichen.

Die Gattung **Python** hat an der Spitze der Schnautze Schilder und eine doppelte Reihe von Bauchschildern unter dem Schwanze. Diese Gattung, deren Arten in den heißesten Ländern von Asien und Afrika leben, heißt Abgottsschlange, weil viele entartete Völker, welche nur das sclavisch verehr-

Digitized by Google

ten, was ihnen furchtbar war, nicht aber dem Gott Ehre bezeugten, der uns liebt und den wir wieder lieben sollen, mit jenem häßlichen Thiere Abgötterei trieben. Die eine, bekanntere Art der Abgottsschlangen lebt auf Java, Sumatra, Borneo, und heißt deshalb die javanische Riesenschlange oder auch Ular Sawa (Pyth. javanicus). Sie wird 20 bis 30 Fuß lang, und vermag Kälber, Ziegen so wie ohne Zweifel, wenn sie deren habhaft werden kann, auch Kinder zu verschlingen. Von allen Arten der Riesenschlangen gilt es, daß sie bei kühlem Wetter, wie etwa die Regenzeit mit sich bringt, unbeweglicher werden, so daß schon Reisende, die durch Grasgegenden kamen, wo eine solche Schlange in der kühlen Zeit der Regenmonate wie erstarrt da lag, sie für einen Baumstamm hielten, aber freilich erschrocken genug davon flohen, wenn sie bemerkten, daß sich der vermeintliche Baumstamm zu bewegen anfing. Denn wenn diese gefräßigen Schlangen sich recht satt gefressen haben, dann liegen sie einige Zeit ganz still, und können sich, wie gelähmt, gar nicht bewegen. Dann suchen sie die Neger oder Indianer auf, und schlagen sie todt, ziehen ihnen ihr buntes Fell ab und genießen das Fleisch, was so fett seyn, und so schmecken soll, wie Schweinefleisch. Uebrigens lassen sich auch zu andern Zeiten die Neger und Indianer mit der Riesenschlange in siegreiche Kämpfe ein, und die Europäer schießen die amerikanischen Arten häufig mit Schroten todt.

7) Die Ringelnatter (Coluber Natrix), ist stahlfarbig, mit weißen Seitenflecken am Leibe, die besonders am Halse recht groß und deutlich sind, und da meist ins gelbliche fallen, so daß es aussieht, als wenn die Natter ein Halsband hätte. Das ist bei uns die am häufigsten vorkommende Natter, welche, weil sie die Leute immer mit der Otter verwechseln, und sie für giftig halten, gar oft unschuldiger Weise leiden muß. Und doch ist sie durchaus ungiftig, und wird sogar dadurch nützlich, daß sie, wenn man sie, wie die Italiener zuweilen thun, in den Häusern hält, eine Menge Mäuse und anderes Ungeziefer vertilgt. Sie säuft auch Milch, und geht den Milchtöpfen oft in die Höfe und Keller nach. Es hat sonst sehr große Schlangen dieser Art gegeben. Die Ringelnatter legt Eier, fast so groß als Taubeneier, die in Schnüren zusammenhängen.

Die Aesculapsnatter (C. Aesculapii), mit breitem Kopf, 6eckigen Schuppen, oben bräunlich, unten gelblich, wird

Digitized by Google

gegen 5 Fuß lang und läßt sich leicht zähmen. Sie findet sich im südlicheren Europa.

8) Die Blindschleiche, oder Haselwurm, (**Anguis fragilis**), die sich auch gar häufig bei uns findet, hat über den ganzen Leib, sowohl am Rücken als am Bauche, lauter ziemlich gleiche, kleine Schüppchen. Sie sieht bräunlich oder graulich aus, spielt aber immer etwas ins Kupferrothe. Wenn man darauf schlägt, zerbricht sie gar leicht in Stücken. Sie ist durchaus nicht giftig, so daß man sie ohne Nachtheil in die Hände nehmen kann, welcher Versuch indeß nur dem zu rathen ist, der sie genau kennt, weil ein Anderer wohl gar statt ihrer die Otter (die freilich himmelweit davon verschieden ist) erwischen könnte.

§. 58. Die Eidechsen (**Lacertae**), haben bei einem zum Theil schlangenartigen Baue, 4 oder doch 2 Füße, die freilich manchmal sehr klein sind; der Leib ist geschwänzt und mit flachen oder körnigen Schuppen bedeckt. Es gehören dahin:

1) Das Krokodil (**Crocodilus niloticus**), ein gar furchtbares Thier, das zuweilen 15 Ellen lang wird, und dann Menschen und andere große Thiere verschlingt, oder sie hinabreißt ins Wasser, dort unter einer Klippe, oder unter Gesträuchen am Ufer verbirgt, und sie nach und nach verzehrt. Sein Rücken ist starr, durch festanschließende Rücken-Schilder, die Schilder am Bauche sind weicher, darum muß man ihm im Kampfe dort beizukommen suchen, was die Neger bei dem Senegalkrokodil mit solcher Kühnheit thun, daß sie unter dasselbe hinunter schwimmen, und ihm mit einem scharfen Messer den Leib aufreißen.

Menschen, die, wie einmal ein Engländer, von einem Krokodil verfolgt wurden, sind ihm öfters dadurch entkommen, daß sie nicht gerade aus, sondern immer im Zickzack, bald rechts, bald links liefen. Das steife, schwerfällige Thier kann sich dann nicht so geschwind umkehren, und bleibt zurück. Doch muß man sich, wenn man es in der Nähe umgehen will, in Acht nehmen, daß man nicht seinem Schwanz zu nahe kommt, denn mit dem kann es gewaltig um sich schlagen, und Menschen hinschmettern. Das Weibchen legt viele Eier, so groß als Gänseeier, auf einen Haufen. Und es ist gut, daß viele Sumpfvögel und das Ichneumon so da-

Digitized by Google

hinter her sind, und diese Eier, — die übrigens das alte Krokodil, wenn es gerade nichts anders zu thun hat, bewachen soll, — aussaufen, wo sollte man sonst am Ende im heißeren Afrika mit allen Krokodilen hin?

Im heißeren Amerika giebt es verschiedene Arten von einem kleineren Krokodil (Kaiman). Der gemeine Kaiman (Cr. sclerops) kann 10 bis 14 Fuß lang werden. Er verschlingt Fische, Wasservögel, Hunde und andere Säugthiere, die sich dem Wasser nahen, wird aber nur selten für Kinder, und kaum jemals für Erwachsne gefährlich. Er hält einen Winterschlaf, und hat eine tiefe, dumpfe Stimme, gleich dem fernen Brüllen einer Kuh.

2) Das Chamäleon (**Chamaeleon vulgaris**), ist ein sonderbares Thierchen, mit langen Beinen, eckigem Kopfe, großen Augen. Es besteht fast nur aus Haut und Knochen, kann sich jedoch, indem es sich aufbläst, ein gar dickes, feistes Ansehen geben, auch nimmt es dabei einen ganz besonders gravitätischen Gang an. Gewöhnlich sitzt es aber ganz still in einem Strauche, oder in einem Winkel der Stube, worinnen man dieses nützliche Thierchen hält, und wenn dann eine Fliege in seine Nähe kommt, schießt es seine lange, klebrichte Zunge heraus, und erhascht sie, so daß es eine große Menge Fliegen vertilgt. Mit dem einen Auge kann das seltsame Thier in die Höhe, und zugleich mit dem andern hinabwärts schauen, mit einem vor- mit dem andern rückwärts. Dabei sieht es, je nachdem ihm kalt oder warm, heiter oder übellaunig zu Muthe ist, bald grünlich, bald gelblich, weißlich, röthlich aus, und hat so oft in einem Tage gleichsam 4 bis 5 verschiedene Kleider an. Es kann nur in heißen Ländern leben.

3) Die eigentliche Eidechse (**Lacerta**, z. B. **agilis** und **viridis**), mit einem fast 4eckigen von schilderartigen Schuppen bedecktem Kopfe, findet sich auch bei uns, und zwar eine grüne so wie eine graue Art. Sie sind beide ganz unschädlich, gar nicht giftig, und selbst sehr nützlich, indem sie eine große Menge von Insekten fressen.

Kleine Verstümmlungen, z. B. am Schwanze, ergänzen sich von selber wieder. Ein solches armes Thierchen, dem man den Kopf abgehauen, kroch sogar noch ohne Kopf wie-

Digitized by Google

der an der Mauer hinauf in sein gewöhnliches Loch, aber freilich wächst ein Kopf nicht so leicht wieder dran, und solchen Patienten ist wohl nicht mehr zu helfen gewesen.

4) Der Leguan (**Iguana sapidissima**), unterscheidet sich durch den hohen Schuppenkamm auf seinem Rücken und durch den großen sackartigen Ansatz an seiner Kehle. Er lebt im wärmeren Amerika auf Bäumen, sein Fleisch ist überaus wohlschmeckend.

§. 59. Die Vögel (**Aves**), Thiere, welche Eier legen, warmes, rothes Blut, Federn und Flügel haben und auf zwei Füßen gehen, sind so schöne, dem Menschen zum Theil durch ihren Gesang, ihre Eier, ihr Fleisch, ihre Federn, so angenehme und nützliche Gesellschafter auf der Erde, daß man nicht viel zu ihrem Lobe voraus zu sagen braucht. Viele von ihnen bauen künstliche Nester, viele wandern, wenn ihre bestimmte Zeit gekommen ist, oft in sehr weit entfernte Gegenden und auf unabänderlich festbestimmten Wegen. Sie vertilgen eine unzählige Menge von Insekten, Schlangen und andern schädlichen Thieren; freilich fressen die Raubvögel auch manche nützliche Thiere auf, und die von Körnern und Früchten lebenden Vögel thun hin und wieder Schaden. Es giebt keinen giftigen Vogel. Sie können zum Theil sehr alt werden, z. B. Papageien und Schwäne (wie der Schwan von Alkmar, der im Jahr **1672** starb) wohl **100** Jahre und darüber, denn der berühmte Aldrovand erzählt sogar von **300**jährigen Schwänen. Meist halten sich ein Männchen und ein Weibchen treulich zusammen. Bei manchen hat aber ein Männchen mehrere Weibchen. Die letzteren legen Eier, welche sie durch die natürliche Wärme ihres Leibes ausbrüten. Bei vielen Vögeln kommen die Jungen ganz nackt, auch blind aus dem Ei, und müssen lange gefüttert werden. Bei andern geht das Junge schon ganz vollständig, so daß es gleich herumlaufen kann, hervor, und das sind meist die vollkommensten Vögel, die den lebendig gebährenden Säugethieren am nächsten stehen.

Die Flügel der Vögel sind eigentlich befiederte Vorderfüße, an denen man Zehen und selbst einen Nagel

Digitized by Google

sieht, und manche, z. B. die Pinguine, gebrauchen die Flügel auch beim Schwimmen wie Vorderfüße, indem sie mit allen Vieren schwimmen. Ueberhaupt zeigt das Skelet der Vögel schon eine große Uebereinstimmung mit dem Skelet der Säugthiere, nur ist das Brustbein viel breiter, der Hals hat eine viel größere Zahl von Wirbelbeinen, außer dem Schlüsselbein findet sich noch als eigenthümlicher Knochen das Gabelbein. Der Magen ist bei den körnerfressenden Vögeln mit dicken Muskeln versehen, (fleischig), zum Zermalmen der Speise, bei den fleischfressenden ist er meist nur häutig; das Herz der Vögel hat wie bei den Säugthieren 2 Kammern und 2 Vorkammern; beim Athmen dringt die Luft aus den an den Rückwirbeln und Rippen festgewachsnen Lungen in mehrere Höhlungen des Innenleibes. Das Gehirn wie die Augen sind von verhältnißmäßig sehr bedeutender Größe; der Gesichtssinn wie das Gehör sehr scharf. Einmal wenigstens im Jahre, nach der Zeit des Nistens, wechseln die Vögel ihre Federn (mausern sich).

Wenn man die Vögel so anordnen wollte, daß die von den Säugthieren ferner abstehenden zuerst, dann die ihnen näher stehenden kämen, müßte man entweder bei den Pinguinen anfangen, die vielleicht den Amphibien am nächsten stehen, oder man müßte wenigstens die kleinen, nackte und blinde Junge ausbrütenden Singvögel ungleich tiefer stellen als jene Vögel, deren Junge sogleich zum Laufen und Schwimmen befähigt aus dem Ei hervorgehen, wie bei den Hühnern und Straußen. In jedem Falle grenzen die letztgenannten, die Straußen, zunächst an die Säugthiere. Wir wollen übrigens hier bei einer gewöhnlicheren Anordnung bleiben.

§. 60. Die Raubvögel (**Rapaces**), haben eine Hinterzehe und 3 ganz frei von einander abgesonderte Vorderzehen, dabei hakenförmige Klauen und Schnäbel. Es gehören dahin zum Theil sehr große Thiere.

1) Der Geier (**Vultur**), hat am Hals oder Kopf kahle Stellen, dagegen dann nach unten um den Hals herum eine Art von dickem Federkragen.

Digitized by Google

Es giebt viele Arten, die meistens in wärmern Ländern leben, nur selten auf lebendige und gesunde Thiere stoßen, sondern nur kranke oder todte fressen, und, bei ihrer Neigung zu allem dem, was stinkt, auch giftige Schlangen häufig anfallen und fressen. Dadurch, und durch das Hinwegfressen des Aases, sind sie in heißen Ländern gar nützliche Thiere, die man, trotz des üblen Geruches, den sie von sich geben, und trotz ihrer garstigen Nase, aus der immer eine übelriechende Feuchtigkeit herausträufelt, sehr in Ehren hält. Vor allem verdient diese ehrende Anerkennung der **Aegytische Aasgeier** (**Vultur** oder **Cathartes Percnopterus**), der im Alter mit Ausnahme der schwarzen Schwingen ganz weiß ist und der namentlich auch im gelobten Lande, um Jerusalem häufig gesehen wird. Im wärmeren Amerika kommt eine schwarze Art von Aasgeiern (**Cathartes Aura**) vor, welcher sich in derselben Weise nützlich macht als der ägyptische. In der nämlichen Erdgegend lebt auch ein weißer ansehnlicher Geier, mit stattlichem Halskragen und rothem, fleischigem Kamm auf dem Schnabel: der **Königsgeier** (**Sarcoramphus Papa**), vor welchem die schwarzen einen solchen Respekt haben, daß sie selbst, wenn ihrer viele sind, sogleich ihre Mahlzeit verlassen und zur Seite fliegen, wenn auch nur ein oder zwei Königsgeier zu ihnen kommen. Erst wenn diese hohen Gäste sich entfernt haben, naht sich der schwarze Aasgeier von neuem der Mahlzeit. Das Gefieder der Geier ist zum Theil flaumenfederartig weich, so daß man es hie und da als Pelzwerk braucht. Ihre Stimme lautet meist häßlich wie ein Eselsgeschrei. Sie fressen sich auf Aas oft so voll, daß man sie mit den Händen greifen kann. Dieses thut besonders der große, graue Geier (**V. cinereus**), der zuweilen aus den südlicheren Seeküstengegenden zu uns geflogen kommt, von Statur größer ist als ein Puterhan und mit ausgespannten Flügeln gegen 9 Fuß klaftert.

2) Der **Bartgeier** oder **Lämmergeier** (**Gypaëtus barbatus**), der sich leicht durch den pinselartigen Haar- oder Federbüschel, den er wie einen Bart am Unterschnabel trägt, unterscheiden läßt, klaftert mit ausgespannten Flügeln 10 Fuß, findet sich auf und über den höchsten Gebirgen der Schweiz, Tyrols u. s. w. Er raubt auch manchmal kleine Kinder, und ein Bauer, welcher einem, der ihm sein 6jähriges Knäbchen weggetragen hatte, mit Lebensgefahr nachgeklettert war auf seinen Felsenhorst, konnte das arme Kind doch nicht mehr retten, sondern es starb nach wenig Stunden an den Mißhandlungen der jungen Geier.

3) Die **Falken und Adler** (**Falco**), haben

einen stark, von seiner Wurzel an gebogenen Schnabel, mit einer meist gelblichen Wachshaut, und an den starken Fängen sehr krumme, scharfe Klauen.

Die größern Vögel, welche in dieses Geschlecht gehören, nennt man Adler, und

a) Der Goldadler (Aquila fulva) steht an Größe und Stärke dem Lämmergeier nur wenig nach, indem er mit seinen ausgespannten Flügeln auch wohl 9 Fuß klaftert. Er nistet auf hohen Felsengebirgen z. B. in der Schweiz, Tyrol, und auch hin und wieder in Deutschland. Er lebt hier einsam in der Nähe von Gebirgswassern, legt in sein großes Nest 2 bis 3 Eier, trägt den Jungen Wild zu, soll auch schon Kinder geraubt haben. Gegen seine eignen Jungen ist er sehr streng, wirft manchmal einzelne aus dem Neste, wenn es an Futter fehlt oder eins kränklich wird, und mag sie, sobald sie ihr ganzes Gefieder haben, nicht mehr in seiner Nähe leiden. Ueberhaupt leidet kein solcher Raubvogel einen seines Gleichen (außer das Männchen sein Weibchen) nahe um sich, während die von Pflanzen und Insekten lebenden so gerne sich vertragen, daß sie fast immer in Gesellschaft beisammen sind. Das Weibchen ist größer als das Männchen, dieses aber muthiger.

Zum Falkengeschlecht gehören aber noch viele Arten von Raubvögeln, unter andern:

b) Der rothe Milan, Weihe, Gabelgeier (F. Milvus), zeichnet sich schon durch seinen starken gabelförmigen Schwanz und die halbbefiederten Füße aus, ist 2 Fuß 3 Zoll lang und klaftert mit ausgespannten Flügeln über 5 Fuß. Diesen trägen und nicht sehr muthigen Raubvogel, der sich oft von den Krähen verjagen läßt, sieht man nicht selten hoch in der Luft schweben, von wo er auf Lerchen, junge Kiebitze, Mäuse und andere kleine Thiere herunterstößt. Er frißt übrigens auch Aas.

c) Der Bußaar, Mäusefalk (F. Buteo). Lebt bei uns in Vorhölzern, hat ein dunkelbraun gewelltes Gefieder, gelbe Wachshaut und Fußwurzeln. Er frißt viele Nattern und andere Amphibien, geht aber auch auf andere kleine Thiere.

d) Der gemeine Falke oder Habicht, den man auch Hühnergeier nennt (F. palumbarius), hat eine schwarze, am Rande gelbe Wachshaut und gelbe Füße, ist braun, hat aber an den Schwungfedern weißliche Binden. Dieser ist überall bekannt, horstet auf hohen Bäumen und legt 4 Eier. Diese, und einige andere verwandte Arten, hat man sonst zur Jagd abgerichtet, indem man sie lange nicht schlafen und fressen ließ, und dadurch am Ende ganz zahm und nachgiebig machte.

e) Der Sperber (F. Nisus), mit etwas grünlicher Wachshaut, graulich weißem, wellenförmig gezeichnetem

Digitized by Google

Bauche, ist ungeachtet seiner kleinen Statur ein muthiger allbekannter Raubvogel.

f) Der Singfalke (F. musicus), lebt in Südafrika, und ist dadurch merkwürdig, daß er statt des wüsten Geschreies unserer Raubvögel, einige angenehme, singende Töne hören läßt.

4) Die Eulen (Strix), haben die großen Augen an dem dicken Kopfe nach vorne stehen, und diese Augen sind wie Katzenaugen beschaffen, können in der Dämmerung, wo die Eulen auf Raub ausfliegen, am besten sehen.

Es giebt große Arten, besonders die große Ohr- oder Adlereule (Str. Bubo), die so groß als eine Gans ist, und solche stoßen allerdings aufs Wildpret und andere große Thiere, die kleinen aber nähren sich meist von Mäusen (Feld- und Hausmäusen) und Amphibien, und sind daher, besonders durch die Verminderung der Feldmäuse, überaus nützliche Thiere, die man in Jahren und Gegenden, wo es recht viele Mäuse giebt, manchmal in Schaaren kommen sieht, und dann auch bemerkt, daß die Mäuse abnehmen. Uebrigens saufen die schönen gelben Perleulen manchmal auch in den Kirchen das Oel aus den Lampen. Alle Eulen haben ein gar weiches Gefieder wie Flaumen und fliegen so leise, daß man sie kaum kommen hört. Darum dachte einmal einer, der bei Nacht über einen Kirchhof ging und dem auf einmal jemand seine Perücke ganz leise vom Kopfe nahm, es habe sie ihm ein Geist genommen, der gerade eine brauchte. Als man aber nach einiger Zeit am Thurme etwas zu bauen hatte, fand man die Perücke in einem Eulennest, wohin sie die alte Eule getragen hatte, um ihren Jungen ein recht weiches Bett zu machen.

Eine merkwürdige Art von Eulen, die jedoch am Tage herum fliegt, ist die amerikanische Höhleneule (Str. cunicularia), welche in Guiana zuweilen mit Klapperschlangen, noch öfter aber im mittleren Amerika mit einer Art von Murmelthier (Arctomys ludoviciana) dem sogenannten Wiesenhund, dessen Stimme der ihrigen sehr ähnlich lautet, traulich in einer Höhle beisammen wohnt.

§. 61. Die Klettervögel (Scansores), unterscheiden sich durch den Bau ihrer Füße, an denen 2 Zehen nach vorn, 2 nach hinten gerichtet stehen, so daß diese Vögel meist sehr geschickt damit klettern, und an den Zweigen sich festhalten können. Es gehören hieher folgende Geschlechter:

1) Die Papageien (Psittacus), wovon es in heißen Ländern eine gar große Menge von Arten giebt, sind schöne, bunte und gar komische Thiere, die aller-

Digitized by Google

hand sonderbare Geberden machen, auch zum Theil Worte nachsprechen lernen. Mit Recht hat man sie als die Affen unter den Vögeln bezeichnet und sie, als die klügsten, an die Spitze der Thiere ihrer Klasse gestellt. Die obere Kinnlade ihres hakenförmigen Schnabels ist beweglich, die Zunge fleischig.

Im Freien draußen halten sich immer ein Männchen und Weibchen paarweise zusammen, und bei manchen kleinern, wie beim sogenannten sympathetischen Vogel, ist die Zärtlichkeit des Pärchens so groß, daß beide gar nicht ohne einander leben können. Bei uns in der Gefangenschaft sitzen diese Vögelchen immer neben einander, wenn das eine frißt oder säuft oder schläft, thut es auch das andere, und wenn das eine stirbt, stirbt ihm das andere (meist sehr bald) nach. Die Papageien brüten gewöhnlich nur 2 Eier, dafür aber jährlich zum Theil mehr als einmal, daher sie in manchen heißen Ländern so häufig sind, daß sie an den Früchten viel Schaden thun. Man schießt sie dort und genießt zum Theil ihr Fleisch, das aber von den Alten sehr hart ist. So schön buntfarbig auch ihr Federwerk ist, so hat man sie doch nicht mehr so gern, wenn sie ihren Schnabel aufthun zum Schreien, denn sie schreien ganz unverschämt, und für ihre eigene Ehre wäre es besser, sie schwiegen ganz, auch sind die größeren Arten, der Arras, wenigstens in der Gefangenschaft, zum Theil recht boshafte Thiere. Petersilie ist den Papageien ein Gift.

2) Der Pfefferfraß oder Tucan (**Ramphastos**), hat ein, wenigstens an Brust und Hals, meist schön buntfarbiges Gefieder, und einen so ausnehmend großen, zackigen Schnabel, daß man sich vor ihm fürchten, und meinen möchte, er könnte wenigstens die Hand zerbeißen. Und doch sieht man auch da wieder, wie sehr oft der Anschein trügt. Denn gerade dieser ungeheure, furchtbar aussehende Schnabel ist von so lockerem Gewebe, und hat so wenig Kraft in sich, daß der Vogel kaum eine Kirsche damit zerdrücken kann, sondern sie ganz hinunter schlingen muß. Er lebt im heißen Amerika, nährt sich von weichen Früchten, Insekten, so wie andren kleinen Thieren und hat eine häßliche, lautschreiende Stimme.

3) Der Specht (**Picus**), führt ein gar mühseliges Leben. Mit seinen kräftigen Füßen klettert er an den Bäumen auf und nieder, klopft mit dem geraden eckigen, keilförmig zulaufendem Schnabel an allen an,

Digitized by Google

und hört er am Klange, daß der Baum gesund ist, so fliegt er weiter: merkt er aber, daß er inwendig von Würmern angefressen ist, so fängt er gleich an, da einzuschlagen, und bohrt nun oft ein so tiefes Loch bis dahin, wo die Würmer, die er so gerne frißt, sitzen, hinein, daß die eine, große Art in einem Tage wohl einen Metzen Späne herauswirft, und zuweilen so müde bei der sauern Arbeit wird, daß sie dabei selbst mit dem Kopfe nach unten hängend, einschläft. Manche Arten der Spechte fressen auch Nüsse.

Die Spechte legen ihre wenigen Eier in einen hohlen Baum, den sie sich selber dazu ausgehöhlt haben. Sie sind zum Theil unter einander selber neidische Vögel, die ihres Gleichen nicht gern in der Nähe leiden. Freilich giebt es auch nicht viel solche große und kleine Holzwürmer in den Bäumen, wie sie die Spechte brauchen. Uebrigens vertritt der Specht für viele andere Waldvögel die Stelle eines Zimmermanns oder Schreiners, indem er, z. B. den Staaren, ohne viel Dank dafür zu begehren, die Bäume zu ihren Nestern aushöhlt. Wir haben bei uns eine große schwarze Art mit rothem Kopfe, (den Schwarzspecht, P. Martius), diese ist wie eine Taube, dann eine grüne (P. viridis) und graugrüne (viridicanus) und 3 schwarz, weiß und roth gefärbte Buntspechtarten (P. major, medius und minor), die nur so groß, wie ein Sperling, nur der eine etwas größer sind. Alle Spechte haben eine sonderbare, lange Zunge, welche durch das lange Zungenbein, dessen Fortsätze sich um das Stirnbein herum legen, weit hervorgeschnellt werden kann und dabei durch den Saft, der sich aus den starken Speicheldrüsen aussondert, immer klebricht erhalten wird, so daß sie damit die Würmer tief aus einem Loche herausholen können.

4) Der Wendehals (**Iynx Torquilla**), ein kleines, braun und graulich gezeichnetes Vögelchen, kann den Hals nach allen Seiten drehen, und den Schwanz wie ein Pfau ausbreiten. Es nistet manchmal bei uns, oder kommt wenigstens im Herbste aus nördlichen Gegenden zu uns. Wenn man es im Käfig hält, und es nähert sich jemand Unbekanntes, dann macht es gar sonderbare Geberden, geht zischend, und mit ausgebreitetem Schwanze bald vor-, bald rückwärts. Es hat auch eine solche Schnellzunge wie der Specht.

5) Der Kukuk (**Cuculus canorus**), ein dunkelaschgrauer, mit rundlichem, schwachem, mäßig gebogenem Schnabel und einem schwarzen, weiß gefleckten

Digitized by Google

stufigen Schwanze versehener Vogel, kommt auch als besuchender Gast im Frühling und Sommer in alle unsre Gegenden, und ist deshalb überall bekannt.

Dieser kann recht als ein Beispiel dienen, wie sich die Vorsehung alles Verlassenen und Verwaisten in der Welt, und wäre es auch nur eine Goldkäferlarve (m. s. oben S. 297) oder ein junger Kukuk, so reichlich annimmt und für dasselbe sorgt. Das Weibchen, das seine Eier in langen Absätzen, fast alle Wochen nur eines legt, kann diese nicht selber brüten, sondern legt sie in die Nester kleinerer Vögel; diese aber freuen sich nicht nur sehr darüber, sondern brüten das Ei auch sorgfältig aus, und füttern das ausgekrochene Junge groß. Und wenn dann so ein junger Kukuk, der jetzt noch mehr Speise bedarf als vorher, aus seinem Neste ausgeflogen ist, und vor Hunger auf einem Baume oder Busche schreit, da bringen ihm alle insektenfressenden Vögel, die in der Nähe sind, (nicht blos seine Pflegeältern) Futter getragen; der eine steckt dem kleinen Waisen eine Fliege, der andere einen Schmetterling, der dritte einen Käfer oder ein Würmchen in den Schnabel, so daß er diesen kaum oft genug aufsperren kann, und gar nicht weiß, zu welchem von den vor Freude um ihn schreienden, pflegelustigen Vögelchen, die in Schaaren zu ihm hinfliegen, er sich zuerst wenden soll. So wird gerade das scheinbar Verlassenste, in der That am reichlichsten versorgt, und der Mensch will das doch so oft nicht glauben.

§. 62. Die Kantenschnäbler (**Anguliros-tres**) nähern sich durch manche äußere Aehnlichkeit, vorzüglich im Schnabelbaue den Spechten, durch andre Züge jedoch den Vögeln der nächstfolgenden Familie, namentlich den Bienenfressern. So wie diese haben sie kurze Füße, deren äußere Zehe fast so lang als die mittlere und mit dieser bis zum vorletzten Gliede verbunden ist. Unter den vaterländischen Vögeln gehört hieher nur die eine, nachstehende Gattung.

Der Eisvogel (**Alcedo ispida**), ist ein gar schöner Vogel, dessen Gefieder stark ins Grüne schillert, so daß er oft im Vorüberfliegen wie ein Smaragd glänzt. Er hat einen langen, geraden, eckig zugespitzten Schnabel.

Er nistet in Erdlöchern, an Bächen, und legt in ein Nest, worinnen meist viele Fischgräten sind, gegen 8 Eier hinein; brütet aber im Frühling, nicht, wie eine alte Sage geht, mitten im Winter. Auf einzelnen, über einen Bach hervorstehenden Aesten oder Wurzeln lauert er kleinen Fischen auf, die er plötzlich, mit einem Schuß, erhascht, und ganz verschlingt. Das thut er auch im Winter, wo es ihm aber freilich, obgleich er sich gern auch mit Blutigeln und

Digitized by Google

Insektenlarven begnügt, wenn die Bäche zugefrieren, oft so knapp geht, daß er Hungers sterben muß. Deshalb wandert er in der kalten Jahreszeit häufig in die wärmeren Seeküstengegenden aus. Im Zimmer kann man ihn lange durch kleine Fische, die man in eine Schüssel mit Wasser setzt, erhalten.

§. 63. Die Dünnschnäbler (**Tenuirostres**), haben sehr zarte, pfriemenförmige und meist krumm gebogene Schnäbel. Dahin gehören folgende Geschlechter:

1) Der Immenwolf (**Merops Apiaster**), ist ein schöner, gelb und grün und braun gefleckter Vogel, größer als ein Staar, der schon im südlichen Europa, noch mehr aber an den wärmern westasiatischen Küstengegenden, namentlich im gelobten Lande, in der Nähe des Wassers, in Erdlöchern nistet, und selbst nach Deutschland zu uns auf seinen Wanderungen kommt. Er frißt viele Heuschrecken und andre schädliche Insekten, freilich auch Bienen auf. Die Kinder auf Kandia angeln ihn ordentlich in der Luft, indem sie an einer langen Angelschnur eine Heuschrecke an einer krummen Nadel fest machen, die dann der Immenwolf mit sammt dem Insekt hinterschluckt.

2) Der Wiedehopf (**Upupa Epops**), mit mäßig gebogenem, an der Wurzel 3kantigem Schnabel, gehört freilich auch mehr den warmen Ländern an als den unsrigen, und nistet z. B. in Aegypten, in Abtritten, ja sogar in dem Innern eines zusammengedorrten Aases. Doch findet er sich auch bei uns, und ist, trotz seines schönen, gelblichen, schwarzgefleckten Federbusches, den er recht artig zu tragen weiß, kein sehr geachteter Vogel. Denn er putzt sich nur für andere Leute, und in seinem eignen Hause hält er so wenig auf Reinlichkeit, daß sogar das Sprichwort von dem Gestank eines Wiedehopfnestes zu reden weiß, aus welchem die Alten niemals (wie doch andre Vögel so viel als möglich thun) den Unrath der Jungen wegtragen, sondern alles unaufgeräumt liegen lassen.

3) Das Baumläuferlein (**Certhia familiaris**), ein ganz kleines, graues Vögelchen mit langem, krummen, dünnen Schnabel, läuft Sommer und Winter an unseren Obstbäumen und andern Bäumen auf und nieder, und zieht gar manches schädliche Insekt,

Digitized by Google

so wie Insektenei aus der Rinde heraus. Diese, so wie die nächstfolgende, 4te Gattung könnte man auch, wegen des innren Baues ihrer Luftröhre (nach §. 65) zu den Singvögeln stellen.

4) Die Mauerklette (**Tichodroma muraria**), mit einem nur wenig gebogenem, langem, dünnen Schnabel, unterscheidet sich durch die schöne rothe Farbe ihrer Flügel. Sie lebt meist nur in Gebirgsgegenden.

5) Der Colibri (**Trochilus**), ist der kleinste Vogel auf der Welt, und dabei doch einer der muthigsten; indem er seine Jungen gegen große Thiere und selbst gegen Menschen vertheidigt, denen er nach den Augen fliegt. Freilich ist er auch zugleich der jähzornigste, der immer mit seines Gleichen wüthende Händel hat und gleich so außer sich ist, wenn er in einer Blume nichts Genießbares findet, daß er sie voll Zorn abreißt und hinwirft. Dabei ist er immer in rascher Bewegung, saugt den Nectarsaft der Blumen und mit ihm zugleich viele kleine Insekten im Fluge (schwebend, wie ein Schmetterling) mit seinem langen röhrenförmigen Schnäbelchen auf, und nährt damit auch seine Jungen, die er in einem vorsichtig angelegten Nestchen den Nachstellungen der Schlangen und Meerkatzen gar geschickt zu entziehen weiß. Es ist meist ein gar schön bunt gefärbtes Vögelchen, was allen Farbenschmelz und Glanz unserer Edelsteine zeigt. Er findet sich nur in Amerika. Bemerkenswerth ist auch noch die verhältnißmäßig bedeutende Größe des Herzens der muthigen Colibris. Denn dieses gleicht an Umfang ihrem Schädel, während der volle Magen fast nur die Größe des Augapfels des kleinen Vögeleins hat.

Mit den Colibris durch die Form des Schnabels verwandt sind die meist prächtig gefärbten Arten des Honigvogels (**Nectarinia**). Durch den Singmuskelapparat (nach §. 65) reihen sie sich jedoch den Singvögeln an, obgleich keiner dieser schönfarbigen Vögel einen Gesang hat.

§. 64. Die Krähenartigen Vögel (**Coraces**), haben einen mittelmäßig großen, starken, oben erhabenen Schnabel und kurze Füße, und nähren sich von kleinen Thieren, Aas, auch Körnern.

Digitized by Google

1) Der Rabe (Corvus), dahin zuerst a) der gemeine oder Kolkrabe (Corv. Corax) gehört, der so groß ist wie ein junger Hahn und schwarz aussieht wie die Rabenkrähe. Er nistet bei uns hie und da in Gebirgsgegenden und ist unter andern häufig auf Island, wo er manchmal sogar junge, neugeborne Lämmer anfällt und umbringt. Er brütet sehr zeitig im Jahre. Die Art seines Fluges soll auf die Art der bevorstehenden Witterung schließen lassen; weßhalb die alten Heiden mit seinem Fluge viel Aberglauben trieben. In diesen seinen Bewegungen wie in den Modulationen seiner Stimme zeigt sich eine große Mannichfaltigkeit, und der Fuchs in der alten Fabel hatte nicht ganz unrecht, wenn er den Raben als einen Sänger pries, denn man findet an seiner Luftröhre, wie an jenen der andern, zu diesem Geschlecht gehörigen Arten, denselben Bau, der nach §. 65 die Singvögel auszeichnet.

Dem Raben an Farbe sehr ähnlich, aber nur viel kleiner, ist

b) Die gemeine Rabenkrähe (C. Corone). Diese findet sich überall in unsern Wäldern, und ist vielmehr nützlich als schädlich, indem sie auf den Feldern eine unzählige Menge von Maikäferwürmern zusammenliest und selbst Feldmäuse frißt. Freilich stiehlt sie manchmal auch junge Hühner. Auch

c) Die Saatkrähe (C. frugilegus) sieht der gemeinen ähnlich, nur sind bei ihr die Gegend um die Schnabelwurzel, so wie die Nasenlöcher kahl. Dieses kommt aber blos von dem Hineinbohren in den Boden, wo sie Engerlinge und andere Insektenlarven sucht. Denn die Jungen haben, eben so wie die andern Krähenarten, an jenen Stellen auch Federn. Sie nistet oft gesellschaftlich und frißt zwar Körner und Pflanzensaamen, besonders Erbsen, zugleich aber auch viele Käferlarven, Feldmäuse, Grasraupen.

d) Die Nebelkrähe (C. Cornix), welche mehr in nördlichen Ländern nistet, ist grau und schwarz. Diese kommt im Winter oft in großer Menge zu uns.

e) Die Dohle (C. Monedula), welche ebenfalls zu diesem Geschlecht gehört, nistet gerne auf Thürmen, besonders in Städten. Im Hause wird sie zahm und komisch, stiehlt aber gern alles Glänzende (Gold, Ringe u. s. w.), versteckt es, und hat dadurch schon manchmal Unschuldige in Verdacht gebracht. Auch draußen im Freien liest sie Münzen und andere ihr stark in die Augen fallende Sachen auf und trägt

Digitized by Google

sie in ihr Nest, weshalb man einst auf einem Thurm in Erfurt, in den Dohlennestern, mehrere sehr schätzbare alte Geldstücke selbst aus der Römerzeit, entdeckte, welche diese Vögel auf den Aeckern und anderwärts zusammengelesen hatten.

f) Der Nußheher (C. Glandarius), ist röthlichgrau und hat am Flügel schöne blaue Federn; trägt sich Eicheln und andere Waldfrüchte auf Haufen, die ihm dann die kleinen Eichhörnchen wieder wegstehlen. So ist auch bei den Thierlein in den Wäldern keine Treue und Ehrlichkeit mehr zu finden.

2) Die Elster, Atzel (**Pica vulgaris**), ist schwarz und weiß, hat einen langen Schwanz und baut sich ihr kunstreiches Nest, welches hohl gewölbt (oben zugedeckt) ist, auf Bäume. Sie kann nur bis 5 zählen, denn wenn in eine Hütte, die unter ihrem Neste steht, weniger als 5 oder gerade 5 Jäger gehen, und dann einzeln wieder heraus, so wartet sie ab, bis alle heraus sind, ehe sie wieder zu Neste fliegt. Was aber über 5 ist, merkt sie nicht mehr.

3) Die Mandelkrähe (**Coracias garrula**), ist schön blau, nistet in nördlichen Gegenden, bis Schweden, kommt aber auch in manchen wärmeren Ländern (selbst in Palästina, am Carmel) sehr häufig vor. Sie kommt oft nach der Ernte in ganzen Zügen zu uns. Ihre Stimme gleicht fast der des Laubfrosches.

4) Die Paradiesvögel (z. B. **Paradisea apoda**), von denen man sonst glaubte, sie hätten gar keine Füße, und müßten ihr ganzes Leben hindurch nur fliegen, oder wenigstens in der Luft schweben, sind gar schöne, bunte Vögel, mit prächtig glänzendem Gefieder, und sehr verlängerten, weit hinausreichenden Bürzelfedern am Schwanze. Die Paradiesvögel wohnen in den heißesten Gegenden von Neuholland und Südasien auf den dortigen Inseln.

5) Der Nashornvogel (**Buceros nasicornis**), unterscheidet sich durch seinen großen, an den Rändern gezähnten Schnabel, auf dessen Rücken bei vielen Arten ein dicker, knolliger, innen aus lockern Zellen bestehender Ansatz, wie ein zweiter Schnabel steht. Das Gefieder ist meist schwärzlich, am Bauche weißlich. Einige Arten sind größer als ein Haushahn.

Digitized by Google

sie nähren sich von Aas und Amphibien, zum Theil auch von Früchten.

6) Der Pirol (**Oriolus galbula**), ist der schön gelb und schwarz gefärbte Vogel, der sich auch in Deutschland hin und wieder sein kunstreiches Hängenest baut und so gerne Kirschen frißt. Seine Luftröhre zeigt den Bau der Singvögel.

In der Gefangenschaft kann man den Pirol meist nur so lange erhalten, als man frische Kirschen für ihn hat. Doch gelingt es auch, ihn ans Nachtigallenfutter zu gewöhnen, wobei er dann lebend bleibt. Er kommt spät im Frühling und geht zeitig wieder fort. Denn den so gar bunt aussehenden Vögeln, außer dem Eisvogel, ist es meist für gewöhnlich zu kalt bei uns; diese kommen nur zu uns im warmen Sommer zu Besuche.

Zu der Familie der Pirole gehören viele, zum Theil sehr buntfarbige Arten von Vögeln, welche vorzugsweise in Amerika ihre Heimath haben. Man faßt sie unter dem Namen der Trupiale oder auch der Cassikenvögel zusammen. Sie bauen sehr kunstreiche Nester, namentlich gleichen die des Gilbvogels (**Oriolus persicus**), der die Stimmen anderer Vögel und Thiere sehr treffend nachmacht und auch selber angenehm singt, einem Flaschenkürbis und finden sich meist gesellig, viele auf einem und demselben Baume beisammen. Bei vielen Trupialen, wie bei dem eben erwähnten Gilbvogel, ist die gelbe Farbe vorherrschend, bei andern, wie beim Gluthvogel (**O. Jamacaji**), die feurig rothe, einer glühenden Kohle gleichende, noch andere sind schwarz, mit rothen und gelben Farbenstreifen und Flecken. So namentlich der Korndieb-Trupial (**O. phoeniceus**), dessen unzählige Schaaren in den nordamerikanischen Freistaaten zwar einen ansehnlichen Theil der Getreidesaaten (manchesmal fast ½) zerstören zugleich aber auch im Frühling viele tausend Millionen von schädlichen Insektenlarven (Engerlinge und Raupen) vertilgen, welche bei ihrer ungeheuren Vermehrung kaum eine Saat würden aufkommen lassen. An diesem Geschäft, sowohl dem nützlichen, der Vertilgung der Insekten, als an dem schädlichen der Saatenverheerung, nimmt die nächstfolgende Vögelart einen großen Antheil.

7) Der Maisdieb (**Gracula Quiscula**), auch Purpuratzel genannt, ist von der Größe einer Amsel, und das Männchen hat ein schwärzliches, prächtig ins Purpurrothe hineinspielendes Gefieder, das Weibchen aber nur ein einfach bräunliches.

Da diese Vögelart, welche sich häufig mit der vorhergehenden zusammengesellt, am Mais großen Schaden thut, hatten sie die Colonisten in Amerika einmal fast ganz ausgerot-

Digitized by Google

tet. Aber da nahmen die schädlichen Insekten, von denen jene Thiere einen großen Theil des Jahres hindurch leben, und dann nur in der Maiserndte einen kleinen Lohn an Mais für ihre Mühe begehren, so überhand, daß fast kein grüner Halm mehr aufkam, und jetzt die Leute ihre Uebereilung bereueten und den Maisdieb, der sich doch allenfalls von den Saaten abscheuchen läßt, was bei den Insekten und Würmern nicht angeht, gerne wieder überhand nehmen ließen.

Zu dieser Gattung wird auch die sogenannte Rosendrossel (**Gracula rosea**) gezählt. Sie zeichnet sich durch die rosenrothe Farbe ihres Rückens und ihrer Brust, sowie durch den schwarzen Federbusch auf ihrem Kopfe aus, findet sich zuweilen selbst bei uns, lebt aber vorzugsweise in wärmeren Ländern, wo sie durch Vertilgung der Heuschrecken sehr nützlich wird.

8) Der Mino (**Eulabes religiosa**), ist ein merkwürdiger ostindischer Vogel, welcher noch besser und deutlicher die Worte der Menschensprache nachsprechen und allerhand Stimmen nachahmen lernt, als die Papageien. Er ist ohngefähr von der Größe einer Amsel, hat ein glänzend rabenschwarzes Gefieder, einen gelben, langen, etwas gebognen Schnabel, gelbe Füße. Was ihn jedoch am meisten auszeichnet, das ist die wachsgelbe, lappige Haut, welche sich hinter den Augen, auf beiden Seiten des Kopfes, kragenförmig ausbreitet.

§. 65. Die Singvögel (**Canori**) unterscheiden sich vor Allem durch eine Eigenthümlichkeit ihres Baues, welche nicht äußerlich, wie die Gestalt der Füße und Schnäbel, sondern erst im Innern des Thieres, wenn man dieses nach seinem Tode zerschneidet, ins Auge fällt. Dieses ist der sogenannte Singmuskelapparat, welcher aus 8 kurzen Muskeln besteht, die am untern Kehlkopfe sitzen, und der sich freilich auch schon bei mehreren in §. 64 beschriebenen Vögelarten findet. Außer diesem haben die Singvögel mittelmäßig lange, schlanke Füße, an denen 3 Zehen nach vornen, eine nach hinten gerichtet stehen, scharf zugespitzte Schnäbel und leben von Insekten und Pflanzensaamen. Die meisten bauen kunstreiche Nester und pflegen ihre an-

Digitized by Google

fangs faſt nackten, blinden Jungen mit zärtlicher Elternliebe. Viele von ihnen machen alljährlich Wanderungen zum Theil in ſehr ferne Gegenden. Es gehören unter dieſe Abtheilung die nachſtehend erwähnten Geſchlechter.

1) Die Lerche (**Alauda arvensis**), hat einen ſchwachen, geraden, cylindriſchen, ſpitz zulaufenden Schnabel und eine ſpornartig verlängerte Kralle an der Hinterzehe. Dieſe Kralle iſt länger als die Zehe ſelber. Die Lerche findet ſich überall in Deutſchland, und möchte den Menſchen, wenn ſie bei den erſten Morgenſtrahlen in die Höhe fliegt, und faſt bei jedem Würmchen, das ſie findet, wieder mit dankbarem Geſang gen Himmel emporſchwebt, gern auch zu einer ſolchen Dankbarkeit wecken. Arten der Lerche ſind die Heidelerche (**Al. arborea**) und Haubenlerche (**Al. cristata**).

2) Der Flüevogel, die Steinlerche (**Accentor alpinus**), unterſcheidet ſich durch die ſtark eingezognen Ränder ſeines hatten, ſpitzigen Schnabels, durch graubraune Farbe des Oberkörpers, weiße Kehle. Er lebt in unſren Alpen; nährt ſich im Sommer von Inſekten, im Winter von Beeren. Zum Geſchlecht des Flüevogels gehört auch die Braunelle (**Acc. modularis**), braun mit ſchwarzen Flecken, Vorderhals ſchmutzig blaulich grau. Beide Arten haben einen vortrefflichen Geſang.

3) Der Pieper (**Anthus**), gleicht der Lerche an Farbe, und die eine Art deſſelben, der Wieſenpieper (**A. pratensis**), auch durch die lange Kralle der Hinterzehe. Durch andre Eigenſchaften, wie durch die beſtändige Bewegung des Schwanzes, nähert er ſich den Bachſtelzen. Der Baumpieper (**A. arboreus**) hat eine kürzere, gebogene Kralle an der Hinterzehe. Sein Geſang iſt jenem des Kanarienvogels ähnlich.

4) Der Staar (**Sturnus vulgaris**), iſt ein gar guter, ehrlicher Vogel, der in manchen Gegenden, wo man ihm häufig kleine, hohle Käſtchen an die Bäume hängt, darin er niſtet, die Larven des gemeinen ſchäd-

Digitized by Google

lichen Maikäfers so sehr vermindert zu haben scheint, daß man dort ungleich weniger als anderwärts sieht. Er vertilgt aber auch außerdem noch eine große Menge anderer schädlicher Insekten. Sein schwärzliches, schön ins Grüne spielendes, gesprenkeltes Gefieder, sein angenehmer, schwirrender Gesang, bei welchem er mit den Flügeln zu tanzen pflegt, machen ihn auch überdieß außen auf dem Lande sehr beliebt.

5) Der Wasserstaar (Cinclus aquaticus), ist ohngefähr so groß als der Staar, hat aber einen spitzigeren Kopf und stärkere Brust und Leib. Oben ist er schwärzlich, unten rostbraun, an der Brust weiß. Die Federn sind alle wie abgenagt. Dieser Vogel, der sich hin und wieder, besonders in waldigen Gegenden, an kühlen Forellenbächen, welche kiesigen Grund haben, aufhält, und sein Nest gern in die Nähe von Wasserfällen und Wehren, oder an Mühlbetten anlegt, lebt von Wasserinsekten, Schnecken und kleinen Fischen. Um diese zu erhaschen, taucht er nicht blos tief ins Wasser, sondern läuft auch ganze Strecken auf dem Grunde fort, so daß er zuweilen in Netze geräth, oder auch wohl durch ein Insekt, das an der Angel hängt, betrogen und gefangen wird. Er bleibt mitten im härtesten Winter bei uns, hält sich dann zu solchen Plätzen, wo das Eis aufgehauen, oder wegen der raschen Bewegung des Wassers gar keines vorhanden ist, und läßt an hellen, sonnigen Wintertagen seinen einfachen Gesang auf einsamen Waldwiesen hören.

6) Die Drosseln (Turdus), mit einem mäßig langen messerförmigen Schnabel, dessen Oberkieferspitze etwas niedergebogen und an den Seitenrändern ausgeschnitten ist, sind meistens sehr musikalische, und dabei auch tanzlustige Vögel, vor allen aber

a) Die Spottdrossel (T. polyglottos), die mehr Thier-, besonders Vögelsprachen, mit Fertigkeit spricht, als der gelehrteste Professor Menschensprachen. Denn sie macht, auf ihrem Baume sitzend, die Stimme aller Vögel, sogar das Geschrei der Aeffchen nach, dann aber auf einmal fängt sie selber auf ihre Weise an zu singen, und dieß so herrlich und entzückend, daß wohl kein Vogelgesang, selbst nicht jener der Nachtigall, den ihrigen übertrifft. Dabei bewegt sie oft

Digitized by Google

im Takt die Flügel, dann hebt sie sich fliegend in die Luft, und dreht sich nun in dieser tanzend herum. Sie lebt in Nordamerika.

b) Unsere Sangdrossel oder Weißdrossel (T. musicus), am Rücken grünlichbraun, am Bauche weiß und mit blaß und orangefarbenen inneren Deckfedern der Flügel, kann zwar nicht so schön tanzen, aber singen thut sie auch gar schön. Besonders herrlich soll sich der Gesang von Tausenden solcher Musikdrosseln im nördlichen Norwegen oder Schweden ausnehmen, wo während des kurzen Sommers dort in dem einsamen Gebirge alle Felsen und Bäume von dem Lied solcher Vögel wiederhallen.

c) Auch der Mistler oder Ziemer (T. viscivorus), der olivenbraun, aber viel größer als die Weißdrossel (so groß als eine Turteltaube) ist, kann gut singen, doch kennt man ihn, so wie

d) den Krammetsvogel (T. pilaris), der sich durch seine rostgelbe, schwarz gefleckte Brust und Bauch unterscheidet, und der vorzüglich den Wachholderbeeren nachgeht, mehr als Tisch- und Tafelvogel, der nur im Herbst mit seines Gleichen in ganzen Schaaren aus Norden, wo er gebrütet hat, kommt, und dann häufig in Netzen und Schneußen gefangen wird.

e) Die Amsel (T. Merula), ist der schöne schwarze Singvogel mit gelbem Schnabel, der bei uns gleich die ersten Frühlingstage anfingt.

f) Die Steindrossel (T. saxatilis) die schon auf unseren Alpen und hin und wieder im fränkischen Jurakalkgebirge nistet, gehört, weil sie sehr zahm wird und angenehm singt unter unsere seltneren, dabei beliebtesten Stubenvögel. Das Männchen ist an Kopf und Hals blaulichgrau gefärbt, am Bauche röthlichgelb und auch der Schwanz den der Vogel unter zierlichen Verbeugungen beständig auf und nieder bewegt, ist roth wie bei einem Rothschwänzchen. Die Farbe des Weibchens ist vorherrschend dunkelbraun mit weislichen Federrändern.

7) Die Würger (Lanius) nennt man auch Neuntödter oder Bergälstern. Diese haben an jeder Seite der hakigen Spitze des ziemlich starken, an seinem Rücken etwas gebogenen Schnabels ein Zähnchen. Sie sind nicht viel größer, und die meisten Arten kleiner, als eine Amsel.

Es sind zum Theil gar sonderbare Thiere, die, wenn sie auf ihrem Baume sitzen, die Stimmen und den Gesang der vorüberziehenden und fliegenden Vögel nachmachen, selbst den Gesang der Nachtigall, was aber freilich auch darnach ist. Sogar das Knarren der Thüre, den Klang des Geldes, suchen sie in ihrem Käfig nachzuahmen. Draußen im Freien fressen

Digitized by Google

sie Insekten und kleine Vögel, und dabei hat die eine Art: der Dorndreher (Lanius spinitorquus), die sonderbare Manier, daß sie eine ganze Reihe Insekten an einen Dorn spießt, und sich dann erst daran macht und sie auf einmal frißt. Sie scheint sich gerne den Tisch nicht jede Minute, sondern ein für allemal decken zu wollen, um die Sache mit einander abzuthun. Der Dorndreher ist so groß, als eine Lerche, das Männchen hat einen schwarzen, von den Nasenlöchern aus nach den Augen und von da nach den Ohröffnungen gehenden Streifen, der Rücken ist rothbraun. Dagegen haben die Bergälster (L. Excubitor), die so groß ist als eine Rothdrossel, und der kleine, graue Würger (L. minor), zwar auch einen schwarzen Streifen oder Strich über die Augen, aber der Rücken ist aschgrau und bei jenem ist die Stirne weißlich, bei diesem schwarz.

8) Der Seidenschwanz (Ampelis garrulus), welcher bräunlich und schwärzlich aussieht, und an den Flügelfedern schön scharlachrothe feste Läpplein, wie von Siegellack hat, kommt nur im Winter als Wandervogel zu uns, und wird gegessen.

Als Hausvogel steht er gerade in keinem guten Ruf, denn er frißt unverschämt viel. Freilich nimmt er dabei auch mit den schlechtesten Speisen vorlieb. Wenn er sich nur nicht immer so unrein hielte, ließe man sich gern auch sein vieles Fressen gefallen: denn er wird denken, daß er das draussen im kalten Winterschnee nicht so gut haben kann, und es deßhalb mitnehmen muß, so lang er's hat.

Im heißern Amerika lebt eine sehr schöne, purpurfarbige Art von Seidenvögeln: der Pompadurvogel, (A. pompadura), so wie eine prächtig blaue, der Cotinga genannt (A. Cotinga).

9) Der Kreuzschnabel oder Krünitz (Curvirostra), dessen starker, spitziger Ober- und Unterschnabel kreuzweise über einander gelegt sind, zeigt an seinem schönen, bunten Gefieder nach Alter und Zeitumständen viele Abwechslung und ist gelblich, grünlich, röthlich. Er brütet, wenn kein anderer Vogel brütet, und um Weihnachten, wenn in unsern Wäldern alles stumm und still ist, läßt er mitten in den dichten Fichten und Tannenwäldern seinen schönen, einfachen Gesang hören, trägt dann zu Neste, und hat in der kalten Zeit des Januars schon Eier und bereits dann flügge Junge, wenn die meisten andern Vögel eben von ihren Vergnügungsreisen ins Ausland wieder heim kommen und nun erst anfangen,

Digitized by Google

für ihren künftigen Haushalt zu sorgen. Das kommt nicht daher, weil er sein Nest von Harz baut, das im Frühling zerliefe, sondern daher, weil er und seine Jungen von dem Saamen der Fichten und Tannen leben, der zum Theil gerade im Winter seine volle Reife hat, und den er dann mit seinem seltsamen Schnabel gar geschickt aus den Zapfen herauslößt. Uebrigens kann er, da wo es dieses Futter zu andern Zeiten in hinlänglicher Menge giebt, auch zu andern Zeiten nisten. Im Käfig ist's ein komischer Vogel, der sich bald bei den Füßen, bald beim Schnabel aufhängt, und deswegen, wie wegen seines bunten Gefieders, der deutsche Papagei heißt. Er kann auch ziemlich hübsch singen.

10) Der Kernbeißer (Loxia), hat einen so starken Schnabel, daß er gar leicht harte Kerne aufbeißen kann. Es gehören daher vor allem:

a) Der Dompfaff, Gimpel, (L. Pyrrhula), mit rothem Unterleib, schwarzem Kopf und Flügeln. Bei diesem Vogel ist es ganz gut, wenn er immer nur bei dem bleibt, was er auswendig gelernt hat, und von eignem Sinne so wenig als möglich hinzuthut. Denn sein eigner Gesang ist etwas gar zu einfach und gleicht nur den auf- und niederknarrenden Tönen einer Thüre; dagegen lernt er leicht allerhand schöne Melodien sowohl den Menschen als andern Vögeln nachpfeifen, und besonders unter den Dörfern des Thüringer Waldes giebt es einige, die gleichsam als hohe Schulen bekannt sind, aus denen alljährlich eine große Menge gelehrter Gimpel nach allen Gegenden hin ausgeführt werden, namentlich nach England. Es kostet wohl ¾ Jahre Zeit, ehe ein solcher Vogel abgerichtet ist, und viel Geduld. Seinem Gemüth nach ist der Gimpel ein guter, zuthätiger Vogel. Will man ihn im Käfig einige Jahre (er lebt nur etwa 6) gesund erhalten, so muß man ihm wenig, oder keinen Hanf geben, der ihn blind und abzehrend macht. Denn er ist im Freien, wo er vorzüglich Fichtensaamen frißt, gar nicht an solche Leckereien gewöhnt.

b) Der Grünling (L. Chloris), der auch hieher gehört, sieht gelblich grün aus, ist gerade kein sonderlicher, aber ein sehr fleißiger Sänger, nur kann ers nicht lassen, manchmal dazwischen zu schnarren. Er ist eben kein Kostverächter, frißt aber viel und läßt andere Vögel nicht zum Freßnapf, wenn er sich nicht selber vorerst ganz vollgefressen hat, auch noch Vorrath genug für den künftigen Hunger liegen sieht.

c) In Südafrika lebt ein merkwürdiges Thier von die-

Digitized by Google

sem Geschlecht, der geſellige Gimpel (L. socia). Mehrere hundert bis tausend Paare dieſer Vögel legen auf dem Aſt eines Mimoſenbaumes ihre Neſter in einem gemeinſamen Bau an, den ſie mit einem kunſtreich aus Gras geflochtenen Dache überwölben. Das Ganze iſt faſt wie ein großes Kloſtergebäude mit vielen Gängen und Zellen.

d) Der eigentliche Kernbeißer oder Dickſchnabel (L. Coccothraustes) mit ſchwarzer Kehle, ſchmutzig-röthlicher Bruſt, übrigens aber bräunlich und mit einem weißen Streifen über die Flügel, iſt etwas größer als der Gimpel. Er niſtet in Gärten, und thut an den Kirſchen großen Schaden, indem er das Fleiſch derſelben wegwirft und bloß nach dem Kerne geht, welchen er aufbeißt, während dagegen der Pirol blos das Fleiſch frißt, und den Kern wegwirft. Uebrigens frißt der Kernbeißer auch andere harte Sämereien, z. B. vom Ahorn u. ſ. w. Sein Fleiſch iſt eßbar.

11) Der Ammer (Emberiza), hat einen kegelförmigen Schnabel und am Gaumen einen wulſtartigen Knochenhöcker oder Zahn. Die gemeinſte Art iſt der ſchöne gelbe Goldammer (E. citrinella), der ſogar im Winter bei uns bleibt und dann ſein Futter mühſam an den Heerſtraßen zuſammenlieſt. Er niſtet nahe an der Erde. Eine andere Art iſt der graulich olivengrüne Gartenammer oder Ortolan (E. hortulana), der ſich mehr in wärmeren Gegenden, doch auch bei uns in Deutſchland da aufhält, wo ſein Lieblingsfutter: der Hirſe wächſt. Dieſer war ſeines wohlſchmeckenden Fleiſches wegen bei den alten heidniſchen Leckermäulern gar hochgeachtet, und iſt es auch noch bei den heutigen. Im Winter kommt auch zuweilen der weißliche Schneeammer (E. nivalis) aus ſeiner Heimath im höchſten Norden zu uns auf Beſuch.

12) Zur Gattung der Finken, die ſich durch einen kegelförmigen, ſpitzigen Schnabel auszeichnet, werden gar viele Vögel gezählt, z. B.

a) Der gemeine Fink (Fringilla caelebs), hat röthlichen Unterleib, ſchwarze Flügel und Schwanz, mit weißen Streifen und Flecken. An dieſem Thier hat man die ſonderbare Beobachtung gemacht, daß auch die Vögel in ihrem Geſange gewiſſe Moden halten. Denn alte Leute am Thüringer Walde erinnern ſich noch, in ihrer Jugend Waldmelodien und Weiſen von den Finken in den Wäldern gehört zu haben, die ſeitdem verſchwunden, und dagegen andere an ihrer Stelle aufgekommen ſind. Wenn alſo einmal von Zeit zu Zeit unter den Finken ein rechtes Genie aufſteht und eine

Digitized by Google

neue Melodie aufbringt, so pfeifen ihm die andern Finken alle nach, und seine Weise wird eine Zeitlang Mode. Heut zu Tag wäre es wohl gut, wenn unter den Finken, statt des ewigen „Wirthsgebühr, trinke Bier, Weingesang" auf einmal die Weise: „Bleib zu Haus, trink auch Wasser," Mode würde. In manchen Thüringer Walddörfern ist eine so große Liebhaberei an Finken, daß die Bauern sonst wohl eine Kuh für einen Finken mit ausgezeichnetem Schlage hingaben. Außerdem gehören zum Finkengeschlecht:

b) Der Haussperling (Fr. domestica). Dieser ärgert freilich manchen Gartenbesitzer durch sein ewiges Naschen sehr; doch verzehrt er auch manches schädliche Insekt.

c) Der Stieglitz (Fr. Carduelis), mit rother Stirn und Kehle und gelben Flecken am Flügel, läßt sich zu allerhand kleinen Künsten abrichten und singt mittelmäßig.

d) Der Canarienvogel (Fr. canaria), ist vor etwa 300 Jahren von den canarischen Inseln zu uns gebracht worden, wo man ihn nun in großer Menge und von den verschiedensten Farben in den Canarienhecken zieht.

e) Der Zeisig (Fr. spinus), zeisiggrün, mit gelbem Schwanzende, baut sein Nestchen gar künstlich versteckt an die Gipfelstämme hoher Erlen und Fichten, daher die Leute sonst glaubten, der Zeisig habe einen Stein im Neste, womit man sich unsichtbar machen könne.

13) Zu den vorzüglichsten Sangvögeln gehören viele Arten von Grasmücken (Sylvia), die sich alle durch einen dünnen, weichen Schnabel, kleine, etwas eingedrückte Nasenlöcher, und eine gespaltene Zunge unterscheiden. Vor allen steht hier:

a) Die Nachtigall (Sylvia Luscinia), oben rostfarbig grau, röthlich, unten hellgrau mit braunröthlichem Schwanze, ist unser berühmtester Sangvogel, der aber in manchen Gegenden von Deutschland fast ausgerottet scheint, weil jeder Vogel immer gern nur wieder in der Gegend brütet, wo er jung geworden ist, und deshalb dahin, wo man die Jungen sammt den Alten wegfängt, keine wiederkommen. Im Frühling kommen zuerst die Männchen, ein oder etliche Tage früher als die Weibchen, setzen sich dann bei Abend jedes auf einen Zweig oder Busch, und suchen es eins immer dem andern im Schönsingen zuvorzuthun. Dazu haben sie aber auch ihren guten Grund, denn wenn die Weibchen von der Reise ankommen, bemerkt man immer, daß sich diese zuerst die Männchen auswählen, die am schönsten singen, und da es immer mehr Männchen giebt als Weibchen, bleiben jene Männchen, die am schlechtesten singen, zuletzt allein übrig, und bekommen kein Weibchen. Sie bauen ihr Nest in dickbelaubten Hecken, und während das Weibchen brütet, singt ihm das Männchen etwas

Digitized by Google

vor, hilft ihm aber dann, sobald die Jungen ausgekrochen sind, diese treulich mit füttern. Man bemerkt auch, daß die Nachtigallen aus verschiedenen Ländern, etwas verschiedene Hauptgesangweisen (gleichsam Dialekte) haben. Die Nachtigall ist wohl am häufigsten in Palästina und Persien, geht aber im Sommer nördlich hinauf bis nach Schweden, und in Asien giebt es welche bis nach China und Japan, wo sie aber sehr theuer sind. Außerdem gehören daher:

b) Der Sprosser, oder die Wiener Nachtigall (S. Philomela), die etwas größer ist als die eigentliche Nachtigall und einen viel lauter schmetternden Gesang hat, den sie auch vorzüglich oft bei Nacht hören läßt, findet sich vorzüglich häufig in Ungarn, Oestreich, Polen, einzeln auch in Schlesien, Pommern, in einigen Elbgegenden, sowie in Bayern bei Eichstädt. Sie ist oben schmutzig graubraun; die Brust auf hellgrauem Grunde dunkler gefleckt, die weiße Kehle hat einen schwarzgrauen Saum, der Schwanz ist rostbraun. Sie ist dauerhafter, als die gemeine Nachtigall, und wenn sie gegen Anfang des Winters hin erkrankt, curirt man sie oft mit einigen Spinnen und Holzmaden, oder mit etlichen Tröpflein hallischer Goldtinktur, die man unter das Trinkwasser mischt.

c) die Schwarzplatte, oder der Mönch (Sylvia atricapilla), hat ein schwarzes Plättchen auf dem Kopfe, und findet sich überall bei uns. Dieser Vogel singt oft eben so schön als eine Nachtigall.

d) Die gemeine Grasmücke, oder der graue Spötter (Sylvia cineraria), ist ein immer munteres, fröhliches Vögelein, das in Gärten und an Hecken unzählige Insektenlarven und kleine Räupchen aufliest und verzehrt. Es geht vorzüglich den Insekten nach, die sich tief unten, im niedrigen Gesträuch und Gras verbergen und den grünen Raupen, die an Dornenhecken sitzen, so wie den Räupchen der Blüthenknospen. Zu diesem Geschäft ist dann nur ein so kleiner, gewandter Vogel geschickt, wie das Grasmückchen. Außer diesem Nutzen schafft jener kleine Bewohner der Gärten und Hecken dem Menschen auch viel Vergnügen durch seinen Gesang, den er oft bis spät Abends auf einem Zweige sitzend, hören läßt. Sein Liedchen tönt erst lange ganz leise, auf einmal aber endet es mit einigen lauten, schnell aufeinander folgenden Tönen, während denen der kleine Vogel sich tanzend in die Luft hebt, zuletzt eine Schwenkung im Kreis herummacht und dann sich auf sein Gesträuch setzt. Sein Lockton ist ein lautes Tzä, Tzä; die Töne der Furcht oder des Unwillens, die er so oft hören läßt, wenn sich ein Mensch oder Thier seinem Nest nähert, lauten wie ein oft wiederholtes Gä, Gä, Gä. Der arme Vogel hat auch gute Ursach, so ängstlich zu seyn. Denn sein aus Grashalmen, Moos und etwas Pferdehaar gewebtes Nestchen ist so nahe an der Erde, daß wenn es nicht die Dornhecken schützen,

Digitized by Google

in denen er deshalb am liebsten nistet, feindselige Thiere, sogar Ratzen, es gar oft berauben. — Die gemeine Grasmücke ist oben aschgrau, am Unterleib weißlich, hat an den äußersten Schwanzfedern weiße Flecken und bräunliche Füße, dagegen ist eine nahe verwandte Art, die Gartengrasmücke (S. hortensis), mehr röthlich grau, hat an den Schwanzfedern nur zarte weiße Spitzen, bleigraue Füßchen, nistet schon ein wenig höher, und hat zum Ausdruck ihres Unmuths schon das zweisilbige Wort Gääk, Gääk: während die kleine Klappgrasmücke (S. garrula), die auch, wie die gemeine, in unsern Stachelbeersträuchen nistet und viele Räupchen von den Blüthenknospen abliest, der gemeinen Grasmücke so ähnlich ist, daß man sie fast leichter an ihrem Liedchen, in dessen leise Töne sie von Zeit zu Zeit die lauten wie klapp, klapp klingenden einmischt, als am Gefieder unterscheidet.

c) Die gelbbäuchige Grasmücke, oder der grünliche Spötter (S. Hippolais), die mit ihrem „Dack, Dack, Fidhoi, Fidhoi," womit sie Zorn und Liebe ausspricht, oft auch in unsern Gärten und Anlagen, besonders da, wo einzelne Fichten stehen, gehört wird, ist oben olivenfarb, unten hellgelb, an den Schwungfedern hellgelb gerandet. Sie legt ihr künstliches Nestchen gern auf jungen Fichten oder in den Gabelzweigen der Gebüsche und zwar in einer Höhe von acht Fußen an. Es ist äußerlich meist mit weißer Birkenrinde umkleidet. Dieser kleine Vogel singt sehr schön, ist aber als Stubenvogel schwer fortzubringen.

f) Das Rothschwänzchen (S. Phoenicurus), nistet in Mauern und in hohlen Bäumen.

g) Das Rothkehlchen (S. Rubecula), das mit Recht wegen seiner Niedlichkeit und seines artigen Gesanges in Stuben sehr beliebt ist, nistet in hohlen Bäumen, Felsenritzen und in Löchern unter der Erde.

h) Der Zaunkönig (S. Troglodytes), mit braunem Oberleib, schwarz bandirten Flügelchen und Schwänzchen, weißlichem Unterleib, kommt im Winter oft in unsere Gärten, singt fein und artig, und baut ein gar künstliches, flaschenförmiges Nest. — In den heißesten Ländern von Amerika lebt ein kleiner unsrem Zaunkönig sehr ähnlicher Vogel (Thryotorus), der sein künstliches Nest gern in leere Flaschen hineinbaut, die man für ihn unter den Dächern und Gallerien der Landhäuser aufhängt. Er lohnt seinem Wirth diese kleine Mühe durch das Hinwegfangen von Fliegen und durch seinen feinen, sehr lieblichen Gesang.

i) Das Goldhähnchen (S. Regulus), ist unter allen seinen Gattungsverwandten, die bei uns sind, das kleinste und hübscheste Vögelchen, das bei seinem gelblich grünen Gefieder auch noch auf dem Köpfchen einen schönen goldgelben Flecken hat. Alle diese Arten sind eigentliche Silvien, dagegen sind

Digitized by Google

14) gewöhnliche Bachstelzen (Motacilla), mit langem Schwanz:

a) Die weiße Bachstelze (M. alba). Diese findet sich im Sommer von Island an, bis zum Vorgebirg der guten Hoffnung, und nistet in Steinbrüchen, Holzstößen u. s. w.

b) Die gelbe, oder das Ackermännchen (M. flava), nistet gern an feuchten Orten, unter Baumstämmen, auch unter Baumwurzeln an Bächen.

15) Die Meisen (Parus), haben einen kurzen, kegelförmigen, etwas zusammengedrückten, an seiner Wurzel behaarten Schnabel. Dieses sind fruchtbare Vögel, davon manche Arten, z. B. die Beutelmeise, ein sehr künstliches Hängenest bauen. Die gemeine Kohlmeise oder Finkmeise (Parus major), mit schwarzem Scheitel, oben olivengrünlichem, unten gelbem, schwarzgestreiftem Unterleib, ist im Zimmer für andere Vögel ein böser Geselle, weil sie ihnen den Kopf aufhackt, und das Gehirn herausfrißt.

16) Der Felsenhahn, große Manakin (Pipra rupicola), von der Größe einer Taube, hat einen kurzen, dreikantigen, oben gewölbten Schnabel, kurzen Schwanz, die äußere Zehe zur Hälfte mit der mittleren verwachsen. Das Männchen, von prächtig orangefarbenem Gefieder, ist mit einem großen, fächerförmigen Federbusch geziert. Der Felsenhahn lebt in Südamerika, nistet in Felsenlöchern. Die Männchen halten zur Zeit der Paarung ganz eigenthümliche Solotänze, indem immer eines von ihnen allein, mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanz und mannichfachen Bewegungen des Kopfes sich herumdreht, bis es müde ist, wo dann ein andres an seine Stelle denselben Tanz (etwa auf einem großen, platten Steine) fortsetzt. Von der Gattung des Manakins giebt es, vornämlich in Südamerika, viele Arten. Es sind fast sämmtlich buntfarbige Vögel, denen aber bei ihrem schönen Gewand die Gabe des Gesanges abgeht.

17) Der Blauspecht, Kleiber (Sitta europaea), sieht bläulichgrau aus, und klettert wie die Spechte an Bäumen herum. Er heißt auch Kleiber,

Digitized by Google

weil er öfter die Baumlöcher der Spechte aufsucht und sie, wenn sie für ihn zu groß sind, mit lehmiger Erde so verklebt, daß nur noch eine für seine Größe passende Oeffnung bleibt. Zuweilen kommt dann aber auch der Specht und bestraft ihn für seine Frechheit, indem er den Lehmen wieder weghackt und den Kleiber verjagt.

18) Die Schwalbe (**Hirundo**), zeichnet sich durch einen kurzen, schwachen, platten, bis hinter die Augen aufsperrbaren Schnabel aus. Unsere hieländischen Schwalbenarten, wovon die braunkehlige Rauchschwalbe (**H. rustica**) ein oben offenes Nest, und die weißkehlige Hausschwalbe (**H. urbica**), ein bis auf eine kleine Oeffnung zugewölbtes baut, die graue Uferschwalbe (**H. riparia**), in Löchern an Ufern und in Lehmgruben nistet, sind im Sommer unsere gar nützlichen Gäste, die uns eine Menge plagender Insekten wegfangen, aber dennoch selber von manchen Insekten, z. B. Wanzen, Schwalbenläusen u. dergl. sehr geplagt werden. Sie ziehen im Herbste alle fort in warme Länder.

In Ostindien giebt es eine kleine Art mit ganz kurzen Füßen, die Salangane (**Hirundo** oder **Hemiprocnes esculenta**), wovon sich das Männchen wie das Weibchen (jenes zum Ruhen bei Nacht, dieses auch zum Nisten) ein kleines, gallertleim-artiges, fast durchsichtiges Nestchen baut, zu welchem allerdings eine gallertartige Seetangart nebst mehreren thierischen Nahrungsmitteln den Grundstoff liefern, doch scheint dieser erst durch seine Vermischung mit dem Safte, welcher sich aus den vielen starken Drüsen des Schlundes der Salanganen-Schwalbe aussondert, seine rechte Beschaffenheit zu empfangen. Nimmt man ihnen ihre Ruhenestchen zu einer Zeit, in welcher der dort ziemlich kühle Südwind weht, so müssen sie umkommen. Diese eßbaren Schwalbennester waren vormals bei Gastmählern in Holland eine so theuere Modespeise, daß man für eines 1 Ducaten und darüber zahlte. Die seltsamen Leute denken, Alles, was theuer ist, muß auch gut seyn. Aber ein hart gekochtes Hühnerei, mit Gartensalat schmeckt viel besser, und ist nicht so theuer.

19) Der Ziegenmelker oder die Nachtschwalbe (**Caprimulgus europaeus**), ein Vogel mit dünnem, kurzem, weitrachigem Schnabel, grau und gelblich braun geflecktem Gefieder, ist so groß als eine

Digitized by Google

Amsel, und fliegt nur bei Nacht herum. Seine Stimme klingt schnarrend wie ein Spinnrad. Er frißt die Insekten, die gern auch, wie er, so spät noch auf sind, z. B. Nachtschmetterlinge.

§. 66. Die Tauben- und Hühnerarten oder die Scharrvögel (**Rasores**) unterscheiden sich durch einen an der Wurzel mit einer fleischigen Haut überzogenen Schnabel und kurze Füße. Ihre Hauptnahrung sind Pflanzensaamen.

1) Die Taube (**Columba**), hat einen an seiner Wurzel fleischig aufgetriebenen Schnabel. Bei dieser, und zwar schon bei der Haustaube (**Col. Oenas domestica**), giebt es eine so unzählige Menge von Arten und Spielarten, die bei der letzteren der Mensch durch seine künstliche Pflege hervorgebracht hat, daß man davon allein ein ganzes Büchlein voll schreiben könnte. Unsere zahmen Tauben nützen, da es gar fruchtbare Thiere sind, die unter begünstigenden Umständen in einem Jahre wohl 8 bis 10mal brüten, so daß man von einem einzigen Paare in 4 Jahren gegen 1500 Tauben bekommen könnte, am meisten durch das Fleisch ihrer Jungen.

Man bedient sich der Tauben zuweilen als schneller Briefboten, durch die man über Land und Wasser, selbst aus belagerten Städten hinaus sich Nachricht geben kann. Die Lütticher Tauben, mit denen man am 9ten August 1829 einen Versuch machte, um die Schnelligkeit des Fluges abzumessen, waren in etwa 10 Stunden von Leipzig nach Lütich geflogen, sie hatten demnach jedesmal in der Zeit von 4⅔ Minuten eine gute Stunde Weges, in jeder Secunde gegen 45 Fuß zurückgelegt und mochten hierbei wohl auch eine Zeitlang ausgeruht und Nahrung zu sich genommen haben.

a) Die Turteltaube (**Col. Turtur**), mit einem schwarzen, weiß gestreiften Flecken an jeder Seite des Halses, und die Lachtaube (**C. risoria**), gelblich, mit schwarzem Halsband am Nacken, sind, die erstere schon bei uns, die letztere aber, welche übrigens ein bekannter Stubenvogel ist, in wärmeren Ländern zu Hause.

b) Die Wandertaube (**Col. migratoria**), mit einem etwas keilförmigen, verlängertem Schwanze, lebt in Amerika und kommt dort manchmal in so ganz ungeheuren Zügen an, daß ein solcher Zug, der eine Stunde lang und ½ Stunde breit ist, die Sonne ganz verdunkelt, und in Wäldern, wo sich die Tauben niederlassen, die Aeste unter ihnen brechen.

Digitized by Google

Man fängt sie dann zu vielen Tausenden, und jede Familie in der Nähe lebt in solchen Zeiten fast von nichts als von jenen Tauben, die man auch geräuchert aufbewahrt. Denn wo sie nisten, haben sogar die Schweine eine Art von Mastung an den heruntergefallenen Eiern und Jungen, und wenn diese flügge sind, ziehen ganze Gesellschaften von dortigen Einwohnern in die Wälder, und halten ein ordentliches Erndtefest von Tauben.

c) Die Kronentaube (C. coronata), die in heißen Ländern von Asien zu Hause ist, wird so groß als ein Truthahn, dagegen die Sperlingstaube (C. passerina), aus Amerika nur so groß als ein Sperling ist.

Zu den Wildhühnern (Tetrao), die über den Augen einen kahlen warzigen Fleck und befiederte Stirn und Füße haben, rechnet man mehrere Arten, z. B.

2) Das Schneehuhn (Tetrao Lagopus), das ganz besonders rauhe (befiederte) Füße hat, und im Winter weiß wird. Es ist in den kältesten Ländern, besonders in Amerika, so häufig, daß es gar manche Familie mit seinem Fleische ernährt. Es findet sich aber auch in der Schweiz und Tyrol. Eigentlich unterscheidet man 3 Arten von Schneehühnern, das rostrothe (T. scoticus), das Moraſtschneehuhn (T. saliceti), und das eigentliche Schneehuhn (T. lagopus). Nur die beiden letztern werden weiß im Winter. Zu dieser Gattung gehören auch:

a) Der Birkhahn, Spielhahn (T. Tetrix), wovon die Männchen gar heftige Kämpfe mit einander halten, und durch ihre Kampflust gefangen werden, indem man sie durch ein, wie ein männliches Birkhuhn aufgeputztes Scheinbild ins Netz lockt, lebt hin und wieder in Deutschland, häufiger aber in nördlichen Ländern, z. B. in Norwegen und in Schweden. Das Männchen hat einen Gabelschwanz und ist grünlich schwarz mit weißen Flecken auf den Flügeln und Schwanz, das Weibchen ist rostfarb und schwarz gefleckt.

b) Der Auerhahn (T. Urogallus), ist grünlichschwarz, am Rücken weiß gesprenkelt, an der Kehle mit einem herabhängenden Federbüschel versehen, an den Schultern weiß, der Schwanz zugerundet; das Auerhuhn ist roth, braun, weiß und schwarz gesprenkelt. Der Hahn ist so scharfsichtig und scharfhörend, daß man ihn insgemein schwer schiessen kann. Wenn er aber in den Morgenstunden in den ersten Frühlingstagen, auf einem Baumaste vor einem Waldbache sitzend, seine Weibchen mit seiner lauten Stimme, die dem Wetzen einer Sense gleicht, herbeiruft, dann sieht er nur seine Weibchen, und hört nur sich selber, und der Jäger

Digitized by Google

kann sich ihm dann unvermerkt nähern und ihn schießen. Er ist so groß als ein Truthahn, und auch ein geschätztes Wildpret, welches zwar bei uns, wo der Auerhahn vorzugsweise die Gebirgswaldungen bewohnt, zu den Seltenheiten gehört, in einigen Gegenden des hohen Nordens aber, namentlich in Sibirien etwas sehr Gemeines ist. Denn am Jenisey braucht man sich nicht die Mühe zu geben den Auerhahn beim Balzen zu überlisten, sondern man geht bei Nacht mit brennenden Holzfackeln in den Niederwald und erschlägt ganze Schaaren der halbwachen, zur Flucht ungeschickten Thiere mit Stöcken und Stangen; am Oby jagt man sie in große Netze oder fängt sie in Schlingen die man in einem Flechtwerk längs des Flusses anlegt.

3) Die Wachtel (**Coturnix dactylisonans**), hat keinen kahlen Fleck, sondern nur einen gelblich weißen Strich über den Augen und ritzenförmige Nasenlöcher, die mit einer sehr aufgeblasenen Haut überzogen sind. Diese kommt im Spätfrühling in so ungeheuern Schaaren aus heißen Ländern zu uns nach Europa herüber, daß man sie da, wo sie (auf einigen Inseln an der italienischen Küste) sich ermüdet zum Ausruhen niederläßt, zu vielen Tausenden fängt, und im Herbst, wo sie zurückzieht, eben so. In China richtet man sie zu Wettkämpfen zu, und braucht sie zum Händewärmen, wenn es kalt ist.

4) Das Rebhuhn (**Perdix cinerea**) mit einem nackten, rothen, warzigen Streif unter den Augen, macht sich's bequemer, und bleibt auch im Winter bei uns. Eine Art des Rebhuhns: das Rothhuhn (**P. rufa**) lebt im südöstlichen Europa und selbst in Indien und Palästina.

5) Das Perlhuhn (**Numida Meleagris**), mit kahlem, gehelmtem Kopfe, und Fleischlappen unten an der Kehle, ist aus Afrika zu uns gebracht worden. Es legt ziemlich viele wohlschmeckende Eier, aus denen die äußerst flinken, zierlich gezeichneten Jungen bei uns nach 23 bis 24 Tagen, wenn man sie Truthennen oder gemeinen Hühnern unterlegt, ausgebrütet werden. Die Perlhühner haben eine durchdringend laute Stimme; das Geschrei der Henne klingt wie „Glock acht" oder wie „Papa."

6) Das Huhn (**Phasianus Gallus**), ist durch

die künstliche Pflege des Menschen in eben so viele Arten auseinander gegangen als die Taube. Ursprünglich scheint es in Ostindien zu Hause zu seyn, und die dortige wilde Art hat an den Flügeln eine Art solcher fester Blättchen oder Läppchen, wie der Seidenschwanz an den seinen. In England läßt man die Hähne mit einander kämpfen, und wettet dann hohe Summen darauf, ob der oder jener siegen werde.

Die Fasanen, nämlich der gemeine grüne und goldgelbe (Ph. colchicus), der in Deutschland auch gehegt wird, der Silberfasan (Ph. Nycthemerus), mit schwarz und violettem Federbusch, Kehle, Brust und Bauch, übrigens weiß mit schwarzen Linien, und der unten feuerrothe, oben gelbe mit goldfarbenem Federbusch und orangefarbenen Halskragen gezierte Goldfasan (Ph. pictus), alle im südöstlichen Asien zu Hause, gehören auch hierher. In einigen Gegenden der russischen Besitzungen jenseits des Kaukasus, z. B. bei Jekaterinograd in Ciskaukasien kommt der gemeine Fasan so überaus häufig vor, daß dort jeder gemeine Soldat oder Taglöhner fast täglich sein Fasanengericht genießen kann.

7) Das Truthuhn (**Meleagris Gallopavo**), auch Welschhuhn, Piphuhn genannt, und durch das fleischige Zäpfchen oben an der Schnabelwurzel so wie durch die Fleischwarzen am nackten Kopfe und Oberhals ausgezeichnet, ist ursprünglich in Amerika zu Hause, so daß Benjamin Franklin das Bild eines Truthahns als des Nationalvogels, statt des Adlers in die Nationalfahne der vereinigten Staaten aufzunehmen wünschte. Das Weibchen zeigt sich beim Brüten und Führen der Jungen als eine vorzüglich zärtliche Mutter, und auch das Männchen kann man, durch Berupfen des Bauches und Bestreichen desselben mit Pfeffer und Branntwein, zum Brüten der Eier bringen.

Der Truthahn kann auch so, wie viele andere Leute, die rothe Farbe nicht leiden. In England und Frankreich treiben die Bauern oft ganze Heerden vom Lande hinein nach der Stadt, blos dadurch, daß sie ein rothes Läppchen an einen Stecken binden, und ihn so den Thieren zeigen. Die Männchen besonders sind oft gar leicht zum Zorn zu reitzen und fliegen dann den Leuten auf den Hals. Einen, der in Holland in einem Lustgarten gehalten wurde und der auch so ungezogen war, drückte der Aufseher, wenn er vornehme Fremde mit Haarbeuteln und rothen Kleidern hinein zu füh-

Digitized by Google

ren hatte, allemal mit dem Kopfe zur Erde, und malte dann mit der Kreide einen weißen Strich auf den Boden, und zugleich mit über den Schnabel des Thieres weg. Da blieb dann das dumme Thier liegen, und betrachtete immer, bald mit dem einen, bald mit dem andern Auge den weißen Strich, bis der Mann wieder kam und es aufhob.

8) Der Hocoe (**Crax Alector**) von der Größe des Truthans ist ebenfalls in Amerika, doch nur in den heißeren Gegenden dieses Welttheiles zu Hause. Ein stattlicher, rabenschwarzer Vogel, geziert mit einem Federbusch von schön gekräuselten Federn, der Schnabel an seiner Wurzel von einer gelben Wachshaut umfaßt, sein Obertheil gewölbt. Sein Fleisch wie seine Eier sind wegen des Wohlgeschmackes sehr geschätzt. Im wilden Zustand bewohnt er die Wälder, wo er meist am Boden läuft. Jagt man ihn, besonders in der Abenddämmerung, oder kurz vor Sonnenuntergang, durch schnelles Hinzuspringen oder durch Hunde auf einen Baumast; dann scheint er sich hier so sicher zu halten, daß man ganz nahe hinzutreten und einen nach dem andern herunterschießen kann, ohne daß die nicht Getroffenen davon fliegen. Man hält die Hocos in ihrem Vaterlande eben so wie bei uns die Hühner auf den Höfen und in den Häusern, wo sie so heimisch und zahm werden als unser Haushuhn. Unter der Zucht des Menschen sind schon viele Spielarten vom Hocco entstanden, aber auch im wilden Zustand unterscheidet sich dieses Geschlecht in mehrere Arten, und auch der Pauxi, der keinen Federbusch, dagegen an der Basis des rothen Oberschnabels einen knochigen, kuglichen Auswuchs hat, läßt sich hieher zählen.

9) Auch das Schakuhuhn (**Penelope**) mit nackter, rother Kehle, fast von der Größe einer Fasanhenne, ist in den Waldungen von Südamerika zu Hause und wegen seines trefflichen Fleisches sehr geschätzt, anders ist das beim

10) Stinkhuhn, (**Opistocomus cristatus**), welches selbst von Hunden und hungernden Indianern wegen des abscheulichen Geruches seines Fleisches verabscheut wird; lebt ebenfalls im heißeren Amerika.

Digitized by Google

11) Der Pfau (**Pavo cristatus**), ein gar schöner, mit einem Federbusch auf dem Kopf und radförmig ausbreitbaren, buntfarbigen Bürzelfedern am Schwanze gezierter Vogel, aber mit häßlicher Stimme und boshaftem Gemüth. Denn das Männchen zerstört seinem eignen Weibchen, wenn es dazu kommen kann, die Eier, daher dieses sie meist an einen sehr versteckten Ort legt, und zeigt sich öfters selbst noch feindselig gegen die eben ausgekrochenen Jungen. Der Pfau kam aus Ostindien nach Europa, ist aber nun in manchen warmen Ländern von Europa so häufig, daß er schaarenweise in den Wäldern lebt, wie bei uns die gemeinen Fasanen. Vor Alters waren gebratene Pfauen ein vornehmes Hochzeitessen und wurden so zubereitet, daß sich das ohnehin trockene Fleisch auf mehrere Monate hielt.

12) Noch prachtvoller und feuriger als das des Pfauen, glänzt das smaragdene, rubinrothe und goldene Gefieder des Glanzfasans (**Lophophorus impeyanus**), der im Himalayahgebirge lebt, einen Federbusch wie der Pfau, dabei aber keine verlängerten Bürzelfedern am Schwanze hat.

13) Der Trapp (**Otis tarda**), ist am Körper und Gewicht der größte Vogel in Deutschland. Das Männchen wiegt oft 30 Pfund. Er lebt in ebenen Gegenden, in Kornfeldern und Sandhaiden, wo auch das Weibchen einsam brütet. Das Männchen hat unten am Halse einen drüsigen Sack, wie die Kameele, worin eine Feuchtigkeit ist, und an den Ohren lange, auswärtsstehende Federbüschel. An den langen, starken Füßen sind nur 3 Zehen, die Flügel kurz.

§. 67. Die Straußen (**Struthiones**), sind die größten Vögel, die wegen der Kürze ihrer Flügel nur laufen, nicht fliegen können, und schon in ihrem innren Baue viel Aehnliches mit den Säugthieren zeigen. Sie haben alle nur 3, ja der ächte Strauß nur 2 Zehen an den Füßen. Dahin gehören:

1) Der Casuar (**Casuarius Emeu**), ein grosser Vogel, der vom Schnabel bis zum Ende der Klauen, gegen 2¾ Ellen mißt, auf dem Kopfe ein

Digitized by Google

helmartiges Horn hat, und an den Flügeln nackte Kiele, wie Stachelschweinstacheln, findet sich im südöstlichen Asien. Er ist ein wildes, jähzorniges Thier, das wie ein Schwein grunzt, mit den Füßen stampft, fast immer böse ist und mit Schnabel und Füßen gefährlich um sich hauen kann. Er hat 3 Zehen.

2) Der Strauß (**Struthio Camelus**), ist, wenn er steht, wohl 8 Fuß hoch, meist schwarz und hat nur weiße Schwanz- und Flügelfedern, die als Zierrath für reiche Frauenzimmer sehr geachtet sind. Die Füße haben 2 Zehen und sind fast wie Kameelfüße gestaltet.

Das Ei ist so groß, daß mehrere Menschen daran zu essen haben, und man findet meist eine ziemliche Anzahl (mehrere zwanzig) solcher Eier in einem Neste. Denn während der Zeit des Nistens halten sich gewöhnlich vier bis fünf Hennen mit einem Hahn zusammen; die Hennen legen ihre Eier meist in ein gemeinschaftliches Nest, das nur aus einer im Sand ausgescharrten Grube besteht, und brüten, außer in den heißesten Stunden des Tages, abwechselnd, wobei auch der Hahn sie ablöst. Die Jungen laufen sogleich, sobald sie aus dem Ei gekrochen sind, munter herum, wie dieß einst ein Begleiter von Adanson sahe, der ein Straußenei, darinnen das Junge nahe am Auskriechen war, in seinen Hut gelegt hatte, um es mit aufs Schiff zu nehmen. Die erste Nahrung der Jungen besteht gewöhnlich in den überflüssigen, unbebrüteten Eiern, welche die Fruchtbarkeit und Sorglosigkeit der Mütter auch außerhalb dem Umfang des Nestes hingebracht hat, später frißt der Strauß Pflanzen und Pflanzenfrüchte, verschluckt aber auch große Steine, Eisen, ja glühende Kohlen. Er läßt sich zähmen, und wäre dann ein herrliches Reitpferd, das 2 Mann auf seinem Rücken tragen und damit schneller laufen könnte als das schnellste Pferd; aber das dumme Thier hat die Art, daß es immer im Kreise läuft, und man mag es lenken wie man will, nach einiger Zeit immer wieder an den Ort hinkommt, von wo es ausgelaufen war. Auch die zahmen Strauße sind, besonders gegen Fremde, sehr wild und böse und schlagen mit den Füßen so heftig aus, daß sie einem den Leib aufreißen können.

3) Die Rhea, oder der Tuju (**Rhea americana**), ist bedeutend kleiner als der Strauß und hat 3 Zehen an den Füßen. Sie lebt im südlichsten Amerika und auch der neuholländische sogenannte Casuar gehört zu diesem Geschlecht.

Digitized by Google

§. 68. Die Sumpfvögel (**Grallae**), zeichnen sich meist durch gar besonders lange Beine und auch meist langen Hals aus. Dahin gehören einige ganz vorzüglich nützliche und wohlthätige Vögel, welche es so muthig, und zugleich so geschickt im Kampfe mit den giftigsten Schlangen aufnehmen, die sie ganz besonders gern zu fressen scheinen, daß sie für die heißen Länder, in denen sie und die Schlangen wohnen, eine recht große Wohlthat sind. Sie kämpfen ja eigentlich doch für den Menschen, der diese Kämpfe selber zu bestehen kein Geschick hat. Fährt die Schlange nach ihnen, so fliegen sie auf, und wissen sie dann immer mit dem Schnabel hinter dem Kopfe zu packen, den sie zerknirschen, so daß ihnen die Schlange nichts mehr thun kann. Die wichtigsten Geschlechter der Sumpfvögel sind:

1) Der Flamingo (**Phoenicopterus ruber**), ein großer, im Alter schön roth überlaufener Vogel, der aus Afrika manchmal auf kurze Zeit auch zu uns kommt, z. B. an den Rhein bei Straßburg. Der breite, nicht sehr lange, winklicht gebogene Schnabel ist wie aus mehreren Stücken zusammengeleimt, die Füße und der Hals sind im Verhältniß zum Leibe überaus lang. Der Flamingo baut ein Nest wie einen Backofen, und ganz oben liegen die Eier. Wenn er dann brütet, streckt er die langen Beine zu beiden Seiten neben dem Neste nieder, als wenn er ritte.

2) Der Löffelreiher (**Platalea Leucorodia**), zeichnet sich durch seinen nach vorn löffelartig rund endigenden Schnabel und seine unbefiederte Kehle aus. Er hat die Größe des Reihers, ist weißfarbig, nistet in den nördlichen Küstengegenden auf hohen Bäumen. Bei einer amerikanischer Art des Löffelreihers (**Pl. Ajaja**), ist das Gefieder rosenfarb überlaufen.

3) Der Storch (**Ardea Ciconia**), mit langem, spitzen Schnabel und ritzenförmig langgezogenen Nasenlöchern, ist ein allbekannter Vogel, der in vielen sumpfreichen Gegenden von Deutschland sein wie ein Wagenrad großes Nest auf die Häuser baut, und welcher im Herbste gar weite Reisen in wärmere Länder macht.

Digitized by Google

Er frißt viele Schlangen, Frösche, Mäuse weg, freilich auch manchmal junge Rebhühner u. s. w. Auch der graue Reiher (**A. cinerea**), der so manchen Fisch aus unsern Teichen stiehlt, und die rostgelbe, schwarzgefleckte Rohrdommel (**A. stellaris**), so wie der dickhalsige, in wärmeren Ländern lebende Nachtrabe (**A. Nycticorax**), können zu diesem Geschlechte gerechnet werden. Die zuletzt genannte Art (der Nachtrabe) scheint die „Rohrdommel in der Wüste" zu seyn.

An das Geschlecht der Störche schließt sich auch der ostindische Riesenstorch oder Marabu (**Ciconia Argala**) an, dessen Schwanzdeckfedern, die am Bürzel des Vogels stehen, ein beliebter Schmuck der Damen sind. Der Marabu ist, wenn er in seiner Weise gerade aufrecht steht, mehr als Mannshoch, hat einen ziemlich langen, dicken, gelblichen Schnabel, nackten Hals und Kopf und klaftert mit ausgespannten Flügeln gegen 15 Fuß weit. Durch das Vertilgen von Schlangen wird er sehr nützlich, verschlingt aber auch Aas, frißt das Fleisch der im Ganges schwimmenden Leichname der Hindus. In den heißesten Stunden des Tages erhebt er sich in die kälteren Höhen des Luftkreises und tummelt sich da herum, bis der Tag kühl wird. — Selbst den amerikanischen Jabiru (**Mycteria americana**) kann man zu den Störchen zählen, von denen er sich nur durch die etwas aufwärts gehende Biegung seines Schnabels unterscheidet.

4) Der Kranich (**Grus cinerea**), 4 Fuß hoch, grau, mit schwarzer Kehle, rothem, fast nacktem Hinterhaupt, langen, weichen, gekräuselten Federn am Bürzel, nistet im Sommer schon im nördlichen Deutschland auf hohen Bäumen und zieht im Herbst nach Süden. Er frißt Getreide und Insekten. Gezähmt zeigt er sich als ein sehr kluger Vogel.

5) Der Austernfischer (**Haematopus**), der sich durch seinen von beiden Seiten zusammengedrückten, vorn keilförmig endigenden, langen Schnabel unterscheidet, hat nur 3 Zehen an seinen rothen Füßen. Er lebt an der Ost- und Nordsee.

6) Der Strandreuter (**Himantopus**), hat ebenfalls nur 3 Zehen an seinen unverhältnißmäßig langen, schmal zusammengedrückten, korallenrothen Füßen.

7) Den Wassersäbler (**Recurvirostra Avocetta**), unterscheidet man leicht an seinem langen,

Digitized by Google

flachen, aufwärts gekrümmten Schnabel. Er, wie der Strandreuter, bewohnt die europäischen Küstengegenden und Flußufer, namentlich in Holland.

8) Der Brachvogel (**Numenius arquata**) hat einen langen, bogenförmig nach unten gekrümmten Schnabel; zwischen seinen Vorderzehen findet sich eine Haut ausgespannt.

9) Der Ibis (**Ibis sanctus**), der viele schädliche Amphibien, besonders Schlangen, wegfängt, war bei den alten Aegyptern so hoch geehrt, daß sie ihn sogar nach seinem Tode einbalsamirten, und fast göttlich verehrten. Das machen die Menschen oft so, daß sie gerade da übertrieben dankbar sind, wo sie es eben nicht brauchten, und da gar nicht, wo sie es am meisten sollten.

Eine schön rothfarbige Art des eigentlichen Ibis lebt im südlichen Amerika und heißt der Scharlach-Ibis (**I. rubra**). Dagegen ist der ägyptische Sichelstorch-Ibis (**Tantalus Ibis**) kein eigentlicher Ibis, sondern unterscheidet sich von diesem durch den viel stärkeren Schnabel.

10) Die Schnepfen (**Scolopax, z. B. rusticola**), mit langem, geradem, in ein stumpfes Ende ausgehenden Schnabel, sind wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches sehr beliebt.

11) Der Kiebitz, mit kleiner Hinterzehe und einem Federbusch auf dem Kopfe (**Tringa Vanellus**), noch mehr aber der Kampfhahn (**T. pugnax**), davon das Männchen zur Begattungszeit einen Federkragen am Halse hat, sind auch eßbar. Aus dem letztern macht man (in England besonders) eine große Delikatesse; man muß aber, wenn man ihn lebendig einsperrt, nicht mehrere Männchen in einem Korbe lassen, denn sie sind so streitsüchtig, daß sie sich meist unter einander umbringen. Selbst im Freien draußen kämpfen sie unaufhörlich mit einander, wo es doch Sonne und Futter für alle genug gäbe.

12) Der Regenpfeifer (**Charadrius**), mit kolbig endigendem Schnabel, hat nur 3 Zehen.

13) Das Wasserhuhn (**Fulica atra**), ein schwärzlicher Vogel, mit einer kahlen Bläße an der Stirn, findet sich fast überall in Deutschland in Tei-

Digitized by Google

chen und Seen. Aus dem Fell macht man hie und da ein Pelzwerk zu Müffen.

14) Der Wachtelkönig (**Rallus Crex**), so groß wie eine Amsel und mit bräunlich gesprenkeltem Gefieder, nistet und lebt auf unsern Wiesen, wo er bei Abend oft seine schnarrende Stimme hören läßt. Im Herbste ist er überaus fett.

15) Der Spornflügler (**Parra Jacana**) zeichnet sich durch Sporenansätze an den Flügelbuchen und durch unverhältnißmäßig lange, dünne Zehen aus. Er lebt in Südamerika an Sümpfen.

§. 69. Die Schwimmvögel (**Natatores**), haben kurze Schwimmfüße, deren Zehen durch Häute unter einander verbunden sind. Sie sind auch durch ihre Federn, Fleisch und Eier gar nützliche Thiere. Denn sie nisten z. B. an manchen armen, nördlichen Küstenländern, in solcher Menge, daß die Menschen, die dort wohnen, und die sonst gar nicht viel haben, (auch keine Hühner mehr halten können, für welche es da zu kalt wäre) ohne Mühe sich so viele Eier für ihren Haushalt sammeln können, daß sie fast das ganze Jahr daran genug haben.

1) Der Verkehrtschnabel (**Rhynchops nigra**) fällt ganz besonders durch den merkwürdigen Bau seines Schnabels in die Augen. Denn dieser ist, wie eine Messerklinge, von beiden Seiten flach zusammengedrückt; der Unterschnabel ist viel länger als der Oberschnabel. Er lebt am Meere, von dessen Oberfläche er sich seine Nahrung (Fische und andre Seethiere) abschöpft.

2) Die Möve (**Larus**), ist ein schnellfliegender Vogel mit einem etwas gebogenen, an seinem Untertheile eckigem Schnabel, so wie schwarz, weiß und grauem Gefieder, der am Meere und an Landseen wohnt und nistet. Eine Möve von der bei uns gewöhnlichsten Art, die Lachmöve (**L. ridibundus**), mit rothem Schnabel und Füßen, bräunlich schwarzem Kopfe, bläulich grauem und weißem Gefieder, kann, wenn sie Junge zu versorgen hat, für welche sie das Futter weit herholen muß, selbst noch schneller als die Tauben

Digitized by Google

(nach S. 413) fliegen und einen Weg von mehreren Stunden in einer halben Viertelstunde zurücklegen.

3) Die Seeschwalbe (**Sterna**, z. B. **hirundo**), hat einen gabelförmig getheilten Schwanz und sehr lange Flügel, mit denen sie ungemein schnell fliegt. Sie findet sich auch an Landseen, großen Flüssen und Meeresküsten.

4) Der Pelecan (**Pelecanus Onocrotalus**), lebt in wärmeren Ländern, und hat einen sehr großen häutigen Beutel unter dem Unterschnabel. Wenn das Weibchen weit landeinwärts in trocknen Felsenklüften brütet, oder wenn die Jungen ausgekrochen sind, dann trägt der Pelecan in seinem Beutel eine so große Menge Wasser zum Neste, daß auch das dürstende Kameel der Wüste, welches da vorbei zieht, öfters davon gelabt wird. Und in der Natur sammelt und arbeitet gerne eine Kreatur für die andere.

An das Geschlecht des Pelecans reihen sich durch die gemeinsame Schwimmhaut, welche die drei Vorderzehen mit der etwas einwärtsstehenden Hinterzehe verbindet, folgende zwei Gattungen:

5) Der Fregattvogel (**Tachypetes aquilus**), ausgezeichnet durch die außerordentliche Länge seiner Fügel und gabelförmigen Schwanz, und

6) Der Tropikvogel (**Phaëton**), der sich durch die bedeutende Verlängerung seiner schmalen mittleren Schwanzfedern unterscheidet. —

7) Der Sturmvogel (**Procellaria**) und 8) der mächtig große Albatroß (**Diomedea exulans**), beide Bewohner des Meeres, unterscheiden sich dadurch, daß ihre Nasenlöcher sich röhrenförmig auf dem Oberschnabel verlängern.

9) Die Gans und Ente (**Anas Anser** und **A. Boschas**), mit einem Schnabel, in welchem inwendig blättrige Zähnchen stehen, der auswendig mit einer empfindlichen Oberhaut überzogen ist, und vorn wie ein Fingernagel zuläuft, sind alte bekannte und gar nützliche Hausthiere, durch ihre Federn, Eier und Fleisch. An den ersteren übertrifft freilich alle Arten die Eidergans (**An. mollissima**), die gerade da

Digitized by Google

wohnt, wo es am kälteſten iſt, und man am meiſten ſo eine warme Decke gebrauchen kann, z. B. an Labrador ſo wie an Island und Norwegen, wo dann die Leute oft mit der größten Lebensgefahr an ſteiler Felswand ihr Neſt erbeuten. Das Männchen hat bei dieſer Art an beiden Seiten des Kopfes einen ſchwarzen ſichelförmigen Flecken, am Hals iſt es grün, am Oberleib weiß, am Unterleib ſchwarz gefärbt; das Weibchen dagegen iſt nur braun und ſchwarz gefleckt. Aber unſre gemeine Gans verſteht dennoch, weil ſie viel allgemeiner verbreitet iſt, noch eine viel größere Zahl von Menſchen mit wärmenden Betten, obgleich man berechnen kann, daß zu dem vollſtändigen Bette eines deutſchen Bürgers oder Landmannes, wenn daſſelbe 40 bis 50 Pfund Federn enthält, die Federn von 200 Gänſen gehören und daß mithin 5 Millionen Gänſe ihr Gefieder hergeben müſſen, um für eine unſrer Mittelſtädte 25000 Betten auszuſtatten. Auch unſer allbekannter Teichſchwan (**An. Olor**), mit einem ſchwarzen Höcker an der Wurzel des Schnabels, gehört zu dieſer Gattung.

10) Der Steißfuß (**Podiceps**), von welchem es auf unſern Teichen und Seen mehrere Arten giebt, unterſcheidet ſich dadurch, daß ſeine Zehen nicht durch eine vollkommene Schwimmhaut verbunden, ſondern nur mit ſchildartig breiten Hautlappen eingefaßt ſind. Die Füße ſtehen ſehr weit nach hinten.

11) Der Papageytaucher (**Mormon Fratercula**), der in den nördlichſten Küſtengegenden lebt, wo er ſich lange Höhlen in den Sandboden gräbt, da hinein er ſein Ei legt, hat einen Schnabel, der faſt eben ſo hoch als lang und von Queerfurchen durchzogen iſt.

12) Der Pinguin (**Aptenodytes**), der in den kälteſten Meeresgegenden der ſüdlichen Erdkugel lebt, hat ſtatt der Flügel floſſenartige, mit Schuppen bedeckte Lappen, deren er ſich auch beim Schwimmen, wie ein vierfüßiges Thier ſeiner Vorderfüße bedient. Wo die Seefahrer in dieſen fernen Meeren gar nichts mehr zu eſſen finden, da iſt für ſie auf jeder kleinen

Digitized by Google

Insel, auf welche die Pinguine zu Tausenden ihre Eier hinlegen, bereits der Tisch gedeckt. Das Fleisch der Thiere selbst schmeckt thranig.

§. 70. Die Klasse der Säugethiere (Mammalia), steht in ihrer ganzen leiblichen Bildung und Entwicklung dem Menschen, der ja seinem Leibe nach selber zu ihr gehört, am nächsten. Denn obgleich bei den Säugethieren sich selten etwas findet, was den unwillkührlichen und ganz bewußtlosen, aber desto bewunderungswürdiger in die Augen fallenden Kunsttrieben der Insekten, ja selbst denen der Vögel entspräche, so zeigt sich dafür desto öfter in dieser Klasse eine Spur, oder gleichsam ein Vorbild der höheren Seelenfähigkeiten, die der Mensch hat, und man kann zum Beispiel von einem Elephanten sagen, daß er wirklich mit Ueberlegung handle. Die Säugethiere haben warmes, rothes Blut, ihr Blutumlauf ist, wie der bei den Vögeln, jener vollkommene, der oben S. 388 beschrieben wurde. Sie gebären lebendige Junge, und säugen diese an Brüsten. Ein Theil von ihnen ernährt sich aus dem Pflanzenreich, ein anderer frißt thierisches Fleisch. Der Mensch findet in dieser Klasse seine vorzüglichsten, wichtigsten Hausthiere, die ihm zum Theil so lieb und unentbehrlich geworden sind, daß er sie überall, wohin er bis jetzt auf der Erde ausgewandert war, mit sich genommen hat. Obgleich es etwas unschicklich herauskommt, den Menschen, von dem wir zuletzt auch einige Worte reden möchten, auf die Schnabelthiere und Consorten folgen zu lassen, so wollen wir dennoch hier, um das Auffinden und Nachschlagen zu erleichtern, die gewöhnliche Ordnung beibehalten, und von den Affen anfangen. Ist es doch ohnehin mit dem, was wir von der innern Vollkommenheit eines Thieres wissen, noch etwas sehr Ungewisses, und der plumpe Elephant, der doch z. B. weniger Aehnlichkeit mit dem Menschen hat, als das elende Faulthier, steht dem Menschen in mancher Hinsicht, und zwar namentlich in den höheren Seelenfähigkeiten eben so nahe, und vielleicht näher, als der menschenähnliche Affe. Uebri-

Digitized by Google

gens ist, was die Hauptsache betrifft, schlechterdings vom Thiere kein eigentlicher Uebergang zum Menschen, und wie der Himmel, der die Erde rings umher umgiebt, jedem Punkte ihrer Oberfläche gleich nahe und gleich ferne steht, so ist auch der Mensch, wie man eben will, vom Thierreich ganz geschieden, oder mit ihm nahe vereint. Es ist daher im Grunde genommen, einerlei, über welchem Punkte der untern, niedern Welt man mit jener höheren anfangen will.

Man pflegt zwar bei der Eintheilung der Säugethiere auf das Vorhandenseyn und die Bildung der 3 Arten von Zähnen, (Schneide-, Eck- und Backenzähne) und auf die Beschaffenheit der Füße sowie der Zehen und Klauen eine besondere Rücksicht zu nehmen. Doch dürfen hierbei auch der äußre Gesammtumriß und der innre Bau, vor allem der des Gehirns, nicht unberücksichtigt bleiben. Wir haben aus diesem Grunde in der nachstehenden Anordnung der Familien der Säugthiere im Vergleich mit den früheren Ausgaben dieses Lehrbuches manche Aenderung nothwendig gefunden, obwohl auch hierbei der Gang der Entwicklung des Thierreiches aus den niedern Formen zu den höheren, menschenähnlicheren nur im Allgemeinen, in dem Verhältniß ganzer größerer Massen angedeutet werden konnte. Denn diese Entwicklung steigt, wie schon oft bemerkt worden, nicht nur in einer geraden Linie, etwa von den Grenznachbarn an der Klasse der Vögel, von den Schnabelthieren zu dem Orangoutang auf, sondern von so verschiedenen Seiten und Enden her, wie die Linien, die man von den einzelnen Punkten des Umfangs eines Kreises her nach dem gemeinsamen Mittelpunkte zieht. Dieser Mittelpunkt ist der Mensch, zu dessen Verähnlichung die einzelnen Ordnungen und Familien des Thierreiches von sehr verschiedenen Seiten her in ihrer Entwicklung anstreben.

§. 71. Die Affen (**Simiae**) heißen auch vierhändige Thiere, weil ihre hinteren Füße vermöge des abgesonderten Daumens fast eben so gebildet sind, wie die Hände, und weil sie auch mit diesen hintern

Digitized by Google

Händen eben sowohl alles anfassen und verrichten können, als mit den eigentlichen Händen. Dabei haben manche von ihnen, statt einer 5ten Hand, den Wickelschwanz, mit dem sie sich nicht blos an Bäumen aufhängen, sondern mit dem sie auch allerhand Dinge ergreifen und an sich ziehen können, wie mit einer Hand. Sie haben alle 3 Arten von Zähnen.

Die Affen sehen dem Menschen ähnlicher, als irgend ein Thier, und besonders sind die Arten des Orang-Outang in alter wie in neuer Zeit gar oft für Menschen von einer besondern Art, die nicht reden könnten oder wollten, eine haarige Haut hätten, und um sich bissen und kratzten, gehalten worden. Doch kann, ohngeachtet dieser Aehnlichkeit, der Affe weder dem Menschen einen einzigen Laut der Sprache nachbilden lernen, (seine Stimme ist ein häßliches Plärren, Schreien oder Brüllen) noch auch so vollkommen und eigentlich aufrecht gehen, wie der Mensch. Denn, wenn der Affe auch auf seinen Füßen steht, so sind doch die Kniee immer vorgestreckt, und seine gebogene Stellung noch viel auffallender, als bei ganz blödsinnigen Menschen. Es haben aber schon die Alten gesagt, der Hauptunterschied des Menschen von allen, auch den ihm ähnlichsten Thieren, bestehe darinnen, daß der Mensch sein Haupt frei zum Himmel erheben, und immerfort, im Gehen wie im Stehen nach oben aufblicken könne, gleich als der mehr für den Himmel gemacht ist, als für die Erde, oder wenigstens mit jedem Augenblick eben hiermit an den Himmel erinnert werden soll.

1) Der eigentliche Affe (**Simia**), wohin vor allen der ungeschwänzte und ganz besonders menschenähnliche Orang-Outang (**S. Satyrus** und **Troglodytes**) gehört, zeichnet sich durch eine menschliche Bildung der Ohren und Hände, und durch nach vorne stehende Nasenlöcher aus. Seine Arten leben in den heißesten Gegenden Asiens und seiner südlichen Inseln, so wie in Afrika.

Der Orang-Outang geht sehr oft auf den Füßen, wobei er zuweilen in den Händen einen Stock trägt, lebt in

Digitized by Google

Gesellschaften, die sich selber Laubhütten zum Schutz gegen die Sonne bauen, Elephanten die in ihr Gehege kommen, mit Prügeln und Steinwürfen verjagen, auch sehr oft den Menschen, die in ihre Gegend kommen, gefährlich werden, und zuweilen Kinder entführen (Mädchen), die sie bei sich wie ihres Gleichen halten. Aber bei alledem ist ein solcher, auch noch so klug abgerichteter Affe, doch (wenn er gesund ist) ein tückisches, boshaftes Thier, das alles gern zerstört und zerreißt, unreinlich und unkeusch ist, und man sieht da recht, daß der Affe, außer seinen gelernten Künsten, nur die bösen (thierischen) Eigenschaften vom Menschen habe, daß aber der Mensch alle seine guten, die er erlangen kann, nur dem Wort, der Sprache, oder wenigstens dem Verstehen ihres eigentlichen Sinnes verdanke. Denn den eigentlichen Sinn der Menschensprache versteht der Affe nie so, wie der taubstumme Mensch sie versteht, obgleich jener nach und nach einzelne Wörter der Drohung und des Antreibens zu seinen Künsten fassen lernt. Werden die Orang-Outangs, wovon der von Borneo, wenn er ausgewachsen ist, die Größe eines Mannes erreicht, und übertrifft, jung gefangen, so lassen sie sich gar leicht zu vielerlei abrichten, z. B. Holz und Wasser in die Küche zu tragen, den Bratspieß zu wenden, sich anzukleiden wie ein Mensch, mit demselben zierlichen Anstand zu essen und zu trinken, wie viele Menschen, besonders aber zu solchen Künsten, die eigentlich Affen-, nicht Menschenkünste sind, z. B. zum Seiltanzen, denn da übertrifft ein Affe seinen Affen: den Seiltänzer, bei weitem.

Diese Geschicklichkeit der Affen überhaupt (nicht des Orang-Outangs allein) macht sich übrigens der Mensch zu Nutze, wenn er welche zum Schiffsjungen- und Matrosendienst abrichtet, denn ein solcher Affe klettert bei Sturm und bei allem Schwanken des Schiffes mit Leichtigkeit auf den höchsten Mastbaum hinauf, und verrichtet da am Segelwerk Alles, was man ihn gelehrt hat. Ein solcher abgerichteter Schiffsaffe, den die Matrosen auf einem europäischen Schiffe bei sich hatten, betrachtete sich ordentlich und sie ihn auch, als ihres Gleichen, und wenn die Matrosen sich zum Frühstück oder Mittagessen hinsetzten, setzte er sich auch zu ihnen, und mußte dann seine Portion Branntwein und Schiffszwieback eben so gut erhalten, als die Matrosen, arbeitete aber auch eben so viel, und zum Theil mehr, als einer von ihnen. Wie in dem eben erwähnten Falle beim Seedienst, benutzt man die Geschicklichkeit und Dienstfertigkeit mancher Affen auch bei allerhand Geschäften auf dem Lande. Namentlich richtet man sie ab, auf hohe Bäume zu steigen, und die Früchte derselben abzunehmen und herunter zu werfen, so wie junge Vögel aus hoch gelegenem Neste herabzuholen.

Es ist etwas sehr Bedenkliches, Affen, die in Gesellschaften beisammen sind, zu beleidigen, denn wenn einer in Zorn und Grimm gebracht ist, gerathen gleich die andern alle auch

Digitized by Google

hinein. Das erfuhr ein vornehmer Europäer, der mit mehreren seiner Freunde im Senegalflusse in Afrika mitten unter dichten Bäumen hinauffuhr. Sie kamen an einen Ort, wo eine ganze Gesellschaft von Affen war, die Anfangs ganz ruhig und neugierig der Fahrt zusahen, reihenweise auf die vordersten Aeste kamen, und dann, wenn die eine Reihe genug gesehen hatte, eine andere vorließen. Der vornehme Europäer hatte den Einfall, unter die Affen schießen zu lassen. Da veränderte sich die ganze Sache gewaltig, denn die Affen warfen nun so grimmig mit Aesten, und Allem, was sie erwischen konnten, auf die im Boote sitzenden Leute hinunter, daß diese in Lebensgefahr kamen, und schnell entfliehen mußten.

Zu der ersten, vollkommensten Abtheilung der Affen, die ein rundlicheres menschenähnlicheres Gesicht, keinen Schwanz und keine Backentaschen hat, gehört außer den Orang-Outangs: der langarmige Affe oder Gibbon (S. **Lar**).

2) Der Magot, oder sogenannte gemeine Affe, (**Inuus ecaudatus**) hat auch keinen eigentlichen Schwanz, sondern statt desselben nur einen häutigen Anhang. Es ist der grünlich graue, im nördlichen Afrika wohnende Affe, den die Kameeltreiber und Bärenführer so gar oft mit sich führen, daß ihn jedes Kind kennt.

3) Der Meerkatzenaffe (**Cercopithecus**), besitzt einen Schwanz und Backentaschen. Die hieher gehörigen Arten leben alle in der alten Welt (Ostindien, Afrika) und halten sich in großen Gesellschaften zusammen. Dahin gehört der grünliche Affe aus Afrika (**C. sabaeus**), der oft lange keinen Laut von sich giebt, der dafür aber desto mehr Grimassen macht, und sich den Jägern durch seine Ungezogenheiten verräth, indem er Zweige und allerhand Anderes auf sie herunterwirft von den Bäumen, auf denen er sich versteckt hält. Auch gehört hieher der chinesische Hutaffe (**C. sinicus**).

4) Der Pavian (**Papio**), hat eine lang vorragende Schnautze, und neben der Nase öfters bunte (grüne, rothe) Streifen. Der Pavian ist ein überaus boshafter Affe, der auf Menschen, die durch seine Wälder gehen, Steine herunter wälzt, und sie, wenn er sie erwischt, öfters aufs Grausamste umbringt. Er ist zwar meist nur so groß, als ein mittelmäßiger Hund,

Digitized by Google

hat aber viel mehr Gewalt als ein Mensch. Seine Arten finden sich in Afrika und Asien.

5) Die Arten des Sapajous (**Cebus**), ohne Backentaschen und Gesäßschwielen, davon sehr viele einen Wickelschwanz haben, der ihnen fast wie eine Hand dient, wohnen in den heißesten Gegenden von Amerika und leben zu ganzen Heerden in den Wäldern beisammen.

Da hört man zuweilen, z. B. den schwarzen Brüllaffen oder Waldteufel (**Mycetes ursinus** oder **Beelzebub**) bei Nacht in den Wäldern erst einzeln, mit dumpfer, tiefer Stimme brüllen. Es dauert aber gar nicht lange, so stimmt die ganze Gesellschaft ein und fängt auch laut zu brüllen an, und das hat Gelegenheit gegeben zu einer Fabel von Affenpredigten in Brasilien, wo erst einer eine Rede ans Volk hielte, und dann das ganze schwarzpelzige Volk zu singen anfienge. Manche Art, wie z. B. ein solcher Brüllaffe von röthlich brauner Farbe (**M. seniculus**), wird von den dort lebenden Einwohnern gegessen. Es mag aber ein häßlicher Anblick seyn, einen solchen Affen gebraten auf dem Tisch zu sehen, denn er sieht aus, wie ein (weinendes) Kind, dessen Größe er auch hat. Unter den amerikanischen Affen zeichnet sich hauptsächlich das Sajongeschlecht (**Cebus**) aus. Darunter giebt es sehr artige Thierchen, die zum Theil schon ihrer Kleinheit wegen nicht so bös seyn können, als die großen Affen, aber freilich, wenn sie z. B. eine Uhr oder einen Spiegel, oder sonst etwas der Art erwischen können, erst sich ganz entsetzlich darüber freuen, dann aber alles am Boden in Stücken schlagen und die Stücke wegwerfen. Mit ihren Wickelschwänzchen vermögen sie überaus kräftige und geschickte Bewegungen zu verrichten. Dahin gehört der: braune Sajou (**Cebus Apella**), so wie der Winselaffe (**C. capucinus**) u. a.

6) Das Sachoinchen, Eichhörnchenäffchen (**Callithrix sciureus**), ist eines der niedlichsten amerikanischen Aeffchen. Mund und Nase sind schwärzlich, das Gesicht weißlich, übrigens ist es gelblich.

7) Der Halbaffe oder Maki (**Lemur**), zeichnet sich durch die spitzige Kralle am Zeigefinger der Hinterhand, so wie durch eine hundeartig gestaltete Schnautze aus. Er findet sich in verschiedenen Arten auf Madagaskar.

8) Der fliegende Maki (**Galeopithecus volans**), hat eine behaarte Flughaut, die ihm nur als Fallschirm dient, und blos zwischen Füßen und Schwanz

Digitized by Google

ausgebreitet ist, so daß dieses Thier nur eine ohngefähre Annährung der Affenarten an die nächstfolgende Familie der Säugthiere bildet. Er ist so groß als eine Katze und lebt auf den Molucken.

§. 72. Die Handflughäuter oder Fledermausarten, (**Chiroptera**), unterscheiden sich durch die sehr langen Finger der Vorderfüße, die länger sind, als der ganze Körper, und zwischen denen auch die Flughaut ausgespannt ist, mittelst welcher sie fliegen oder flattern können. Ihre Brüste stehen, wie bei den Menschen und Affen, vorne zwischen den Vorderfüßen, auch haben sie, wie Mensch und Affe, alle 3 Arten von Zähnen.

1) Der fliegende Hund (**Pteropus edulis**), der auf den Molucken und in Ostindien, so wie, wenigstens in nahe verwandten Arten auf den Südseeinseln lebt, ist noch die erträglichste, am wenigsten häßliche Fledermaus. Denn er hat ein schönes glänzendes Haar, auch hat er fast die Gestalt eines Hündchens, wird zwar höchstens 15 bis 18 Zoll lang, klaftert jedoch mit ausgespannten Flügeln über 4 Fuß. Seine Flughaut ist zwischen den Schenkeln tief ausgeschnitten, er hat keinen Schwanz. Er lebt nur von Pflanzen- (z. B. Palmensäften und Früchten) die er aussaugt oder frißt, und ist auf den Molucken so häufig, daß er am Tage in ganzen Klumpen zusammenhängt und beim Auffliegen die Luft verdunkelt. Man ißt sein wohlschmeckendes Fleisch, braucht auch seine Haare zu allerhand Webereien. Er läßt sich sogar etwas zahm machen. Bei den Hindus wird er als heiliges Thier geschätzt und verehrt.

Eine keinere Art des fliegenden Hundes: Der ägyptische (Pt. **aegyptiacus**) findet sich in Unterägypten, in Grotten und in den Kammern der Pyramiden.

2) Das Geschlecht der Fledermaus (**Vespertilio**), enthält häßliche, zum Theil übelriechende Thiere, die durch allerhand häutige Ansätze an Nase und Ohren häßlich entstellt, oder durch andere widerwärtige Eigenschaften für den Menschen ein Gegenstand des Ekels und sogar des Abscheues sind. Dieses letztere gilt übrigens nicht sowohl von dem bei

Digitized by Google

uns einheimischen Arten, welche durch das Vertilgen vieler schädlicher Insekten, namentlich der Nachtschmetterlinge für den Haushalt der Natur sehr nützlich werden und nur nebenbei auch etwa den Speck in den Schornsteinen benaschen, sondern vorzugsweise von einigen in heißen Erdtheilen wohnenden Arten. Die Fledermäuse sind lichtscheue Thiere, die sich am Tage in ihren Schlupfwinkeln verborgen halten und erst in der Dämmerung auf ihre Beute ausgehen. Die Jungen, deren sie nicht über zwei auf einmal gebären, saugen sich gleich nach der Geburt fest an die Brustwarzen der Mutter an und werden von dieser auf ihrem nächtlichen Fluge überall mit herumgetragen. Wenn die Fledermäuse ruhen wollen, hängen sie sich an ihren Hinterfüßen auf und wickeln sich in ihre Flughaut wie in einen Mantel ein. Es gehören zu dieser Familie, die sich zunächst nur durch die hochgesteigerte Entwicklung der Hand und ihrer verbundenen Finger zum feinen Gefühlsorgan an die menschenähnlichen Affen anreihet:

a) Der Blutsauger oder Vampyr (**Phyllostoma spectrum**) mit einem blattähnlichen Ansatz an der Nase und in der Ohrmuschel, einem dicken Kopf, vorragendem Unterkiefer, höckriger Unterlippe, langer wurmförmiger, an ihrem Ende warziger Zunge, lebt in den heißesten Ländern von Amerika. Obgleich er sich meist von Insekten ernährt, hat er doch auch zugleich nach warmem, frischem Blut der Menschen und vollkommneren Thiere, denen er im schwebenden Fluge und mit Kühlung zufächelnden Flatterhäuten bei Nacht sich nähert und wahrscheinlich nur mit den Warzen der steif hervorstreckbaren Zunge, vielleicht aber auch mittelst eines kleinen Einschnittes, den er mit einem seiner scharfen Eckzähne in die Haut macht, das Blut auszieht. Bei den Hühnern saugt er die Kämme an, so daß diese an der Verblutung sterben, was auch bei zarten Kindern zuweilen geschieht, während Erwachsene so wie die größeren Thiere (Pferde, Maulthiere, Rinder) wenigstens sehr entkräftet werden, ja die letzteren abzehren und darauf gehen, wenn die Blutsauger, wie dies ihre Art ist, in jeder folgenden Nacht wiederkehren und die alten Wunden wieder ansaugen. Der gemeine Vampyr ist einen halben Schuh lang, seine Flughäute spannen 2 Fuß weit.

b) Die Luftballonfledermaus (**Nycteris**), deren Fell nur eine locker anliegende Hülle um den Körper bildet, kann durch zwei Oeffnungen im Innern des Mundes Luft unter ihr Fell hineinpumpen, wodurch sie fast rund wie eine

Kugel wird und leichter in der Luft herumschwebt. Die einzelnen Arten leben in heißen Ländern (Oberägypten, Java, afrikanische Westküste u. s. w.), nähren sich von Insekten.

c) Die gemeine bei uns einheimische Fledermaus (Vespertilio murinus), hat Ohren so groß als der Kopf, der Schwanz ist fast so lang als der Leib, während dagegen bei der langöhrigen Fledermaus (V. auritus) die Ohren fast so lang als der Leib sind und in ihrem Innern, als wenn sie doppelt wären, noch ein ½ Zoll langes, lanzettförmiges Blättchen steht, und während bei der Speckfledermaus (V. Noctula), die Ohren kürzer als der Kopf sind.

d) Die Hufeisennase, (Rhinolophus ferrum equinum) hat zu beiden Seiten am Rand der Nase 2 halbmondförmige Blättchen, welche über der Oberlippe zusammenstoßen und hier eine kleine Kerbe bilden, so daß die Gestalt eines Hufeisens daraus entsteht. Alle diese, bei uns einheimischen Fledermäuse sind, wie schon erwähnt, sehr nützliche Thiere durch das Vertilgen schädlicher Insekten.

§. 73. Die Thierfresser (Ferae), welche auch unter dem allgemeinen Namen Raubthiere zusammengefaßt werden, haben alle Arten von Zähnen, unter denen vorzüglich die Eck- oder Reißzähne bei den meisten hieher gehörigen Geschlechtern durch scharfe Zuspitzung und Größe sich auszeichnen. Vorherrschend nehmen zwar die Geschlechter und Arten dieser Ordnung ihre Nahrung aus dem Thierreich, doch nach ihrer Größe und Stärke eine sehr verschiedene. Namentlich leben die Thiere der ersten Familie von Insekten und Würmern, sind dabei lichtscheue, nächtliche Thiere, die meist unter der Erde leben und gränzen auch im Bau des Gehirns an die Fledermäuse an.

A. Die Insektenfresser (Insectivora), leben freilich nicht alle blos von Insekten und Würmern, sondern die eine, größere Gattung schon von Mäusen und andern kleinen, warmblütigen Thieren. Darin jedoch stimmen die Mitglieder dieser Familie überein, daß sie beim Gehen auf die ganze Sohle auftreten und meist nur bei Nacht aus ihren Schlupfwinkeln hervorkommen oder ihrer Nahrung in verborgenen unterirdischen Bauen nachgehen. Wir nennen hier nur die folgenden Geschlechter:

1) Die Spitzmaus (Sorex), zeichnet sich durch

Digitized by Google

ihre, in einen beweglichen Rüssel verlängerte Schnauze aus. Die meisten Arten dieses Geschlechts geben, wie dies auch bei manchen Fledermäusen der Fall ist, einen Moschusgeruch von sich, und die eine, zwischen der Wolga und dem Don in kunstreichen Bauen am Wasser lebende größere Art: der Wüchüchol (**Sorex moschatus** oder **Mygale moscovitica**) von der Größe einer Ratte, welche vorzüglich von Blutigeln lebt, sondert aus Drüsen, an der Wurzel ihres breitgedrückten Schwanzes eine Menge von stark nach Zibeth duftender Flüssigkeit ab. Unsere gemeine Spitzmaus (**S. araneus**), kann mit ihrem kleinen Mäulchen weder die Kühe ins Euter beißen, wie die Sage geht, noch ist sie giftig, sondern geht nur in Ställen und in den Düngerhaufen der Höfe den Insektenlarven und Würmern nach.

2) Dem Maulwurf (**Talpa europaea**), mit 8 Vorderzähnen und schaufelförmigen Händen an den Vorderfüßen, thun die Leute auch oft sehr unrecht, wenn sie glauben, er sey es, der die Wurzeln der Pflanzen, unter deren Rasen er seine Baue anlegt, abfresse. Dies thut nicht er, sondern die Engerlinge und Würmer, die der Maulwurf aufsucht und frißt. Aber freilich ist es nicht hübsch von ihm, daß er bei der Gelegenheit das Erdreich so umreißt und Gärten und Wiesen unterwühlt. Aus diesem Grunde fängt man ihn mit Recht da weg, wo er zu häufig werden will.

3) Der Igel (**Erinaceus europaeus**), mit 6 Vorderzähnen, und Eckzähnen, welche kleiner sind als die Backzähne, frißt zwar auch Obst, das er an seine Stacheln spießt und daran fortträgt, aber doch vorzüglich gern Mäuse oder dergleichen kleine Thiere. Durch sein vieles Mäusefangen ist er, besonders gegen Feldmäuse, ein gar nützliches Thier, das man auch in Häusern lieber halten würde, als die naschhafte Katze, wenn er nicht bei Nacht so gar laut herum trappte und wenn seine Nachbarschaft nicht so manchen üblen Geruch mit sich brächte.

B. Die Bärenartigen Sohlengänger (Plantigrada). Diese treten wie die Thiere der vor-

hergehenden Familie auf die ganze Breite der Fußsohle auf und können deshalb ohne große Schwierigkeit auf ihren Hinterfüßen aufrecht stehen. Sie wohnen zum Theil in unterirdischen Bauen und nähern sich dadurch den nächtlichen Thieren, so wie sie in manchen Zügen ihrer Gestalt und Eigenschaften der ersten Ordnung der Säugthiere (den affenartigen) fast noch näher stehen als die Katzen und Hunde. Mehrere von ihnen nehmen, wenigstens in ihrer Jugend, ihre Nahrung mehr aus dem Pflanzen- als aus dem Thierreiche.

4) Der Bär (**Ursus Arctos**), unterscheidet sich durch die ziemlich auffallende Lücke, welche zwischen den großen Eckzähnen und zwischen den großen höckrig, fast wie bei den pflanzenfressenden Thieren gebauten Backzähnen ist, und durch die sehr kleinen Zähnchen, welche in diesem Zwischenraume stehen. Er ist das ansehnlichste Thier unter den Fußsohlengehern.

Eigentliche Bären unterscheiden wir bei uns in Europa den schwarzen (kleinen) und den braunen (großen). Es sind dieß wohl eigentlich 2 Arten, denn der kleine, schwarze, hält sich mehr nördlich auf, und hält sich mehr an Pflanzenkost und Honig; der braune, der auch noch in unsern südlichen Nachbaralpen vorkommt, und bis ins südliche Europa und westliche Asien verbreitet ist, frißt lieber Fleisch. Beide haben sie indeß viel Uebereinstimmendes in ihrer Lebensart. Sie wohnen gern in einsamen Wäldern; beide, besonders aber den kleinen, schwarzen, führt seine Liebhaberei zum Honig auch häufig zu den Wohnungen der Menschen, wo man ihn oft und auf allerhand Weise beim süßen Honig, noch ehe er ihn verkostet hat, fängt. Nach seinem Aufenthaltsorte im Waldgebirge hin führt ein ordentlich betretener Fußsteig, auf dem man dem Bären gewöhnlich mancherlei Fallstricke legt, unter andern ihn auch durch seinen dummen Jähzorn fängt. Denn am Bären sieht man recht, wie der Jähzorn ganz dumm und blind mache, wenn derselbe manchmal einen schweren Klotz, an dem er sich gefangen hat, zornig von einem Felsen herunter stürzt und sich selber, weil er ja daran hängt, auch mit, und die Sache doch nicht merkt, sondern zornig brummend den Klotz noch einmal hinaufschleppt, ihn wieder sammt sich selber herunterwirft, bis er sich zerschmettert oder so matt gemacht hat, daß er nicht weiter kann. Der Bär hält einige Monate lang Winterruhe; das Weibchen und die Jungen in Höhlen, die alten Männchen in einem Moos- und Reißigbette im Walde, das sie sich selbst zusammen getragen haben. In diesem Lager schlafen sie zwar nicht immer, aber sie liegen

Digitized by Google

doch ganz träge, an ihren Tatzen, die sich dann häuten, saugend da, ohne Nahrung zu nehmen, und die Bärin hält auch noch im Winterlager ihr Wochenbette. Man jagt den Bären wegen seines Fleisches und Felles, und er ist in manchen Gegenden von Sibirien so hoch geachtet, daß ein Mensch für ganz besonders artig gehalten wird, der die Manieren eines Bären am meisten (beim Tanz u. s. w.) an sich genommen hat, und daß die Leute dort, wenn sie einen Bären erlegt und aufgezehrt haben, zuletzt noch den Kopf, in welchem, wie sie glauben, die vernünftige Seele des Thieres wohnt, ordentlich bewirthen, ihn bitten, er solle es doch seinen Verwandten auf den Bergen und im Walde sagen, wie hoch sie ihn geehrt hätten, damit mehrere sich von ihnen fangen ließen, dann aber doch auch den Kopf mit sammt den Früchten essen, die sie ihm in den Rachen gesteckt hatten. Der Bär hat aber auch manchmal in seinem Anstand etwas so Menschenähnliches, daß einmal Einer einen Bären, dem er den Kopf etwas barbirt hatte, für einen wilden Menschen ausgab, der nicht sprechen, sondern blos brummen könne wie ein Bär, auch fast am ganzen Leibe so behaart sey, wie ein Bär. Der Mann ließ diesen Menschen, dem er einen rothen Rock und eine Weste angezogen hatte, für Geld sehen, und es liefen viele Leute hin, die den Spaß glaubten, und sich von dem wilden braunen Manne, der auf einem Stuhle saß, und Thee aus einer Tasse trank, gleich jedem andern Menschen, die Hand (Tatze) geben ließen, und seine große Bärenähnlichkeit bewunderten. Einige glaubten wohl gar, es sey ein reisender Gelehrter, der sich nur gleich einem Bären anstelle; bis endlich ein feiner Kopf bemerkte, daß dieser Reisende nicht sowohl ein Mensch sey, der einige Bärenart und Manieren an sich genommen, als vielmehr ein Bär, der einige Hofmanieren gelernt hatte. Der Mann, dem dieser höfliche Bär gehörte, hatte übrigens bereits gar vieles Geld damit gelöst.

In den Polargegenden, in der Nähe seiner beständigen Eismassen lebt der furchtbare, etwas gelblich weiße Eisbär (U. maritimus). Vor der großen Fluth muß eine jetzt wohl ausgestorbene Art der Bären, der Höhlenbär (U. spelaeus), wie dies seine meist in Höhlen aufgefundenen Knochenüberreste bezeugen, häufig, über viele Länder von Europa verbreitet gewesen seyn.

5) Der Vielfraß (Gulo borealis), der in den nördlichsten Gegenden lebt, ein kostbares Pelzwerk liefert, und gar nicht so gefräßig ist, als man ihm nachsagt, und

6) der Dachs (Meles Taxus), der auch bei uns seine Baue anlegt, und meist von Pflanzenwurzeln, aber auch von kleinen Thieren sich nährt, haben keinen solchen Zwischenraum zwischen den Back- und

Digitized by Google

Eckzähnen als die Bären, und die Backzähne sind schon mehr reißzähneartig (wie bei den eigentlichen Raubthieren) gebaut.

C. Die Zehengänger (**Digitigrada**), treten beim Gehen nicht auf die ganze Sohle, sondern nur auf die Spitzen der Zehen auf. Die meisten von ihnen leben in ihrem wilden Naturzustand nur vom Fleisch der Thiere, deren sie sich durch List und Gewalt bemächtigen; einige fressen auch Eier, noch andre genießen das Aas der gefallenen Thiere. Wir nennen hier nur einige der ausgezeichnetsten Geschlechter der Zehengänger.

7) Der Hund (**Canis**), hat oben 6, unten 7 Backzähne, an den Vorderfüßen 5, an den hintern 4 Zehen. Der gemeine Hund (**Canis domesticus**), zu dessen Sippschaft auch der räuberische Wolf, (**C. Lupus**) mit geradem, und der listige Fuchs (**C. Vulpes**) mit dickbuschigtem Schwanze gehören, unterscheidet sich von beiden durch den nach oben umgebogenen Schwanz.

Der Hund ist freilich eines der besten und nützlichsten Hausthiere, das bei uns zum Bewachen der Häuser und zum Jagen, in manchen kalten Ländern als Zugvieh, zum Ziehen der Schlitten, auf den Südseeinseln gar als Schlachtvieh, wie bei uns die Schaafe und Schweine, dient. Er läßt sich alle die Speisen gefallen, die der Mensch ihm giebt, und begleitet diesen in alle Gegenden der Welt, ausdauernder als irgend ein Thier. Es giebt eine ungeheure Menge von Abarten davon, die vielleicht zum Theil von dem räuberischen Wolf abstammen, dem sie nun fast gar nicht mehr ähnlich sind. Dieser (der Wolf) ist fast immer mehr von uns weg auf die polnischen und russischen Wälder verwiesen, wo er noch in ganzen Schaaren herumläuft und öfters in großer Menge die Schlitten und Wägen anfällt, welche durch seine Wälder fahren, dann die Pferde, und wenn es ihm gelingt, auch die Menschen würgt und frißt. — Vor nicht so gar langer Zeit gab es selbst in unsern deutschen Wäldern viele Wölfe, und mancher Bauer weiß noch die Geschichte von jenem Geiger in der Wolfsgrube so gut, als wäre sie gestern geschehen, obgleich sie ihm schon sein Großvater erzählt hat. Es gieng nämlich einmal ein Geigersmann von einer Kirchweih nach Hause, auf welcher er den Leuten bis tief in die Nacht aufgegeigt hatte. Das Männlein gieng ohnehin nicht gern auf dem geraden Wege und kam daher auch in dem dicken Forste, durch den es mußte, bald so weit zur Seiten

Digitized by Google

ab, daß es am Ende in eine Grube fiel, welche der Jäger zum Wolfsfange gegraben hatte. Der Schreck war schon groß genug für den Geiger, da er so ohne Weiteres von der ebenen Erde hinunter in die Tiefe fuhr, wurde aber noch größer, als er unten auf etwas Lebendiges auffiel, das wild aufsprang, und als er merkte, daß es ein Wolf sey, der ihn da mit funkelnden Augen ansahe. Der Mann hatte nichts in der Hand als seine Geige, und in der Angst fängt er an, hier vor dem geöffneten Wolfsrachen alle seine Stücklein aufzugeigen, die ihm aber dießmal selber gar nicht lustig vorkamen. Dem Wolf mußte aber diese Musik ganz besonders schön und rührend vorkommen, denn das dumme Vieh fieng an überlaut zu heulen, was wohl, wie bei unsern musikalischen Hunden, wenn sie Sang und Klang hören, gesungen heißen sollte. Die andern Wölfe draußen im Walde, da sie ihren Cameraden drinnen in der Grube so singen hörten, stimmten auch mit ein, und ihr Geheul kam manchmal so nahe, daß das Geigerlein, an welchem kaum ein einziger Wolf satt geworden wäre, geschweige zweie, jeden Augenblick fürchten mußte, es käme noch ein andrer, auch wohl noch dritter und vierter Gast zu seinem Bischen Fleisch in die Grube herein. Unser Capellmeister in der Wüste guckte indeß einmal übers andre in die Höhe, ob's noch nicht Tag werden wollte, denn das Geigen war ihm sein lebtag noch nicht so lang geworden, und so ganz sauer und niederträchtig vorgekommen, als da vor dem Wolfe, und er hätte lieber Holz dafür hacken wollen, zwanzig Jahre lang alle Wochentage. Ehe aber der Morgen kam, waren schon zwei Saiten an seiner Geige gerissen und da es Tag wurde, riß die dritte und der Geiger spielte nun blos noch auf der vierten und letzten, und wäre die auch noch gerissen, so hätte ihm der Wolf, der durch das viele Heulen, die ganze Nacht hindurch, nur noch hungriger geworden war, keine Zeit mehr gelassen zum Wiederaufziehen, sondern hätte ihn dabei aufgefressen. Da kam zum Glück der alte Jobst, der Jäger, der den Wolf schon von weitem singen, den Geiger aber in der Nähe geigen hörte. Dieser zog den Capellmeister gerade noch zur rechten Zeit von dem hungrigen Wolfe heraus, und erlegte dann diesen. Der Spielmann gieng aber ganz still seines Weges und nahm sich vor, künftig lieber am Tage und auf geradem Wege nach Hause zu gehen. Das Geigen im Wirthshause war ihm auch so ganz entleidet, daß er zu seinen Cameraden sagte, er wolle sich lieber mit der Nähnadel (denn er war ein Schneider) sein tägliches Brod ergeigen, und wenn er einmal eins auf Saiten aufspielen möchte, so thäte ers lieber in der Kirche als im Wirthshaus, denn von dort sey ein geraderer und sicherer Weg nach Hause, sey auch nicht so weit dahin, als vom Wirthshaus.

8) Die Hyäne (Hyaena), die nur 4 Zehen

an jedem Fuße, in der obern Kinnlade 5, in der untern 4 Backzähne hat, lebt vorzüglich in Afrika, und ist ein so wild und jähzornig grimmiges Thier, daß sie das, was sie einmal mit den Zähnen gepackt hat, nicht wieder los läßt, bis man sie todt geschlagen hat. Doch ließ vor mehreren Jahren einmal eine Hyäne einem Schiffstrompeter, in der Nähe der Capstadt, der bei Nacht ganz toll und voll betrunken am Boden liegen geblieben war, und den sie schon am Kragen gepackt hatte und fortzog, wieder los, als dieser in der Angst einige laute Stöße in die Trompete that. Die Hyäne gräbt sogar todte Leichname aus und frißt sie, auch kommt sie bei Nacht in die Dörfer, wo sie dann Kinder, die sie etwa noch außen findet, Hunde u. s. w. fortträgt.

Vor der großen Fluth muß eine Art von Hyäne, welche der südafrikanischen, gefleckten Art (**H. picta**), sehr ähnlich war, auch in Europa gelebt haben.

9) Das Geschlecht der Katzen (**Felis**), mit scharfen Klauen, die sich in besondere Scheiden der Zehen zurückziehen lassen, oben mit 4, unten mit 3 Backzähnen, hat in sich gar große Thiere aufzuweisen.

Hiervon nennen wir nur

a) den Löwen (**Fel. Leo**), wovon das Männchen manchmal bis 9 Fuß lang wird und sich durch seine schöne Haarmähne auszeichnet. Der Löwe findet sich jetzt vorzugsweise in Afrika, und nur selten in einigen angränzenden Gegenden von Asien, war aber vormals in dem letztgenannten Welttheil viel häufiger, und fand sich selbst in Griechenland. Er ist ein so starkes Thier, daß er ein Rind im Maule fortträgt, wie eine Katze die Ratten, und dasselbe sogar über niedrige Mauern wirft. Der Löwe ist in seiner Art ein großmüthiges Thier, indem er nicht leicht ein andres Thier mordet, wenn er nicht hungrig ist, und den Menschen meist nur dann anfällt, wenn er keine Thiere haben kann. Er läßt sich zähmen, doch muß man sich auch dann nicht zu vertraut mit ihm machen, damit nicht sein natürlicher Blutdurst aufwache; obgleich man Fälle hat, wo er mit Menschen, so wie mit kleinen Thierchen, z. B. Hündchen, in einem wahrhaft zutraulichen Umgange gelebt hat. Er ist ein Geschöpf, das sich vor keinem andern Thiere fürchtet, vor dem aber alle größere Thiere zittern, wenn sie sein furchtbares Gebrüll im Walde hören, so daß dann das Vieh selbst in den Ställen ängstlich wird. Es ist eine Fabel, daß er sich vor Hähnen oder Feuer fürchte, das

Digitized by Google

zeigte im vorigen Jahrhundert das Beispiel jenes Mannes, der seinen zahmen Löwen, den er für Geld sehen ließ, eines Tages, da gar zu viel Leute schon da gewesen waren, denen er seine Künste vormachen mußte, noch immer dazu reizen und zwingen wollte. Der Löwe zog erst die Stirne, bleckte die Zähne, schlug sich mit dem Schwanze, und da der Mann immer noch nicht nachließ, warf er ihn nieder und stellte sich mit seiner Tatze auf des Mannes Schultern. Dieser winselte um Hülfe, und unverständige Leute, die einen Hahn, andere, welche Feuer herbeibrachten, machten den Löwen nur noch zorniger, bis endlich Jäger mit Kugelbüchsen kamen, und das große schöne Thier erschossen. Aber im Sterben zuckte es noch, und riß dem Manne die Schulter weg, so daß dieser auch sterben mußte. Der Löwe geht meist bei Nacht auf Raub aus. Man fängt ihn vorzüglich in Gruben.

b) Der große bengalische Tiger mit gestreiftem Fell (**Fel. Tigris**), ist noch größer als der Löwe, wohl so groß als ein mäßiges Rind, und so ungeheuer stark und kühn, daß er sich mitten aus einer Gesellschaft auch bewaffneter Leute, mit einem Sprunge einen herausholt, und damit fortläuft. Denn er ist nicht so großmüthig wie der Löwe, würgt auch, wenn er nicht hungrig ist, blos aus Lust zu würgen, und fällt Menschen gar gerne an. Dennoch hat ihn einmal ein junges Frauenzimmer, da er auch eben sich an eine Gesellschaft schlich, unter der sie war, durch das schnelle Aufmachen ihres rothen Sonnenschirmchens so erschreckt, daß er furchtsam fortlief. Das Tigerweibchen wirft 3 bis 4 Junge und die Tiger würden gar sehr überhand nehmen, wenn es nicht zum Glück so eingerichtet wäre, daß alle solche bösen Thiere immer in größter Feindschaft mit einander lebten, und sich selbst untereinander aufrieben. Denn der alte Tiger frißt öfters selbst seine eignen Jungen.

c) Die Katze (**F. Catus**), findet sich auch in unsern Ländern manchmal noch wild, mehr aber noch am Caspischen Meere. Die wilde Katze ist rothgrau mit dunklen Queerstreifen, hat am Schwanze 3 schwarze Ringe und eine schwarze Spitze. Unsre zahme Katze ist zum Vertilgen der Mäuse doch immer ein sehr nützliches Thier, so daß die Bewohner der Südseeinseln, bei denen die aus den europäischen Schiffen zu ihnen hinüber gelaufenen Mäuse und Ratten so überhand genommen hatten, daß sie fast alles auffraßen, die Katzen, die ihnen die Europäer mitbrachten, als die größte Wohlthat bei sich aufnahmen.

10) Die Viverren (**Viverrae**), haben eine wie beim Fuchs spitzig zulaufende Schnautze, einen meist katzenartigen Schwanz, 6 Vorder- oder Schneidezähne. Viele von ihnen sondern aus eignen Drüsen, in der Nähe des Afters, eine starkriechende Substanz ab.

Digitized by Google

So z. B. die Zibethkatze (**V. Zibetha**), von der man das aus ihren Drüsen in eine Art von Beutel ausgesonderte Zibeth sammelt und in der Medicin gebraucht. Man hält zu dem Ende auch in manchen Ländern Zibethkatzen als Hausthiere, die man von Zeit zu Zeit in einen Käfig hineindrängt, worin sie sich nicht umdrehen und beißen können, und nimmt den Zibeth mit kleinen Löffelchen heraus. Anfangs riecht er widerwärtig stark, so daß man Kopfweh davon bekommt, nach und nach wird aber der Geruch für manche Nasen angenehm. Das Vaterland der Zibethkatzen ist Ostindien und Afrika.

Als eine Unterabtheilung der Zehengänger lassen sich jene kurzbeinigen Raubthiere betrachten, welche man wegen ihres langgestreckten, niedern Baues auch schlanke (**gracilia**) genannt hat:

11) Der Ichneumon (**Herpestes Ichneumon**), mit langgestrecktem, grauen Körper, langem Schwanz, welcher mit einer schwarzen Haarquaste endigt, lebt in Aegypten, und ist ein gar gutes, nützliches Thier, was nicht blos Mäuse so wie Eier und Junge des Krokodils auffrißt, sondern mit wüthender Kampflust auf giftige Schlangen losspringt, sie am Genick packt, ihnen den Kopf zerbeißt, und sie dann frißt.

Mehr noch als der ägyptische, ist der kleinere bräunlich queergestreifte ostindische Ichneumon (**H. Mungos**), als Schlangenvertilger bekannt und geehrt. Wenn er, was selten geschieht, von einer Schlange gebissen wird, soll er sich heilsame Wurzeln aufsuchen und sich damit curiren. In den Ländern, wo dieses Thier vorkommt, hält man sich gerne ein Ichneumon, als Hausthier, besonders gegen die leicht herein schleichenden Schlangen.

12) Das Mardergeschlecht (**Mustela**), hat oben 5, unten 6 Backenzähne, enthält viele Arten, von denen manche sehr gut klettern können.

Es giebt davon bei uns: den Baummarder mit gelber Kehle (**M. Martes**), den Steinmarder (**M. Foina**), mit weißer Kehle; den Iltis (**M. putorius**), mit weißen Nasen- und Ohrenspitzen, das kleine Wiesel (**M. vulgaris**) und hie und da auch das Hermelinchen (**M. erminea**), mit schwarzer Schwanzspitze. Es sind sämmtlich sehr arge Raubthiere, davon die größten Arten dem Geflügel des Waldes und der Häuser großen Schaden zufügen, doch aber

Digitized by Google

auch zugleich wie die kleinen durch Vertilgung der Feldmäuse nützlich werden. Eine Spielart des Iltis mit gelblichem Felle und rothen Augen: das Frettel (M. furo), richtet man zum Kaninchenfang ab. Fast alle Arten haben ein gutes Pelzwerk, am meisten aber der Zobel (M. zibellina), der noch immer ziemlich häufig im nordöstlichen Sibirien vorkommt, wo ganze regelmäßige Gesellschaften von Jägern (unter ihrem eignen Hauptmanne) auf seinen Fang ausgehen.

13) Das Stinkthier (Mephitis), lebt in Amerika, und giebt, wenn es verfolgt wird, eine so stark stinkende öhlichte Flüssigkeit von sich, daß Menschen und Thiere, die davon bespritzt sind, oft krank davon werden, und daß man die besudelten Kleider lange in die Erde graben, oder gar wegwerfen muß.

14) Die Fischotter (Lutra), hat Zehen an den Füßen, die durch eine Haut verbunden sind, (Schwimmfüße) und oben so wie unten 5 Backzähne an jeder Seite.

a) Die gemeine Fischotter (L. vulgaris) findet sich noch hie und da (wiewohl selten) an unsern deutschen Gewässern in eignen Bauen, und thut dann dem Fischfange sehr großen Schaden. Ihr Laut ist ein Pfeifen. Sie ist schwer zu schiessen und zu fangen, weil sie gut und lange unter dem Wasser fortschwimmen kann, und wenn man ihr Tellereisen legt, muß man diese so lang anbinden, daß sie damit unter das Wasser kann, sonst beißt sie sich den Fuß, womit sie gefangen war, ab, und entwischt doch. Sie hat ein kostbares Pelzwerk, und ihr Fleisch schmeckt nach Fischen.

b) Die Seeotter (L. marina), mehr als doppelt so groß denn unsre Fischotter, mit sehr kurzen Hinterfüßen, die vorzüglich in den kalten Meeren zwischen Nordamerika und Nordasien lebt, ist ein sonderbares, kluges Thier, das seinen Jägern gar oft durch List entkommt, dann die Vorderfüße über die Augen hält, ihnen spöttisch zublinzelt, und sich auf seine Weise durch allerhand affenartige Possen über den Menschen lustig zu machen scheint. Das Weibchen hat seine Jungen so zärtlich lieb, daß es sich für sie todt schlagen läßt, spielt mit ihnen, wie ein Affe, drückt sie mit den Vordertatzen zärtlich an sich, spielt Fangeball mit ihnen, indem sie sie in die Höhe wirft und wieder auffängt u. s. w. Das Pelzwerk ist kostbar, und wird viel, so wie theuer nach China verkauft.

D. Die robbenartigen Raubthiere (Phocae), haben zum Theil schon ganz verwachsene, flossenartige Füße. Die meisten von ihnen leben nur von thierischem Fleisch, zunächst von dem der Fische, wie

Digitized by Google

dieſes ſchon durch den Bau ihres Gebiſſes angedeutet wird, welches denen der vollkommneren Fleiſchfreſſer ähnlich iſt. Bei der einen Gattung, die ſich durch große Stoßzähne auszeichnet, erſcheint es noch ungewiß, ob ſie nicht außer kleineren Seethieren auch Seegrasarten (Tange) als Nahrung zu ſich nimmt.

1) Das Seehundsgeſchlecht (**Phoca**), enthält fleiſchfreſſende Thiere, die im Meere leben, unvollkommen entwickelte Vorderfüße, und nach hinten ausgeſtreckte, verwachſene Hinterfüße haben.

Selbſt der gemeine Seehund (**Ph. vitulina**), gelblichgrau und ſchwarz gefleckt, ohne äußere Ohren, der ſich in allen unſern Nachbarmeeren findet, iſt ein ſinnvolles, kluges Thier, das der Muſik und dem Glanz eines Schmiedeofens nachkriecht, dabei auch den Bewohnern der nördlichſten Länder unſrer Erde, z. B. den Isländern, und noch mehr eine nahe verwandte Abart: der grönländiſche Seehund (**Ph. grönlandica**), die ſich durch einen breiten, halbmondförmigen Streifen auf jeder Seite unterſcheidet, den Grönländern durch Fleiſch, Thran und Fell ſo nützlich iſt, daß dieſes Thier zu dem Hauptreichthum jener Länder gehört, und die Grönländer ohne den Seehundsfang kaum beſtehen könnten. Namentlich in den Meeren zwiſchen Amerika und Aſien giebt es noch einige andere, größere Arten: den Seebären (**Ph. ursina**), braun, mit äußeren Ohren, und den Seelöwen (**Ph. jubata**), gelblich, das Männchen mit löwenartig gemähntem Halſe, wovon beſonders der erſtere in merkwürdigen und geſelligen Familienverhältniſſen lebt. Ein Männchen hat wohl 30 Weibchen um ſich, dieſe werden von ihm beſtraft, wenn ſie ſich von dem liſtigen Jäger ihr Junges rauben ließen. Die jungen Männchen werden von den Alten zu Kämpfen angehalten und ermuntert, der Sieger belohnt, und ein ſolcher rauhhaariger Hausvater hält in ſeiner Familie oft beſſere Zucht und Ordnung, als mancher, der ſich in feines Fell und Seide kleidet.

2) Das Wallroß (**Trichecus Rosmarus**), das an den Gränzen des niemals mehr wegthauenden Polarkreiſes lebt, iſt ein 9 bis 10 Ellen langes Thier, deſſen Haut allein 4 Zentner wiegt. In der ſchmal zulaufenden Unterkinnlade hat es weder Vorder- noch Eckzähne, in der aufgetriebenen Oberkinnlade zwei lange, nach unten gerichtete Eckzähne. Dieſe, wovon einer öfters gegen 2 Fuß lang iſt, und mehrere Pfund wiegt, geben ein gutes Elfenbein, das Fleiſch von

Digitized by Google

den jungen Thieren ist eßbar, die Alten fängt man auch um ihres Thranes willen.

Das Wallroß hält sich in großen Heerden beisammen, die sich, wenn sie angegriffen werden, mit ihren Hauzähnen gar nachdrücklich zu vertheidigen wissen, und lebt von Seetang und Fischen. Der äußeren Form nach nähert sich das Wallroß noch sehr den Seehunden.

§. 74. Die Wallfischarten oder Cetaceen (Cetacea), sehen in ihrer ganzen Körperbildung sehr den Fischen ähnlich, zu denen sie auch lange gerechnet wurden. Es sind aber wirklich solche Thiere, die in ihrem innern Baue den Säugethieren vollkommen gleichen, indem sie Luft durch Lungen schöpfen, warmes, rothes Blut und auch Saugwarzen haben, woran ihre Jungen Milch saugen. Sie können eben so wenig lange, ohne Luft zu athmen, ausdauern, als andere ins Wasser gehende Säugethiere, liegen deßhalb, wenn sie schlafen, ganz oben auf dem Wasser, und müssen, selbst wenn sie verwundet sind, und sich gar gern den weiteren Nachstellungen im tiefen Meere entziehen möchten, doch wenigstens in $\frac{1}{4}$ Stunde wieder herauf, wo ihnen dann die Wallfischfänger vollends den Rest geben. Allen Wallfischarten fehlen die Hinterfüße gänzlich, dagegen zeigt sich an den Vorderfüßen ihres Skeletes noch ganz der Bau einer Hand mit ihren Fingern, obgleich dieselben, wenn sie noch mit Fleisch und Haut bedeckt sind, nur das unförmliche Aussehen von Flossenlappen haben. So unvollkommen die Wallfischarten ihrem Aussehen nach erscheinen, ist dennoch ihr innerer Bau, namentlich am Gehirn, ein sehr vollkommner und diesem entsprechend zeigen sich dieselben häufig ihren Seelenkräften nach als kluge Thiere. Man kann diese ganze Ordnung der Säugethiere als eine solche Entwicklungsstufe betrachten, wie dies bei den Insekten die Puppe ist; sie bilden, von unten nach oben gehend, einen Uebergang aus der niederern Reihe der Säugthiere, die mit dem Schnabelthier beginnt und mit den elephantenartigen Thieren endigt, zu der menschenähnlicheren, höheren Reihe, die von den Robben an durch die

Digitized by Google

Raubthiere bis in die Nähe der Menschenform sich erhebt.

1) Der eigentliche Wallfisch (**Balaena Mysticetus**), hat keine Zähne, sondern mehrere hundert Barten von verschiedener Größe an jeder Seite des Gaumens stehen, woraus das Fischbein gemacht wird. An seinen Brustrudern (Flossen) sieht man innerlich noch den Knochenbau einer Hand.

Vormals, wo noch nicht so gar viele Wallfische weggefangen worden waren, gab es, wie man erzählt, öfters solche, welche mehrere tausend Centner Gewicht hatten. Die größesten, welche man jetzt fängt, haben nur etwa 60 Fuß Länge und 1000 Centner Gewicht. Indeß ist auch ein solches Thier noch respectabel genug, und wenn es sich an den Wunden der Harpune der Wallfischfänger verblutet hat, und nun todt auf dem Meere schwimmt, so daß sich ihm der zwergige, und doch an Geist ihm so überlegene Mensch nähern kann, dann fährt man mit einem Boote in den geöffneten Rachen hinein und dieser nimmt, wie ein großer Saal, eine ganze Gesellschaft von Leuten auf, welche die Barten und die spekkige Zunge herausarbeiten. Und doch frißt dieses riesenhafte Thier meist nur kleine ungeschaalte Mollusken, die zu Millionen im Meere auf- und niederschwimmen, und die es schaarenweise mit sammt dem Wasser verschlingt, welches letztere es dann durch die Spritzlöcher wieder, gleich einem Springbrunnen, von sich treibt, während zum Durchseihen der verschlungenen Beute die langen, borstenartigen Wimpern, die an den Barten stehen, wohl geeignet erscheinen. Der Wallfisch lebt gesellig. Vor Ungewittern tobt er sehr herum. Er schwimmt zuweilen fast so schnell, als ein Vogel fliegt. Die Grönländer und andere weit nach Norden wohnende Völker, essen sein Fleisch, und machen sich Hemden aus seinen Därmen; die Europäer benutzen nur die Barten, deren ein mittelmäßig großer 10 Centner enthält, und den Thran, wovon einer gegen 120 Tonnen liefert, so daß ein solches Thier gegen 5000 Rthlr. werth ist.

2) Der Kaschelot, Pottfisch (**Catodon macrocephalus**), hat spitzige Zähne, ist über 60 Fuß lang, und von dieser Länge nimmt der ungeheuere, mit Wallrath meist ausgefüllte Kopf, mehr als die Hälfte ein. Dieser Fisch liefert den wohlriechenden grauen Ambra, und, vorzüglich aus dem Kopf und Rücken, gegen 50 Tonnen Wallrath. Er gehört, wie die Delphine, zu den Raubthieren, kann schon ansehnlich große Fische und andre in sein Bereich kommende Thiere (z. B. große Sepien) verschlingen.

Digitized by Google

3) Der Narwhal, das See-Einhorn (**Monodon monoceros**), hat, meist nur an der einen Kinnlade, einen solchen großen, geraden, weißen, gewundenen Zahn, wie man dergleichen öfters in den Sammlungen und in Materialhandlungen hängen sieht und sie Einhornszähne nennt.

4) Der Delphin, Tümmler, (**Delphinus Delphis**), mit schnabelartig dünn zulaufender Schnauze und sehr vielen, kegelförmig spitzigen Zähnen in den Kinnladen, wovon es mehrere Arten in allen unsern Meeren giebt, ist ein kluges, geselliges Thier, was öfters den Schiffen, blos um in der Nähe der Menschen zu seyn, schaarenweise nachfolgt, und Musik sehr lieben soll.

Außer den so eben kurz beschriebenen, nur im Gewässer und vorherrschend von thierischer Kost lebenden Wallfischen giebt es auch solche, die ans Land heraus kriechen und von Gewächsen leben: die sogenannten grasfressenden Wallfische. Sie bilden einen deutlichen Uebergang zu den Säugthieren der nächsten Ordnung, den sogenannten Dickhäutern. Zu diesen Gras- und Seetang fressenden Wallfischen gehört:

5) Der Manati (**Manatus**) von **manus**, die Hand, so genannt, weil sich an seinen flossenlappigen Vorderfüßen noch immer eine gewisse Handähnlichkeit erkennen läßt, dessen Arten in den Flüssen und an den Meeresküsten mehrerer (meist heißeren) Erdgegenden leben. Der Manati scheint ein sehr sinniges Thier zu seyn, das namentlich Musik gern hört und durch ihre Töne bei Nacht sich herauslocken läßt ans Ufer. Wenn ein Thier dieser Gattung mit halbem Leibe aus dem Wasser hervorragt, soll es allerdings von fern wie ein Mensch mit einem Fischleib aussehen. Man glaubt daher, daß der Manati, oder ein ihm ähnliches Thier, der Wasserbewohner sey, der zu der so oft wiederholten Sage von Seejungfern und Seemännern Veranlassung gegeben habe. Indeß mag noch gar vieles sich da unten im unergründlichen und unüberschlichen Ocean den Blicken des Menschen klug entziehen, und nur manchmal sich den Augen

Digitized by Google

vorüberfahrender Schiffer zeigen, wie unter andern das Beispiel jenes sonderbaren, affenartigen Thieres lehrt, welches einmal ein berühmter Naturforscher, der Steller hieß, in dem an solchen Wundern vorzüglich reichen Meere zwischen Kamtschatka und Amerika sahe, und das seitdem, so viel man weiß, Keiner wieder gesehen hat.

§. 75. Die Dickhäuter oder vielhufigen Thiere (**Pachydermata** oder **Multungula**) schließen sich durch viele Züge des Baues und der Eigenschaften an die so eben betrachteten Ordnungen der Wasserthiere an, denen sie schon durch die riesenhaftere Masse ihres Körpers nahe kommen. Sie haben zwar alle 4 Füße, aber diese sind bei mehreren Arten so kurz, der Leib so plump, daß sie mehr zum Verweilen im Wasser als zum Laufen am Lande geeignet sind. Ueberhaupt sind alle größeren Dickhäuter halbe Wasser- oder Sumpfthiere, die beständig das Baden und Befeuchten im Wasser, das Herumwälzen in Pfützen zu ihrem Wohlbefinden und Gedeihen bedürfen. Die Zehen der Dickhäuter sind zwar nicht so, wie die der Wallfische und Robben zu einer Flossenmasse, wohl aber bei mehreren in eine dickere, schwielige Hautmasse so verwachsen, daß fast nur die hufartigen Klauen frei daraus hervorstehen. Die hieher gehörigen Thierarten nähren sich vorherrschend von Pflanzen; bei mehreren von ihnen finden sich noch alle 3 Arten von Zähnen, obgleich in einem Verhältniß der Stellung und Größe, welche von jenem abweicht, das bei den oberen Klassen der Säugthiere gefunden wird.

1) Das Nilpferd oder Flußpferd (**Hippopotamus amphibius**), nähert sich in vielfacher Hinsicht den Wasserthieren der vorhergehenden Ordnung. Zwar sein riesenhafter Leib, der einem dicken Faß gleicht und der ein Gewicht von mehr denn 2000 Pfund erreicht, wird von 4 stämmigen Füßen getragen, an deren jedem 4 Zehen, von einer kleinen Hornscheide bedeckt stehen, aber diese Füße sind im Verhältniß zu der über 12 Fuß betragenden Länge so überaus kurz, daß beim Gehen der dicke Wanst fast

Digitized by Google

auf dem Boden aufstreift. Das Flußpferd scheint sich deshalb im Wasser behaglicher und mehr noch in seinem angemessenen Elemente zu finden, als auf dem Lande, und zuweilen sieht man es unten auf dem seichten Grunde eines Flusses oder Landsees eben so die Wasserkräuter abweiden, als den Stier das Gras der Wiesen, doch muß es dabei immer wieder mit dem Kopf in die Höhe kommen, um Luft zu schöpfen. Auch geht es bei Nacht ans Land heraus und richtet dann in den Pflanzungen am Ufer oft sehr großen Schaden an. Aus seiner ungemein dicken, zähen Haut fertigt man Schilde und unverwüstlich dauerhafte Reitgerten. In seinem unförmlich großen Kopfe stehen alle 3 Arten von Zähnen, unter denen die Eckzähne eine Länge von 2 Fuß erreichen und von noch festerer Substanz sind, als das Elfenbein, auch nicht gelb werden, wie dieses. Der viergetheilte Magen des Flußpferdes nähert sich im Bau dem Magen der Wiederkäuer. Das Fleisch, namentlich der Jungen, ist wohlschmeckend. Das Flußpferd, das in einer älteren Vorzeit selbst in Europa (z. B. am Arno) häufig war, findet sich jetzt nur noch in den Seen und Nebenflüssen des obern Nillaufes und in den Flüssen und Seen des mittlern und südlichen Afrikas. Die Jagd dieses mächtigen, leicht zum Zorn zu reizenden Thieres ist gefährlich.

2) Das Nashorn (**Rhinoceros**), hat in seinen verschiedenen Arten auf der Nase 1 oder 2 große, lange, oben sehr scharf zulaufende Hörner, eine dicke, wie aus Schildern zusammengesetzte Haut und gleicht am Kopfe einem Schweine. Es wird gegen 12 Fuß lang und dabei nur halb so hoch, hat an jedem der kurzen Füße nur 3 Zehen, vollkommene Backzähne und Schneidezähne, aber nur kleine, unvollkommene Spuren von Eckzähnen.

Mit seinen Hörnern haut es gewaltig um sich, und kann damit leicht einem Menschen den Leib aufreißen, so daß ihm die Eingeweide herausfallen. Es ist ein störriges, höchst jähzorniges Thier, aber eben weil es so jähzornig ist, wird es dann auch dumm und blind, und man kann ihm, während es wüthend hinter einem hertobt, leicht entkommen,

Digitized by Google

wenn man nur seitwärts läuft. Denn trotz seinem sonst nicht schlechten Gesichte, sieht und hört es im Zorne nicht. Sein Fleisch ist fast ungenießbar, aus seiner Haut macht man Schilder, Spazierstöcke u. s. w. Aus seinem Horn dreht man Becher, aus denen solche Leute in Asien trinken, welche Furcht haben, vergiftet zu werden, denn man glaubt dort, solche Becher zeigten das Gift an. Es wäre aber besser, jeder machte es darnach, daß er von seinem Nebenmenschen gern gesehen, oder doch geachtet wäre, dann brauchte es solcher Becher weiter nicht.

3) Der Elephant (**Elephas asiaticus** und **africanus**), den schon sein Rüssel mit fingerartigem Vorsprunge und die beiden Stoßzähne unterscheiden, ist der Riese unter den Landthieren, der 10 ja bis 15 Fuß hoch wird, und schon in seinem 20sten Jahre, wo er noch lange nicht ausgewachsen ist, 70 Centner wiegt. Er hat 5 Zehen an jedem Fuß, davon jedoch nur die Spitzen mit ihren hornartigen Hufen aus der dicken Hautmasse hervorstechen, keine Vorderzähne, in jeder Kinnlade und an jeder Seite nur einen Backzahn, der jedoch im Verlauf des Lebens mehrere Male durch einen jungen Zahn ausgestoßen und ersetzt wird.

Der Elephant zeigt fast menschliche Ueberlegung. Denn, wenn in manchen asiatischen Städten am Morgen der Cornack (Elephantenführer) dem Thiere sein Tagewerk angewiesen hat, und es nun z. B. Waarenballen an einen Ort hintragen und aufeinander schlichten soll, thut es dieses mit solcher Bedachtsamkeit, daß es mit dem Rüssel den Ballenhaufen prüft, ob er auch gut aufeinander liege und die schlecht gelegten Ballen wieder aufhebt und besser zu rechte legt, wie ein Mensch. Oder wenn es etwa einen Balken zieht, und stößt an etwas an, z. B. an einen großen Stein, wobei ein Ochse mit dummer Ruhe stehen bliebe, sieht es sich um, woran es liegt, kehrt im Nothfall um und umgeht das Hinderniß, oder legt seinen Fuß als eine Art von schiefer Ebene hin, an welche es dann die Last hinaufschiebt. Dabei ist das Thier mild und dankbar gegen Alle, die es nicht beleidigen oder ihm gar Gutes thun; auch merkt es sichs trefflich, wenn man ihm etwas versprochen hat und ist dann desto fleißiger, wird aber auch (denn ein Elephant glaubt noch an Treue und Redlichkeit unter den Leuten) ganz wüthend, wenn man ihm das Versprochene nicht hält. Wein und Palmenbranntwein sauft er gar gerne. So ungeschickt er aussieht, kann er doch mit dem fingerförmigen Haken an seinem Rüssel die festesten Stöpsel aus den Bouteillen ziehen und überhaupt mit diesem Finger die künstlichsten Sachen verrichten. Sonst hat man ihn im Kriege gebraucht und ganze

Digitized by Google

hölzerne Thürme voll Kriegsleute auf ihn gepackt: in der neueren Zeit hat man ihn mit besserem Erfolge zu den Tigerjagden benutzt. Er wird über hundert Jahre alt. Seine Stoßzähne geben das Elfenbein. Die eine Art lebt in Asien, die andere, die etwas kleiner ist, sich nicht zähmen läßt, und besonders schöne Stoßzähne hat, in Afrika. Im gezähmten Zustand vermehrt er sich nicht leicht, es müssen daher immer wieder wilde gefangen werden, die dann meist von zahmen Elephanten selber gezähmt und abgerichtet werden.

4) Der gemeine Tapir oder Anta (**Tapirus americanus**), hat in seinem Munde alle 3 Arten von Zähnen, an seinen Vorderfüßen 4, an den Hinterfüßen 3 in breite Hufen ausgehende Zehen, eine rüsselförmige zum Wühlen im Boden geeignete Schnautze. Das Thier gleicht einem großen Schweine, es fehlen ihm jedoch die Vertheidigungswaffen, welche das Schwein hat, denn seine Eckzähne sind ganz klein, deshalb ist es zu keinem Angriff noch Widerstand gegen Menschen geeignet. Es geht gern ins Wasser, kann vortrefflich schwimmen, frißt im wilden Zustand Wassergewächse, geht aber dabei oft in den Wassermelonenfeldern und Zuckerplantagen auf die Weide. Es läßt sich, jung gefangen, sehr leicht zähmen und frißt im zahmen Zustand, wie das Schwein, die verschiedensten Dinge. Sein Fleisch ist noch besser und wohlschmeckender als das des Schweines. Auch in Ostindien lebt eine Art von Tapir.

5) Das Schwein (**Sus Scrofa**), hat zwar 4 Hufzehen, nur 2 aber davon berühren den Boden. In seinem Munde stehen alle 3 Arten von Zähnen, von denen die Eckzähne als Hauer zu starken Vertheidigungswaffen anwachsen. Dieses Thier ist gar weit über alle Gegenden der Erde verbreitet und durch sein Fleisch dem Menschen nützlich. Es frißt allerhand (auch Fleisch). Auf einigen großen Inseln Südasiens leben die dortigen wilden Schweine in so vertrauter Gesellschaft mit den Affen, daß diese auf ihnen reiten, wie der Mensch auf einem Pferde. Unter den ausländischen Arten des Schweines ist das furchtbarste das afrikanische Warzenschwein (**Phacochoerus**) mit sehr breitem, durch Fleischlappen und Auswüchse entstellten Rüssel und gewaltig starken, runden, gleich einem

Digitized by Google

kleinen Stierhorn gekrümmten, scharf zugespitzten Hauzähnen.

Auch in Amerika giebt es ein besondres Geschlecht von Schweinen, Pecari oder Bisamschweine (Dicotyles) genannt. Sie erreichen nur die Größe eines halbwüchsigen europäischen Ebers, haben nur kurze Eckzähne, an den Hinterfüßen nur 3 Zehen, keinen hervortretenden Schwanz; am Rücken ganz hinten ein sackförmiges Drüsenbehältniß, darin eine nach Bisam riechende Flüssigkeit abgesondert wird. Die eine, etwas größere Art (D. labiatus) findet sich auf dem südamerikanischen Festland in Heerden von mehreren hundert Stücken beisammen und kann in solcher Menge, wenn sie gereizt wird, Jägern und Hunden durch ihr Beißen gefährlich werden, die kleinere, etwas dickere Art, mit weißlichem Halsbande (D. torquatus), lebt nur in kleinen Gesellschaften beisammen und ist durch Hunde jagdbar.

§. 76. Die einhufigen Thiere (Solidungula), bei denen die 3 Zehen nicht nur wie bei den großen vielhufigen Thieren (z. B. dem Elephanten) bis an ihre Spitze in eine dicke schwielige Hautmasse, sondern zu einer gemeinsamen Knochenmasse verwachsen sind, welche in einen halbkreisförmigen Huf endigt, schliessen sich dennoch durch die Hauptzüge ihres Baues unmittelbar an die Thiere der vorhergehenden Ordnung an. Man hat deshalb auch die Einhufer mit den Vielhufern zu einer gemeinsamen Familie, unter dem Namen der Dickhäuter (nach Seite 448) vereint. Die einhufigen oder pferdeartigen Thiere haben in beiden Kinnladen alle 3 Arten von Zähnen, im Bau ihres Gehirns so wie der Eingeweide, nähern sie sich, so wenig sie diesen äußerlich ähnlich sind, den Schweinen. Die Einhufer bilden nur ein bekanntes Geschlecht: das des Pferdes (Equus), welches aber in mehrere Arten, z. B. das eigentliche Pferd (E. Caballus), den Esel (E. Asinus), Halbesel (E. hemionus), das schöngestreifte Zebra (E. Zebra), Quagga (E. Quagga), und noch in einige den beiden letzteren verwandte Arten zerfällt. Alle diese Arten gehören der sogenannten alten Welt (den 3 Welttheilen der östlichen Halbkugel) an, Amerika hat keine einheimische Art. Das Pferd ist wahrscheinlich ursprünglich im südwestlichen Asien (Palästina und Arabien) zu Hause;

Digitized by Google

wenigstens giebt es in Arabien noch immer die schönsten und edelsten Rosse, über deren Abkunft die Araber noch jetzt ordentliche Stammbäume unterhalten, die bis zu den Leibpferden des Königs Salomo oder des Propheten Muhamed hinaufreichen. Ueberhaupt ist dort das Roß ein so beliebtes Hausthier, daß es in die Zelte hinein kommt, selbst neben ganz kleinen Kindern vorbeitritt, ohne eines zu beschädigen, und von den Leuten wie ein lieber Hausfreund betrachtet und gehalten wird.

Esel hat es in Europa mehrere gegeben, die sehr berühmt geworden sind und zu großem Ansehen kamen. Und dieses hat der Esel des Hauptmann Dundas in Malta wirklich verdient, denn dieser Esel gehört zu den merkwürdigsten reisenden Personen unsers Zeitalters und lebte, so viel ich weiß, noch vor wenig Jahren in großen Ehren. Derselbige war nämlich im März 1816 am Bord der Fregatte Ister (Capitän Forrest) in Gibraltar eingeschifft worden, um zu seinem Herrn nach Malta gebracht zu werden. Aber das Schiff stieß bei der Gat-Spitze auf eine Sandbank, und der Esel wurde, weil er wohlbeleibt und schwer war, ins Meer geworfen, damit er — wo möglich — sein Heil mit Schwimmen versuchen möchte. Und siehe da, nach etlichen Tagen, da man die Thore in Gibraltar aufthat, kam unser Esel herein und stellte sich vor den Stall des Meisters Week hin, bei dem er einige Zeit in Kost und Logis gewesen. Der scharfsinnige Langohr hatte denn da in wenig Tagen einen ihm vorher ganz unbekannten Weg von mehr als 50 Stunden über Berg und Thal und manchen Gebirgsstrom hinüber gemacht, um seinen alten Wirth, bei dem es ihm wohlgegangen, wieder aufzusuchen. Und zwar in einem Lande, wo nicht einmal einer sein ehrliches deutsches „Ja" verstanden, wo er also keinen Menschen um den Weg fragen können. — Ueberhaupt sind die Esel schon in Italien und Frankreich, und durchgängig in südlichen Ländern viel feinere Thiere, als bei uns, denn sie können die Kälte nicht ertragen, und scheinen daher bei uns, wo es kalt ist, so träg und dumm, während sie in warmen Ländern gar munter und gescheit sind.

§. 77. Obgleich die bereits erwähnten Klassen der Säugethiere manche dem Menschen sehr zugethane und nützliche Arten enthalten, so kommen darinnen doch keine der Klasse der wiederkäuenden Thiere (**Ruminantia**) gleich, in welche mit Ausnahme des Pferdes die wichtigsten Hausthiere gehören. Alle diese Thiere haben nur 2 eigentliche Zehen oder 2 Hufen,

Digitized by Google

außer ihnen aber meist noch zwei kleine Blind- oder Afterhufen; ihr Magen besteht aus 4 Abtheilungen, und ist so eingerichtet, daß das Futter, welches sie auf der Weide abgezupft und einstweilen in den großen Magen vorrathsweise hineingeschluckt haben, von da erst in den 2ten, so wie aus diesem wieder in den Mund gebracht und noch einmal gekaut werden kann, dann geht die Speise gleich, indem sich das rinnenartig offene, bis in den 3ten Magen reichende Schlundende zusammenschließt, aus dem Mund hinunter in den 3ten Magen, nicht erst von neuem in den 1ten und 2ten und vom 3ten, wo dieselbe durch den Magensaft wohl durchweicht wird, in den 4ten. Alle Wiederkäuer nähren sich von Pflanzen. Bei den meisten sind blos Backenzähne und dazu bei allen blos in der Unterkinnlade eigentliche Schneidezähne vorhanden, nur das Kameel hat Eckzähne.

1) Das Kameel (Camelus), mit Eckzähnen, ist durch seinen ganzen Bau und seine Eigenschaften recht dazu eingerichtet, den Menschen und seine Lasten durch die Sandwüsten der Länder zu tragen, welche seine Heimath sind, und heißt daher mit Recht das Schiff der Wüste.

Seine Füße sind so gebaut, daß sie das Thier nicht so tief in den Sand einsinken lassen; seine Organisation ist so eingerichtet, daß es mehrere Tage in der dürren Wüste gehen kann, wobei es nur trocknes Bohnenfutter und etwa bei Gelegenheit einige harte Dorn- und Distelgewächse zu fressen hat, ohne dabei verdursten zu müssen, was sonst in jenen so wasserarmen Wüsten jedem anderen Thiere widerfahren würde. Ueberhaupt ist das Kameel recht zur Mühseligkeit eines Lastträgers der Wüsten geboren und erzogen. Denn die 2 Buckel des backtrianischen Kameels oder Trampelthieres (C. bactrianus), die aus einer fettigen Masse bestehen, gleichen zwar einem natürlichen Sattel oder Lasthalter, aber diese Buckel des Trampelthieres wie der des gemeinen Kameels, haben eine ganz andere wichtigere Bestimmung: sie sind gleichsam Vorrathskammern der Nahrungssäfte, welche ins Blut aufgenommen werden und den Leib bei Kräften erhalten, wenn ihm die gewöhnliche Nahrung gebricht. Man gewöhnt öfters schon die jungen Kameele, so lange sie noch an der Mutter saugen, ans Lasttragen, so daß das arme Thier nicht einmal eine freie Kindheit genießt, wie unsere Pferde, und auch bei Nacht nimmt man zuweilen auf Reisen dem Kameel

Digitized by Google

seine Last nicht ab, wenn die Gegenden nicht ganz sicher sind, oder wenn das Aufpacken zu viele Zeit raubt. Dennoch ist das gutmüthige Thier fast immer sanft und geduldig, und freut sich, wenn der Kameeltreiber ihm etwas vorsingt oder Musik macht. Man kann übrigens auch vom Kameel das Fleisch essen, die Milch der Weibchen (die gewöhnlich nicht zum Lasttragen gebraucht werden) genießen, und die Haare zum Weben von Fußdecken und Zelten, so wie groben Mantelzeug benutzen. Die gemeine Art, die nur einen Höcker hat, heißt Dromedar (C. Dromedarius). In Amerika giebt es auch 2 Thiere vom Kameelgeschlecht, das eine ist das Lama (Auchenia Llacma), das auch dort zum Lasttragen dient, aber viel kleiner als das Kameel ist; das andere ist die Vicunna, die ihres außerordentlich feinen Wollenhaares wegen gejagt wird.

2) Unter das Geschlecht des Moschushirsches (Moschus), der einem Reh sehr ähnlich sieht und von graulicher Farbe ist, dabei aber keine Geweihe hat, sondern statt dieser das Männchen sehr lange Eckzähne in der Oberkinnlade, gehören die niedlichsten Thierchen dieser Familie. Das eigentliche Mosschusthier (M. moschiferus), das sich auf den Hochgebirgen des nördlichen und mittleren Asiens, so wie auf den Tibetanischen Alpen findet, hat unten am Leibe einen Beutel, in dem der in den Apotheken so hoch und theuer gehaltene Moschus sich findet.

3) Das Hirschgeschlecht (Cervus), zeichnet sich durch Geweihe aus, die bei den gesunden männlichen Thieren alle Jahre abgeworfen werden, und dann wieder neu, und zwar immer um einige Zacken größer herauswachsen, so, daß man aus der Zahl der Zacken das Alter des Thieres erkennen kann. Das Weibchen ist bei fast allen Arten, außer beim Rennthier, ungehörnt.

Der Elennhirsch (C. Alces), der vormals auch in den deutschen Wäldern lebte, jetzt aber nur noch im nördlichen Europa, Asien und Amerika gefunden wird, ist die größte Hirschart und wird über 8 Fuß lang, 7 Fuß hoch. Er hält sich am liebsten in sumpfigten Wäldern auf, kann gut schwimmen und auch über Sümpfe rutschen. Die nützlichste und wichtigste unter allen Hirscharten ist aber das Rennthier, das als Hausthier den Bewohnern der nördlichsten, kältesten Erdtheile durch sein Fleisch, seine Milch, sein Fell dient und dabei noch ihre Schlitten zieht, sowie Lasten trägt. Bei uns finden sich der Edelhirsch (C. Elaphus), Damhirsch (C. Dama) und der Rehbock (C. Capreolus).

Digitized by Google

4) Die Giraffe (**Camelopardalis Giraffa**) mit kurzen, kegelförmigen, behaarten, niemals abfallenden Geweihen und einem Knochenhöcker auf der Stirne, ist eines der merkwürdigsten Säugethiere. Sie wird 18 Fuß hoch, der Hals allein 6 Fuß lang, die Vorderfüße sind viel länger als die Hinterfüße. Sie lebt in Afrika und frißt vorzüglich Baumblätter.

5) Vom Antilopengeschlecht (**Antilope**), welches nicht Geweihe, sondern wie die Ziegen und Schaafe Hörner trägt, die aus einer hohlen Scheide bestehen, in deren Innern sich ein Knochenzapfen findet, welcher auf dem Stirnbein aufsitzt, (sogenannte Hohlhörner) haben wir in unserer Nachbarschaft nur noch die Gemse (**A. rupicapra**). Die meisten Arten, darunter es gar zierlich schöne giebt, leben, und zwar meistens in großen Heerden beisammen, in heissen Ländern.

6) Der Stier (**Bos**), unterscheidet sich vorzüglich durch die runden, gleich von ihrem Ursprung an gekrümmten Hörner und der gemeine Hausstier (**Bos Taurus**) noch überdieß durch die niederhängende, aus der schlaffen Kehlhaut gebildete Wamme. Seine vielfache Benutzung in unsrem Haushalt ist bekannt. In Südafrika dient der dortige Stier auch noch überdieß zum Bewachen der Hottentottendörfer. Man läßt da mehrere solcher gehörnten Wächter zusammengehen, die, so lange sie bei einander sind, selbst einen Löwen durch die gemeinschaftlichen Stöße ihrer Hörner vom Einbruch ins Dorf abhalten können. Es ist sehr gefährlich, sich einem auf solche Weise bewachten Dorfe zu nahen, wenn man nicht Einen, der daraus her ist, und den die Stiere kennen, zum Begleiter hat. In Tibet und Ostindien giebt es einen Ochsen, der ein zottiges, ziegenartiges Haar, eine grunzende Stimme und einen buschigen, sehr langhaarigen Schwanz hat, welchen man in Indien überall zum Fliegenwedel braucht.

7) Die Ziege (**Capra hircus**), die schon der Bart am Unterkinn auszeichnet, ist als nützliches Hausthier dem Menschen fast überall nachgefolgt, wohin er

Digitized by Google

gezogen ist, und sogar auf einigen Inseln der wärmeren Meere, so wie als Bezoarziege (C. Aegagrus) im westlichen Asien wild geworden. Die wichtigste von den vielen Arten dieses Geschlechts ist jene, von der das feine, seidenartig glänzende Haar zum Kameelsgarn kommt, und die unter dem Namen der angorischen Ziege bekannt ist.

8) Auch das Schaaf (Ovis aries), welches der Mangel des Bartes und die schneckenförmige Windung der an ihrem untern Ende zusammengedrückten Hörner von der Ziege unterscheidet, hat gar viele Abarten, davon sich manche durch 3, 4 Hörner, andre durch besonders lange Beine und unvollkommenes Wollenhaar, noch andre durch eine vorzüglich schöne Wolle, andere durch das Ausarten des Schwanzes in eine große Fettmasse, auszeichnen. Es ist bekanntlich ein besonders gutes, genügsames Thier, reinlich und zuthätig gegen den Menschen; seinem Hirten oder Pfleger folgsam. Unser eben beschriebenes gemeines Schaaf (Ovis Aries) unterscheidet sich vorzüglich durch seinen längeren, hängenden Schwanz und seinen wolligen Pelz von den wilden Arten des Schaafes, davon der Muflon (O. Musimon) auf einigen Inseln des Mittelmeeres, der Argali (O. Argali) im östlichen Asien und in Nordamerika lebt.

§. 78. Die Nagethiere (Glires), haben nur scharfe Schneide- oder Vorderzähne und Backenzähne, keine Eck- oder Hundszähne. Sie leben meistens von Pflanzen. Im Bau ihres Gehirns, so wie durch ihre Kunsttriebe und ihre rasche Beweglichkeit nähern sie sich schon mehr den Vögeln, auch sind manche von ihnen mit einer Flatterhaut (zum Fluge) versehen.

1) Das Stachelschwein (Hystrix cristata), das schon in Italien lebt, hat außer den Haaren auch viele große Stacheln, die inwendig hohl sind, wie Federkiele. Es macht sich Baue unter der Erde, mit einem Eingang und vielen Kammern, frißt Baumrinden, Buxbaum, Wurzeln u. s. w. Man ißt sein Fleisch.

2) Das Meerschweinchen (Cavia Cobaya),

Digitized by Google

das an den Vorderfüßen 4, an den Hinterfüßen nur 3 Zehen hat, ist ursprünglich aus Amerika zu uns gebracht worden, ist aber nun bei uns ein allbekanntes Hausthier geworden, dem, wenn man es in einem Hause hält, die Ratten weichen sollen. Männchen und Weibchen sind gar zärtlich gegen einander. Sie fressen allerhand Gemüse.

3) Der Aguti (**Dasyprocta Aguti**), unterscheidet sich schon durch seine langen, dünnen Hinterfüße und seine kurzen am Kreuze borstenartigen Haare vom Meerschweinchen. Der Kopf, mit seiner gespaltenen Oberlippe, hat ein hasenartiges Aussehen. Es ist von brauner, ins Olivengrüne hinüber spielender Farbe; am Leibe ist es nicht viel größer, als ein Kaninchen, doch ist es viel hochbeinigter. Sein Vaterland ist das südliche Amerika. Es nährt sich von Kräutern und ist leicht zu zähmen.

Verwandt mit den beiden zuletzt genannten Gattungen der Nagethiere ist der ebenfalls im heißern Amerika wohnhafte Capybara oder das Flußschwein (**Hydrachoerus Capybara**), so groß als ein halbjähriges Schwein, lebt gesellig am Ufer der Flüsse, läßt sich leicht zähmen und ist wegen seines wohlschmeckenden Fleisches sehr geschätzt.

4) Der Hamster (**Cricetus frumentarius**), den schon seine Backentaschen und sein kurz behaarter Schwanz, so wie das am Bauche schwarze, am Rücken fuchsrothe und dabei weißgefleckte Fell, vor andern Mäusen auszeichnen, findet sich auch in Deutschland, besonders durch Mitteldeutschland bis zum Rheine.

Der Hamster ist ein rechtes Bild des Geizes. Den ganzen Sommer und angehenden Herbst durch schleppt er in seinen Backentaschen Getreide zusammen und in seinen künstlichen Bau hinein, ist dabei so geizig und hartherzig, unverträglich und boshaft gegen seines Gleichen, daß nicht einmal sein eigenes Weibchen in seinen Bau hinein darf, sondern seinen eigenen haben muß, und daß, wo sich 2 Hamster begegnen, sie sich öfters so lange beißen, bis der eine todt ist, der dann oft vom andern gefressen wird. Selbst das Weibchen jagt seine Jungen, nach 3 Wochen, wo sie noch ganz klein sind, aus seiner Höhle hinaus, und benimmt sich dann, wo sie ihnen begegnet, als ihre ärgste Feindin. Und recht sonderbar ist es: im südlichen Rußland und Sibirien giebt es ein Thier, das zum Geschlechte des Iltis gehört, dieses beißt

Digitized by Google

den Hamster todt, und trägt wohl 10 solcher Geizhälse in seinen Bau hinein, der noch dazu ein Hamsterbau ist, woraus es die Hamster vertrieben hat. So wird der hartherzige Geiz in seiner eignen Manier durch einen fremden Geiz bestraft, und ein Stärkerer trägt sich die selber als Vorrath ein, die ihr ganzes Leben nichts thaten, als Vorräthe sammeln, wovon sie niemand etwas mittheilten. Im Gothaischen hat man zuweilen in einem Jahre gegen 27000 Hamster erlegt. Man gräbt ihre Baue gar gern auf, weil sich darin ein Vorrath des besten, auserlesensten Getreides, von wohl 60 Pfund findet. Jede Sorte liegt da zuweilen rein von der andern abgesondert, wie bei geldlustigen Leuten die Sechsbätzner, die Zwölfer, die Vierziger, alles besonders sortirt liegt. Uebrigens, um doch auch einen guten Zug vom Hamster anzuführen, frißt er auch nebenbei Maikäfer und Heuschrecken, wodurch er allerdings einigen Nutzen stiftet.

5) Das Murmelthier, der Munggen (Arctomys Marmotta), das an den Vorderfüßen 4 vollkommene Zehen und eine Daumenwarze, an den Hinterfüßen 5 Zehen; oben 5, unten 4 spitzhöckrige Backzähne hat, ist dagegen ein desto gutartigeres, freundlicheres Thier gegen seines Gleichen, was sich gern in Gesellschaften zusammenhält, friedlich die Kräuter der hohen Alpenfelsen abweidet, und am Quell sich sonnt. Den Winter bringt es in tiefem, künstlichen Baue zu, und bleibt da, bis im höchsten Sommer auch von seinen einsamen Bergwiesen der Schnee weggethaut ist, und bis die Sonne es aufweckt. Und hie und da, wo es Felsen bewohnt, die wie einsame Inseln aus dem Gletschereis herausragen, welches mit jedem Jahre immer höher hinaufsteigt, dauert die Zeit des Schlafens gar lange, (über 10 Monate) und wird mit jedem Jahre immer länger, bis zuletzt eine solche vereinsamte Colonie unter der nun gar nicht mehr wegthauenden Eisdecke gar nicht mehr aufwacht. Das Murmelthier nützt übrigens auch dem Menschen durch sein gesundes Fleisch und sein Fell. Es ist etwa $1\frac{1}{4}$ Fuß lang und von schwärzlich grauer Farbe.

6) Das Eichhorn (Sciurus vulgaris), das sich in unsern Wäldern außer den Bettchen in hohlen Bäumen oder auf Baumzweigen, worinnen es seine Jungen heckt und redlich verpflegt, noch manches Nest auf Vorrath, gleichsam als kleine Land- und Lusthäu-

Digitized by Google

ser baut, ist überhaupt ein Thierchen, welches gern auf Vorrath denkt, und dazu des Hehers seinen öfters mit benützt, dafür aber auch wieder von wilden Schweinen geplündert wird. Der Haarbüschel an den Ohren, sowie das lange gescheitelte Haar am langen Schwanze, unterscheiden es. Es hat oben 5, unten 4 Backzähne. Eine, dem Unsrigen nahe verwandte Art, die in der Nähe des Polarkreises wohnt, zieht manchmal in ganzen Schaaren südwärts, und soll dann auch auf Baumrinden über Flüsse schiffen, wobei ihr das Schwänzchen als Segel dient. Es giebt in Asien so wie schon im nördlichen Europa auch ein fliegendes (flatterndes) Eichhorn (**Pteromys**), mit Flughäuten, und mehrere Arten von Erdeichhörnchen, die nicht auf Bäume gehen, sondern in Löchern unter der Erde leben. Vorrath sammeln auch diese.

7) Der Siebenschläfer (**Myoxus**), oben und unten mit 4 Backzähnen, und mit behaartem Schwanze, dessen größere Arten, z. B. den grauen (**M. Glis**), welcher auch Billmaus heißt, die alten Römer mästeten und als Leckerbissen verspeißten, lebt auch bei uns, besonders in den Gebirgen des südlichen Deutschlands, baut Nestchen, wie das Eichhörnchen, und schläft da im Winter, wie man ihm nachsagt, zuweilen 7 Monate. Der kleine, röthlich braune, der fast wie ein junges Eichhörnchen aussieht (**M. muscardinus**), ist der niedlichste und schönste.

8) Von Maus und Ratte (**Mus Musculus** und **M. Rattus**), die schon ihr fast ganz kahler Schwanz unterscheidet, läßt sich freilich nicht viel Gutes, und überhaupt nichts sagen, was nicht jeder wüßte, doch giebt es in Sibirien eine Art Maus, welche den dortigen armen Leuten, die ihre Baue aufgraben, ihre Wintervorräthe sammeln hilft. Wenn die Kamtschadalen dem armen Mäuschen fast alles weggenommen haben, was für Menschen eßbar ist, und ihm nichts ließen, als die betäubenden Wurzeln, mit denen sich, wie sie sagen, das Mäuschen bei seinen Festen berauscht, sind sie wenigstens so artig, ihm einige Glasknöpfe, wie auch Fischroggen, als Vergeltung in den

Digitized by Google

Bau hineinzulegen. Denn sie wollen, sagen sie, nichts umsonst haben. Freilich kann das Mäuschen die Glasknöpfe nicht brauchen. Diese Art heißt die ökonomische Maus: **Mus oeconomus.**

9) Die Blindmaus (**Spalax typhlus**), die schon im südöstlichen Europa, besonders aber im Morgenlande, namentlich in Palästina sehr häufig ist, hat einen breiten, platten Kopf, in der Oberkinnlade gefurchte Schneidezähne, keinen Schwanz, die Augen, so klein wie ein Stecknadelkopf, liegen unter dem Fell verborgen, so daß das Thier wie ein geborner Blinder nur durch Geruch und Gehör sich helfen kann. Es gräbt tiefe, lange Röhrenbaue, in denen es meist sich aufhält.

10) Der Hase (**Lepus timidus**), mit doppelt hintereinander stehenden Schneidezähnen in der oberen Kinnlade, ist auch ein friedlicher Mitbewohner unsers Vaterlandes, der, so viel ihm auch Menschen, Füchse und Raubvögel nachstellen, doch das alles durch seine Fruchtbarkeit ersetzt.

Auf den Sibirischen Alpen lebt ein kleiner Hase: der ungeschwänzte Alpenhase (**Lagomys alpinus**). Dieser beißt im Sommer Alpenkräuter ab, trocknet sie sorgfältig zu Heu, und schlichtet sie dann, zum Vorrath für den Winter, zu Heuschobern auf. Dadurch hilft denn das kleine, fleißige Thierchen den nördlichen Sibiriern, die ohnehin ein gar mühsames, armes Leben haben, das nöthige Heu für ihr Vieh sammeln, denn jene ziehen im Herbst herum, und holen sich einen grossen Theil der Vorräthe des Alpenhasen, die dieser ohnehin nicht ganz braucht, hinweg. Das Caninchen (**Lepus Cuniculus**), welches auch zum Hasengeschlecht gehört, ist schon ehehin an manchen Orten zur wahren Landplage, welche ganze Inseln verödete, geworden. Denn es vermehrt sich unbeschreiblich.

11) Der Biber (**Castor Fiber**), mit plattem, schuppigen Schwanz und Schwimmhäuten zwischen den Hinterzehen, ist bekannt durch die künstlichen Burgen oder Baue, die er, aus mehreren Stockwerken bestehend, am Ufer der Wasser aufführt, und dabei öfters auch noch ein Wehr anlegt. Er schneidet die Aeste und dünneren Stämme der Bäume dazu, wie ein Zimmermann, mit seinen scharfen, meiselartigen Schneidezähnen durch und nimmt überdies Schilf und thonige

Digitized by Google

Erde zur Grundlage und Aufmauerung seiner Burgen. Ein Beutel, der an seinem Leibe liegt, enthält das in den Apotheken gebräuchliche Castoreum oder Bibergeil. Sein Fell ist ein köstliches Pelzwerk. Man findet ihn jetzt noch am häufigsten im nördlichen Amerika, nächst dem auch im nördlichen Europa und Asien. Sonst war er auch in Deutschland nicht selten, jetzt ist er da nur noch sehr vereinzelt zu finden.

§. 79. Die Beutelthiere (**Marsupialia**), gebären ihre Jungen in einem so unvollkommenen, halbreifen Zustand, daß dieselben kleinen nackten Fleischklümpchen gleichen, an denen man fast nur einen verhältnißmäßig großen Mund deutlich entwickelt sieht. Aber dieser Mund hat auch gerade in dieser Zeit eine ganz besondre Bedeutung für das Fortleben des jungen Thieres, denn durch ihn verwächst dasselbe gleichsam noch einmal mit dem Körper der Mutter und bleibt mit ihm zu Einem verbunden, bis es zum zweiten Mal in einem vollkommneren Zustande geboren werden kann. Die Alte hat nämlich an ihrem Unterleibe gleichsam eine Art von Tasche oder Beutel; ein Behältniß, in welchem die Saugwarzen liegen, über welche sich die weiten Falten der Haut und der äußern Fleischschichten des Bauches, auf jeder Seite durch einen Knochen gestützt so hinziehen lassen, daß sie die Tasche fest verschließen. Die Mutter bringt die neugebornen, unreifen Jungen in das Behältniß hinein, wo sich dieselben an den Saugwarzen ansaugen und mit diesen so fest vereinen, daß man sie nicht hinwegbringen kann, ohne die Warzen mit abzureißen. Jene Tasche vertritt mithin die Stelle eines Nestes der Vögel, darinnen die Jungen durch die mütterliche Wärme ausgebrütet und dann in ihrem nackten, blinden Zustand noch eine Zeitlang von den Alten gehegt und gepflegt werden, nur daß die Beutelthiermutter keine solche Mühe mit dem Nesterbau und der Pflege der Jungen hat, sondern diese nur zärtlich in ihrem warmen, sichern Mutterschooß verwahrt und sie hier aus den Quellen des eignen Lebens sich nähren lässet, bis sie nach einigen Wochen, wenn ihre Glieder und Sinnen sich entwickelt

Digitized by Google

haben, von selbst sich trennen und allmählich an freie, selbstständige Bewegung gewöhnen, obwohl bei den meisten Arten die Jungen noch lange eine sehr enge Verbindung mit der Mutter unterhalten. Allerdings nähern sich schon durch diese äußern Züge ihres Lebens und seiner Entwicklung, noch mehr aber durch den innren Bau der damit im Zusammenhange steht und durch das Gehirn die Beutelthiere der Klasse der Vögel, doch stehen, einzeln betrachtet, in dieser Ordnung sehr verschiedenartige Thiere beisammen, davon einige den Nagethieren und selbst den Wiederkäuern, andere den Raubthieren, ja selbst wegen des handartigen Baues der Hinterfüße den Affen in etwas verwandt erscheinen. Die meisten Arten der Beutelthiere leben in Australien, andere in den wärmeren Ländern von Amerika und auf den Molucken.

1) Das Känguruh (**Halmaturus** oder **Macropus giganteus**), ist das Größeste unter den noch lebenden, bekannten Beutelthieren, denn es hat, wenn es auf den Hinterschenkeln aufrecht sitzt, die Höhe eines Mannes, und erreicht ein Gewicht von $1\frac{1}{2}$ Centnern. Es fehlen ihm, sowie den Nagethieren, die Eckzähne; die fünfzehigen Vorderfüße sind verhältnißmäßig sehr kurz, der ganze Oberleib schmal, dagegen die Hinterfüße (mit 4 Zehen), davon jedoch 2 verwachsen sind, so daß sie nur wie 3 erscheinen, überaus lang und der Schwanz so groß und stark, daß er zum Stützen des Körpers die Stelle eines Fußes vertritt. Vermöge dieser Einrichtung ist das merkwürdige Thier nur unvollkommen zum vierfüßigen Gange, desto mehr zum Springen geeignet. Es ist das größeste Landthier von Neuholland, lebt von Pflanzen, sein Fleisch hat den Wohlgeschmack des Hirschfleisches. Wenn das Junge zuerst geboren wird, hat es nur die Größe einer Haselnuß, es bleibt lange im Beutel der Mutter und flüchtet sich auch dann noch in diesen, wenn es schon ganz ausgebildet ist.

2) Der Wombat (**Phascolomys ursinus**), fast von der Größe eines Dachses, steht im Bau der Zähne den Nagethieren, dadurch daß er beim Gehen auf

Digitized by Google

die ganzen Sohlen auftritt, den Sohlengängern nahe. Lebt auch in Australien.

3) Der Schweifbeutler (**Dasyurus**), dessen Arten in Neuholland zu Hause sind, lebt, wie die insektenfressenden Sohlengänger (S. 434) von Insekten, einige fressen auch Aas, andere Fische. Der hundsköpfige Schweifbeutler (**D. cynocephalus**) ist von der Größe eines mittelmäßigen Hundes.

4) Die Beutelratten (**Didelphys**), deren Arten zum großen Theil das heißere Amerika bewohnen, zeichnen sich durch die ungewöhnliche Zahl ihrer Zähne (deren sie gegen 50 haben), durch ihren unbehaarten Wickelschwanz, an den sie sich aufhängen können, und durch den abgesonderten, nagellosen Daumen am Hinterfuß aus. Sie sind zum Theil blutdürstige Räuber, die dem Geflügel und andern kleinen Thieren nachstellen, manche fressen Krebse. Das virginische Beutelthier (**D. virginiana**) hat die Größe einer Katze; die neugebornen Jungen, (oft mehr als 10) nur die Größe einer Erbse; beim Cayopollin (**D. Cayopollin**) halten sich die Jungen noch lange Zeit nach ihrer Trennung von der Mutter mit ihren Schwänzchen am Schwanz von dieser fest.

5) Der Flugbeutler (**Phalangista**), hat, wie der fliegende Maki und die fliegenden Eichhörnchen, eine Art von Flatterhaut zu beiden Seiten des Leibes, welche aus den Falten des locker anliegenden Felles gebildet wird und dem Thiere als Fallschirm zum Fortschwung von einem Baume zum andern dient.

§. 80. Zahnlückige Säugethiere (**Edentata**), sind solche, die entweder gar keine, oder blos Backenzähne und Eckzähne, dabei aber keine Vorderzähne haben. Es sind meist sehr unvollkommene Thiere, die nur in den heißesten Ländern der Erde leben. Einige von ihnen bilden den nächsten Uebergang aus der Klasse der Säugethiere in die der Vögel.

1) Das Faulthier (**Bradypus tridactylus**), das in Guiana u. s. lebt, hat fahle Haare wie welkes Gras und keine Vorderzähne, wohl aber Eckzähne und 4 Backzähne. Mit seinen langen, starken Klauen

Digitized by Google

klettert es ganz geschickt auf Bäume, von deren Blättern es lebt, dagegen kann es auf plattem Boden, wenn derselbe von fester Beschaffenheit ist, nur sehr mühsam und langsam sich bewegen, weil es nur mit der äußern Handfläche auftritt.

2) Das Gürtelthier, oder Tatu (**Dasypus**), mit oben 7, unten 8 Backzähnen, keinen Vorderzähnen, hat Schaalen und Schilderstücke fast wie die Schildkröten und dabei noch mehrere Schildergürtel. Es findet sich in Südamerika, macht Baue unter der Erde, und hat ein wohlschmeckendes Fleisch. Es lebt meist von Pflanzen und Insekten, frißt aber auch Aas.

3) Das Schuppenthier (**Manis brachyura und macroura**), das gar keine Zähne hat, ist mit scharfen Schuppen, wie die Tannzapfen, bedeckt, und mit diesen vertheidigt sich auch das Thier, indem es sich igelartig zusammenrollt. Es lebt im südöstlichen Asien, und nährt sich, wie die Ameisenfresser, von Ameisen und Termiten, die es mit seiner langen, klebrichten Zunge aus ihren Bauen hervorzieht.

4) Die Arten des Ameisenfressers (**Myrmecophaga**) haben gar keine Zähne in ihren Kinnladen, die zu einer Schnautze verlängert sind, deren Länge nahe den fünften Theil der Gesammtlänge des Leibes (ohne den Schwanz) beträgt. Vorn, am Ende dieser langen Rüsselschnautze steht ein Mund, der so klein ist, daß er zur Größe des Thieres, davon die eine Art: der gemähnte Ameisenfresser oder Tamandua (**M. jubata**) bis zur Schwanzwurzel eine Länge von $4\frac{1}{2}$ bis 5 Fuß erreicht, in gar keinem Verhältniß zu stehen scheint. Aber nicht der Mund, auch nicht die Kinnladen sind bei diesem merkwürdigen Thiere zum Fangen und Ergreifen der Nahrung bestimmt, sondern hiezu dient ihm die dünne, etwas rundliche Zunge, welche ohngeachtet ihrer Zartheit aus kräftigen Muskelfasern gebildet ist, und die es $1\frac{1}{2}$ Fuß weit aus dem Mund hervorstrecken kann. Die Nahrung des Tamandua besteht zunächst in Ameisen und Termiten, in deren Baue er mit den starken Klauen seiner Vorderfüße einen Einbruch macht, dann

unter die zulaufenden, dicht gedrängten Schaaren der kleinen Bewohner seine klebricht-schleimige Zunge hineinschnellt, die er, nachdem sie durch einmaliges Hindurchfahren mit der Beute sich beladen hat, in den Mund hineinzieht, und nachdem er den Fang verschlungen, abermals herausstreckt. Seine plumpen Vorderfüße sind mit 4, die Hinterfüße mit 5 starken Klauen bewaffnet. Längs des Rückens steht ein Kamm von langen Haaren. Noch länger und dick wie an einem Pferdeschweif sind die Haare an dem mehr denn 2 Fuß langem, starken Schwanz, der mit ihnen so reichlich überkleidet ist, daß er dem Thier, wenn dasselbe in zusammengerollter Lage ruht, zu einer Decke dient. Der Tamandua, wie alle Arten seines Geschlechtes, darunter es einige ungleich kleinere giebt, deren Schwanz ein Wickelschwanz ist, und welche auf Bäume, nach den Termitenbauen klettern, lebt in den heißeren Ländern von Amerika. Gegen Hunde weiß er sich kräftig zur Wehre zu setzen, indem er sich in sitzender Stellung auf den linken Vorderfuß stützt und mit den Klauen des rechten Fußes um sich haut, im Nothfall auch auf den Rücken wirft und mit den Klauen beider Vorderfüße auf den Gegner einhaut. Das Weibchen trägt sein Junges lange Zeit auf dem Rücken, dahin sich dasselbe auch später noch bei Gefahren flüchtet, bis es nach einem Jahre von einem neuen Ankömmling verdrängt wird. In der Gefangenschaft nimmt der Tamandua auch klein gehacktes Fleisch zu sich. Sein Gesichtsinn scheint sehr stumpf zu seyn. Beim Gehen tritt er nur auf den Rand des Fußes auf.

5) Der Ameisenfresser vom Cap, oder das Erdschwein (**Orycteropus capensis**), hat die Statur eines mäßigen Schweines, ziemlich lange mit starken Klauen bewaffnete Füße, einen langen Schwanz und eine spitz zulaufende lange Schnautze; in den Kinnladen stehen Backzähne, die wie aus einzelnen Röhrchen zusammengesetzt sind. Das Thier hat wie der Tamandua eine lange Zunge, durch welche es so wie dieser Ameisen fängt. Es gräbt sich un-

Digitized by Google

terirdische Baue, sein Fleisch wird von den Bewohnern des südlichen Afrikas, wo seine Heimath ist, sehr geschätzt.

6) Das Schnabelthier (**Ornithorynchus paradoxus** und **rufus**), das in Neuholland in Erdlöchern am Ufer der Flüsse und Landseen lebt, trägt in seinem Wesen unter allen Säugthieren die meisten Züge, welche mit dem Wesen der Vögel übereinstimmen. Zwar hat es Haare wie die Säugthiere und eine fast fischotternartige Statur, aber statt einer Schnautze eine Art von Entenschnabel, in welchem sich oben und unten 2 flache, faserige Backenzähne befinden. Ferner hat es kurze Füße mit Schwimmhäuten, wie die Enten, mit denen es auch in der Lebensart etwas Aehnliches hat, denn es wühlt mit seinem Schnabel im Schlamme nach Würmern, wie jene. Auch ist es in seinem innern Baue den Vögeln so ähnlich, daß man noch vor wenigen Jahren zweifelhaft war, ob es Eier lege, oder (wie dieß jetzt erwiesen ist) lebendige Junge gebähre. Das Männchen hat keine Federn, sondern an der Ferse einen hohlen Sporn, der an der Spitze offen, an seiner Wurzel mit einem Bläschen in Verbindung steht, aus dem ein scharfer Saft ausfließt, welcher bei Verwundungen Entzündungen erregen soll.

7) Der Ameisenigel (**Echidna hystrix**), der sich ebenfalls in Neuholland findet, gleicht an Größe, so wie durch seine langen Stacheln und durch die Neigung, sich bei eintretender Gefahr zusammen zu rollen, einem Igel, kommt jedoch im innern Bau ganz dem Schnabelthiere nahe. Sein Kopf verlängert sich zu einer röhrenförmigen Schnautze, aus welcher es die wurmförmige Zunge zum Fang von Ameisen hervorstreckt; beide Geschlechter haben Sporne an den Hinterfüßen, die Ohrenöffnungen gleichen denen der Eulen, die Augen haben keine Nickhaut. Sie leben in selbstgegrabenen Höhlen.

§. 81. So ist denn die ganze schöne Erde, mit allen ihren mannichfaltigen Steinen, Erzen, Kräutern und Thieren, für den Menschen zu einem Wohnsitz und großen, reichen Vorrathshause ausgestattet. Selbst

Digitized by Google

von dem menschenähnlichsten Affen unterscheidet den Menschen äußerlich schon der zum Stehen geschickte Fuß und der ganze, blos zum aufrechten Gange eingerichtete Bau des Körpers, so wie vor Allem die Befähigung zum Sprechen. Alle schwarze, rothe, gelbe, groß- und kleinnasige, groß- und kleinäugige Menschen, gehören doch nur zu Einer Gattung, sind aus einem gemeinschaftlichen Stamme entsprungen, dessen Zweige sich nach und nach über die ganze Erde ausgebreitet haben, denn dieses geht aus allen den Gründen hervor, welche die Gelehrten sonst in der Natur für ein sicheres Zeichen halten, daß verschieden aussehende Thiere und Pflanzen von einerlei Stammart wären, so wie aus den gemeinschaftlichen Sagen, Religionsbegriffen und Aehnlichkeiten der Sprachen, bei vielen, auch noch so weit von einander entfernten Völkern. Ohne die Sprache und das verständige Wort, das er durch die Sprache vernimmt, wäre der Mensch doch nur ein armes, rohes Thier, denn seine Natur neigt sich, wenn sie nicht einen geistigen Antrieb von innen bekommt, mehr zur thierischen Sinnlichkeit hin, als zu einem höheren, geistigen Leben. Der Mensch muß auch nicht anfangs gleich wie ein rohes Thier gewesen seyn, wie das Manche gesagt haben, denn das, was wir noch von Sprachen und Sagen und Kunstwerken aus den allerältesten Zeiten übrig haben, übertrifft an Geist und an Vortrefflichkeit oft alles, was wir jetzt in der Art fertigen, und die jetzigen Leute würden keine Aegyptischen Pyramiden, und nur selten solche Bildsäulen machen können, wie die alten Griechen gemacht haben; sie würden kaum einen Straßburger Münster bauen. Man sieht es auch allen solchen alten Denkmälern an, daß damals, wo sie gemacht wurden, dem Menschen die Religion das Beste, Höchste, Nächste gewesen, die jetzt leider so vielen Menschen das Letzte, Fernste geworden ist. Und darum haben die älteren Zeiten so viel Vortreffliches geleistet, was wir jetzt nicht mehr leisten können. Denn der Mensch kann alles Gute, das er thut, nur durch Kraft der Religion thun, und

Digitized by Google

ohne diese ist nirgends ein Segen und Gedeihen bei Etwas. Der Mensch kann auch nur gut seyn und gut werden, wenn er Gottesfurcht hat, denn die Menschenfurcht allein thuts nicht. Und man möchte wohl meinen, wenn einer auch nur die große Natur um sich her ansähe, so müßte er lernen Gott fürchten und verehren und lieben. Aber es giebt doch ein Buch, was Alles dieses noch viel besser lehrt, als das Buch der Natur, die heilige Schrift. Ohne die möchte Jeder, der sie recht kennt, gar nicht mehr auf der Welt seyn. Ohne sie würden wir auch das große, schöne Buch der Natur, seinem eigentlichen höchsten Inhalte nach gar nicht verstehen. Darum wäre es wohl gut, wenn Jeder, der den ersten, blos vorbildlichen und vorbedeutenden Theil der Offenbarungen Gottes an den Menschen — das Buch der Natur, liebgewonnen, dabei vor allem auch Liebe und Interesse für jenen zweiten, höheren Theil gewönne, welcher allein die Räthsel und das dunkle Sehnen der Natur und des Menschenherzens lösen und erfüllen kann.

Digitized by Google

Zusatz zu Seite 263 Zeile 18.

Die große Familie der Gewächse, zu welcher die Seegräser oder Tangarten gehören, wird unter dem allgemeinen Namen der Wasserwasen oder Algen (**Algae**) zusammengefaßt. Wie auf dem Lande die Gräser und andre Wiesengewächse den grünenden, bunt durchwebten Wasen unsrer Auen und Triften bilden, so geschieht dieses auf dem Meer und in unsern Landgewässern durch die Algen. Namentlich darf hier ein Geschlecht der Süßwasser-Algen nicht unerwähnt bleiben, welches Jedem von uns unzählige Male ins Auge gefallen und welches überdieß für den menschlichen Haushalt von bedeutendem Nutzen ist: das Geschlecht des Wasserfadens (**Conferva**). Seine verschiedenen Arten, vornämlich der gemeine oder der Bach-Wasserfaden (**Conf. rivularis**), kann man fast überall in Gräben, Kanälen und langsam fließenden Wassern sehen, wo die öfters mehrere Ellen langen einfachen, gleichförmigen, hin und wieder mit kleinen Höckerchen besetzten Fädchen zu vielen Tausenden vereint durch ihre schöne, grüne Farbe dem Wasser das Aussehen einer grünen Wiese geben. Sowohl der gemeine, als auch andre Arten des Wasserfadens, von denen die eine, mit ganz kurzen Fäden auch in hölzernen, offnen Rinnen und Wasserleitungen wächst, vermehren sich so stark, daß man sie öfters, wenn sie den Lauf des Wassers nicht hemmen und bei ihrem Absterben die Luft nicht verpesten sollen, herausnehmen muß, wo sie dann zur Düngung des Bodens dienen. Aus Conferven hat sich auch ein Theil unsrer Torflager gebildet. Vor Alters hat man dem Wasserfaden heilende Kräfte gegen Knochenbrüche zugeschrieben, indem man damit das gebrochene Glied umwickelte und diese kühlende Bandage oft erneuerte.

Zusatz zu Seite 386 nach Zeile 2.

Unter den vielen ungiftigen und harmlosen Arten der Nattern zeichnet sich noch ganz besonders durch ihre Schönheit aus: die Juwelenschlange oder

Digitized by Google

Ahätullanatter (**Coluber** oder **Dryophis Ahaetulla**). Bei einer Länge von mehreren Fuß hat diese prächtige Schlange, an der man alle Farben des Sapphirs, des Smaragdes, des Topases, mit dem Weiß so wie dem Glanz des Silbers verschmolzen sieht, nur die Dicke eines kölnischen Pfeifenrohres. Sie lebt in den heißeren Gegenden von Amerika, windet sich kletternd auf Bäume, hängt sich mit ihrem Schwanz, den Kopf abwärts, an Zweige, lauert den kleinen Vögeln und Eidechsen auf, dient zum Spiel der Kinder.

Zusatz zu **Seite 395** nach Zeile **20** v. u.

6) Der Curucui (**Trogon Curucui**), ist ein sehr buntfarbiger Vogel, dessen prachtvoll glänzendes, grün- und rothfarbiges Gefieder weich wie Seidenfäden ist, und der mit seinem kurzen, breiten Schnabel die Insekten fängt, die in seine Nähe kommen. Denn zum Nachjagen derselben ist er viel zu träge, sitzt fast Tage lang still auf einem Baumast, und ist so wenig zur Flucht geneigt, daß man ihn öfters mit einem Stock todtschlagen kann. Er lebt in den Wäldern des heißeren Amerikas.

Digitized by Google

Register.

Aal 355
Aalmutter 357
Aalputte 357
Aalraupe 357
Aasgeier, ägyptischer 390
Abdominales 363
Abendpfauenauge 318
Abgottsschlange 384
Abies 258
Absinthium 240
Acacia vera 271
Acalephae 285
Acanthia 314
Acanthopterygii 355
Acarus 326
Accentor 402
Acer 270
Achat 59
Acheta domestica 304
Achillea 243
Achilles 316
Achras 175
Achtfuß 343
Acipenser 352
Ackergänsedistel 236
Ackerkuhweizen 216
Ackermännchen 411
Ackernuß 230
Ackerrade 189
Ackerrose 200
Ackersalat 126
Ackerscharte 237
Ackerschmele 129
Aconitum 206
Acorus 173
Acridium 305
Actaea 202
Actinia 287
Actinotus 67
Adamas 50
Adansonia 224
Adansonia 224
Aderschwämme 274
Adler 390
Adlereule 392
Adlerroche 351
Adlerstein 98
Admiralfalter 317
Adoxa 188
Adular 60
Aegopodium 166
Aeneas 316
Aërides 248
Aërochalcos 102
Aëromagnes 102
Aesche 369
Aesculapie 160
Aesculapsnatter 385
Aesculus 177
Aethusa 164
Affen 427
Affenbrodbaum 224
Afterhartsteine 64
Afterwespe 310
Agalmatolith 73
Agaricus 274
Ageley 207
Agrimonia 192
Agrion 306
Agrippina 321
Agrostemma 189
Agrostis 129
Aguti 458
Ahätullanatter 471
Ahorn 270
Ahornbaum 179
Ajaja 420
Aira 130
Aitl 368
Ajuga 213
Akazienbaum 227
Akazie, ächte 271
Akis 300
Alabaster 80
Aland 368
Alant 242
Alauda 402
Alaunschiefer 68
Alaun, natürlicher 85
Alaunstein 83
Albatroß 424
Albin 66
Albit 61
Alcea rosea 223
Alcedo 395
Alchemilla 142
Alcyonium 283
Afsranke 155
Algae 470
Algen 470
Alipedia 342
Alisma 176
Allermannsharnisch 127
Allium 170
Almandin 52
Alnus 252
Aloë 174
Aloë 174
Alopecurus 130
Alpen-Enzian 160
Alpenfettkraut 124
Alpenhase 461
Alpen-Johannisbeere 156
Alpenkalk 31
Alpenröschen 186 u. 199
Alsine 188
Althaea 223
Alumen 85
Aluminit 70
Aluminites 70
Alyssum 218
Amalgam 93
Amaranthus 252
Amarillis 172
Amaryllis 172
Amaul 362

Digitized by Google

Amazonenstein 61
Ameise 313
Ameise, weiße 307
Ameisenfresser 465
Ameisenigel 467
Ameisenjungfer 306
Ameisenlöwe 306
Amellus-Sternblume 242
Amethyst 58
Amiant 73
Ammer 407
Ammoniacum 85
Ammoniten 18
Ammonites 18
Amomum 120
Ampelis 405
Ampfer, krauser 175
Amphibia 371
Amphibien 371
Amsel 404
Amygdalus 196
Anabas 361
Anacardium 181
Anakondo 384
Anagallis 148
Analzim 62
Anarrhichas 355
Anas 424
Anastatica 219
Anchusa 145
Andalusit 63
Andorn 214
Andromeda 186
Andromeda 186
Andropogon 131
Anemonen 208
Anemone 208
Anethum 163
Angelika 163
Angelica 163
Angiospermia 215
Anguis fragilis 386
Angulirostres 395
Anhydrit 80
Anispimpinelle 165
Annona 209
Annularia 290
Anodonta 333
Anoplotherium 9
Anser 424
Anta 451
Anteros 77
Anthemis 244
Anthericum 173
Anthophyllit 67
Anthoxanthum 125
Anthracolithus 76
Anthrakolith 76
Anthriscus 166
Anthus 402
Anthyllis 228
Antilope 456
Antilopengeschlecht 456
Antimon 101
Antipathes 284
Antirrhinum 216
Antonskraut 217
Apargia 235
Apatelios 78
Apatit 78
Apfelbaum 198
Aphis 315
Aphodius 297
Aphrodita 292
Apis 312
Apium 165
Aplysia 342
Apodes 354
Aprikose 197
Aptenodytes 425
Aptera 324
Aquamarin 53
Aquila 391
Aquilegia 207
Aranea 326
Araneacea 325
Araucaria 259
Araucariabaum 259
Arbutus 186
Arca Noae 332
Arctium 238
Arctomys 459
Ardea 420
Arena 21
Argala 421
Argali 457
Argentan 102
Argentum 91
Argilla 70
Argillacei 70
Argusfalter 317
Argynnis 317
Argyrodamantes 78
Argyrodamas tesselatus 79
Aristolochia 249
Armfüßler 330
Armpolypen 282
Arnica 243
Aron 253
Arragonit 77
Arrau-Schildkröte 377
Arsenicum 103
Arsenik 103
Arsenikkies 103
Artemisia 240
Articulata 291
Artischoke 238
Artocarpus 249
Arum 253
Arundo 134
Arytaene 334
Asarum 191
Asbestos 73
Asbeststein 73
Ascaris 290
Asch 369
Ascidia 335
Asclepias 160
Asparagus 173
Aspergillum 334
Asperugo 145
Asperula 140
Asphalt 86
Aspides 380
Aspidium 273
Astacus 327
Aster 242
Asterias 288
Astragalus 230
Astrantia 164
Astrios 60 u. 61
Astroites 61
Ateuchus 297
Atizoes 69
Atlasbeeren 197
Atropa 154
Atzel 399
Auchenia 424
Auerhahn 414
Auferstehungsblume 220
Aufgußthiere 280

Digitized by Google

Augenspiegel, rother 316
Augentrost 216
Augit, eigentlicher 56
Augites 56
Aurikelchen 147
Aurum 89
Auster 330
Austernfischer 421
Avena 132
Aves 388
Avicula 331
Avogatobaum 181
Axinit 61
Axinites 61
Azedarachbaum 184
Bachbunge 122
Bachneunauge 349
Bachstelzen 411
Bacillaria 281
Badeschwamm 276
Bär 436
Bärenklau 162
Bärentraube 186
Bärlapp 275
Baikalit 56
Balaena 446
Balanus 328
Baldrian 126
Ballote 214
Ballota nigra 214
Balsamine 159
Bambusa 174
Bambusrohr 174
Bananenfeige 168
Bandfisch 359
Bandgras 131
Bandjaspis 60
Bandwurm 290
Barbe 368
Bardana 238
Barhaupt- oder Barmundthier 9
Bartgeier 390
Bartgras 131
Bartgrundel 364
Barylithus 81
Barystathmi 81 u. 82
Baryt 81 u. 82
Basalt 20 u. 68
Basanites 20
Basilienkraut 213
Batatas 149
Bataten 149
Bauchflosser 363
Baumläuferlein 396
Baummarder 442
Baumpieper 402
Baumwollenpflanze 224
Becherblume 252
Beerenwanze 314
Beifuß 240
Beilstein 61
Beinholz 122
Beinwell 146
Beißschildkröte 378
Belemniten 18
Belemnites 18
Bellidiastrum montanum 243
Bellis perennis 243
Berberis 174
Berberisstrauch 174
Bergälster 404
Bergammottenorange 205
Berge, feuerspeiende 4 u. 5
Bergflachs 73
Berggeißwedel 198
Bergholz 74
Berg-Jasione 158
Bergkork 74
Bergkrystall 57
Bergmaasliebchen 243
Bergmilch 78
Bergnaphtha 86
Bergpolei 212
Bergseife 71
Bergwohlverlei 243
Bernhardskrebs 328
Bernstein 87
Beroë 286
Bertramswurzel 244
Berufskraut 228
Beryll 53
— schörlartiger 54
Besenginster 226
Besuchs-Ameise 313
Bettstroh 141
Bettwanze 314
Betula alba 255
Beutelmeise 411
Beutelratten 464
Beutelthiere 462
Bezoarziege 437
Biber 461
Bidens 240
Biene 312
Bienenkörbchen 340
Bienenophrys 248
Bienensaug 213
Bildstein, chinesischer 73
Billmans 460
Bilsenkraut 152
Bimsstein 66
Bingelkraut 267
Binse 128
Birke 255
Birkhahn 414
Birnbaum 198
Bisamkräutchen 188
Bisamschwein 452
Bischir 366
Bischofsmütze 336
Bißgurre 364
Butterklee 148
Bittepkraut 225
Bitterling 368
Bitterlings-Enzian 160
Bittersalz 76
Bittersüß 155
Bitumen 86
Bixa 204
Blätterschwämme 274
Blätterzeolith 66
Bläulingfalter 317

Blasenqualle 287
Blasenstrauch 227
Blasentang 273
Blasenwurm 289
Blatt (wandelndes) 303
Blatta 303
Blattlaus 315
Blattlauslöwe 306
Blattwespe 310
Blaubart 332
Blaufellchen 370
Blaugyps 80
Blauholzbaum 183
Blauspath 63
Blauspecht 111
Blei, das 99
Blei, der 367
Blende 100
Bleierde 99
Bleierz 99
Bleiglanz 99
Blennius 357
Blindfisch 347
Blindmaus 461
Blindschleiche 386
Blitum 120
Blumenbinse 180 u. 226
Blumenkohl 222
Blumenkresse 178
Blumenrohr, Indisches 120
Blutegel 291
Blutkraut 192
Blutnelke 187
Blutsauger 433
Blutrieb 243
Boa 384
Bohne 228
Bohnenbaum 227
Bohnenkraut 212
Bohnerz 98
Boletus 274
Bolus 71
Bombax 224
Bombyx 319
Bootshaken 338
Borago 146
Borax 85
Boraxit 81
Boretsch 146
Borstengras 129
Borstenrose 199
Bos 456
Bostrichus 301
Bovist 274
Brachsen 367
Brachvogel 422
Bradypus 464
Brandschiefer 68
Brasilienholz 182
Brassica 221
Brauneisenstein 97
Braunellenkraut 215
Braunkohlen 87
Braunnelle 402
Braunspath 76
Braunwurz 217
Brausekalksteine 74
Breiapfelbaum 175
Breitling 274
Breme 322
Brennessel 251
Brillenschlange 383
Briza 131
Brodbaum 249
Brombeerstaude 200
Bromus 133
Bronzit 68
Bruchweide 262
Brüllaffe 431
Brunnenkresse 220
Brustflosser 357
Buceros 399
Buche 255
Buchsbaum 251
Buchweizen 179
Bücherscorpion 327
Bufo 375
Bulimus 341
Buntkupfererz 95
Buntspecht 394
Buphthalmum 244
Bupleurum 166
Buschmeester 382
Buschotter 382
Buschschnecke 341
Bußaar 391
Butomus 180
Butte 358
Buxus 251
Cacaobaum 233
Cactus 194
Cadixkoralle, weiße 285
Cadmia 100
Caesalpinia 182
Cajeputbaum 238
Calamus 173
Calamus 173
Calandra 302
Calcarii 74
Calces caementariae 74
Calces phosphoratae 78
Calendula 245
Caleobdolon 213
Calla 253
Callais 62
Callait 62
Callithrix 431
Callitriche 120
Calosoma 299
Caltha 208
Calx 74 u. 75
— vulgaris 18
— cretacea 77
— spumea 78
Camasus 326
Camelopardalis 456
Camelus 454
Campanula 150
Campechenholz 183
Campherbaum 180
Canarienvogel 408
Cancer 327

Digitized by Google

Caninchen 461
Canis 438
Canna 120
Cannabis 265
Canoni 401
Capparis 201
Cappernstrauch 201
Capra 456
Caprimulgus 412
Capuzinerblume 178
Capybara 458
Carabus 299
Carbunculus 51
Cardamine 220
Cardamom 121
Cardium 333
Carduus 238
Caretta 377
Carex 250
Carica 268
Carlina 239
Carneol 59
Carpholithus bohemicus 74
Carpinus 255
Carthamus 239
Cartheuserneike 187
Carum 165
Caryocar 207
Cassadabrod 257
Cassia 182
Cassida 302
Cassienbaum 180
Cassikenvogel 400
Cassis 339
Cassiteris 99
Castor 461
Casuar 418
Casuarius 418
Catalpa 217
Cathartes 390
Catocala 320
Catodon 446
Caucalis 164
Cayopollin 464
Cavia 457
Cebus 431
Cederbaum 259
Cenoprisma 64
Centaurea 245
Centunculus 141
Cephalopoda 342
Cephalus 353
Cepola 359
Ceratonia 266
Cercopithecus 430
Cerinthe 146
Certhia 396
Cervus 455
Cetacea 445
Cetaceen 445
Cetonia 297
Cetraria 275
Chabasit 62
Chaerophyllum 165
Chaetodon 362
Chalcanthum nativum 85
Chalcedon 59
Chamäleon 387
Chamaeleon 387
Chamille 244
Charadrius 422
Cheiranthus Cheiri 221
Cheirostemon 224
Chelidonium 201
Chelonia 376
Chenopodium 161
Chiastolith 64
Chirimoya 210
Chironia 159
Chironectes 354
Chiroptera 432
Chiton 347
Chlorit 69
Chloritschiefer 69
Chondracanthi 347
Chondrilla 237
Christophskraut 202
Christwurz 209
Chrysanthemum 243
Chrysis 309
Chrysobalanus 197
Chrysoberyll 52
Chrysoberyllus 52
Chrysocolla 85
Chrysocollites tessellatus 81
Chrysolith 54
Chrysophyllum 151
Chrysopras 60
Chrysopteros 54
Cichorienkraut 237
Cichorium 237
Cicindela 299
Cicuta 165
Cimex 314
Cinchona 150
Cinclus aquaticus 403
Cineraria 242
Circaea 125
Cirripedia 328
Cissus 142
Cistus 204
Cistusröslein 204
Citrin 57
Citronenbaum 205
Citrus 205
Clavaria 275
Clematis Vitalba 207
Clinopodium 215
Clio 342
Clupea 365
Cnicus 238
Coagulum 83
Cobitis 364
Coccinella 302
Coccopflaume 197
Coccus 315
Cochenillen-Fackeldistel 195
Cochleae 335
Cochlearia 218
Cocos nucifera 252
Cocosnußpalme 252
Cölestin 82
Coenurus 289
Coffea 150
Colchicum 175
Coleoptera 296
Colibri 397

Digitized by Google

Coluber 385
Colubrini 384
Columba 413
Colutea 227
Combustibilia 85
Conchae 330
Concrementum carboniferum 19
Conferva 470
Conium 164
Conus 335
Convallaria 173
Convolvulus 149
Conyza 241
Cophias 382
Copris 296
Coraces 397
Coracias 399
Corallen, rothe 285
Corallenwurz 248
Corallium 285
Coriander 165
Coriandrum 165
Cornelbaum, weißer 139
Corneliuskirschenbaum 138
Cornus 138 u. 139
Coronilla 231
Coronula 329
Corund 51
Corvus 398
Corydalis 225
Corylus 256
Coschenille 315
Cossus 320
Cottus 361
Coturnix 415
Coyamilbe, rothe 326
Crambe 220
Crataegus 197
Craterites 54
Crax 417
Crepis 236
Cricetus 458
Crocodilus 386
Crocus 127
Crotalus 381
Crustacea 327
Cryptogamia 272
Crystallini 57
Cuboizit 62
Cucubalus 187
Cuculus 394
Cucumis 261
Cucurbita 261
Cujavabaum 193
Culex 324
Cupressus 260
Cuprum 93
Curculio 301
Curcuma 121
Curucui 471
Curvirostra 405
Cuscuta 143
Cyane 245
Cyanit 68
Cyanoïdes 68
Cyanus 62
Cycas 268
Cyclamen 147
Cyclas 333
Cyclopen-Trichterfische 359
Cyclopterus 354
Cynara 238
Cynips 309
Cynoglossum 145
Cynosurus 132
Cypergras 128
Cyperus 128
Cypraea 335
Cypresse 260
— falsche 239
Cyprinus 366
Cypripedium 248
Cytisus 227
Dachs 437
Dachschilf 134
Dactylis 131
Dactylolithus 80
Dactylus 18
Dämmerungsfalter 317
Damhirsch 455
Daphne 178
Dasyprocta 458
Dasypus 465
Dasyurus 464
Datholith 80
Dattelbohrmuschel 334
Dattelpalme 264
Dattelpflaumenbaum 272
Datura 153
Daucus 164
Decagynia 189
Decandria 182
Deleterion 81
Delphin 447
Delphinium Consolida 206
Delphinus 447
Demant 50
Demantspath 51
Dentalium 292
Diadelphia 225
Diandria 121
Dianenohr 337
Dianthus 187
Dichroit 55
Dichrus 55
Dickhäuter 448
Dickschnabel 407
Dicotyles 452
Dictamnus 182
Didelphis 464
Didynamia 214
Digitalis 216
Digitigrada 438
Digynia 120
Dill 163
Dinkelkorn 136
Dintenbeere 122
Diodon 353
Dioecia 261
Diomedea 424
Diopsid 56
Dioscorea 267
Diospyrus 272
Dipsacus 139
Diptam 182
Diptera 322
Distel 238
Distelfinkchen 318
Dodecandria 190
Dodecagynia 192
Dohle 398
Doldenpflanzen 162
Dolium 339
Dolomit 76
Dolomitkalk, dichter 19 u. 77

Digitized by Google

Dompfaff 406
Donax 333
Doppelspath 75
Doppler 286
Dornendreher 405
Dorngrundel 364
Dornsau 360
Dorsch 356
Dotterweide 262
Dracaena 174
Drachenbaum 174
Drachenkopf 360
Dragun 240
Drathwurm 300
Dreieckmuschel 333
Dreifaltigkeitsblümchen 176
Dromedar 455
Drosera 168
Drosseln 403
Dryade 200
Dryas 200
Dryophis 471
Dünnschnäbler 396
Dürle oder Dürlitzenbaum 138 u. 139
Dürrwurz 241
Dysodes 76
Dytiscus 300
Ebenbaum 269
Ebenholzbaum 272
Ebereschenbaum 197
Eberwurzel 239
Ebschbeerbaum 197
Echeneis 358
Echidna 467
Echinodermata 287
Echinops 246
Echinus 288
Echinus 19
Echium 146
Edeleiche 254
Edelesche 122 u. 270
Edelhartsteine 50
Edelhirsch 455
Edelkorallen 285
Edeltanne 259
Edelweis 241
Edentata 464
Egeran 56
Ehrenpreis 121
Eibenbaum 269
Eibisch 223
Eiche 254
Eichenwickler 321
Eichhorn 459
— fliegendes 460
Eichhörnchenäffchen 431
Eidechse, die eigentliche 387
Eidechsen 386
Eidergans 424
Einbeere 179
Eingeweidewürmer 289
Eisbär 437
Eisen 95
Eisenblüthe 77
Eisenerde 98
Eisenerz 98
Eisenglanz 97
Eisenhütchen 206
Eisenkiesel 58
Eisenkraut 124
Eisenniere 98
Eisenopal 65
Eisenoxyd 97
Eisenpecherz 98
Eisensandstein 28
Eisensinter 98
Eisvogel 395
Elater 300
Elennhirsch 455
Elephant 450
Elephantenknochen aus dem Boden in kalten Ländern ausgegraben 8
Elephas 450
Elephas junbatus 10
Ellritze 368
Elster 399
Elymus 134
Emberiza 407
Emya 377
Endivien-Salat 237
Enneandria 180
Ente 424
Entengrün 121
Entenmuschel 329
Entozoa 289
Entstehung der meisten festen Erdoberfläche aus u. durch Wasser 11
Enzian 159
Ephemera 306
Epheu 156
Ephyra 286
Epidendron 248
Epilobium 178
Equisetum 272
Equus 452
Erbse 229
Erbsenstein 75
Erdbeerbaum 186
Erdbeere 200
Erdbeerspinat 120
Erdbirne 247
Erde 1
Erdeichel 230
Erdfloh 302
Erdharz 86
Erdkobalt 103
Erdmandel 128
Erdöl 86
Erdpech 86
Erdrauch 225
Erdscheibe 147
Erdschnecken 342
Erdschwein 466
Erebus 321
Erica 178
Erigeron 242
Erinaceus 435
Eriophorum 128
Erle 252
Ervenwürgerkraut 217
Ervum Lens 229
Erysimum 221
Erythrinus 365
Esche, rundblättrige 270
Esel 452
Esox 370
Esparsette 229
Espe 267
Estragon 240

Digitized by Google

Eugenia 195
Eulabes 401
Eulchen 320
Eulen 392
Eumenes 311
Eupatorium 239
Eupetalos 63
Euphorbia 192
Euphorbium-harz 192
Euphrasia 216
Euryala 288
Evonymus 156
Exocoetus 364
Fackeldisteln 194
Fadenqualle 286
Färberginster 226
Färberröthe 141
Färberscharte 237
Färberwaid 220
Fäßchenbeere 197
Fagus 255
Fahlerz 95
Falco 390
Falken 390
Fallkraut 243
Farnkräuter 273
Farnkraut-männlein 273
Fasanen 416
Faserkiesel 68
Faserzeolith 66
Faßschnecke 339
Faulbaum 155
Faulthier 464
Federmotte 321
Federnelke 187
Federrübe 221
Federweiß 73
Fedia 127
Feigbohne 228
Feigenbaum 263
Feige, indianische 195
Feldahorn 271
Feldchamille 244
Feldgrylle 304
Feldmajoran 211
Feldmohn, gemeiner 202
Feldrüster 161
Feldspath 61
Felis 440
Felsenhahn 411
Fenchel 163
Fenchelholz 181
Fensterspinne 326
Fernambukbaum 182
Ferae 434
Ferrum 95
Festuca 132
Fettkraut 124
Fettrübe 221
Feuerkröte 375
Feuerschwamm 274
Feuerstein 59
Fibrolith 68
Fichte 259
Fichtenkäfer 301
Fichtenspargel 184
Ficus 263
Fieberklee 148
Fieberrindenbaum 150
Filaria 290
Filices 273
Filipendel 198
Filzkraut 143
Fingerhut 216
Fingerkraut 200
Fink 407
Finkmeise 411
Fische 344
Fisch, kletternder 361
Fischaugenstein 66
Fischotter 443
Fissurella 341
Flachs 167
— neuseeländischer 172
Flachsseide 143
Flamingo 420
Flaschenbaum 209
Flatterrüster 162
Flechten 275
Fleckenkukuk 247
Fledermaus 432
Fledermausarten 432
Fledermausfisch 353
Fledermausschnecke 337
Fleischblume 189
Fleischfliege 323
Flieder 122
Fliederspanner 321
Fliege, eigentliche 323
Fliege, spanische 300
Fliegen 322
Fliegenschwamm 274
Flitterchen 131
Floh 325
Flohkraut 242
Florfliege 306
Flötzgebirge 16
Flötzgyps 19 u. 31
Flötzkalkstein 18
Flötzsandstein 17
— rother 27
Flötztrappgebirge 19
Flossenfußfisch 366
Flüevogel 402
Flügelfüßler 342
Flügelschnecke 337
Flügelschote 231
Flugbeutler 464
Flußbarsch 362
Flußkalke 78
Flußpferd 448
Flußschildkröte 377
Flußschwein 458
Flußschwimmschnecke 340
Flußspath 79
Föhre 258
Forelle 369
Forficula 303
Formica 313
Fossilia terrena 49
Fossilien 49 70 u. 85
Fragaria vesca 200

Digitized by Google

Frauneis 80
Frauenfisch 368
Frauenflachs 216
Frauenglas 69
Frauenhaar, goldnes 275
Frauenmantel 142
Frauenschuh 248
Fraxinella 182
Fraxinus excelsior 122 u. 270
Fregattvogel 424
Freselmehlkraut 275
Frettel 443
Fringilla 407
Fritillaria 171
Frosch 376
Froschfisch 353
Froschlöffel 176
Frühlingsfliegen 306
Frühlings-Walderbse 230
Frühlingsweiß 169
Fuchs 438
Fucus 273
Fulgora 315
Fulica 422
Fumaria 225
Futterwicke 229
Gabelgeier 391
Gadus 356
Gänseblümchen 121
Gänseblume, gelbe 200
Gänsedistel 236
Gänsekohl 236
Gärsche 166
Gaisblatt 152
Gaisklee 227
Galactodendron 161
Galanthus nivalis 169
Galeopithecus 431
Galeopsis 213
Galium 140
Galmey 100
Gallenkraut 123
Gallwespe 309
Gamander 211
Ganggebirge 12
Gans 424
Gansheil 148
Gareis 368
Gartenaster 242
Garten-Ammer 407
Garten-Balsamine 159
Gartenfuchsschwanz 252
Gartengrasmücke 410
Garten-Hyazinte 173
Gartenkresse 218
Gartenmohn 202
Gartennelke 187
Gartenraute 185
Garten-Reseda 192
Gartenrhabarber 181
Gartensalat 234
Gartenschierling 164
Gartenschnecke 341
Gartenwicke 231
Gasterosteus 360
Gastrobranchus 347
Gastrus 322
Gauchheil 148
Gebirge 21
Gegenden, wo die Flötzgebirge vorkommen 27
— wo die Flötztrappgebirge vorkommen 31
— wo die Urgebirgsarten vorkommen 25
—, wo aufgeschwemmtes Land vorkommt 32
Geier 389
Geißbart-Staude 198
Geißfuß 166
Geistchen 321
Gelberde 71
Gemse 456
Gemswurzel, römische 243
Gengling 368
Genista 226
Gentiana 159
Geotrupes 296
Geradflügler 303
Geranien 223
Geranium 223
Gerbwurzel 200
Gerste 135
Gestellstein 14
Getreidemotte 322
Geum 200
Gewürznägeleinbaum 195
Gewürznelken-Sommerwurz 217
Gibbon 430
Gichtrose 205
Gießkanne 334
Giftbarsch 363
Giftlattig 234
Gilbvogel 400
Gimpel 406
—, geselliger 407
Giraffe 456
Gladiolus 127
Glanzfasan 418
Glanzgras 131
Glanzkohle 89
Glanzschmeele 130
Glarea 21
Glaserz 92
Glasschmalz 120
Glasschwärmer 318
Glattroche 351
Glaucochalcos 102
Glechoma 214
Glimmer 69
Glimmerschiefer 14
Glires 457
Globularia 138
Glockenblume 207
Glockenblumenarten, die eigentlichen 150
Gluthvogel 400
Glycyrrhiza glabra 229
Gnadenkraut 123
Gnaphalium 240

Digitized by Google

Gneuß 13
Gobius 359
Göse 368
Gold 89
Goldadler 391
Gold-Ammer 407
Gold-Aschkraut 242
Goldblattbaum 151
Goldfasan 416
Goldhähnchen 410
Gold-Laufkäfer 299
Goldkäfer 297
Goldkarpfe 368
Goldklee 231
Goldregen 227
Goldruthe 241
Goldstein 54
Goldweide 262
Goldwespe 309
Goldwurm 292
Goliathkäfer 298
Goliathus 298
Gonium pectorale 281
Gorgonia 283
Gorgonien 283
Gorgonocephalus 288
Gossypium 224
Gracula 400
Grätenfische 354
Grallae 420
Grammatias 61
Grammatit 67
Granat 53 u. 54
Granatapfelbaum 196
Granit 13
Graphit 88
Graphitis 88
Grasmücke 408
Gratiola 123
Graubraunsteinerz 102
Grau-Spiesglanzerz 101
Grauwacke 16
Grenadilla 223
Gretchen im Busch 207
Grindkraut 139
Gropp 361
Groppe 357
Groß-Klauenthier 9
Großkopf 370
Grubenotter 382
Grübling 250
Gründling 368
Grünling 406
Grünerde 16 u. 72
Grünstein 20
Grünsandstein 28
Grus 421
Grylle 304
Gryllotalpa vulgaris 304
Guajacbaum 182
Guajacum 182
Günsel 213
Gürtelthier 465
Güster 368
Gulo 437
Gummi, arabisches 271
Gummi arabicum 271
Gummifeigenbaum 264
Gummi-Tragant 231
Gundermännlein 214
Gundelrebe 214
Gurke 261
Gurkenkräutig 146
Guttabaum 271
Gymnarchus 371
Gymnetrus 358
Gymnospermia 210
Gymnotus 354
Gynandria 246
Gypaëtus 390
Gypse 79 u. 80
Gypsa 79
Gypsum stratarium 19
Haarstrang 163
Haberdistel 237
Habicht 391
Habichts-Bitterkraut 235
Habichtskraut 236
Haemanthrax 53
Haematopus 421
Haematoxylon 183
Händleinkukuk 247
Hängeweide 262
Häring 365
Häßling 368
Hafer 132
Haft, das 306
Haftdolden 164
Hagenbuche 255
Hagebutte 199
Hahnenfuß 209
Hahnenkammblume, gelbe 215
Hahnenkammklee 229
Haideginster 226
Haidekorn 179
Haidekraut 178
Haifisch 349
Hainbuche 255
Haje 383
Halbaffe 431
Halbdeckflügler 314
Halbesel 452
Halbgaul 175
Halbopal 65
Haliotis 341
Hallithartige Steine 83
Halmaturus 463
Haloidei 83
Halsflosser 356
Haltica 302
Hammerfisch 350
Hamster 458
Handbaum 224
Handflughäuter 432
Hanf 265
Hanfnessel 213
Harfe 339
Harpa 339
Hartheu 232
Hartriegel 139
Hartsteine 55
Hase 461
Hasel 368
Haselnußstrauch 256

Digitized by Google

Haselwurm 386
Haselwurz 191
Hasenöhrchen 166
Hasensalat 236
Haubenlerche 402
Hauhechel 228
Hausen 352
Hausgrylle 304
Hauslaub 192
Hausschwalbe 412
Hausperling 408
Haustier 456
Haustaube 413
Hauswurz 192
Hecht 370
Heckenbuche 255
Heckenrose 199
Heckenweißling 317
Heckſamenſtrauch 226
Hector 316
Hedera Helix 156
Hedysarum 229
Heerwurmſchnake 324
Heidelbeere 177
Heidelerche 402
Heiligenbutte 358
Heilkraut 162
Heimchen 30
Heinrich, der gute 161
Helianthus 244
Heliotrop 60
Helix 341
Helleborus 209
Helmert 247
Helmkraut 214
Helmſchnecke 339
Helvin 55
Hemerobius Perla 306
Hemionus 452
Hemiprocnes 412
Hemiptera 314
Hepatica 208
Hepialus 318
Heptandria 176
Heracleum 162
Herbſtlöwenzahn 235
Herbſtzeitloſe 175
Hermelinchen 442
Herpestes 442
Herzmuſchel 333
Heuſchrecke 304 u. 305
Hexandria 168
Hexenkraut 125
Hieracium 236
Hiften 199
Himantopus 421
Himbeerſtaude 200
Himmelsſchlüſſelchen 147
Hippocrepis commosa 230
Hippomane 261
Hippophaë 265
Hippopotamus 448
Hippuris 119
Hirnblaſenwurm 289
Hirnkoralle 285
Hirſchgeſchlecht 455
Hirſchkäfer 298
Hirſchwurzel, weiße 164
Hirſchzunge 140
Hirſe 133
Hirſegras 131
Hirtentäſchlein 219
Hirudo 291
Hirundo 412
Hockoe 417
Höhe, bis zu welcher der Menſch hinauf geſtiegen iſt 2
Höhlen unter der Erde 2 u. 3
Höhlenbär 437
Höhleneule 392
Höhlenfiſch 364
Höhlenſalamander 374
Hörnerſchwamm 275
Hoa-hya 161
Hohlſpath 64
Hohlwurz 225
Hohlzahn 213
Holcus 131
Hollunder, türkiſcher 122
Holosteum 137
Holzbock 325
Holzkäfer, großer 302
Holzkohle, mineraliſche 89
Holzopal 65
Holzſtein 58
Honiggras 131
Honigvogel 397
Hopfen 266
Hopfenhainbuche 256
Hopfenſchwärmer 318
Hordeum 135
Hornbaumkorallen 283
Hornblende 15 u. 67
Hornblende-Fels, der gemeine 15
Hornblendeſchiefer 67
Hornbuche 256
Hornerz 92
Hornfiſch 370
Hornſtein 58
Hortenſia 187
Hottonia 149
Huche 369
Hühnerarten 413
Hühnerdarm 188
Hühnerfußgras 131
Hühnergeier 391
Hülſenfrüchte 225
Hufeiſennaſe 434
Huflattig 240
Huhn 415
Hulſtbaum 144
Hummer 327
Humulus 266

Digitized by Google

Hund 438
—, der fliegende 432
Hundsbeerenstrauch 139
Hunds-Petersilie 164
Hundszunge 145
Hura 260
Hurchen 369
Hutaffe 430
Hyaena 439
Hyäne 439
Hyalit 65
Hyacinthus 173
Hyazinth 52
Hyazinthe 173
Hydnum 274
Hydra 282
Hydrachoerus 458
Hydrangea 187
Hydrargyrus 93
Hydrophilus 300
Hydrus 384
Hyla 376
Hyoscyamus 152
Hyoseris 235
Hypericum 232
Hypochthon 374
Hyssopus 212
Hystrix 457
Jabiru 421
Jalapenwinde 149
Jasione 158
Jasmin, wilder 195
—, ächter 123
Jasminum 123
Jaspis 60
Jaspis 60
Jatropha 256
Ibis 422
Ibis 422
Icarusfalter 317
Ichneumon 309
Ichneumon 442
Ichthiophthalm 66
Icosandria 193
Je länger je lieber 152
Jerichorose 219
Igel 435
Igelskolbe 250
Iguana 388
Ilex 144
Flanken 369
Iltis 442
Immenwolf 396
Immergrün 159
Immortelle 241
Impatiens noli me tangere 159
— balsamina 159
Indigopflanze 230
Indigofera 230
Infusionsthiere 281
Ingwer 120
— deutscher 253
Insecta 293
Insekten 293
—, bienen- u. wespenartige 308
—, ungeflügelte 324
Insektenfresser 434
Insectivora 434
Inula 242
Inuus ecaudatus 430
Johannisbeere 156
Johannisblume 243
Johannisbrodbaum 266
Johanniskraut 198
Johanniskraut 232
Johanniswedel 198
Johanniswürmchen 300
Jolith 55
Jonia electrica 55
Josephsstekt 170
Iris 127
Isatis tinctoria 220
Isis nobilis 285
Judenkirsche 154
Juglans regia 254
Jugulares 356
Juncus 174
Jungfer im Gras 207
Juniperus 268
Juwelenkäfer 301
Juwelenschlange 470
Ixodes 325
Lynx 394
Kabeljau 356
Käfer 296
Käferschnecken 341
Kälberkern 165
Kälberkropf 165
Känguruh 463
Käseblume 243
Kaffeebaum 150
Kaffeewicke 230
Kahlbäuche 354
Kaiman 387
Kaiserfisch 355
Kaiserkrone 171
Kaiserschlange 384
Kalamit 67
Kali 72 u. 84
Kalke, kohlensaure 74
Kalkgattungen, boraxsaure 80
Kalkspath 16 u. 74
Kalksteine 74 u. 75
Kalksinter 75
Kalktuff 75
Kalmar 343
Kameel 454
Kammgras 132
Kammmuschel 331
Kampfhahn 422
Kamtschatkalilie 171
Kantenschnäbler 395
Karausche 368
Karinthin 67
Karpfen 366
Karpholith 74
Kartoffel 154
Karyophyllata 200
Kaschelot 446
Kastanienbaum 255
Katze 440
Katzengeschlecht 440

Digitized by Google

Katzenauge 58
Katzenkraut 212
Katzenmünze 212
Katzenpfötchen 240
Katzensilber 69
Katzenwurzel 126
Kaulbarsch 363
Kaulkopf 361
Kegelschnecke 335
Kehlflosser 356
Keller-Assel 328
Kellereisel 328
Kellerhals 178
Kermesbeere 189
Kernbeißer 406
Kettenbandwurm 290
Keuper 28
Kiebitz 422
Kiefer 258
Kieferwurm 349
Kies 21
Kieselschiefer 58
Kieselsteine 57
Kindleswehrose 205
Kinkhorn 339
Kirschenbaum 196
Klaffmuschel 333
Klaffenblume 215
Klapperschlange 381
Klappgrasmücke 410
Klebkraut 141
Klebschiefer 71
Klee 232
Kleiber 411
Kleidermotte 322
Kleinding od. Kleinling 141
Klette 238
Klettenkerbel 166
Klettervögel 392
Klimmenstaude 142
Klingstein 20
Klippen-Seeigel 277
Klippfisch 356 u. 362
Knabenkraut 246
Knallbüchsenbaum 260
Knauelgras 131
Knoblauch 170
Knochenfische 354
Knollenopal 65
Knopfgras 128
Knopfsimse 174
Knorpelfische 347
Knorpelsalat, kahler 237
Knurrhahn 361
Kobaltmetall 102
Kochsalz 83
Königsgeier 390
Königskerze 152
Körbelkraut 164
Kofferfisch 353
Kohl 221
Kohlenblende 89
Kohlmeise 411
Kohlrabi 222
Kohlraupenschlupfwespe 310
Kohlweisling 317
Kokardenschwamm 274
Kokkolith 56
Kolbenschwärmer 318
Kolophonit 54
Kolkrabe 398
Kopffüßler 342
Korkrüster 161
Korkschwamm 283
Korn 135
Kornblume, blaue 245
— rothe 189
Korndieb-Trupial 400
Kornwurm, weißer 322
—, rother 302
Krähenartige Vögel 397
Kräuselschnecke 340
Krammetsvogel 404
Kranich 421
Kranzblasenqualle 287
Kratzdistel 238
Krausemünze 211
Krautgartenkaffee 230
Krebs 327
Kreide 77
Kreidekalk 31
Kreismuschel 333
Kreßling 368
Kreuzblume 225
Kreuzdorn 156
Kreuz-Enzian 160
Kreuzkraut 241
Kreuzschnabel 405
Kreuzspinne 326
Kreuzstein 66
Kriebelmücke 323
Kröte 375
Krötenfisch 354
Krötenkraut 214
Krokodil 386
Kroneneichel 329
Kronentaube 414
Kronenwalze 336
Krünitz 405
Krummhals 145
Kruper 371
Krustenthiere 327
Kryolith 83
Küchenkohl 221
Küchenschellen 208
Küchleins-Hollunder 167
Kühblume 235
Kühling 369
Kühling 368
Kümmel 165
Kürbis 261

Digitized by Google

Kugelblume 138
Kugeldistel 246
Kugelschwämme 274
Kugelthierchen 281
Kuhbaum 161
Kuhweizen 216
Kukuk 394
Kukuk, weißer 247
Kukuksblume 189 u. 246
Kunold 210
Kupfer 93
Kupferkies 94
Kupferglanz 94
Kupferlinsenerz 95
Kupferglimmer 95
Kupfermalachit 95
Kupfergrün 95
Kupferlasur 95
Kupferschiefer 76
Kurkumewurzel 121
Laberdan 356
Labetrunkstrauch 206
Labkraut 140
Labradorstein 61
Labrus 363
Lacerta 387
Lacertae 386
Lachmöve 423
Lachs 368
Lachsforelle 369
Lachtaube 413
Lackmusschildflechte 275
Lactuca 234
Lämmergeier 390
Läuchelhederich 221
Lagomys 461
Lama 455
Lamia 302
Lamium 213
Lamprete 349
Lampyris 300
Land, aufgeschwemmtes 20
Landsalamander 373
Landschildkröten 377
Langhalsjungfer 307
Langhornkäfer 302
Lanius 404
Lanzettträger 362
Lapsana 235
Larus 423
Laserkraut 164
Laserpitium 164
Lasionit 63
Lasurstein 62
Laternenträger 315
Lathraea 215
Lathyrus 230
Lauben 368
Laubfrosch 376
Laubmoose 275
Laugenkraut 243
Laumontit 67
Laurus 180
Laus 324
Läusekraut 215
Lava 5
Lavandula 211
Lavendel 211
Lazarusklappe 331
Lazulith 63
Lebensbaum 259
Leberblümchen 208
Leberblume, weiße 167
Lecythis 203
Ledum 185
Leguan 388
Leguminosa 225
Lehmenlager 21
Lehmen 70
Leilus 316
Leinkraut 152 u. 216
Lema 302
Lemna 121
Lemur 431
Leng 356
Leontodon 235
Lepas 329
Lepidium 218
Lepidolith 69
Lepidoptera 316
Lepidosiren 371
Lepus 461
Lerche 402
Lerchenbaum 259
Letten 71
Leuchtstein 81
Leucochrysos 89
Leucoium 169
Leuzit 62
Levkoi 221
Liassandstein 28
Libellulae 305
Lichenes 275
Lichtnelke 189
Liebesapfel 155
Lieschgras 130
Lievrit 98
Ligusterstrauch 122
Ligustrum 122
Lilie, weiße 170
Lilienkäfer 302
Lilium 170
Limax 342
Limnaea 341
Linaria 216
Lincurium Hyacinthus 52
Lindenbaum 202
Linnen 208
Linse 229
Linum 167
Lippfisch 363
Lippia 217
Liriodendron 209
Lithanthrax 86
Lithionglimmer 69
Lithophytha 284
Lithospermum 145
Lochmuscheln 19 u. 330
Lockenfüßler 328
Locusta 304
Löcherschwämme 274
Löffelkraut 218

Digitized by Google

Löffelreiher 420
Löwe 440
Löwenmaul 216
Löwenzahn 235
Lolch 136
Loligo 343
Lolium temulentum 136
Lonicera 152
Lophius 353
Lophophorus 418
Lophyrus 310
Lorbeerbaum 180
Lorbeerweide 262
Lotus 231
Loxia 406
Lucanus 298
Luftballonfledermaus 433
Luftblume 248
Lumbricus 291
Lump 354
Lungenkraut 145
Lupinus 228
Lutra 443
Luzerne 232
Lychnis 52 u. 189
Lychnites 16
Lycochalcos 105
Lycoperdon 274
Lycopodium 275
Lycopsis 145
Lycopus 124
Lysimachia 148
Lythrum 192
Lytta 301
Maasliebchen 243
Macropus 463
Madia 241
Madrepora 284
Mänakmetall 105
Märzenblümchen 169
Magnesia 77
Magnesites 73
Magneteisenstein 97
Magnetkies 97
Magot 430
Mahagonybaum 183
Maienbaum 255
Maikäfer 297
Maiwurm 301
Mais 250
Maisdieb 400
Majoran 211
Maki 431
Makrele 360
Malacopterygii 354
Malermuschel 333
Malthe 353
Malva 224
Malven 224
Mammalia 426
Mammea 204
Mammeibaum 204
Mammuths-Elephant 10
Manakin 411
Manati 447
Manatus 447
Mancinellenbaum 261
Mandelbaum 196
Mandelkrähe 399
Mandelstein, rother 16
—, schwärzlicher 20
Mangifera 151
Manglebaum 190
Mangobaum 151
Maniocstrauch 256
Manis 465
Mannagras 132
Manna-Tamariske 166
Mannsbart, alter 208
Mantis 303
Marabu 421
Marder 442
Marga 78
Margaris 64
Margarit 69
Marienglas 69
Marmor 75
—, weiser 16 u. 75
Marrubium 214
Marsupialia 462
Marum verum 212
Maskenwanze 315
Mastixbaum 263
Mastkraut 143
Mastodon 9
Mastodon ohioticum 9
Matricaria 244
Mauerklette 397
Mauerpfeffer 188
Mauerwespe 311
Maulbeerbaum 251
Maulwurf 435
Maulwurfsgrylle 304
Maus 460
Mauseöhrlein 236
Mäusefalk 391
Mayenblümchen 173
—glöckchen 173
Medicago 232
Medinawurm 290
Medusa 286
Meduse 286
Medusenhaupt 289
— stern 288
Meeresabnahme 7
Meeräsche 370
Meeralant 370
Meereichel 328
Meeresgrund 6 u. 7
Meergrundel 359
Meerjunker 363
Meerkatzenaffe 430
Meerkohl 220
Meernabel 340
Meernadel 353
Meernesseln 285
Meerpalme 289
Meerrettig 218
Meerschaum 73
Meerschnabel 340

Digitized by Google

Meerschweinchen 457
Meerscorpion 360
Meerwachtel 364
Meerwolf 355
Meerzähnchen 292
Meerzwiebel 171
Megalonyx 9
Megatherium 9
Mehlfäßchen 197
Mehlkäfer 300
Mehlwurm 300
Meisen 411
Melaleuca Cajeput 233
Melampyrum 216
Melanit 54
Meleagris 416
Meles 437
Melia 184
Melica nutans 132
Melichloros 56
Melilotus 231
Melipona 313
Melissa 211
Melisse 211
Meloë 301
Melolontha 297
Melonenbaum 268
Melonencacten 194
Melonenqualle 286
Menelaus 316
Menilit 65
Mensch, der 467
Menschenfresser 350
Mentha 211
Menyanthes 148
Mephitis 443
Mercurialis 267
Mergel 78
Mergelsandstein 28
Mergelschiefer 76
Merops Apiaster 396
Messerscheidenmuschel 334
Messing 94
Mespilus 197
Metalla 89
— nobilia od. virginea 93
Metalle 89
—, edle 93
Miesmuschel 332
Milan, rother 391
Milbe 326
Milchbaum 161
Milium 131
Millepora 284
Milleporen 284
Mimosa 271
Mimose 271
Mineralalkali 84
Mineralogie 33
Mino 401
Mirabilis 150
Mispickel 103
Mispelblüthe 197
Mistel 264
Mistkäfer, kleiner 297
Mistler 404
Mitra 336
Mocchastein 59
Möhre 164
Möhringia 179
Moehringia 179
Mönch 409
Möve 423
Mohn 201
Molch 373
Mollusca 329
Mollusken 329
Molybdänmetall 105
Molybdaenium 105
Monadelphia 222
Monandria 119
Monas 281
Mondfisch 353
Mondhornkäfer 296
Mondschnecke 340
Monodon 447
Monoecia 249
Monogynia 119
Monotropa 184
Montes primitivi 13
— transitorii 16
— stratarii 16
— salini 19
Montia 128
Moos, Isländisches 275
Moosbeere 178
Moraltschneehuhn 414
Morgeln 274
Mormon 425
Morus 251
Mosehus 455
Moschushirsch 455
Mosquito 324
Motacilla 411
Mückenpflanze 248
Mühlsteinfisch 353
Münze 211
Muflon 457
Mugil 370
Mullus 363
Multe 370
Multivalves 328
Multungula 448
Munggen 459
Muraena 355
Murex 338
Muriazit 80
Murmelthier 459
Mus 460
Musa 168
Musca 323
Muschelkalk 29
Muscheln, vielschaalige 328
Muscheln 330
Muscheln, zweischaalige 329
Muscatennußbaum 269
Musci 275
Mustela 442
Mutternelken 195
Mutterwurz 243
Mya 333
Mycetes 431
Mycteria 421
Mygale 435
Myosotis 144
Myoxus 460
Myristica 269

Digitized by Google

Myrmecophaga 465
Myrmeleo 306
Myrmica 314
Myrobalane 188
Myrtenbaum 195
Myrtus 195
Mytilus 332
Myxine 347
Nachtigall 408
Nachtkerze 178
Nachtpfauenauge 319
Nachtrabe 421
Nachtschatten 247
Nachtschwalbe 412
Nachtsilene 188
Nachtvögel 319
Nackthäuter 373
Nadelzeolith 66
Nagelkraut 236
Nagelroche 351
Nagelthiere 457
Nais 292
Naja 383
Napfschnecke 341
Narcissus 170
Nardengras 131
Nardus 129
Narwhal 447
Narzisse 170
Nase 368
Nashorn 449
Nashornkäfer 296
Nashornvogel 399
Nasturtium 219
Natatores 423
Natrolith 66
Natrum 84
Natternkopfblume 146
Nautilus 343
Nebelkrähe 398
Necrophorus 298
Nectarinia 397
Nelkenpfeffer 196
Nelkenwurzel 200
Nelumbium 202
Nepeta 212
Nephrit 61
Nereide 292
Nereis 292
Nerfling 368
Nerita 340
Netzflügler 305
Neunauge 348
Neuntödter 404
Neuroptera 305
Nickelerz 102
Nicotiana 153
Nierenbaum 181
Nieswurz 209
Nigella 207
Nigelle 207
Nilpferd 448
Nisselsalat 126
Nitrolithus 66
Nitrum vulgare 84
Noahsarche 332
Noctua 320
Nonne 320
Notenschnecke 337
Numenius 422
Numida 415
Nußheher 399
Nutzfisch 366
Nycteris 433
Nymphaea 202
Nymphalis Iris 317
Obisium 327
Obsidian 64
Obsidianus 64
Ochra fusca 72
Ochsenzunge 145
Octaëdrit 105
Octandria 177
Octopus 343
Ocymum 213
Ocypoda 327
Odermennich 192
Oelbaum 122
Oelblume 241
Oelkäfer 301
Oenothera 178
Oestrus 322
Ohiothier 9
Ohnblatt 216
Ohreule 392
Ohrwürmchen 303
Olea 122
Olmsthier 9
Oliva 337
Olivenschnecke 337
Olivin 55
Omphalea 250
Omphazit 56
Oniscus 328
Onobrychis 229
Ononis 228
Onopordon 238
Onyx 59
Opal 64
Opal, gemeiner 65
Opaljaspis 65
Ophites 15 u. 68
Ophiura 288
Ophrys 218
Opistocomus 417
Opium 202
Opuntia, gemeine 195
Orangenbaum 205
Orang-Utang 428
Orchis 246
Ordensband 320
Oreostearini 72
Orf 368
Origanum 211
Oriolus 400
Oritis 62
Orleansbaum 204
Ornithogalum 172
Ornythorynchus 467
Orobanche 217
Orobus 230
Orthoptera 303
Ortolan 407
Orycteropus 466
Oryza 175
Ostacanthi 354
Osterluzey 249
Osternachtsrose 220
Ostracion 353
Ostrea 330
Ostrya 256
Otis 418
Otter 383

Digitized by Google

Otternköpflein 336
Ovis 457
Oxalis 189
Pachyderma-ta 448
Paederos 64 u. 65
Paeonia 205
Päonie 205
Pagarozzo 300
Pagurus 328
Palaeotherium 9
Palmenweide 262
Panicum 133
Panorpa 307
Papageien 392
Papageitaucher 425
Papaver 200
Papierasbest 74
Papiergras 128
Papiliones 316
Papilio 316
Papio 430
Pappel 267
Parachrysos 101
Paradiesvögel 399
Paradisea 399
Paris 179
Parmelia 275
Parnassia 167
Parnassia 167
Parnassius 316
Parra Jacana 423
Parus 411
Passiflora 222
Passionsblume 222
Pastinaca 162
Pastinak 162
Patella 341
Pavian 430
Pavo 418
Pecari 452
Pechnelke 189
Pechstein 66
Peckeabaum 207
Pecten maximus 331
Pedicularis 215
Pediculus 324
Pelamys bicolor 384
Pelargonien 223
Pelargonium 223
Pelecansfuß 338
Pelecan 424
Pelecanus 424
Peltschen 231
Pelzmotte 322
Penelope 417
Pennatula 284
Pentacrinus 289
Pentagynia 167
Pentandria 144
Perca 362
Perdix 415
Periklin 61
Periophthalmus 359
Perlenmuschel 333
Perlglimmer 69
Perlenmuttermuschel 331
Perleule 392
Perlgras 132
Perlgyps 80
Perlhuhn 415
Perlmutterfalter 317
Perlstein 64
Persea 181
Petalit 69
Peterfilie 165
Petromyzon 348
Peucedanum officinale 163
Pfaffenhütchen 156
Pfaffenröhrlein 235
Pfau 418
Pfauenauge 317
Pfeffer 125
Pfefferfraß 393
Pfefferkraut 212
Pfeffermünze 211
Pfeifenstrauch 195
Pfeifenthon 71
Pfennigkraut 215
Pferd 452
Pferdeegel 281
Pferdehufklee 230
Pfifferling 274
Pfingstrose 205
Pfirsich 196
Pflanzen, kreuzblüthige 217
Pflanzenreich 106
Pflanzenthiere 283
Pflasterkäfer 300
Pfriemen 226
Pfriemengras 129
Pfundrose 205
Phacochoerus 451
Phaeton 424
Phalaena 321
Phalaenae 319
Phalangista 464
Phalaris 131
Phallus 274
Phascolomys 463
Phaseolus 228
Phasianus 415
Philadelphus 195
Phleum 130
Phoca 444
Phocae 443
Phoenicitis 63
Phoenicopterus 420
Phoenix dactylifera 264
Pholas 334
Phormium 172
Phosphorkalke 78
Phosphorit 78
Phragmites 130
Phryganeae 306
Phyllostoma 433
Physalia 287
Physalis 154
Phyteuma 158
Phytocrene 206
Phytolacca 189
Pica 399
Picris 235
Picus 393
Pieper 402
Pieris 317
Piezata 308
Pilgermuschel 331
Pillenkäfer, großer 297
Pilse 274
Pimelit 72

Digitized by Google

Pimelodus 364
Pimentenbaum 196
Pimpernell 165
Pimpernuß 167
Pimpinella 165
Pinguicula 124
Pinguin 425
Pinit 69
Pinna 332
Pinus 258
Pipa 376
Pipa 376
Pipau 236
Piper 125
Piphuhn 416
Pipra 411
Pirol 400
Pisangfeige 168
Pisces 354
Pistacia 263
Pistazie 263
Pistazit 61
Pisum 229
Pläuerkalk 31
Planorbis 341
Plantago 142
Plantigrada 435
Platalea 420
Platanenbaum 256
Platanus 256
Platinametall 89
Platterbse 230
Plectognathi 352
Pleuronectes 358
Plötze 368
Plumbum 99
Poa fluitans 132
Podiceps 425
Polemonium caeruleum 150
Polierschiefer 71
Poliommatus 317
Polyadelphia 232
Polyandria 201
Polygala 225
Polygamia 269
Polygonum 179
Polygynia 176
Polypen 282
Polypterus 366
Polytrichum 275
Pompadurvogel 405
Pompelmuse 205
Populus 267
Porphyr 15 u. 18
Porphyrschiefer 20
Porphyrites 15 16 u. 18
— piceus 66
Porzellane 335
Porzellanerde 70
Porzellanjaspis 60
Porzellanspath 63
Posthörnchen 341
Potamogeton 144
Potentilla 200
Poterium 252
Pottfisch 446
Prasem 58
Prehnit 56
Prehnites 56
Preiselbeere 177
Prenanthes 236
Pricke 349
Primeln 147
Primula 147
Prionus 302
Pristis 350
Probierstein 58
Procellaria 424
Proteus 374
Proteus 374
Prozessionsraupe 320
Prunella 215
Prunus 196
Psaronius 15
Pseudo-Turcosa 62
Psidium 193
Psittacus 392
Pterocarpus 226
Pterocera 338
Pteromys 460
Pterophorus 321
Pteropus 432
Püppchen 340
Puffbohne 228
Pulex 325
Pulmonaria 145
Pulsatilla 208
Pulsatillen 208
Pumex 66
Pumilio Helvinus 55
Punica 196
Punktthierchen 281
Pupa 340
Purpurazel 400
Purpurschnecke 338
Pyknit 54
Pyralis 321
Pyrola 184
Pyrop 53
Pyropoecilos 13 u. 14
Pyrus 198
Python 384
Quadersandstein 28
Quadrat- od. Sechzehntheil-Thierchen 281
Quagga 452
Qualle 286
Quajak-Harz 182
Quajakholz 182
Quappe 357
Quarz, gemeiner 58
Quassia 183
Quassienbaum 183
Queckengras 136
Quecksilber 93
Quecksilberlebererz 93
Quecksilberhornerz 93
Queisenwurm 289
Quellen 6
Quellenmontie 128
Quendel 210
Quercus 254
Quittenmispel 198
Rabe 398
Rabenkrähe, gemeine 398
Radiata 280
Radieschen 222
Radwanze 315
Räderstein-chen 289

Digitized by Google

Räderthiere 281
Ragwurz 246 u. 247
Rainfarren 244
Rainkohl 235
Raja 350
Rallus Crex 423
Ramphastos 393
Rana Bufo 375
Ranaceae 373
Rana esculenta 376
Rankenfüßler 328
Ranunculus 209
Ranunkeln 209
Rapaces 389
Raphanus 222
Raphidia 307
Rapunzelblume, gelbe 178
Rapunzel, unächte 158
Rapwurzel 158
Raseneisenstein 98
Rasores 413
Ratte 460
Raubthiere, robbenartige 443
Raubvögel 389
Rauchschwalbe 412
Rauchtopas 57
Rauhkopfhäring 366
Rauschgelb 105
Rautenspath 76
Rebhuhn 415
Recken-Faulthier 9
Recurvirostra 421
Reduvius 315
Regenpfeifer 422
Regenwurm 291
Rehbock 455
Reiher 421
Reis 175
Reißblei 88
Renke 370
Rennthier 455
Reseda 192
Rettig 222
Rhätizit 68
Rhamnus 155
Rhea 419
Rhea 419
Rheum 181
Rhinanthus 215
Rhinoceros 449
Rhinolophus 434
Rhizophora 190
Rhododendron 186
Rhynchops 423
Ribes 156
Ricinus 257
Riedgras 250
Riedling 370
Riesen-Faulthier 9
Riesenflügler 337
Riesenkröte 375
Riesenmakrele 360
Riesenmuschel 330
Riesenohr 337
Riesenschildkröte 376
Riesenschlangen 384
Riesenstorch 421
Riesenzwiebel 173
Riet, spanisches 134
Rindsauge 244
Ringelblume 245
Ringelnatter 385
Ringelwürmer 290
Rippenqualle 286
Ritterſporn 206
Ritterſpornchen 320
Robinia 227
Robinienbaum 227
Roche 350
Roggen 135
Roggenstein 76
Rohrdommel 421
Rohrgras 134
Rohrschilf 130
Rollblume 209
Rosa 199
Rose 199
Rosendroſſel 401
Rosenpappel 223
Rosenqualle 286
Rosenquarz 58
Rosinen 158
Rosmarin 124
—, wilder 185
Rosmarinus 124
Roßgras 131
Roßkäfer 296
Roßkastanie 177
Roßpoley 214
Rostellaria 338
Rotang-Calamus 173
Rothauge 368
Rothbart 363
Rothbuche 255
Rotheisenstein 97
Rothfeder 368
Rothgiltigerz 92
Rothhuhn 415
Rothkäppchen 302
Rothkehlchen 410
Rothkupfererz 95
Röthel 98
Rothschwänzchen 410
Rothtanne 259
Rotzkolbe 361
Rubia 141
Rubin 51
Rubis Ballais 52
Rubus 200
Ruchgras 125
Rudbeckia 245
Rudbeckia 245
Rübe, gelbe 164
—, weiße 221
Rübsaamen 221
Rüſſelkäfer 301
Rüſter 161
Ruhrkraut 241
Rumex 175
Ruminantia 453
Rundmaul 348
Ruta 185

Digitized by Google

Rutil 105
Rutte 357
Saamkraut, schwimmendes 144
Saatkrähe 398
Saatspringkäfer 300
Sacharum 153
Sachoinchen 431
Säbelheuschrecke 304
Sägefisch 350
Säugethiere 426
Säugethiere, zahnlückige 464
—, vielhufige 448
Saflor 239
Safran 127
Sagina 143
Sagopalme 268
Sahlith 56
Sajou 431
Salamander 373
Salamandra 373
Salangane 412
Salbey 124
Salbling 369
Saley 247
Salia 83
Salicornia 120
Salix 262
Salm 368
Salmiak 85
Salmo 368
Salpeter 84
Salsola 162
Salvia 124
Salweide 262
Salze 83
Salzkraut 162
Salzthongebirge 19
Sambucus 167
Sanct Petersfisch 361
Sand 21
Sandbeere 186
Sanddorn 265
Sander 362
Sandfliege 323
Sandfloh 325
Sandgerste 134
Sand-Katzenpfötchen 241
Sandläufer 299
Sand-Segge 251
Sandstein 12
Sandstein, bunter 28
Sandwespe 310
Sangdroffel 404
Sanguisorba officinalis 142
Santelbaum 226
Santolina 239
Sapajous 431
Saponaria 187
Sapphir 51
Sarcoramphus 390
Sarda 59
Sardelle 365
Sarder 59
Sardonyx 59
Saffafras 181
Sattelkäfer 300
Satureja 212
Saubohne 228
Sauerampfer 175
Sauerklee 189
Saxifraga 187
Saxum 17
Scabiosa 139 u. 140
Scabiosenkraut 139
Scalaria 340
Scandix 164
Scansores 392
Scapolithus 63
Scarabaeus 296
Schaaf 457
Schaafgarbe 243
Schaafmäulersalat 127
Schaalenthiere 329
Schabe 303
Schachtelhalm 272
Schaftheu 272
Schaitfisch 364
Schakuhuhn 417
Scharfkraut 145
Scharlachibis 422
Scharlachwurm 316
Scharrvögel 413
Schaumgyps 80
Schellfisch 356
Scherbencypresse 239
Scheuchzeria palustris 176
Scheuerkraut 272
Schiefer, lithographischer 18
Schieferspath 75
Schieferthon 69
Schierling 164
Schiffsbohrwurm 334
Schiffsboot 343
Schiffshalter 358
Schildkäfer 302
Schildkraut 214
Schildkröten 376
Schildlaus 315
Schillerfalter 317
Schillerspath 68
Schirmpflanzen 162
Schistus 14 u. 68
Schlafmohn 202
Schlammpeitzger 346
Schlangen 378
Schlangenkraut 253
Schlangenstern 288
Schleie 367
Schleimfisch 357
Schlüsselblümchen 147
Schlupfwespen 309
Schmackedungen 250
Schmalzblume 208
Schmeelen 129 u. 130
Schmerle 364
Schmetterlinge 316

Digitized by Google

Schmetterlingsblumen 226
Schmetterlingswespe 310
Schnabelblasenqualle 287
Schnabelschnecken 338
Schnabelthier 467
Schnarrheuschrecke 305
Schnätser 363
Schnätzer 368
Schnecken 335
Schneckenklee 232
Schneeammer 407
Schneeballenbaum 166
Schneeglöckchen 169
Schneehuhn 414
Schnepfen 422
Schnirkelschnecke 341
Schöllkraut 201
Schönleibkäfer 299
Schoenus 128
Schörl 55
Scholle 358
Schrätser 363
Schroll 363
Schuppenschwamm 274
Schuppenthier 465
Schuppenwurz 215
Schwade 132
Schwämme 274
Schwärmer 317
Schwalben 412
Schwalbenschwanz 316
Schwalbenwurz 160
Schwarzbeere 177
Schwarzeisenstein 102
Schwarzkohle 86
Schwarzkümmel 207
Schwarzplatte 409
Schwarzreuter 369
Schwarzspecht 394
Schwarzwurzel 233
Schwefel 85
Schwefelkies 96
Schweifbeutler 464
Schwein 451
Schweinsbrod 147
Schweinsalat, stinkender 235
Schwerspath 81
Schwerspathsteine 81
Schwertfisch 355
Schwertlilie 127
Schwimmschnecke 340
Schwimmvögel 423
Scilla 171
Scirpus 128
Sciurus 459
Scolopax 422
Scolopender 325
Scolopendra 325
Scomber 360
Scorpaena 360
Scorpio 326
Scorpion 326
Scorpionfliege 307
Scorzonera 233
Scorzonere 233
Scrophularia 217
Scutellaria 214
Secale 135
Sechszehntheil-Thierchen 281
Sedum 188
Seeanemone 287
Seebär 444
Seebarbe 363
Seeboll 354
Seeeinhorn 447
Seefeder 284
Seehahn 361
Seehahn, fliegender 361
Seehase 342
Seehecht 355
Seehund 444
Seeigel 19
Seeigel 288
Seelöwe 444
Seelotus 202
Seeohr 341
Seeotter 443
Seepferdchen 353
Seeraupe 292
Seerüßling 368
Seescheide 335
Seeschwalbe (Fisch) 361
— — 424
Seeschwamm 276
Seestern 288
Seeteufel 353
Seetulpe 328
Seewolf 355
Segelqualle 287
Segge 250
Seidelbast 178
Seidenpflanze 160
Seidenschwanz 405
Seidenspinner 319
Seifenkraut 187
Sellerie 165
Selinum 163
Sempervivum tectorum 192
Senecio 241
Senf 222
Sennesblätterstrauch 182
Sepia 343
Serapias 248
Serpentes 378
Serpentin 15 u. 68
Serpula 292
Serratula 237
Sesam 217
Sesamum 217
Sesia 318
Sesleria 130
Sesleria 130
Sherardia 141
Sichelstorch-Ibis 422

Digitized by Google

Siebenschläfer 460
Siegwurz 127
Sigmarskraut 224
Silber 91
Silberdistel 239
Silberfasan 416
Silbergürtelfisch 358
Silberlachs 369
Silene 188
Silene 188
Silex 57 u. 58
Silge 163
Silicei 49
— duri 55
Silicei duriusculi 64
Siliculosa 218
Siliquosa 220
Silurus 364
Silvanmetall 101
Simia 428
Simiae 427
Simse 174
Simulia 323
Sinapis 222
Singfalke 392
Singmücke 324
Singvögel 401
Sinnpflanze 271
Sirenenfisch 371
Sisymbrium 220
Sitta 411
Skapolith 63
Skolezit 66
Skorodit 98
Smaragd 52
Smaragdus 52
Smectis 71
Smerinthus 318
Smirgel 51
Sodakraut 162
Sohlengänger 435
Solanum 154
Solen 334
Solidago 241
Solidungula 452
Sommerlinde 203
Sommerwurz 217
Sonchus 236
Sonnenblume 244
Sonnenfisch 361
Sonnenkäferlein 302
Sonnenthau 168
Sorbus 197
Sorex 434
Spalax 461
Spaltschnecke 341
Spanner 321
Sparganium 250
Spargel 173
Spargelstein 78
Spartium 226
Spatheisenstein 97
Specht 393
Speckfledermaus 434
Speckstein 72
Speierlingsbaum 197
Speiskobalt 102
Spelzweizen 136
Sperbelblüthe 197
Sperber 391
Sperlingstaube 414
Sperrkraut 150
Sphen 105
Sphex 310
Sphinges 317
Sphinx 317
Sphragis 71
Spick 211
Spielhahn 414
Spierstaude 198
Spiesglanzerz 101
Spiesglanzmetall 101
Spiesglanzocher 101
Spinat 265
Spinacia 265
Spinne 326
Spinell 52
Spinnenophris 248
Spinner 319
Spiräa 198
Spiraea 198
Spitzahorn 271
Spitzmaus 434
Spodumen 69
Spötter 409
Spondias 188
Spondylus 331
Spongia 276
Spornflügler 423
Spottdrossel 403
Springkäfer 300
Springsaame 159
Springwürmer 290
Spritzfisch 362
Sprosser 409
Spürkäfer 299
Spulwürmer 290
Spurre 137
Squalus 349
Staar 402
Stabthierchen 281
Stachelbauch 353
Stachelbeere 156
Stachelflosser 355
Stachelhäuter 287
Stachelsau 360
Stachelschnecke 338
Stachelschwämme 274
Stachelschwein 457
Stachys 214
Stalagmites 271
Stangenstein 54
Staphylea 167
Staurolith 54
Staurolithus 54
Stearochalyx 76
Steatites 72
Stechapfel 153
Stechblattbaum 144
Stechfliege 325
Stechginster 226
Stechmücke 324

Digitized by Google

Steckmuschel 332
Stechroche 351
Steckrübe 221
Steinbrech 187
Steindrossel 404
Steine, kiesliche 49
— talkige 72
— thonige 70
Stein-Bibernell 165
Steineiche 254
Steinhirse 145
Steinkern 284
Steinklee 231
Steinkohle 86
Steinkohlengebirge 19
Steinkohlenporphyr 18
Steinkorallen 284
Steinkraut 218
Steinlerche 402
Steinlinde 203
Steinmarder 442
Steinmark 71
Steinsaame 145
Steinsalz 19
Steinsalzgebirge 19
Steinschmerle 364
Steißfuß 425
Stellaria 188
Stendelwurz 248
Stephanomia 287
Sterlet 352
Sterna 424
Sternapfel 151
Sternblume 242
Sterndolde 164
Sternkoralle 284
Sternkraut 188
—, buntes 141
Sternseher 357
Sternspindel 338
Stibium 101
Stichling 360
Stiefmütterchen 158
Stieglitz 408
Stieleiche 254
Stier 456
Stierkäfer 297
Stilbit 66
Stinkcypresse 259
Stinkhuhn 417
Stinkstein 76
Stinkthier 443
Stint 370
Stockfisch 356
Stör 352
Stomoxys 323
Storaxbaum 183
Storch 420
Storchschnabel 223
Strahlenthierchen 281
Strahlenthiere 280
Strahlstein 67
Strahlzeolith 66
Strandkohl 220
Strandreuter 421
Strata argillacea 21
Stratiotes 268
Strauß 418
Straußfeder-Geißbart 198
Straußgras 129
Straußlattig 240
Strenzel 166
Streusandbaum 260
Strix 392
Strombus 337
Stronthiangeschlecht 82
Strontionitei 82
Struthio 418
Stubenfliege 323
Sturio 352
Sturmhauben-Orchis 247
Sturmvogel 424
Sturnus 402
Stutzkopfhering 365
Stypteriacites 83
Styrax 183
Succinum 87
Sudis 366
Sündfluth 11
Süßholz 229
Sulphur 85
Sumpfaloë 268
Sumpfandorn 124
Sumpfaster 242
Sumpfbeere 178
Sumpfcalla 254
Sumpfhottonia 149
Sumpfläusekraut 215
Sumpfporst 185
Sumpfschnecke 341
Sumpfscheuchzeria 176
Sumpf-Schildkröte 377
Sumpfvögel 420
Sus 451
Swietenia 183
Sycomorusbaum 264
Syenit 15
Sylvia 408
Symphytum 146
Syngenesia 233
Syngnatus 353
Syringa 122
Tabak 153
Tabanus 322
Tabernämontanen 161
Tabernae montana 161
Tachypetes 424
Taenia 290
Tännling 274
Tafelschiefer 14
Tagvögel 316
Talk 72
Talkspath 77
Talpa 435
Tamandua 465
Tamariske 166
Tamarix 166
Tanacetum 244
Tangarten 273
Tanne 258
Tannenwedel 119
Tantalus Ibis 422
Tapir 451

Digitized by Google

Tapirus 451
Tatu 465
Tauben 413
Taubenkropf 187
Taubneſſel 213
Tauſendfuß-baum 190
Tauſendgül-denkraut 159
Tauſendſchön-chen 243
Taxus baccata 269
Taxusbaum 269
Tecochalcos 100
Tectona 217
Teichbinſe 128
Teichcalamus 173
Teichlinſe 121
Teichmuſchel 333
Teichnuß 142
Teichroſe 202
Teichſchnecke 341
Teichſchwan 425
Tellina 333
Tellmuſchel 333
Tellurmetall 101
Tenebrio 300
Tenthredo 310
Tenuirostres 396
Terebratuliten 19
Terebratulithus 19
Terebratula 330
Teredo navalis 334
Termes 307
Termite 307
Terpentin, venetian. 258
Terpentinbaum 263
Testudo 377
Tethyon 335
Tetracera 206
Tetradynamia 217
Tetragonolobus 231
Tetragynia 145
Tetrandria 137
Tetrao 414
Teucrium 211
Teufelsabbiß 140
Teufelsapfel 153
Teufelsfinger 19
Thalictrum 208
Thea 204
Theehollunder 167
Theeſtaude 204
Theiochalix 80
Theioxenos 82
Theobroma Cacao 233
Theriakskraut 126
Thesium 152
Thiere, einhufige 452
—, vielhufige 448
Thiere, robbenartige 443
—, gegliederte 291
—, wiederkäuende 453
Thiere, Spinnenartige 325
Thierfreſſer 434
Thierreich 266
Thlaspi bursa pastoris 219
Thoa urens 206
Thonerde, reine 70
Thonlager 21
Thonporphyr 18
Thonſchiefer 14 u. 68
Thoracici 357
Thuja 259
Thunfiſch 360
Thymian 210
Thymus 210
Tichodroma 397
Tiefe, in welche die tiefſten Bergſchachte hinunter in die Erde reichen 1
Tinktbaum 217
Tiger 441
Tilia 202
Tinea 322
Tintenfiſche 342
Tipula 324
Titanmetall 105
Titanium 105
Todtengräber 298
Todtenkopf 318
Töpferthon 70
Töpferweſpe 310
Tofielda 176
Tollkirſche 154
Topas 54
Topfbaum 203
Tormentilla 200
Tragantſtrauch 231
Tragopogon 234
Trampelthier 454
Trapa 142
Trapp 418
Trauermantel 317
Tremolith 67
Treſpe 133
Triandria 126
Trichecus 444
Trichodes 281
Tridacna 330
Trientalis 176
Trifolium 232
Trigla 361
Triginya 118
Trigonocephalus 382
Tringa 422
Trionyx 378
Tripel 71
Triphan 69
Triticum 136
Tritonshorn 339
Tritonium 339
Trochilus 397
Trochus 340
Trogon 471
Trollius 209
Trompetenbaum 217
Tropaeolum 178
Tropikvogel 424
Trüffeln 274
Trupial 400
Truſche 357
Truthuhn 416
Tucan 393
Tuchkarten 139
Tümmler 447
Tüpfelfarn 273
Türkenbundlilie 171

Digitized by Google

Türkis 62
Tuja 419
Tulipa 171
Tulpe 171
Tulpenbaum 209
Turbo 340
Turdus 403
Turfae 87
Turmalin 55
Turteltaube 413
Tussilago 240
Tutenkalk 75
Twalch 133
Typha 250
Tyrse 378
Uebergangsgebirge 16
Uebergangskalk 16
Ueberreste, verschiedene 10
Uferaas 306
Uferschwalbe 412
Uhle 349
Uiar Sawa 385
Ulex 226
Ulmbaum 161
Ulmus 161
Umber 72
Unke 375
Upupa Epops 396
Uranium 105
Uranmetall 105
Uranoscopus scaber 357
Urgebirge 13
Urgrünstein 15
Urkalk 16
Ursus 436
Urtica 251
Utricularia 124
Vaccinium 177
Valeriana 126
Vampyr 433
Vanessa 317
Vanillenpflanze 248
Variolit 61
Veil 221 u. 228
Veilchen 158
Veilchenwurzel 127
Velella 287
Venus 333
Venusmuschel 333
Verbascum Thapsus 152
Verbena 124
Vergißmeinnicht 144
Verkehrtschnabel 423
Veronica 121
Verwüster 307
Verwüsterameise 314
Vertebrata 343
Vespa 311
Vespertilio 432
Vesuvian 56
Viburnum 166
Vicia Faba 228
Vicunna 455
Viehbremse 322
Vielfraß 437
Vielfraßschnecke 341
Vielfuß 325
Vierling 143
Vinca 159
Viola 158
Vipera 383
Viper 383
Viscum 264
Vitis vinifera 157
Vitriol 85
Viverrae 441
Viverren 441
Vögel 388
—, krähenartige 397
Vogel, sympathetischer 393
Vogelbeerbaum 197
Vogelkirsche, kleine 196
Vogelmeierich 188
Vogelmilch 172
Vogelnestorphrys 248
Vogelsternkraut 188
Voluta 336
Volvox 281
Vultur 389
Wachholder 268
Wachsblume 146
Wachtel 415
Wachtelkönig 423
Wärme in der Tiefe 4
Wacke 20
Waldameise 313
Waldknoblauch 221
Waldmangold 184
Waldmeisterlein 140
Waldnessel 213
Waldrebe 207
Waldstocknessel 214
Waldstroh 141
Waldteufel 431
Walker 297
Walkerde 71
Waller 364
Wallfischaas 342
Wallfischarten 445
Wallfisch, der eigentliche 446
Wallfischeichel 329
Wallnußbaum 254
Wallroß 444
Wallwurz 146 u. 175
Wanderheuschrecke 305
Wanderkrabbe 327
Wandertaube 413
Wandflechte 275
Wanzenknabenkraut 247
Warzenschwein 451
Wasserblei 105
Wasserdosten 240
Wasserfaden 470
Wasserfeder 268
Wasserhauf 239
Wasserhuhn 422
Wasserjungfern 305
Wasserkäfer 300
Wasserkolben 250

Digitized by Google

Wasserliesch 180
Wassersäbler 421
Wassersapphir 55
Wasserschierling 165
Wasserschlängelchen 292
Wasserschlange 384
Wasserschlauchblümchen 124
Wasserstaar 403
Wassersternchen 120
Wasserveiel 149
Wasserwasen 470
Wau 192
Wawellit 63
Weberkarten 139
Weckholder 268
Wegerich 142
Weichfisch 356
Weichflosser 354
Weichsattel 215
Weichsteine, laimige 70
Weichthiere 329
Weide 262
Weidenraupe 320
Weidenschwärmer 318
Weiderich 178
—, gelber 148
Weihe 391
Weiherblatt 144
Weilandthier 9
Weinbergsschnecke 341
Weinhandel, betender 303
Weinraute 185
Weinrose 199
Weinstock 157
Weißbuche 255
Weißdorn 197
Weißdrossel 404
Weißfisch 368
Weißkraut 221
Weißtanne 259
Weizen 136
—, türkischer 250
Wels 364
Welschhuhn 416
Wendehals 394
Wendeltreppe 340
Wermuth 240
Wernerit 63
Werre 304
Wespenglasspinner 318
Wespe, eigentliche 311
Wetterfisch 364
Wetzschiefer 68
Wickler 321
Widderkäfer 302
Widerthonmoos 275
Widerwart, schwarzer 214
Wiedehopf 396
Wiesel 442
Wiesen-Aschblume 242
Wiesenbibernell 142
Wiesenbocksbart 234
Wiesenfuchsschwanz 130
Wiesengoldröschen 209
Wiesenhund 392
Wiesenknopf 142
Wiesen-Lichtnelke 189
Wiesenpieper 402
Wiesenraute 208
Wiesenschaumkraut 220
Wiesenschnake 324
Wiesenscorzonere 234
Wildhühner 414
Winde 149
Windhalm 129
Winselaffe 431
Winterblume 241
Wintergrün 184
Wirbelborsten 215
Wirbelthiere 343
Wirsching 222
Wismuth 100
Witherit 81
Wohlgemuth 211
Wolf 458
Wolframmetall 105
Wolfsfuß 124
Wolfsmilch 192
Wolfsmilchvogel 318
Wollblume 152
Wollenbaum 224
Wollgras 128
Wombat 463
Wucherblume 243
Wunderbaum 257
Wundklee 228
Wüchüchol 435
Würfelerz 98
Würger 404
Würmer 289
Wurmfarren 244
Wurmröhre 292
Wurmsaame 240
Xiphias 355
Yamswurzel 267
Ysop 212
Zärthe 368
Zauken 173
Zaunkönig 410
Zaunlattig 234
Zaunlilie 173
Zaunlilie, grasartige 176
Zaunwicke 229
Zea mays 250
Zebra 452
Zecke 325
Zehengänger 438

Digitized by Google

Zehrwurzel 253
Zeichenschiefer 68
Zeisig 408
Zelima 316
Zellendistel 238
Zeolith 16
Zeus 362
Ziberhkatze 442
Ziege 456
Ziegenbart 275
Ziegenmelker 412
Ziemer 404
Zimmetbaum 180
Zindel 362
Zingel 362
Zink 100
Zinnkraut 272
Zinnober 93
Zinnstein 99
Zirkelmotte 318
Zitteraal 354
Zittergras 131
Zitterpappel 267
Zitterroche 352
Zobel 443
Zoisit 61
Zolfo 82
Zoophyta 283
Zuckerrohr 133
Zuckerschote 229
Zuckerstrauch 217
Zünsler 321
Zürbelnußbaum 258
Zweiflügler 322
Zweizahn 240
Zwergdorsch 357
Zwergragwurz 247
Zwetschgenbaum 196
Zwiebel 170
Zwirnwinde 143
Zygaena 350
Zygaena 318

Digitized by Google

639423

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google